





M





3100 PETRI SALM. DIVERSI  
MEDICI, AC PHILOSOPHI  
FAVENTINI

De Febre pestilenti Tractatus,


E T

Curationes quorundam particularium morborum,  
quorum tractatio ab Ordinarijs Pra-  
cticis non habetur.

ATQVE

*Annotationes in Artem Medicam de medendis humani  
corporis malis à Donato Antonio ab Altomari  
Neap. conditam. .*



BONONIAE;   
Apud Ioannem Rossum. MDLXXXIIII.  
Curia Archiepisc. & S. Inquisit. concessu. - 80

*Handwritten:* *Pharmacopoeia*  
 MEDICI, AC PHILOSOPHI

F A V E N T I N I

De Febre pestilenti Tractatus

E T

Curationes duorumque particularium morborum,  
 quorum tractatus ordinis Pra-  
 cici non habent.

ATQVE

Annotationes in Artium Medicarum de morbis humani  
 corporis multis à Donato Astarco abe alienari  
 & rep. conditum.



B O N O N I A E

Abque Ioanne Rosini. MDLXXIII.  
 Curae Archiepiscopi & Capituli Bononiensis.

A M P L I S S I M O.

AC PERILLOVSTRI

DOMINO.

D. ANNIBALI GRASSIO,

Fauentini Episcopo, & Romandiole,

ac Hexarchatus Rauenar dignis.

Prolegato.



*Petrus Salius Diuersus.*

*S.*



DIGNITAS, & Virtus, ij duo sunt fontes, Antistes Amplissime, quibus potissimum homo hominibus ceteris prestare potest. Dignitas quidem, quoniam auctoritate, quam moderando, coercendo, imperando, regendo, & gubernando exercere potest, supra alios cernitur. Virtus autem, quoniam illustribus animi ornamentis, quæ docendo, monendo, suadendo, dissuadendo, exemploque proprio commonefaciendo demonstrare valet, præ ceteris fulget. Hinc duo hæc orbibus terrarum, tanquam suprema humanarum re-

rum fastigia extollit, animoq; prosequitur, non  
æquè tamen. Dignitates enim admiratur, timet,  
& honorat, at virtutes suspicit, diligit, & venera-  
tur. Qui homo harum alteram adeptus erit, ma-  
gnū quidem splendoris specimē consequutus  
videbitur. sed qui utraq; donatus fuerit, hic om-  
nem, & absolutū gloriæ gradum sibi comparasse  
iudicandus eris, in quo & Dignitas, & Vir-  
tus conueniunt, præstantiam amplissimā, sum-  
mamq; excellentiam consequutus est. Has duas in  
te ipso excellere partes, Reuerendissime Præsul, cō-  
siderans, tuiq; præstantiam admirans, & Dignitatē  
tuā summa, quā potius, semper veneratione co-  
lui, & virtutem impensè, incredibiliterq; amaui, ac  
utranq; in te, tanquam hereditariā familiæ tuæ  
obseruaui, in qua ita Dignitates, & Virtutes clare-  
re, ut per sæcula (non dixerim per annos) ex ea orti  
fuerint alij rerum publicarum moderatores, alij  
ecclesiarum principalium Rectores, alij Episcopa-  
tuum Administratores, alij qui Cardinalatus præ-  
clarissima insignia sint consequuti, alij Doctores  
celeberrimi nati sunt, qui & Bononiæ (quæ tui Pa-  
tria est Nobilissima) & Romæ, & apud exteras na-  
tiones publicè docendo, & priuatim consulendū,  
& in omnibus iustissimè iudicando, monumētisq;  
literarum sua prodendo, semper plurimum value-  
runt; totque hi fuerunt, ut non plures ex equo Tro-

iano

iano duces prodierint, quã ex tua familia Viri præ-  
stantissimi orti sint. in qua mihi iure quasi hæredi-  
tario ita Virtutes, & Dignitates cõsociari videntur,  
vt non mirũ sit, si per sæcula tot agnationis tuæ flo-  
ruerint Clarissimi viri, siq; tu ipse in eadem nunc  
plurimum floreas. qui in studijs non tantũ huma-  
narum rerum, in quibus docendo, consulendo, di-  
sputando, & scribendo admodum profecisti, sed  
etiam diuinarum, in quibus quantum excellas, di-  
cant, qui te concionantem, & docentem Populum  
Fauentinum (vt optimum decet Pastorem) verbũ  
Dei audierint, adeo præstas; vt, cum etiam eccle-  
sias nobiles religiosè rexeris, legationes externas, &  
præcipuè ad Philippum Hispaniarum Regem, & In-  
uictissimũ CAROLI V. Imperatoris filium integer-  
rimè, ac felicissimè obieris, Almæ Urbis Academiã  
prudentissimè moderatus fueris, Episcopatum tan-  
ctè administraueris, Prouinciãq; nostram piè, ac  
iustè gubernes, non minus tamen splendoris tibi  
Virtutes, quàm dignitates attulerint: quas ambas  
in te ipso ego obseruãs, & circũspiciens, præ cæteris  
nihilominus tui fidem, pietatem, charitatem, & in-  
tegritatem animi semper admiratus sum, & sum-  
mòperè probaui. Hinc ego me totum, cum animũ  
candore, & virtutibus exornatum, Virtutemq; ip-  
sam omnibus rebus semper prætulerim, tibi dedidi,  
& studiosè ardentiq; animo, cum hoc ex tua gra-

tia tibi libuerit, inseruiui, studiaq; mea, qualiacūq;  
fuerint, Dignitati, & Virtuti tuæ addixi. Hoc cum  
à me firma lege sancitum fuerit, iure tibi dicanda  
erunt, quæ ex meis studijs ego censeo publicanda  
esse, non profectò, vt consumatos viros hinc docē  
dos existimem, sed vt eos tantum, qui Artis Medi-  
cæ ministerio initiantur, exemplo eorū, quæ à me  
tractantur, cōmonefaciam, quanta cum attentio-  
ne, & sedulitate in Veterum perlegendis scriptis  
versari debeāt. hic enim plura animaduertent, quæ  
Antiquitas, priscaq; illa Medicorū Academia vel  
clarè docuit, vel saltem eorum fundamenta, licet  
obscurè, altius iecit: quæ tamen adeò posteritas ne-  
glexit, vt Tyrones, qui priscorum monumenta di-  
ligenter non perquisierint, hæc nō possint attinge-  
re, cum eorum verā cognitionem aliunde sibi com-  
parare non valeant. Quod cum ob nonnullos à  
nouissimis Medicis omisos, & non declaratos  
morbos magno esse humano generi detrimento  
possit, hinc videant alij, & iudicent, an meo exem-  
plo moniti, qui artē hanc totā ex recentiorum legi-  
bus, & præceptis exercere profitetur, possint aliquā  
languētibus vtilitatem asferre. quæ si multa nō erit,  
minima tamen esse nō potest, cū de salute hominis  
eiusq; vita, quæ tātī estimāda est, vt cū præsens nul-  
lā recipiat estimationē, nec vllō thesauro semel adē-  
pta redimi possit, nihil ei æquandum sit, hic agatur.

in

in cuius gratiam solam hæc à me tradita sunt; non  
profectò, vt ex his honorè, cōmodum uè aliquod  
mihi comparem. illum enim ex tam leui labore nō  
spero: hoc autem nec desidero, qui solam omnium  
utilitatem respiciens sub comuni hominum iudi  
cio hæc prodo. quod licèt nouerim, quàm sit seue  
rum, & periculosum: recta fretus tamen intentio  
ne non diffidam hæc ceteris communicare, potissi  
mum autè cum hoc sub tuo auspicio facturus sim  
qui cum & Virtute, & Dignitate plurimū polléas,  
multum etiam splendoris eis es allaturus, si ea hila  
ri frōre accipies, meumque hoc institutum equi bo  
niq; feceris. hæc autem vnicam partem ego atten  
dēs satis mihi fecisse videbor, si hoc cōsequutus fue  
ro. Accipere igitur digneris libenti animo, quæ no  
mini tuo dicanda, ceteris autem cōmunicanda cen  
seo. & quemadmodum mihi hoc maximè cupio,  
itā tibi omnem felicitatem deprecans, D. Op. Max.  
vt virtutes, & dignitates tuas semper fortunet, &  
augeat, supplicabo. Vale Fauentiae Idibus Martij,  
M D L XXXIII.





AD PETRVM SALIVM DIVERSVM

*Lib. Authorem Origenis Salechij I. V. D.*

*Faentini Carmen.*

**H**uius Petre Sali Diuerse voluminis ergo,  
Audi à nominibus carmina ducta tuis.  
Es PETRA iam gemmas inter numerada priores,  
Petra basis Patriæ, firma columna domus.  
SAL putris medicina mali condire paratum,  
Non nisi Principibus, Cœlitibusq; dapes.  
Incorrupta tuo stat munere gloria nostri  
Temporis, & solido plus adamante viget.  
Namq; aliud nullum DIVERtitur orbe volumen,  
Perq; pari medicas laude, & honore manus;  
Nec tot habet Cœlum stellas, non æquora pisces,  
Quot DIVERsa agris arte leuamen erit.  
Petre Sali Diuerse, PETRAE non more deorsum  
Ire, SACRE datum sed super astra tibi.  
Nescit at aequali tecum se tollere SAL tu;  
DIVERtitq; silens fessa camena pedem.

*In eundem Gregorij Zucculi, Philosophi*

*Faentini.*

**Q**uas homo subrepti pœnas luct amplius ignis,  
lapeti nato decipiente Deos.  
Frustra tuli maciem terris, febriumq; cohortem,  
Irati veni nuncia frustra Iouis.  
En morbos, qui etiam poterant sœuire latentes,  
Quàm facili doceat, curet & arte Petrus:  
Talia Pandora dicente, exclamat Apollo;  
Munere non hæc sunt præmia digna meo.  
Author ego medicinæ, atq; hic Authoris alumnus,  
Vt Peon quondam, Cous & ipse senex.

*Iulij*

**N**Vllius Ars hominis Naturæ iuncta leuabat  
Corpora pestifera febre coacta mori;  
Cum pater omnipotens Cœlo remisit ab alto  
Febribus his medicas, Petre adhibere manus;  
Scis medicas adhibere manus, his febribus vnus,  
Certe qui hac tecum laude nec alter erit.  
Hæc igitur, tanti quæ dant medicamina morbi,  
Sunt cuius Medico scripta ferenda sinu:  
Vnde SALTUS alijs; melior tibi vita paratur,  
Cuius semper erunt gloria, fama, decus.

*Peregrini Caponis Philosophi, ac Med.*

*Bononiæ de Authore.*

**P**Harmaca si miscet pestis, firmissima PETRA est:  
Si numerat causas, nomina, signa SALTUS;  
Doctorum longo voluens examine libros,  
Euertit verus dogmata falsa virum.  
En Petrum, Salium, Diuersum, munera iungunt;  
Est PETRA, euertit, magnus & arte salic.

*In eundem Alex. Gottarelli Ar. & Med.*

*Doct. ex Cast. Bonon.*

**M**ORBORUM occultas vires, febresq; malignas,  
Detegit hoc libro Petrus, & addit opem.  
Vnde hic Italici decus admirabile soli  
Acquauit, Græcos, superat & Latios.

*Camilli Auteti Casenatis ad eundem.*

**E**S PETRE PETRA SALTUS, de qua SALTUS vnda SALUBRIS,  
Corpora pestiferis febribus vnde carent:  
Quicumq; igitur cupiunt lethales pellere morbos,  
Ad fontem properent hunc SALTUS aquæ.

# T. A B V L A T R A C T A T V S

## Febris Pestilentis.



- P**ROH AEMER. M. *Chilleg lioquo* *Fol. 1*  
*In febriam casalogu qua sit pestiles* *10*  
*qua de ea tractanda sunt.* *Ca. 1. fol. 2*  
*De periculo, & difficultate febris pe* *10*  
*stilentis.* *Ca. 2. fol. 3*  
*De communi ratione febris pestilentis.* *Ca. 3. fol. 4*  
*Prava qualitas unde oriam habent, et generentur.* *Ca. 4. fol. 5*  
*Quod dentur pestilentes affectus sine febre.* *Ca. 5. fol. 6*  
*De essentia febris pestilentis.* *Ca. 6. fol. 7*  
*Prava qualitas febris pestilentis an consistat in* *Ca. 7. fol. 8*  
*summa putredine.* *Ca. 7. fol. 8*  
*An in febre pestilenti, vel cordis humiditates, vel* *Ca. 8. fol. 9*  
*hemores utriusdem ventriculis existentes, vel* *Ca. 9. fol. 10*  
*cessario putrescant.* *Ca. 9. fol. 10*  
*De differentiis febris pestilentis a subiecto.* *Ca. 10. fol. 11*  
*De differentiis febris pestilentis a materia putresce* *Ca. 11. fol. 12*  
*te, & a loco, in quo hoc putrescit.* *Ca. 12. fol. 13*  
*De differentiis febris pestilentis a causis.* *Ca. 13. fol. 14*  
*De differentiis febris pestilentis ab intensa, & re-* *Ca. 14. fol. 15*  
*missa, & a coniunctis.* *Ca. 15. fol. 16*  
*De signis futuram febre pestilentem indicatibus.* *Ca. 16. fol. 17*  
*De signis comminibus, & propriis febris pestilentis.* *Ca. 17. fol. 18*  
*De signis febris pestilentis sumptis a qualitate ca-* *Ca. 18. fol. 19*  
*loris.* *Ca. 19. fol. 20*  
*De signis febris pestilentis sumptis a loco.* *Ca. 20. fol. 21*  
*De signis febris pestilentis sumptis a symptomati-* *Ca. 21. fol. 22*  
*bus.* *Ca. 22. fol. 23*  
*De signis febris pestilentis sumptis a supernumerariis* *Ca. 23. fol. 24*  
*affectionibus.* *Ca. 24. fol. 25*  
*De signis praeteritis aut febrem fuisse pestilentem at-* *Ca. 25. fol. 26*  
*testantibus.* *Ca. 26. fol. 27*

-AT

De pra-

*De preservatione à febre pestilenti.* C. 22. 207

*De curatione febris pestilentis, & an in ea sit se-*  
*cunda vena.* C. 22. 207

*An conueniat pharmacia pro minoranda materia*  
*in febre pestilenti.* C. 22. 207

*De concoquentibus, & alterantibus aduocandis*  
*in febre pestilenti.* C. 22. 207

*De curatione exanthematum, & macularum, &*  
*aliarum excretionum, quæ in febre pestilenti*  
*contingunt.* C. 24. 195

*De ratione victus in febre seruanda pestilenti.* C. 25. 210

## TABVLA PARTICULARIVM egrotudinum.

<b>D</b> E cerebri inflammatione.	C. 1. fol. 219
De apoplexia à sanguine.	C. 2. 226
De Epilepsia à sanguine.	C. 4. 235
De syncope cardiaca.	C. 4. 237
De hydropulmonis.	C. 5. 242
De inflammatione membranarum intersepiantiũ, & pericardij.	C. 6. 246
De tæbe ex affectu pericardij.	C. 7. 256
De tumoribus diaphragmatis.	C. 8. 257
De hydropo ex colliguatione.	C. 9. 267
De febribus colliguescentibus ex Galeno.	C. 10. 271
De Hæo.	C. 11. 270
De adstrictione ventriculi.	C. 13. 286
De Cholera sicca.	C. 13. 299
De ea tunc suppressione, in qua non descendit uri- na in vesica.	C. 14. 305
De nigris deiectionibus.	C. 15. 313
De Ischiade à materia biliosa,	C. 16. 316
De Ischia.	

De schiade, & arthritide affecitate.	C. 18. 336
De Rabie.	C. 19. 339
De motu convulsivo.	C. 20. 376
De obstructionibus arteriarum lenium pulmo- nis.	C. 21. 385
De morbis acutis mulierum viro gerentium.	C. 22. 404
De morbis acutis puerperarum.	C. 23. 404
De variatione excrementorum, que in febribus biliosis abstrahuntur.	C. 24. 427
De ratione vitæ in febribus biliosis.	C. 25. 430

# TABLEAU



De febribus biliosis.	C. 26. 430
De febribus biliosis.	C. 27. 430
De febribus biliosis.	C. 28. 430
De febribus biliosis.	C. 29. 430
De febribus biliosis.	C. 30. 430
De febribus biliosis.	C. 31. 430
De febribus biliosis.	C. 32. 430
De febribus biliosis.	C. 33. 430
De febribus biliosis.	C. 34. 430
De febribus biliosis.	C. 35. 430
De febribus biliosis.	C. 36. 430
De febribus biliosis.	C. 37. 430
De febribus biliosis.	C. 38. 430
De febribus biliosis.	C. 39. 430
De febribus biliosis.	C. 40. 430
De febribus biliosis.	C. 41. 430
De febribus biliosis.	C. 42. 430
De febribus biliosis.	C. 43. 430
De febribus biliosis.	C. 44. 430
De febribus biliosis.	C. 45. 430
De febribus biliosis.	C. 46. 430
De febribus biliosis.	C. 47. 430
De febribus biliosis.	C. 48. 430
De febribus biliosis.	C. 49. 430
De febribus biliosis.	C. 50. 430
De febribus biliosis.	C. 51. 430
De febribus biliosis.	C. 52. 430
De febribus biliosis.	C. 53. 430
De febribus biliosis.	C. 54. 430
De febribus biliosis.	C. 55. 430
De febribus biliosis.	C. 56. 430
De febribus biliosis.	C. 57. 430
De febribus biliosis.	C. 58. 430
De febribus biliosis.	C. 59. 430
De febribus biliosis.	C. 60. 430
De febribus biliosis.	C. 61. 430
De febribus biliosis.	C. 62. 430
De febribus biliosis.	C. 63. 430
De febribus biliosis.	C. 64. 430
De febribus biliosis.	C. 65. 430
De febribus biliosis.	C. 66. 430
De febribus biliosis.	C. 67. 430
De febribus biliosis.	C. 68. 430
De febribus biliosis.	C. 69. 430
De febribus biliosis.	C. 70. 430
De febribus biliosis.	C. 71. 430
De febribus biliosis.	C. 72. 430
De febribus biliosis.	C. 73. 430
De febribus biliosis.	C. 74. 430
De febribus biliosis.	C. 75. 430
De febribus biliosis.	C. 76. 430
De febribus biliosis.	C. 77. 430
De febribus biliosis.	C. 78. 430
De febribus biliosis.	C. 79. 430
De febribus biliosis.	C. 80. 430
De febribus biliosis.	C. 81. 430
De febribus biliosis.	C. 82. 430
De febribus biliosis.	C. 83. 430
De febribus biliosis.	C. 84. 430
De febribus biliosis.	C. 85. 430
De febribus biliosis.	C. 86. 430
De febribus biliosis.	C. 87. 430
De febribus biliosis.	C. 88. 430
De febribus biliosis.	C. 89. 430
De febribus biliosis.	C. 90. 430
De febribus biliosis.	C. 91. 430
De febribus biliosis.	C. 92. 430
De febribus biliosis.	C. 93. 430
De febribus biliosis.	C. 94. 430
De febribus biliosis.	C. 95. 430
De febribus biliosis.	C. 96. 430
De febribus biliosis.	C. 97. 430
De febribus biliosis.	C. 98. 430
De febribus biliosis.	C. 99. 430
De febribus biliosis.	C. 100. 430

PETRI

## PETRI SALII DIVERSI

MEDICI, AC PHILOSOPHI

FAVENTINI.

DE FEBRE PESTILENTI,

PROOEMIUM.



V<sup>er</sup>ū finis Medici sit rectè curando bene mereri de genere humano; ita inuigilare debet, vt eius artis studia excolendo, nihil incognitum, intētatumuē prætermittat eorum, quorum negligentia, aut ignorantia, ægrotantes vel lædere, vel perdere possit: sed omnia hæc ita eum inue-

stigare, & perscrutari decet, vt illorum certū adeptus scientiam tueri, & summa cum ratione medendo implorantibus Medicinæ auxilium manus admouere queat. Hoc quantū sit difficile, non rudes, & imperiti, sed Viri ij grauissimi, qui noctes, diesq; in hisce studijs sudarunt, & alserunt, verè dignoscunt, & iudicant: cum. n. ij vndequaq; omnia, quæ ad artis nostræ studia pertinent, perscrutauerint, indagauerintq; plurima discriminis, & periculi plena circumspiciunt, modòq; has medicinæ partes mutilas, modò illas superfluas, & obscuras nonnullas esse animaduertunt. hincq; illis alias addendas, istas refecandas esse docent, omniumq; obscuritatē illustrantes ita hæc nostra studia exornare, & perficere nituntur; vt qui his initiati sunt, nec rerū imperfectione, nec difficultate deterriti, audius hæc eadem amplexentur; tutiusq; quam pollicetur languentibus ars nostra, misericordiam, in auxilia laborantium incumbentes præstare possint. Hos ego admiror, extolloq; cum eos

A non

non sibi ipsis tantum, sed etiam publicæ humani generis utilitati inservientes, dum fastigia huius artis vel docendo, vel scribendo, attingunt, dumq; proprios labores, & studia alijs communicant, magnum quid, & supra hominis naturam consequutos videam: nam invidentiæ criminæ carceres, Deiq; misericordiam, & pietatem æmulantes omnibus æqualiter hominibus Medicæ artis auxilio indigentibus proprijs studijs succurrere, & opportunè consulere nituntur.

Quos ego imitatus, non in eorum catalogo describi vel le audeam, cum nec tam impudens arrogansue sim, ut tanta eorum merita mihi censeam ascribenda esse: sed quia eorum pius, ac sanctus consulendi publicæ utilitati desiderium animo æquans, quæ ad perficiendam rectam curandi febres pestilentes rationem in vnum redegì, quæq; ab alijs non animadversa de quibusdam particularibus ægritudinibus notavi, omnibus communicare decreui, non profecto, ut cæteros doceam, cum hoc gravissimos Viros, & qui artem consumasse videntur, tantummodò deceat. Sed ut Tyrones harum particularium curationum exemplo commonetiam, antiquorum volumina nō ita conniuentibus oculis legenda, omniaq; adamussim consideranda esse: ut hinc habita integra morborum cognitione, eorundemq; desumpta recta methodo, & curatione, languentibus, & consulendo, & medicamenta administrando possint, quam eis implorantibus nostræ opis auxilium pollicetur ars Medica, utilitatem, & iuvamentum præstare. Initium autem capiēs à sævissimō morbo, qui ut plurimū agrotantes perdere consueverit, febris pestilentis tractationem ita exordians aggrediar.

*In Februm catalogo quæ sit pestilens, & de ea quæ tractanda sunt. Cap. I.*

*Februm, quot  
sine differentiæ.*

**A** Febris corpus humanum incalescit, quoniam inde cor, quod est totius caloris, & vitæ fons, calorē concipit.



concipit. Calor autem iste vel in substantia ipsius cordis hæret, vel in ipsum aliunde emanat, in substantia cordis calor firmatus est in febribus hecticis: nã in his cordis corpus non calefcit, sed calefactum est, & calorem in habitu concepit, vnde nomen hecticarum febres hæ sibi ascriuerunt. Aliunde autem in ipsum emanat, cum vel à spiritibus, vel ab humoribus cor ipsum incalefcit. A spiritibus quidem incalefcit, cum calefacti & accensi ipsi spiritus cor primum, & inde vniuersum corpus calore imbuunt, & hinc febris ephemera: quæ quoniam in materia tenui, dissipabili, vaga fundatur, ideò terminatur breuissimè, ita vt raro alteram dureret ad diem; hæcquæ sine vilo symptomate verendò accedit, sine timore aliquo, vt semper ratione ipsius sit salubris. Ab humoribus autem in cordis substantiam calor triplici emanat ratione. aliquando. n. humores calefacti tantum sunt, hancquæ caliditatem ad cor ipsi transmittentes causant synocharum febrium diuersa genera: aliquando autem non calefacti ex simplici calore, sed eo quòd putredinem concepere, cum omnia putrida alieno calore sint calida, calefacientes cor, febrium putridarum diuersa genera produnt, prout hic, vel ille humor, & prout in hoc, vel in illo loco idè putrescit. Quandoquæ autem ultra putridum hunc calorem conceperunt humores labem, & qualitatem perniciosam, qua naturam conformem venenatæ materiæ adepti, putrescentesquæ, lacessunt cor tum caliditate putrida, tum venenatæ labe; & hinc febres pestilentes procreant, genus morbi ab omnibus prædictis & causa, & essentia diuersum. De hoc vltimo, quòd omniũ tum cognitione, tum curatione est difficilissimum, acturus primò essentia eius declarabo, secundò differentias ponam, tertio signa, vltimo loco curationem tradã.

*De Febre pestilentis periculo, et difficultate, Cap. II.*

**N**VLVM morbi genus reperitur, à quo magis affligantur homines, quàm à febre ipsa. Mediciquæ in

A 2 hanc



hanc potiorē laboris sui partem impendent. licet. n. mul-  
 to plures alij sint morbi, qui naturam humanam affligant,  
 quā febrium omnia genera, tamen frequentius, & plures  
 inuadunt homines: febres ipsæ, quā cæteræ alię omnes  
 ægritudines. & Medici, qui hanc artis partem callent, & ro-  
 ste faciunt, potissimam totius artis partem consumasse vi-  
 dentur. In curatione autem harum licet plurima occurrant  
 discriminis, & laboris plena: nullibi tamen maior difficul-  
 tas impendat, quā in cognitione & curatione febrium pe-  
 stilentium. nec aliunde manifestius imminet periculū ægro-  
 tantibus, quā ex febribus huiusce generis. periculum qui-  
 dem magis manifestum est, quoniam materia peccans non  
 sola vulgarē putredine, sed supra id, & qualitate venenata,  
 & pernicioſa cor fatigat. difficultas autē adest maxima, quo-  
 niam cum eius essentia non ita sit manifesta, nec etiam po-  
 test subsequi curatio admodū fidelis, & tuta, ultra id, quod  
 multoties non nisi ab experto, (& vix aliquando) cognosca-  
 tur medico: adeo enim latenter hæc febris quandoq; inua-  
 dit, ut egre ab exercitatissimō Virō, & qui in arte multum  
 polleat, dignoscatur. Cum igitur tanta sit huiusce rei dif-  
 ficultas, & discrimen, laborandum nobis erit, & omni in-  
 genio eniti debemus, tum ut essentia huius febris claram  
 habeamus notitiam, tum ut ipsam præsentem, & inuadentē  
 certō cognoscamus: his enim habitis, non erit difficile post-  
 modum remedia opportuna pro curatione parare. Ut au-  
 tem huius morbi perfectē essentiam assequamur, præmittē-  
 da est communis notio huiusmodi febris. per hanc. n. habe-  
 bimus, quæ febris sit pestilentis nomine donata, & noueri-  
 mus materiam, circa quam nostra versabitur speculatio.

*De communī notione febris pestilentis. Cap. III.*

*Febres pesti-  
 lēs quæ sit, et  
 quot modis  
 contingat.*

**F**EBRIS eā, communī omnium sententia, pestilens di-  
 cta est, quæ non intemperie sola, non putrido tantum  
 calore, sed etiam mala qualitate cor ipsum vitæ, & caloris  
 innati

inhati fontem laceſcit; hæc q; vt plurimum à ſæuiſſimis con-  
comitata ſymptomatibus ſolet in perniciem ægrotantium  
terminare. Quòd ſi nonnunquam ſubſequatur ſalus, non  
ſine maximo medici timòre, ægrotantiſq; diſcrimine hoc  
contingit. conſuevitq; febris hæc, potiſſimum eo tempore,  
accedere, quo peſtilentes vigent conſtitutiones, indiſcrimi-  
natiq; plurimos eodem tempore inuādens verè graſſa-  
tur, & populatur. Vnde recta ratione dicta eſt aliquando  
popularis. Quoniam autem aliquando ad harum confor-  
mitatē fiunt in corporibus humanis febres conſimiles con-  
ſimilem prædictis labem, & perniciem adiunctam habētes,  
Ideo non tantum eæ, quæ ſub cælo, & anno peſtilenti con-  
tingunt, dictæ ſunt peſtilentes, ſed etiam iſtæ, quæ ſpar-  
ſim fiunt, licet abſit omnis peſtis ſuſpicio, modò prædictis  
naturam conſimilem retineant. Ultra has nonnullæ aliæ  
verè ſunt, & dicuntur peſtilentes ab omnibus, quæ nec ſpar-  
ſim, nec populariter vagantes, ſed ſolo contagio inuehun-  
tur; dum peſtis regiōnem aliquam non ex aeris inquina-  
mento, ſed per contactum tantum & per fomitem, vt ali-  
quando viderunt patres noſtri ſuperioribus annis, ætaſq;  
noſtra vidit in pluribus Italiæ locis, Urbibuſq; nobiliori-  
bus peragratur. Peſtis enim duplici ratione inuadere con-  
ſuevit, aliàs enim accedit ex communi cauſa, aliàs ex con-  
tagio tantum; dixi ex contagio tantum, quoniam & quæ  
ex communi fit cauſa, ſolet vt plurimum eſſe contagioſa,  
quamuis ea non ex ſolo contagio inuehatur. Ex commu-  
ni cauſa duplici euenit modo. primò quidem cum aer cir-  
cuſtans labem, & corruptelā aliquam conceperit, ſiue hoc  
ſit ex cauſa vni loco tantum propria, ſicuti ex halitu vapo-  
roſo, & pernicioſo elato, vel à lacu aliquo, quòd corruptio-  
nem ſenſerit, vel ex ſpecu recondito iam, & nunc aperto,  
vel ex cadaueribus inſepultis, vel ex conſimili aliqua alia  
exhalatione pernicioſa, ſiue hoc ſit, quia cælum vniuerſum  
ex cōſtitutione peſtilenti (hoc vel ſit ab aſtris, vel ex intem-

*Peſtis quæ  
modis inuade-  
re conſuevit,*

peric non naturali aeri inuecta, nunc non differo) praua cō-  
ceperit inquinamenta; Vnde ex hoc pestēs vniuersales, ex  
illa particularis, vni regioni fiunt. Secundō autem ex com-  
muni euenit causa, cum ex praua; & communi victus ra-  
tione humores eō mālignitatis deueniunt, vt praua infecti  
qualitate febres inferant letales: sicuti sēpē in caritate an-  
nonę assumptis in vsum humanum, & herbis, & radicibus,  
cæterisq; malis cibarijs: vel in potu, & ciborum præparatio-  
ne aquis corruptis & vitiatis, nostra & antiquorum ætate  
visum est. Alias autem inuadit, & peragratur pestis nihil ad  
hanc nec aere, nec prauo victu, sed solo contactu confe-  
rente, per quem ab altero alteri communicata illa ma-  
la, & perniciosa qualitate, solum petit eos, qui cum his,  
qui laborarunt peste, consuetudinem habuerunt, vel quid  
eorum pertractantes per fōmitem labem eam cōceperunt.  
His omnibus modis norunt homines hæc febres accede-  
re, hæcque vocant pestilentes, siue hoc sit ex pestilenti æ-  
ris constitutione, siue ex prauo victu, siue ex contagio. Et  
quoniam ad similitudinem harum, vt dictum est, inter mor-  
bos sporades aliquæ generantur febres consimiles, consimi-  
lem labem habentes; ideō & hæ cōmuni nomine (licet nec  
pestis ex prauitate alimenti, nec ex contagio, nec ex aeris  
inquinamento vagetur) ab omnibus dictæ sunt pestilentes.

*Febris pesti-  
lēs, quæ inter  
sporades mor-  
bos contingit,  
an debeat po-  
tius appellari  
maligna, quā  
pestilens.*

*Mos & spe-  
cies morbi dif-  
ferunt.*

Quæ vltra id, quod in conformitatem earum, quæ ex vitia-  
to alimento, vel ex contagio, vel ex pestilenti oriuntur æ-  
re, pestilentes dicantur, à nonnullis etiam vocantur febres  
malignæ, seu febres mali moris, vel mali modi. quæ appel-  
latio, licet rei conueniat, quoniam omnis febris pestilens  
est maligna, & mali moris, tamen inconueniens est pro  
imponendo nomine huic febrī; quoniam hoc exprimit mo-  
rem, non speciem morbi. Vnde hic animaduertatur, quan-  
tū momenti sit eorum sententia, qui pro specifica deno-  
minatione huiusce febris, abnegātes nomen pestilentis, im-  
ponant hoc nomen malignæ, vel mali moris. quoniam ex-  
plicatio

plicatio moris morbi non exprimit morbi speciem; & species morbi est quid distinctum à more, cum omnis grauis morbus, cuiuscūq; sit speciei, possit esse mali moris. & dicere morem morbi, est dicere qualitatem, non speciem. Vnde omnium rectè sentientium cōmuni iudicio hæ febres verè dictæ sunt pestilentes pro propria huius morbi specie exprimēda. quæ etiā verè omnes sunt malignæ, & mali moris. non tñ hæc duo coincidūt; quoniā omnis quidē febris pestilens est maligna, nō tñ contra; cū plurimæ aliæ sint febres malignæ, quæ tamē non sunt pestilentes. cū. n. mos morbi à superuenientibus deprehendatur symptomatibus: in quocunque febriū genere praua, & sæua subsequantur symptomata, in eodem praua, & maligna comprehenderetur natura. febrisq; hæc & maligna, & cacohetes rectè appellabitur, licet non sit pestilens, sicuti omnes alij morbi, quibus praua, & sæua eueniunt accidentia, licet nullo pacto sint pestilentes, maligni, & cacohetes dicuntur. Vocantur igitur febres huiusce qualitatis, & speciei propriè, ac conuenienti nomine pestilentes, quæ tamen non vnius sunt generis, sed diuersi. Nam aliæ ponuntur diariæ, aliæ hecticæ, aliæ verè sunt, & dicuntur putridæ. Omnibus hoc cōmune est, quòd perniciosa, & mala lædant qualitate. hicq; characterismus est, ac propria differentia, per quam differunt ab omni alio febrium genere. Sunt qui digladiantur, æstuantq; in probādo febrem pestilentem eam tantū esse, quæ à communissimā causā, videlicet ab infesto, & pestilenti aere solum producat: tamen cum hi externas causas morbi huius solummodo, non autem essentiam, nec propriam eius differentiam in imponendo nomine attendant, eorundem opinio à me non acceperabitur, qui Galeni, virorumq; præstantissimorum sententiam in hac re probaturus, rei essentiam explicaturus sum, secundum quam potius, quàm secundum causas exteriores, nomen imponendum est. Cum autem rerum essentia nullo modo perfectè dignosci queat, non cognita

*Febres quæ id  
cendæ sint ma  
lignæ.*

*Febres pestilē  
tis characteris  
mus.*

cuius propria differentia ; ideò ad perfectam febris pestilentis cognitionem videndum erit , in quo hæc mala qualitas consistat, vndeq; generetur. hoc enim habito , eius essentia poterit nobis satis innotescere .

*Prava qualitas unde ortum habeat , & generetur. Cap. IIII.*

*Instrumenta  
præcipua desti-  
nata à natura  
pro cõservatio-  
ne vite.*

*Alimentũ ne-  
cessariò debet  
esse simile ei,  
qđ nutriri de-  
bet, & huius  
causa.*

*In alimentore  
quiritur simili-  
tudo naturæ  
eius, quod nu-  
triri debet.*

*Quære quod  
vni alimentũ  
est, alteri non  
sit.*

*Multa actio-  
nes sunt, quæ*

**H**UMANVM corpus , dum vita fruitur, in integrâq; constitutum est sanitate , rectè omni omnium operationum genere fungitur . ad cõservationem autem, & tutelam harum omnium machinata est prudentissima Natura plura instrumenta , præcipuè autem duo, quibus dum & ipsa rectè disposita sunt , & nos ipsis recta utimur ratione, tutatur corpus nostrum, cõservatq; . hæc autem sunt alimētum, & aer, sine quibus nec constare vita, nec operari possumus. Ista duo ad hoc apta sunt, dum temperamento, & natura nobis sunt familiaria . Temperamentum quidem fuit in alimento necessarium, quoniam si contraria se inuicem oppugnant, extinguūtq; , similia autem se ipsa amant, & cõservant, animal per ea, quæ sibi in temperamento sunt conformia, debebat manuteneri. hincq; factum est, quòd humidis etiam siue actu , siue potentia nutriri debebat . & quoniam amara carent humido, ideò hæc ad nutritionem omnibus alijs rebus sunt ineptiora : non sufficit autem ad cõservationem animalis sola conformitas alimenti in temperamento, sed requiritur etiam similitudo naturæ . Vnde factum est, vt id, quod vni animali est nutrimentum , alteri non sit. canis ex ossè nutritur, equus ex palea, fenoq; , aues nonnullæ ex seminibus duris, nonnullæ etiam ex cruda carne. quorum tamen nullum homini est alimentum. hoc non ratione temperamenti contingit, sed ratione dissimilis naturæ . Vnde euenit, vt id, quod vni est propriũ, alteri sit alienum. non enim omnes actiones, passionesq; mutux semper ratione qualitatum primarum fiunt . Sed plurimæ aliæ cõtingunt, quæ nulla ratione nec ad primas, nec ad cæteras, quæ

quæ ex primis emergunt, vlla possunt ratione reduci, plurimæq; sunt, quæ ab illis distinctæ, non à qualitate vlla, sed ab intrinseca rei natura, & forma eueniunt. quoniam autē à substantia rei hoc contingit, quæ à sensibus nostris longè dissidet; ideo nulla indicia, nulla signa, nullam omnino rationem harum actionum habemus, sed vnico experimento nobis patefiunt. hinc sanguinem hircinum, non alios videmus emollire adamantem. electrum, si allio, non autē alio succo madescat, non amplius paleas trahere. magnetem nō lapides, non yrgulta, sed vnicum ferrum ad se promouere. hoc autem non aliunde prouenit, quā ex propria vnus cuiuscunq; rei natura, ex huiusq; ad alteram conformitate. Conformitas hæc naturæ inter id, quod alimentum nobis futurum est, & corpus nostrum est necessaria, nec vnica temperamenti similitudo satis esse potest. Sed vtrumq; ad hoc, yt quid sit alimentum, requiritur. s. & naturæ, & temperamenti similitudo. & sicuti multa nobis temperamento similia reperiuntur, quæ quoniam à natura nostra dissident, ideo nec ad nostram apta sunt nutritionem: ita multa alia inueniuntur naturæ nostræ conformia, quæ quoniam temperamentum nostro simile non habent, corpus nostrum nutrire nequaquam possunt. quales sunt margaritæ, corallia, aurū, lapides preciosi. quæ cū sint naturæ nostræ amica, in multisq; vtilissima, ad nutritionem tamen inepta sunt. Ea igitur omnia, quæ nobis & natura, & temperamento erunt similia, inter alimenta corporis nostri veniunt recensenda. quæ autem neutram harum conditionem, vel alteram tantum retinent, nequaquam. Ista vero, quæ eo quod nec ad temperamentum nostrum, nec ad naturam, nec ad vtramq; similitudinem habent, non possunt alimenta esse, in duplici sunt discrimine. vel enim sunt tantum nobis dissimilia, vel etiam contraria. Quæ sunt tantum dissimilia, inter medicamenra connumerari possunt. quæ verò sunt contraria, cum naturam nostræ inimicam gerant, venena dicuntur; hæc autem

*ab intrinseca  
rei natura, nō  
ratione qualis-  
tatum eueniūt*

*De his Gal. lib.  
6. Epid. Cist. 6  
com. 5.*

*Ad hoc, quod  
aliquid sit ali-  
mentum quid  
requiratur.*

*Medicamenta  
que sint.  
Venena que  
sint.*



*Alimentū, me-  
dicamentum, et  
venenū, in quo  
differunt, &  
conueniant.*

autem tria inter se in hoc differunt, quod alimentum nos tutatur, & conseruat nutriendo, medicamentum immutat alterando, venenum autem destruit corrumpendo. nec tamen adeo sunt hæc inter se distincta, vt omnino inter se disiuncta Naturam communem nullam retineant. Alimentum quidem, & venenum, quoniam illud à simili, hoc à contraria euenit substantia, nunquam in eodem communicant; at medicamentum, quod mediā gerit naturam, vtriq; copulari potest. idem enim potest esse & alimentum, & medicamentum, eo quod idem potest & nutrire, & alterare; & idē potest esse medicamentum, & venenum, eo quod idē etiam possit & alterare, & corrumpere. nunquam tamen dabitur, quod idem sit alimentum, & venenum. quoniam non eadē res potest destruere, & conseruare: nec ab eodem potest tutela, & corruptio deriuare. Aliquando quidem hoc euenit, vt id, quod apte alimentum esset, omniq; similitudine accommoda ad nutritionem donatum erat, ad aliquā corruptionem deueniat; ex quo vel temperamenti, vel naturæ, vel vtriusq; similitudinem amittat, tuncq; id, quod erat commodum, & opportunum alimentum, vel in medicamenti transit naturam, vel veneni. medicamenti quidem, si tantum dissimilem à nobis sortiatur naturam. si autem contrariam, veneni. Venenum omne id appello, quod cum nō sit ad nutritionem aptum, ad malū alterando in perniciem ducat hominem, siue hoc sit ad mortem tandem, siue ad læsionem aliam, cuiuscunq; sit virtutis, sensibilem. Exemplo hoc pateat. Vinum corporis nostri optimū est nutrimentum: quod tamen si aliquam concipiat labem, nō amplius nutrimentum erit. si enim fiat acidum, medicamentū euadit. & hoc propter corruptionem temperamenti. Si autem vappa fiat, & corrumpatur: tunc quoniam naturam altera m nostræ inimicā consequitur, vim sibi veneno similem, ac conformem adipiscitur. hincq; fit, vt ex potu consimili mors faciliē sublequatur his, qui eo potu vtuntur, sicuti

*Alimentū quā-  
do transcat in  
naturā vel me-  
dicamenti, vel  
veneni.*

experientia

experientia ego vidi factum in cœnobio, in quo ex potu vini corrupti maior pars eo victu vtentium periit ex morbis, symptomatibusq; his similibus, qui à letali veneno producantur. Idem igitur poterit esse alimentum, & medicamentum, pariterq; idem poterit esse medicamentum, & venenum. nunquam tamen dabitur res vna, quæ eodem tempore venenum, & alimentum esse possit. quod tamen deinde poterit esse, cum alimentum ad extraneam corruptionem deuenerit. Quod dictum est de cibo, & potu, videlicet de alimento extrinsecus sumpto, idem verificatur, ac contingit in alimento interno, & propriè dicto. humores enim corporis nostri, dum temperamentum insitum, propriamq; substantiam retinent, ad nutritionem eiusdem aptissimi sunt, & prout diuersum est & temperamentum, & natura horum omnium; ita etiam iste hanc partem, ille aliam nutrit. hinc ossa hoc humore particulari, & proprio fruuntur, ipsoq; nutriuntur, qui ad carnis nutritionem ineptus est, quæ tamen alio diuerso, sibiq; peculiari vtetur pro alimento. membranae similiter, & ligamenta non eundem attrahunt humorem pro nutrimento, quo vel pulmo, vel iecur, vel lien alitur: hæc q; sicuti diuersa inter se existunt; ita etiam distincto, & vnicuiq; proprio humore vnaquæq; pars fruitur. hoc non aliunde contingit, quàm ex cuiusq; proprio temperamento, & propria natura. ex conformitate enim horum euenit, vt hæc pars humorem istum, illa alterum pro sui nutritione attrahat, ac eo fruatur. dumq; inter humorem attractum, & partem nutriendam huius temperamenti, & naturæ est conformitas, & similitudo, recta, & naturalis fit nutritio. Si autem quid horum desit, non amplius laudabilis, & perfecta nutritio erit. nam si temperamentum nutriendæ parti proprium, & familiare deerit humori ipsam nutrituro, pars ipsa ad malum alterabitur: & si sensibilis erit læsio, ex hoc ægrotabit. si autem alienam idem humor nanciscatur naturam, multoq; ex temperamento amisso deterius

*Humores corporis nostri, vt nutritioni apti sint, quas conditiones habere debeant.*

*Partes corporis nostri quare determinato humore nutriuntur.*

*Humores si vel temperamētū, vel propriā naturā amittat, quid succedat.*

circa



circa partem ipsam agatur. nam vel non nutritur pars ipsa ab eo humore; quoniam ratione dissimilitudinis naturæ attractio non ita fiet: vel si nutriatur (quod in defectu alterius proprii humoris eueniet) in propria substantia etiam pars ipsa lētionem patietur. non autem amplius in qualitatibus, sicuti in dissimilitudine temperamenti eueniebat.

Humores nāq; corporis nostri, siue sint illi proprii, ex quibus nutrimur, siue etiam excrementa ab his decisa, dum in hoc ergastulo continentur, ultra plures alias, præcipuè duplicem hanc solent inire mutationem, alteram temperamenti, alteram naturæ propriæ. temperamenti mutationē subeunt, dum alterationem in qualitatibus patiuntur. naturæ autem, dum corruptionem concipiunt. ex temperamenti mutatione fiunt quodāmodo nobis alieni: nec ita, vt prius erant, sunt nobis familiares. at ex corruptione extranei euadunt, nostræq; naturæ, si ingens, & valida fuerit corruptio, inimici. hinc euenit, vt in corporibus humanis procreentur aliquando humores, qui mole quandoq; exigua existentes, vim tamen, & efficaciam letalium venenorum, perniciosarumq; ferarum facile æquent. hinc à digito pedis epilepsia, ab ore ventriculi totius corporis conuulsio, ab utero strangulatus, & suffocatio, ceteraq; hysterica accidentia, hincq; vt in summa dicam, quandoq; subitæ, & improvisæ mortes.

Corruptio autem ista, qua in humores hæc venenata, & perniciosa qualitas inuehitur, non est temperamenti sola immutatio, non est putredo, sed est totius naturæ, insitæque substantiæ destructio, alienæq; ac nobis inimicæ procreatio; qua id, quod per priorem naturam nobis erat benignum, & familiare, inimicam nunc, & perniciosam naturam adipiscitur. cum enim vnus corruptio sit alterius generatio, quid mirum, si corrupta familiari natura, inimica inuehatur: si destructa benigna, venenata generetur? Exemplo hoc pateat in sanguine. sanguis inter omnes corporis nostri humores familiarissimam nobis gerit naturam, ex hocq; præcipuè

*Venenati humores cur aliquando generentur in corpore humano.*

*Humores cum venenata natura adipiscuntur, quam mutatio nec subeant.*

cūpue nutrīmur, & constamus, quī tñ; sicorruptatur, simi-  
 lia lēali veneno accidentia profert. hoc clarē cernimus,  
 cūm ex vena eiectus, in cavitatēq; vel ventriculi, vel vesi-  
 cæ; vel vteri, vel alterius loci existens concrefcit. quā pri-  
 mum enim & syncope, & frigidos sudores, & respirandi  
 difficultates, & pulsus imbecillitates, & frigiditatemq; to-  
 tius corporis inuehit; nisiq; ab arte remedia quāprimum  
 adhibeantur opportuna, mortem etiam breui affert. hoc nō  
 ex temperamenti mutatione euenit, cūm nec pituita vitrea  
 omnium humorum frigidissima hos effectus possit edere;  
 non ex putredine, quoniam hoc statim fit, cūm nundum pu-  
 tredo incipere potuerit; cumq; ex putredine non concre-  
 scat sanguis, sed potius fluidus fiat, & cūm ex putredine  
 sit fætor, & calor, quorum vtrumq; à sanguine statim con-  
 creto negatur. Sed hoc prouenit ex propria sanguinis sub-  
stantia corrupta, quam tantūm intrā venas incorruptam,  
 illæsamq; natura seruare potest; extra venas enim sanguis  
 cūm nec à natura regatur, nec in proprio sit conceptaculo,  
 moxq; spiritus exhalent, & euanescent, parsq; ichorosa sepa-  
 retur, statim propriam amittit naturā, alienamq; & extra-  
 neam induit, & quò prior erat magis familiaris, & magis be-  
 nigna; alteram adipiscitur eò inimicā magis, magisq; per-  
 nitiosam. In corruptione autem ista non tantum est muta-  
 tio naturæ, sed etiam aliquando temperamenti. raro enim  
 humor aliquis corrumpitur, quin etiam temperamentū ali-  
 quo modo immutet. sicuti è contrario sapissimè tempera-  
 mentum immutatur, nulla facta in humoris substantia alte-  
 ratione. Quod dictum est de sanguine, idem intelligatur,  
 verificeturq; de omni cætero humore, & excremento; si enim  
 in sanguine omniū humorū nobis familiarissimo, amicissi-  
 moq; hoc euenit, quid de cæteris humoribus, excrementisue  
 cogitandū erit contingere posse? Porro hæc sæpè ad cor-  
 ruptionem deueniunt, corruptamq; consimilem veneno  
 perniciosarum ferarum naturam frequenter adipiscuntur.

Nec

Nec mirum sit hæc quandoq; in nobis corrumpi; cum sicuti extra corpus nostrum, ita & in corpore nostro multæ sint causæ ad hoc efficiendum aptissimæ, quæma dmodū & ad alterandum in qualitatibus omnia humorum excrementorumq; genera causæ reperiuntur multæ tum externæ, tum internæ. Cum autem has patiuntur mutationes, siue sit tēperamēti, siue naturæ, quodcunq; sit hoc humidum, seu ad nutriendum aptum, seu excrementosum, diuersa morborū genera impertiuntur. hinc enim alij sunt morbi à tempera-  
tura, alij à tota substantia. ab intemperie fiunt morbi, cum mutationem in qualitatibus tantum patiuntur: à tota autē substantia, cum naturam propriam per corruptionem amiserunt. qui morbi à substantia inter venenatos, idest proportionē respondentes his, qui à veneno causantur, recenseri possunt: quoniam fiunt à natura & à tota rei substantia nobis inimica. vnde tales hosce affectus, sine à deliterio pharmaco, siue à bestia virus iaculante, siue ab improbo succo, siue à pestilēti coelo causati fuerint, Hippocrates omnes maleficos appellabat, tamquam eorundem eadem actio, praua, venenosa, & malefica existat. licet autem læsio ex his non sit semper ad mortem, semper tamen offensam immanem hi inuehant, quæ nec à temperamento, nec ab aliqua alia prodit manifesta causa, sed tantum ab intima rei nobis aduersante substantia. Morbi ab intemperie fiunt tū ab internis, tum ab externis causis, hæq; tum naturales, tum nō naturales, tum præter naturam esse possunt. harum infinitus ferè est numerus, qui tamen, licet sub capita breui possit reduci, à me non recensabitur. quoniam ad aliōs morbos: ex corruptione propero. Morbi autem à tota substantia, à venenataq; natura, qui ratione humorū in corpore nostro existentium fiunt, ab eorundem corruptione generantur. causatur autem hæc corruptio vel ab extrinseco, vel ab intrinseco; Ab extrinseco, vel cum homines inspirant aerem ad corrumpendum aptum, vel cum alimentis vtuntur, quorum

*Humores corporis nostri cū permittantur, vel in temperamēto, vel in propria natura, quos morbos pariant.*

*Lib. 6. Epid. secl. 6. sex. et com. 5.*

*Humorū corporis humani corruptio unde causetur.*

rum vitiosa est substantia, quæq; corruptelam aliquam ferere, sicuti aliquando frumentis, leguminibus, cæterisq; cerealibus seminibus contingit, cuiusmodiq; sit quandoque in piscibus, carnibus, alijsq; consimilibus rebus, quæ vel quoniam diutius mactata sint, vel negligenter reposita, corruptelam aliquam senserint; Vel hoc fit à cibarijs quidem incorruptis, sed qui facile, cum leui destituuntur cōcoctione, labem istam concipiunt, sicuti sunt horarij fructus, & ceteri consimilis generis: hoc etiam fit, cum cibaria, nec ordine, nec tempore, nec mensura, nec præparatione conuenienti sumuntur. hinc enim fit succus ad corruptelam paratus. Ab intrinseco autem fit corruptio ista, cum aliquod viscerum, vel quæcunq; sit alia pars corporis, labem aliquam conceperit, qua id, quod ei apponitur, siue sit pro confectione, siue pro sui propria nutritione, in alienam permutat naturam, eademq; corrumpuntur: cuius labis postea possunt, & multæ esse causæ tū externæ, tum internæ: externæ quidem, sicuti Venus immodica, animi pathemata, motus super vires, casus, alterantia immoderata; & consimilia huiusmodi, quæ innatum calorem dissipare apta sint. internæ autem sicuti imbecillitas partis ab ortu, quæ diuturnitate temporis semper magis languescit, intemperies valida, & cetera, quæ partis calorem innatum dissipare, naturamq; immutare possint: Animi aduertendum autem est in vtriusq; his mutationibus, quod non statim, nec semper, quotiescunque humor vel temperamenti, vel naturæ subijt mutationem, morbum procreat. sed quandoq; intra corpus geritur longo temporis spatio; nullam alterationem manifestam exhibens, licet forsan latenter, & sensim semper aliquid male disponat. sicut enim canis rabidi virus aliquando per menses nullo indicio, nulla læsione manifesta intra corpus latet, licet aliquid continuè semper agat. ita huiusmodi humores siue in temperamento sint immutati, siue in substantia corrupti, sæpe in corpore nostro nullum de se indicium præbentes,

on videtur  
olap 1, 1, 1  
700 100 100  
100 100 100

*Humores cum  
sunt mutati vel  
in temperamē  
to, vel in pro  
pria substantia,  
non semper læ  
dunt, nec sem  
per morbos ge  
nerant.*

bentes, per notabile temporis spatium permanent, hiq; nō semper, quamprimum tales geniti sunt, læsionem in corpore manifestatam, & sensibilem produunt, sed nonnunquam per dies & mēses latent, insensibiliterq; semper aliquid continuè agentes tandem morbos manifestos, & atroces aliquando, aliquandoq; mortem inducunt. Hinc sanguis supercalefactus, qui per notabile temporis spatium in corpore sine aliqua læsione sensibili permanfit irrepens in partē aliquam vel exteriorem, vel interiorem, modò generat inflammationē, modò erymsipilas. tuncq; videtur esse factus subitus affectus in homine, cum tamen & eius causā per tēpus in corpore latuisset. Hinc plurimos conspeximus, qui cum sibimetipsis, astantibusq; sani viderentur, à medicisq; expertissimis sani iudicari potuissent, subitā oppetisse mortem. qm̄ corrupti humores, qui venenatā naturā adepti erāt in corpore existentes, insensibiliterq; continuè aliquid agentes, tandēq; in cor subitò erumpentes subitū casum attulere, hiq; non aliud mortis indiciū, quā mortem ipsam habuere, cum tñ mortis causam adeò euidentem, potentissimāq; in sinu suo gererent. Has autē læsiones sensibiles, & manifestas hi humores immutati, qui diutius latuerunt in corpore, produunt, vel cū sunt cōcitati à causā extrinseca, siue sit naturalis, siue nō naturalis, siue præter naturā, vel cū ab intrinseca. si vel cū humores hi partēs principales in consensū traxerint, vel adeò abundant, & in proprio cōceptaculo amplius retineri nequeant, vel cū tetrū vaporē de se ad nobiliores partes emittunt, vel si non vaporem, qualitatem saltem perniciosam edant, vel cum putruerint, vel quid consimile passi fuerint, ex quo humor concitatus suam actionem depromere queat, qualitatemq; vel natura acquisiticia sensibile proferat actionem. Hinc non semper humores in qualitatibus immutati nobis morbos inuehant, sed tantum vel cū putrescunt, vel cum ad aliquam partem transmissi illam lædunt, vel quid simile agunt, hocq; cum à causis vel exter-

nis,

*Homines corrupti quando ledāt, vel morbos generent.*

nis, vel internis concitati fuerint. Hinc etiam humores corrupti non semper propriam edunt actionē, sed tantū cum concitati vel mouentur ad partes nobiles, vel cum ad easdē vaporem, qualitatem ve perniciosam, & malam transmittunt. Vnde euenit, vt à digito pedis non continua fit epilepsia, nec ab vtero hysterica continuè fiant accidentia, sed tantū per interualla, quoniam non semper materia hæc perniciosa agit, sed tantū, cū concitata ad principales partes quid sui transmittit. parem igitur subeunt mutationem, & humores in corpore nostro existentes, & alimenta exterius sumpta. vtrāq; enim, & temperamenti, & substantiæ mutationem patiuntur, illius quidem ex alteratione, istius autem ex corruptione. in hocq; communicant, quòd ex alteratione morbos ab intemperie, ex corruptione autē morbos à substantia, & propria natura inuehunt. quos nō statim semper edunt, sed cum à causis, siue externis, siue internis concitati suam depromunt actionem, vel ab iisdem immutati causis ad sensibilem læsionem inducendam promouentur. Quemadmodum autem alimentum, & humores sortiti hanc sunt naturam, vt duplicem hanc transmutationem subeant. similiter & aer nobis circumfusum, alterum instrumentum ad tutelam caloris nostri paratum, consimilem adeptus est. Hic quidem adeò nobis est necessarius, vt sicuti sine alimento nutriri, nec sine anima viuere; ita nec animam sine aere tutari, aut conseruare possumus. cū enim vita à calore, sicuti mors ab eius extinctio-  
ne pendeat, calorq; ad propriam conseruationem continua egeat euentatione, vt hinc & fumosa excrementa propellere, & refrigerationem haurire possit, Aer nobis vtrūq; hoc officium præstat. nam & recipit excrementa illa fumosa, & pabulum conueniens est pro ipsius caloris refrigeratione; quorum si alterum, vel ambo desint, in discrimen suffocationis homo deuenit, extinctoq; calore in mortē labitur. Hæc autē munia rectè obit aer, propriaq; est tutela, &

B                      nutritio

*Aer quare ne-  
cessarius pro  
conseruanda vi-  
ta.*

*Aer, vt vitā  
tutari queat,*



*quas conditio-  
nes habere de-  
beant.*

*Aer immuta-  
tus vel in tem-  
peramēto, vel  
in substantia  
quomō ledat  
hominem.*

*Aeris corru-  
ptio unde cau-  
setur.*

*Pestis ex ae-  
re.*

*Corruptio à pe-  
stilentia indu-  
cta non est pu-  
tredo.*

nutritio caloris nostri, dum temperamento, & natura no-  
bis est familiaris: cuius contrarium si eueniat, vt scilicet, vel  
in qualitatibus primis immutatus, vel in substantia corru-  
ptus sit; quoniam vtranq; mutationem subire potest, primò  
quidem spiritus, deinde humores, vltimo loco substantiam  
corporis nostri afficiet. & prout diuersa erit mutatio, diuer-  
sos inuehet morbos, hos quidem ab intemperie, cum intem-  
peratus in qualitatibus erit, illos à substantia, cum in substā-  
tia propria fuerit corruptus. Quæ corruptio aliàs ex mo-  
tu, & lumine astrorum in aera malè agentium (illinc enim  
omnis inferiorum virtus regitur, & gubernatur) aliàs ex ca-  
daueribus insepultis, aliàs ex aquis stagnantibus corruptis;  
aliàs ex specu, & voragine aperta, aliàs ex alia causa ortum  
habet. Cum autem aer labem istam conceperit, validissimè  
in corpora nōstra agere, morbosq; perniciosos inducere  
poterit. cum enim continuè hunc, & per arterias, & per in-  
spirationem ad intra corpus trahamus, factusq; sit nobis ex  
labe ista concepta inimicus, non amplius erit aptum calo-  
ris nostri pabulum, & conseruatio, sed potius hinc dissipa-  
bitur corpus nostrum primò malè affectis spiritibus; post  
modum & communicata labe humoribus, & partibus cor-  
poris nostri solidis, præcipuè autem cordi, tanquam ei,  
quod plurimo aere pro sui refrigerio egeat, attrahatq;. Hinc  
pestis ex aere oritur, quæ plurimos vno, eodemque  
tempore inuadens populatur, nō tamen omnes pariter, sed  
eos magis, qui humores ad corruptelam aptos in sere-  
cōdunt. ad quæcunq; enim actionē dispositio patientis re-  
quiritur. nam aer corruptus corruptionem inuehit: vbi au-  
tē sunt humores in hanc procliuēs, & in eosdem corrupte-  
lam præcipitat. Corruptio autē ista à pestilentia inducta nō  
est putredo; quoniā si hoc esset, semper pestis concomitata  
esset febri. at sæpe pestis sine febre visa est. præterea putredo  
à calida, & humida sit cōstitutione. at oriūtur pestes, vigētq;  
aliquando temporibus calidissimis, & siccissimis cuiusmo-  
di fuit

di fuit ea pestilentia, quam ex Thucididis historia totam Asiam, hincq; in Græciam peragrassè nouimus. Pariter igitur & aer, & alimentum, & corporis nostri humores aliquando corruptionem patiuntur, cuius ratione venenatam, & perniciosam labem concipiunt, unde inimica, contrariaq; naturæ nostræ euadunt. ab aere ita alterato fiunt pestilentia communes, quæ promiscuè agendo, vnamquamq; naturam, & tēperaturam inuadunt, omnesq; ætates, omnesq; sexus indifferenter adeunt, licet hos magis, quàm illos dispositionis ratione. ab alimento autem, & à corruptis humoribus, nihil ad hoc aere conferente, fiunt pestilentes febres, inter sporades morbos semper recensendæ, nisi in aliqua regione ex cōmuni alimento corrupto ortum habuerint; quoniam tunc non inter sporades, sed inter endimios sunt connumerandæ. Aliquando tamen corruptionem tantā, adeoq; venenatam naturam concipiunt humores corporis humani, ut vniciq; præsentaneo veneno comparari possint, tantaq; illorum aliquando est efficacia, ut per solum & vnicum contactum in corpus extraneum consimilem inuehant perniciosam, & venenatam naturam. hincq; oritur pestis ex contagio. Pestis autem quæcunq; sit, siue ex pestilenti aeris statu, siue ex contagio, duplici consuevit modo inuadere; aliàs enim febrem, vnāq; malam illam, & venenatam introducunt qualitatem, aliàs hanc tantum sine febre; cum primum agit, febrem pestilentem, vel morbos cū febre pestilenti inducit: cum autem secundum corruptionem in humoribus, non autē putredinem affert. hincq; pestis sine febre. Quod idē potest contingere, visumq; est sapius in corpore humano contigisse, dum nullum pestis genus vagaretur, scilicet, quod facti sunt pestilentes morbi, & affectus ex corruptione ingenti humorum in aliquas corporis partes decumbentium nulla, præsentē, nec putredine, nec peste.

*Pestis ex contagio unde ortum habeat.*

*Pestis vel cū febre, vel sine febre inualit.*



*Quod dentur pestilentes affectus sine febre.*

*Cap. V.*

**Q**UAMVIS liqueat sine febre pestilentes affectus cōtingere posse, hoc tamen suppositum, cum inferioribus, quæ tractanda erunt, inferuire debeat, irrefragabilibus auctoritatibus, orationeque firmabo. Hippocrates, dum recenseret etysipelatosos affectus, ac pestilentes, quos sub anno austrino tertio Epidemiorum libro enarrabat, habebat hæc verba. His adiuncta aliquando, aliquando non erat febris, paulo post subdebat. Multos autem unā cum febribus, & ante febre, atque à febre arripuerunt. si autem ante febre, ergo clarè sine febre potest esse pestilēs affectus. Inferius autem, dum de alui fluxionibus loqueretur, hæc habebat. Aluius biliosa, pinguis, tenuis, aquosa, atque ipse morbus multis eò erupit citra febre, & cū febre. Paulò infra hæc subiungebat. Ex his, quos febres tenebant, aliaque, nemo circa potum intempestius erat. quæ verba [quos febres tenebant] clarissimè docent, alios posuisse affectus pestilentes, quos febris non concomitabatur. Galenus verò in eadem tractatione hanc sententiam exponēs clarissimè docet alios pestilenter egrotasse sine febre, alios cum febre hæc habens. Postquam priori capite dixit de ijs, qui ex ventre laborarunt, quòd partim sitibundi, partim non essent, hic nunc de ægrotantibus simul cum febre ait, non magnoperè illum fuisse sitibundum. Hoc idem superius eadem cōmentatione, dum explicaret, quòd in peste illa longissima, quæ sua ætate vulgata est, per excrementa alui (quemadmodum & in illa Hippocratis tempestate narratur) omnes prope extincti fuere, per hæc verba testatus est. Quod quidem esse symptoma perpetuum febris, quam pestilentem priuatim vocitant, cum mortales vel citra febre pestis arripiat. Hoc clarius, dum normam exhibēdi armenam bolum in pestilentibus affectibus doceret per hæc verba

*Pestem sine febre dari ex mente Hippocr.*

*Tex. 25.*

*Tex. 28.*

*Tex. 55.*

*Tex. 60.*

*Pestem sine febre accidere ex mente Galeni.*

*Com. 60.*


*Com. 57.*

*Lib. 9. de simplic. med. fac. cap. de terra sania.*

verba expressit. Cæterum bibitur ex vino albo, consistentia tenui, modicè diluto, si aut planè febris careat, aut leuiter ea teneatur; sin grauius febriat, admodum aqueo. per quæ clarissimè in peste aliquando febrem esse grauem, aliquando leuem, aliquando nullam testatur. Ratio hoc idem dicat. cum enim aer non semper per putredinem corpora pestilentiali inficiat affectu, sed hoc sæpius ex propria vitiata, & altera venenata acquisita natura agat; cumq; in corpore humano multoties ex prauo victus regimine tanta adsit humorum sine putredine corruptio, ut inde hi humores venenatam labem concipièntes, sæuos, & pestilentes morbos inducant; quemadmodum venena non necessariò putridam qualitatem, à qua febris, includunt; ita nec vbi aer non manifestus, sed venenata qualitate corpora inficiet, nec vbi humores hac eadem labe inquinati, & non putrescentes erunt in causa pestilentialis affectus, necessariò febris subsequetur; quoniam ad inducendam febrem hanc ex necessitate requiritur putredo, quæ in prædictis non necessariò includitur, cum qualitates venenatas, & inficere, & perdere homines sine putredine, & ideo sine febre, possint. Hanc sententiã viri celeberrimi duplici auctoritate, duplici ratione, & experimento euertere nituntur. Prima auctoritas ab Hippocrate desumpta est, qui in libello de spiritibus, flatibusq; diuidens febrium genera in commune, & particulare dicebat, commune febrium genus ab omnibus pestilentiam vocari. hinc arguunt Hippocratem censuisse omninò inseparabilem esse febrem à peste. Altera autem auctoritas plurium quidè scriptentium est, tamen cum vnico innitatur fundamento, pro vnica à me recenseatur, quæ hæc erit. Paulus, Aetius, Auicennas, Rasis, & omnes ferè, qui de peste egerunt, de hac nullibi, præterquam in catalogo febrium, tractarunt. quod certissimum est argumentum eos indicasse febrem affectibus pestilentibus essentialem esse. Rationum hæc prima est. Pests est acutissimus morbus, cum celerrimè moueatur, &

*pestis quare si  
ne febre posset  
inuadere, &  
huius ratio.*

B 3 plurimos



*Lib. p. Epid.  
señ. 3. com. 3.*

*Lib. pri. aph.  
com. 7.*

*Lib. 3. de dif-  
fic. resp.*

*Lib. p. de dif-  
fer. feb. cap. 4.*

*Experimento  
an detur pe-  
stis sine febre.*

plurimos interficiat, igitur necessario habet febrem conco-  
mitantem. ex Hippocrate. n. in Epidemijs acutissimi, & gra-  
uissimi morbi semper habent febres continuas ipsis coniunctas,  
ac ex Galeno, dū interpretatur sententiā Hipp. dicētis Mor-  
bos peracutos statim extremos habere labores, & ideo in  
his extremē tenuissimo victu utendū esse, febres ab acutis  
morbis sunt inseparabiles. quod idē cōfirmasse videtur, dū  
causas, & differentias difficilis respirationis explicaret. Vbi  
habet acutos morbos omninō cū febribus continentibus ge-  
nerari. Altera ratio hæc est. Pestis ex Galeno, febrium diffē-  
rētias docente, generatur ex putrefactione accēta circa cor  
cum hoc ex inspirato aere contingat; at facta putredine  
circa cor, ingenitoq; ibi calore præter naturam non potest  
non subsequi febris; igitur pestem febris semper concomi-  
tabitur. Experimentum autem tale est, videlicet quod asse-  
runt ipsi nullum hisce temporibus ex his, qui peste labo-  
rarint, sine febre inuentum esse. Vnde si nullum reperi-  
re liceat, qui peste, & non febre detineatur, nec etiam cre-  
dendum est, pestem sine febre dari posse. Hæc opinio, ut  
mea fert sententia, præterquā quod Hippocrati, & Ga-  
leno manifestissimē contradicit, veritati consona non est,  
ut omnia superius in contrariū deducta diluens clarissimē  
ostendam. & incipiens ab experimento dico, quod vnus-  
quisq; habet sua & propria experimenta: Vnde si hi asserūt  
non ab eis visum esse pestilētem morbum sine febre; Alij ex  
recentioribus sunt, qui asserunt se oppositum obseruasse.  
quare penes nos quod ad hoc res indecisa remanebit. si ta-  
men ab experimentatoribus vlla fides desumenda erit, qui-  
bus magis erit credendum, an hominibus nostris, an Hip-  
pocrati, & Galeno, qui duo fulgentissima medicinæ lumi-  
na fuerunt? his procul dubio. At Hippocrates, & Galenus  
affirmant se obseruasse pestilētes morbos sine febre; expe-  
rimento igitur pateat dari sine febre pestilētes affectus. quo  
supposito ad deducta in oppositum deuenio. Sanē locus  
ille

ille Hippocratis libro de spiritibus. clarè habet febres communes pestem vocari; sed quo pacto hinc elicere possimus febrè omnino esse inseparabilè à peste, nec video, nec conijcio. perinde autè est hæc positio, ac si morbos in acutos, & longos distinguerem, acutos autem vocarem graues, & periculosos, hincq; elicerem omnem grauem morbum, ac periculosum esse acutum. quod quantum veritati consonet, videant alij, & iudicent. Præterea hoc addo. si diuisio illa febrium omne morborum genus contineret, nulli dubiū esset, quòd hæc propositio [ febres communes sunt pestis ] æquiperaret eis [ pestis omnis est cum febre ] sed cum dentur alij morbi sine febre, ex prima illa propositione secundā deducere nō licet. quoniam ille terminus, pestis, potest esse quid vniuersalius febre communi, perindeq; esset, ac si diuiderè febrium genera in has duas differentias, videlicet, quòd primum genus esset cum loci particularis affectu, alterum autem non, sicuti ea, quæ nullo particulari affecto loco, sed à sparsa fiunt materia; eliceremq; ex primo dicto, omnè particularis loci affectum esse cum febre. hoc autem & fallum est, & illinc elici non potest; quoniam affectus particulares sunt quid commune & febri, & nonnullis alijs morbis. Quapropter concludo ex loco illo Hippocratis haberi quidem febres communes pestem esse: sed quoniam sub hac febrium diuisione non omne morborum genus continetur, ideò hinc non posse deduci omnem pestilentem affectum esse cū febre. Si autem Paulus, Aetius, ceteriq; scribentes de peste in tractatu febrium de ea egerint, hoc cum maxima factum est ab eis ratione; quoniam cum pestis vt plurimum, vel sit febris ipsa pestilens, vel pestilens affectus cum febre, iure de ea inter febres tractandum erat, locusq; hic erat conueniens, in quo hæc tractatio reponi debuerat, vt febrilè affectum, qui pestem sæpissimè concomitari solet, considerarent. Præterea hoc etiam ea ratione est factum; quoniā sicuti pestis est morbus cōmunis, similiter de ea inter mor-

*Paulus, Aetius, ceteriq;  
cur de peste in  
tractatione fe-  
brium egerūt.*

bos communes agere debebant. at febris respectu aliorum  
 morborum est communissima. His addo, quod si de affe-  
 ctibus particularibus pestilentibus agere sigillatim voluis-  
 sent (cum ferè oēs graues, & periculosi morbi, sicuti dysente-  
 ria, tenasmi, dolores colici, hepatis inflammationes, phreniti-  
 des, et yspelata, carbunculi, plurimiq; alij particulares mor-  
 bi possint esse pestilentes) sub singulo quoq; horū capite de  
 iisdē agere debuissent, remq; ipsam in immensum traxissent,  
 sapiusq; eadē ab iisdem repetenda forent. quod vt euitarēt,  
 sub cōmuni morbo, & in cōmuni loco, & in tractatu de mor-  
 bis cōmunibus de peste egerūt. Quare nō est, quod hinc eli-  
 cias horū scribentium mentē fuisse, febrē pestiferis morbis  
 essentialē esse. Quod idē hinc cōfirmari potest; qm̄ Paulus,  
 & Aetius, quos ceteri imitati sunt, agētes de morbis publi-  
 cē grassantibus, nō sub nomine febris, sed sub nomine mor-  
 bi, cum tñ in tractatione febriū de his agerent, rem & sentē-  
 tiam suā aperuerunt. si. n. opinati essent semper pestilentes  
 morbos esse cū febre, vel febrē ipsam esse, non assumpsissent  
 nomen hoc morbi genericū, & ad febres, & ad ceteros affe-  
 ctus, qui sine febre accedunt. Hæc quò ad auctoritates,  
 nunc ad rationes descendo. Prima hæc erat. Pestis est acu-  
 tissimus morbus, igitur cum febre, quoniam ad mentem  
 Hippocratis, & Galeni locis citatis. Omnis acutus morbus  
 febrem committantem habet. At ratio hæc falso innititur me-  
 dio, quod habet, omnes acutos morbos febrem coniunctā  
 habere. norunt enim medici nonnulla morborum acutorum  
 esse genera, quibus febris non annexitur. & hoc adeò cla-  
 rè pluribus in locis testatus est Galenus, vt mirū sit hæc non  
 fuisse ab his notata. nam dum explicaret, quare acutorum  
 morborum non cōmmino certæ sint prænunciationes, vel sa-  
 lutis, vel mortis, habet hæc verba. Febresq; vt plurimum  
 acutis morbis adiunguntur. rari enim sunt ex ipsis, quibus  
 febres non adsint; vt morbus attonitus, quem Græci apo-  
 plexiam vocant. In commentatione autem Aphorismi, in  
 quo

*Acuti morbi  
 an necessario  
 habeant cōiūm  
 etiam febrem.*

*Lib. 2. aph.*  
 19.

quo habetur, Mulierẽ vtero gerentẽ capi ab aliquo morbo acuto lethale esse, dicebat. sic. Et si absq; febre aliquis alius morbus acutus fiat, veluti morbus comitialis, morbus attolitus, quẽ Græci apoplexiã vocant, conuulsio, distentio, &c. hanc eandẽ sententiã cõfirmat loco illo, in quo de difficultate respirationis agitur per hæc verba, dũ loqueretur de morbis acutis. Fuerit autẽ utiq; & eorũ, qui citra febrẽ fiunt, velut etiã cõuulsiones. per quã omnia clarẽ habetur alios esse acutos morbos, qui fiant cũ febre, alios, qui sine febre. Cum autẽ non oēs acuti morbi necessariõ febrem annexã habeãt, nec ea ratio vilius erit roboris, dum habet; ideo febrẽ concomitari pestem, quia hæc sit acutissimus morbus. loca autẽ ea Hippocratis, & Galeni in oppositũ deducta nihil cõtra hæc sententiã habet. Quò. n. ad locum Epidemiorũ animaduertendũ est, Hippocratis intentionẽ esse per ea verba, cũ proposuerit plura esse febriũ genera, declarare, in cuius febris genere sit morbi grauitas, vitæq; discrimen, in quoq; securitas, & eiusdem leuitas esset; & ita inquit, quod morbi acutissimi, grauissimiq; ac maximẽ lethales sũt in continua febre, in cuius comparisonem, & oppositum subiungebat, Quartanam esse securissimam, facillimam, & longissimam. Semitertianã autẽ cum morbis acutis esse lethale. Nocturnam non admodum lethalem, sed longam. Diurnam autẽ longiorem. quã omnia proponebat non ad declarandã horum morborum essentiam, sed ad explicandam grauitatẽ, discrimenq; harum febrium, tanquam ea, quã ad prognosticum tantũ faciant, & ideo hinc non arguatur, quod acuti morbi semper cum febre fiant, sed quod acutissimi, maximi, grauissimi, ac præ ceteris omnibus lethales sint ij morbi, qui fiunt in continua febre. Quò verò ad locum Galeni, in quo habet. Febres à morbis acutis esse inseparabiles, sciendum est, quod loquitur de illis acutis morbis, qui sunt cũ febre ab his autẽ febres sunt inseparabiles; quã hi semper sunt cũ febre continua, vt dicebat Hippocrates, dũ rectam acutorum

Lib. 1. aph.  
30.

Lib. 3. de diff.  
respira.

Morbi acuti,  
qui sunt cũ fe-  
bre, habent ip-  
sas continuas.  
lib. p. reg. acut.  
tex. 8.



acutorum morborum victus rationem institueret vellet per hæc verba. Sunt hi igitur acuti morbi, quos Prisci nominatim perstrinxerunt, pleuritis, peripneumonia, plerentitis, lethargus, causus, & quicunque alij hos consequuntur morbi, quorum febres prorsus continuæ interficiunt. Quod est idem, quod Galenus lib. de difficult. respir. intendebat, dū habebat acutos morbos eos propriè vocari, qui omninò cū febribus continentibus fiunt; quoniam ij sunt soli, de quibus Hippocrates eo in libro pertractat, dum victus rationē acutorum morborum docere intendit. hi enim semper sunt cum febre, & horum febres sunt semper continuæ. quod tamen non includit omne acutorum morborum genus esse cū febre. Secunda erat ratio. Pestis ex Galeno generatur à putrefactione accensa circa cor, igitur necessariò habet febrem connexam; quoniam accenso calore, & putredine in corde, non potest non subsequi febris. Proculdubio, si verum esset semper generari pestem à putredine accensa circa cor, omninò à peste febris esset inseparabilis, sed illud falsum est, ut inferius declarabitur, dū in peste non per putredinē semper aerē agere, & dum vomitū pestilentis morbi nō semper circa cor esse, explicabimus. Quod idē processus Hippocratis confirmare potest, qui crysipelatosos recensens affectus, eorūdemq; putredines, & corruptiones, vnde ossiū denudationes, & decidentię procedebant, cum tanta putredine in nonnullis febrem non adfuisse testatur. hinc autem duo habemus, primum quòd à putredine circa cor non incipere hi affectus; quoniam cū tanta putredine necessariò insigniter febricitassent. alterum quòd fomes huius pestilentis affectus non circa cor, sed in partibus externis sequebatur. Præterea interdum circa cor quidem prima potest esse ex peste infectio, attamen vigente eius robore, validaq; existente vi expultrice, materia infesta quandoq; à corde ad alias partes, & ad externas transmittitur. Vnde modò cutaneos affectus, modò tumores ad axillas, ad inguina, & ad alias corporis

*Pestis an generetur à putrefactione accensa circa cor.*

*Lib. 3. Epid. sect. 3. sex. 25.*



corporis partes inuehit. hicq; non erit necessarium, vt febris subsequatur, dum vigente cordis robore, eiusq; vi naturali reluctante, materia peccans non ibi accenditur, sed alio, videlicet longe ab ipso corde trāsmittatur. His addo, quòd pestilentes affectus non semper ortum habent ab aere, sed nonnūquam hi ratione prauī alimenti assumptis in vsum hominum malis cibarijs generantur, tuncq; non necessarium erit, vt putredo accendatur in corde; quoniam in quacunq; alia corporis parte, cuiuscemodi & circa cor, potest prauitas humorum aggregari, cuius ratione pestilēs affectus subsequatur, & tunc qualitas illa pestilens non necessariò erit cum putredine, à quā putredine febris ipsa accenditur, & dependet. Quòd autem Galenus ibidem asserat pestem generari ex putredine accensa circa cor, & ideo quòd cum peste sit semper annexa febris, non est præter rationem, nec aliquid contra sententiam nostram habet; quoniam tunc loquitur de peste, quæ ratione vitiatī aeris corpora inficiat. Vnde cum hic inspiretur, videtur, quòd necessariò primò inficiat cor. At non semper pestilentes affectus hac fiunt ratione, quemadmodum cum fiunt, vel ratione puri contagij, vel ratione prauī victus. Præterea ibidem Galenus non pestis causas, sed pestilentis febris inquirat. & ideo cum præsupponat febrem, eiusq; causam indagando asserat circa cor accensa putredine ex vitiatō aere inspirato generari pestilentem febrem, non est, quòd hinc deducere possimus eum iudicasse, cuiuscunq; pestis hanc eandem esse causam, & in quacūq; peste febrem necessariò reperiri. nō negauit enim Galenus fieri etiam posse pestilentes affectus, & ratione vitiatī alimenti, & ratione etiam contagij, cuius merito censabat conuersionem eorum, qui peste laborant, esse vitandam; quoniam periculum est, ne inde contagium contrahatur. Et si forsā per contagium id non intellexit Galenus, quod nos intelligimus, ætasq; nostra perspicatius, & diligētius antiquitate perscrutata est, & cognouit,

*Lib. p. de diff.  
feb. cap. 2.*

uit, tamen hoc verum est, & pro certo censeatur, quòd multi in pestilentes incidunt affectus ex solo còtagio per fomitem, tuncq; non ab inspirato aere, vt Galeni præsupponit sententia, sed ex solo contagio auspicantur. cuius ratione potest illa venenata, & perniciosa qualitas non tantum cordi, sed & cuicunq; alteri membro communicari, & hinc febris necessariò ratione prædicta non accedit. At etiam ex inspiratione infecti aeris, ac ex valido contagio experientia docuit aliquos ita efficaciter inquinari, vt nec præcedente aliqua notabili alteratione, nec post mortem subsequente ullo pestilentis affectus signo, subito peste correpti, subito etiam perinde ac si præsentaneum venenum hausissent, de medio sublati sint. quid hoc potuit esse? nisi praua, & perniciosa illa qualitas, pestilens spiritus, & calorem innatum oppugnans, & expugnans simul, absq; quòd vlla facta sit in humoribus vel putredo, vel feruor; & idèò nec febris. si. n. hoc fuisset, non potuisset non adfuisse aliquod symptoma, signumue, quod hæc necessariò consequens, hæc eadem aliquo pacto concomitans indicasset. Quare constanter assero posse pestem, pestilentesq; affectus sine febre dari. hocq; tum experimento, tum rationi, tum Hippocrati, ac Galeno conformari.

*Peste infecti aliquando subito pereunt.*

*De essentia febris pestilentis. Cap. VI.*

**H**is habitis, ad declarandam febris pestilentis essentia descendendo. Quando humores corrupti, qui ex hoc extraneam naturam, perniciosamq; qualitatem sunt adepti, ad putredinem deueniunt, tunc fit febris pestilens. quæ nò calore putrido tantum, sed etiam qualitate maligna corlaccssit. calore quidem; quoniam omnia putrida alieno calore sunt calida, qualitate autem mala; quoniam corrupta extraneam improporcionatamq;, ac inimicam nobis naturam adipiscuntur. Qualitas autem hæc maligna à corruptione causatur, in extranea natura inuecta consistit, à putredine

*Praua qualitas à quo causatur.*

dine concitatur. primò enim humores corruptionem subeunt, à corruptione natura nobis pernicioſa, & inimica inuehitur, in qua mala hæc qualitas fundatur, quæ mala qualitas cor non fatigat per febrem, niſi cum humores ad putredinem deuenierint, hinc enim exſuſcitatur illa maligna natura, ad agendumq; promouetur; nam per putredinem omnia corrupta facilè exhalant, euaporantq; , & cum prius nihil redolerent, addita putredine foetida euadunt. Vnde poſtea quoquo verſus vapores ſibi conſimiles tranſmittunt, ſuamq; malam qualitatem facilius proferunt. exemplo hoc pateat. Vinum vappa factum, corruptumq; non accedente putredine nec caleſcit, nec fœtet. quòd ſi illa ſuperueniat, alieno calore ſtatim alteratur, fœtoremq; acquirit, adeòq; malam illam naturam in corruptione deliteſcentem promouet, vt abhominabile, & magis pernicioſum euadat. Vnde multi potu vini corrupti uſi ſunt, nullus tamen putreſcentis uſum potuit tolerare. Hoc idem humoribus corporis noſtri euenit. hi, dum ſunt corrupti, nondum autem putrefacti, nec calorem, nec malam qualitatem vnà cum calore de ſe neceſſario proferunt; quòd ſi putredo hiſ ſuperueniat, tunc mala illa natura in actum reducitur, & ad agendum promouetur. hincq; excitata vnà cum calore putrido cor fatigat. tuncq; fit febris peſtilens. hæc autem quæ febris, quoniam omnis febris eſt intemperies calida, calore nocet; quàm autem eſt maligna; pernicioſa qualitate ortum habente ex ſubſtantia nobis inimica, à corruptione cauſata lædit. Corruptione autem iſta non ſemper eſt vniformis, nec in puncto conſiſtit, ſed aliquando magis, aliquando minus intenſa eſt. Vnde prout vel maior, vel minor eſt, & prout magis vel minus diſtat à natura humorum priori, & naturali, ita etiàm modò magis pernicioſam, modò minus malam naturam in eoſdem inuehit humores. hincq; cū ad putredinē hi deueniunt, modò peſtilentem febrem minus malignam, modò magis procreāt; prout enim humores facti ſunt vel magis,

*Humores corrupti quando febrem peſtilētem inducunt.*

*Corruptio humorum non ſemper eſt vniformis.*

*Febris peſtilens quare, aliqñ magis aliqñ minus maligna exiſtit.*

*Corruptio, &  
putredo humo-  
rum in febre  
pestilenti quo-  
modo se conse-  
quantur.*

gis, vel minus alieni, impropportionatiq; naturæ nostræ, ita etiam quandoq; febris inde pendens efficitur modò minus, modò magis maligna. corruptio autem horum humorum quandoq; eorundem putredinem præcedit, quandoq; vnà cum ipsa videtur inuadere, clarè præcedit in febribus illis pestilentibus; quæ inter sporades morbos connumerabuntur, clariusq; in illis, quæ ex caritate annonæ, vitiosoq; victu, vel potu ortum habuere. hi enim (qui tali vñ sunt victus genere, cuiusmodi sub Antonino, potissimum autem in his, qui ruri degebant, factum est, cum prius malos, corruptosq; humores aggregarint) tandem febricitabant, cum iidem ad putredinem deuenirent; hisq; si sanguis, anteqnam febricitent, emittatur, non laudabilis, sed totus vitiatus conspicietur. siq; ad præseruationem expurgentur, humores omninò prauis & corrupti educuntur, qui probi ex malo victus genere non potuerunt gigni. corruptio igitur in hisce febribus putredinem manifestè præcedit. at in illis, quæ vel ex pestilenti aeris statu, vel ex contagio ortum habent, non ita liquet; immo videtur vnà accedere, quod tamen ita explicandū erit; Aer pestilens, contagiumq; cum inficit quempiam, non alia ratione validè, citòq; in eundem suam prodit actionem, quam ratione venenatæ naturæ; qua ambo hæc impropportionata homini, inimicaq; facta sunt, venenata autem hæc natura non in putredine consistit. quod & validitas, & velocitas agendi indicat: licet enim quod à putrido contāgitur, putridum fiat, tamē hoc non subitò, nec velociter fieri potest, sed sensim, & temporis spacio conuenienti contingere debet, quoniam hinc qualitatū actiuarū, passiuarumq; mutua actio, passioq; per quam res putrida fiat, requiritur. at res venenosa, cum non ratione qualitatū, sed ratione substantiæ agant, possunt, cum actuatæ sunt, subitò, & validè agere; hinc hausto veneno quis repente moritur, per fomitemq; ex contagio quis subitò inficitur; quæ nec putrida assumpta, nec adhæsu contāgentia facere possunt. præterea si hoc de pestilenti

*Venenata humo-  
rum natu-  
ra in putredi-  
ne non consistit.*

pestilenti aeris statu quis posset imaginari, quid de contagio asseret? in quo vnico contactu, vnica inspiratione communicatur pestilens affectus, hoc ne ex putredine? cū egrotans ex contagio infectus, & carnes diu macätatas, & fructus horarios, quę omnia ad putrescendum promptissima sunt; consimiliaq; diu contrectet, nec ea putrefaciat: at putrefaciet humores in corpore alterius existētes, qui à natura eius propria regulantur, & reguntur vnico contactu, vnicaq; expiratione, simulq; pestilentem affectum inducet? sanè hoc non ex putredine, sed ex venenata natura contingit, cuius violentię ratione corrupta humorū substantia, factaq; pernicioſa, cum amplius regi à natura nequeat, tandem putrefcit. hincq; fit febris pestilens à contagio inducta. hoc idem in pestilenti aeris statu contingit. hic enim factus ex corruptione, vndecunque causata fuerit, naturę humanę inimicus, attractusq; tum per arterias, tum per inspirationem, primò quidem spiritus, postmodum humores, vltimò partes corporis solidas labefaciat, non putredine certè, sed mala, & pernicioſa qualitate, qua humores præcipuè labefactati, multumq; corrupti, cum à natura non regantur, statim postea ad putredinem deuenientes febrē pestilentem causant; hincq; febris pestilens ex aeris mala constitutione. Hoc idem hinc confirmare possum, quòd sæpe & contagium, & aeris status pestilens pestilentem affectum in humores inducant nulla præſente putredine, vt clarè liquet, cum sine febre pestis inuadat. si enim à putredine hoc esset, quis posset imaginari pestilentem affectum in humoribus, ipsisq; putrescentibus nullam præſentem adesse febrē? at sæpe sine febre pestilentes affectus apparent. In pestilenti igitur aeris statu, à contagioq; inuehitur, dum febris per hæc introducit, corruptio, & putredo, quę simul accedere videntur, attamen & tempore, & ratione semper corruptio putredinem præcedit, licet breui hæc illam subsequatur. Quapropter in omni febrium pestilentium genere putredo

*Febris pestilens quasit.*

redo corruptionem subsequetur. hincq; concludendū erit, quòd febris pestilens ea est, in qua humores corrupti putrescentes non solo calore putrido, sed & pernicioſa qualitate cor laceſcunt: quæ mala qualitas fundatur non in temperatura aliqua, vel qualitatibus vllis, sed in natura venenata ex corruptione causata. sicuti pariter vis attrahendi ferrū cōsistit in natura magnetis, sicutiq; vis educandi bilē fundatur in substantia Rhabarbari, non in eorūdem illa temperie, vel qualitate. Quemadmodum autem & Rhabarbarū in corpore nostro suam non prodit actionem, antequam actuatū sit a calore nostro, ita & humores corrupti, antequam putrescant, per febrem suam non proferunt actionem, sed tantum cum per putredinem mala illa qualitas delitescens excitatur, cuiusmodi cum per actuationem in Rhabarbaro attractio bilis exsuscitatur. Animaduertendum autē est, quòd ista mala qualitas pendens à venenata natura causata à corruptione non excitatur à putredine solum; quoniam & aliter suam potest pròdere actionem. si enim causæ putredinem inducentes non sint præstò, poterit quidem hæc materia imputris aliquandiu seruari, tamen spatio temporis, vel cum in molem eximiam excreuerit, vel cū non retineatur in proprio conceptaculo, vel cū à causa aliqua extranea concitabitur, suam depromet actionem & vim, & prout magis huic membro, quàm illi, inimicam gerit naturā, modò etiā syncopas, modò epilepsiā, modò alias infert lēſiones, nulla concomitāte febre. quæ eadem materia, si ad putredinē deueniat, cum vel in mole eximia, vel in loco ad febrē pròducendam apto extiterit, tunc febrē inuehit pestilentē, malamq; illam qualitatem putredine mediante facilius depromet, ac excitabit. His omnibus hoc addo. quoniam longa serie determinatum est in febre pestilēti corruptionem semper putredini præire, non existimet quis, quòd omnis corruptio putredinem præcedat; nam & aliquando corruptio à putredine causatur, cuiusmodi frequenter in externis videmus

*Mala qualitas non semper à putredine excitatur.*

*Corruptio humorum nō semper putredinē eorundem præcedit.*



demus. nam & fructus multi, præcipuè horarij, & carnes diu  
 mactatæ, & frumentum, legumina, cæteraq; cerealìa semina  
 malè reposita sæpè per putredinem corrumpuntur. quod  
 idem humoribus corporis nostri sæpius euenit; nam accen-  
 dente putredine aliquando corrumpuntur, nec tamen hoc  
 à superioribus dissonum est; nam in omni quidem febrium  
 pestilentum genere corrupti humores, qui naturam nobis  
 inimicam adepti sunt, putrescunt, hincq; febris pestilens pe-  
 det. attamen & aliquando ex putredine humorum ingenti  
 ijdem corrumpuntur, naturamq; venenatam inde cõcipiunt.  
 quod tamen cum euenit, nundum facta est febris pestilens,  
 sed hinc fieri debet. dum enim intensa putredine humores,  
 siue hoc in membro particulari, siue in venis. patiantur, pu-  
 trescunt, nondum autem sint corrupti, non potuerunt con-  
 cipere naturam illam perniciosam: sed putredo illa est via  
 ad corruptionem, & ad generandam malam illam. qualita-  
 tem. quæ duo si subsequantur, tunc perscuerante eadem,  
 vel noua accedente putredine fit febris pestilens. quod ex-  
 perientia sæpissimè patuit. multæ enim incipiunt febres, quæ  
 à principio non sunt pestilentes. quæ tamen, si medici igno-  
 rantia, negligentia uè, ægrotantiumq; inobedientia, aut cau-  
 satum externarum sæuitia malè tractentur, acuta, magisq;  
 intensa facta putredine in pestilentes desinunt. hoc nõ aliun-  
 de euenit, quàm ex mala corruptione in humoribus causata  
 ab intensa putredine. quæ tamen non potuit edere febrem  
 pestilentem, nisi cum materia putrescens eo corruptionis  
 deuenerit, qua perniciosam naturam. consequuta sit. casus  
 consimiles rari sunt, febris autem pestilens à principio sæ-  
 pius talis, s. pestilens inuadit, tuncq; non à putredine inten-  
 sa mala illa qualitas ortum habet; nam vnà cum putredine  
 apparet, immo in primo insultu febris, dum putredo incipit  
 tantum, nondumq; consummata est, natura illa maligna iam  
 est. genita, tuncq; magnam de se. profert actionem. quod  
 clare indicat qualitatem hanc malam aliunde, quàm ex pu-  
 tredine



tredine generari. Quare statuatur, in omni febre pestilenti putrescere humorē, qui ex corruptione perniciosā, venenatāq; labem, quæ in nulla intēperie consistat, sed in natura aliena, nobisq; inimica, ex corruptione in humorē inuecta conceperit. hæc autē natura est intima rei substantia humanæ opposita, cōsimilis ei, quæ in lethalibus venenis reperitur.

*Praua qualitas febris pestilentis an consistat in summa putredine. Cap. VII.*

**S**Cio plurimos huiusce fuisse opinionis, quod prava qualitas, quæ affligitur cor in febre pestilenti, in vnica consistat putredine, eaq; summa. quæ opinio, quoniā præclarissimos auctores, fautoresq; habuit, ideò à nobis erit discutieda. Nemini dubium est, quod humores corporis nostri eò corruptionis quandoq; deueniunt, vt propriam amittentes naturam, alienamq; subeunt, lethalibus venenis cōsimiles reddantur. corruptio hæc nō est putredo, longēq; à putredine distat corruptio. à gladio, à veneno, ab apoplexia, à multisq; alijs internis morbis corrūpitur homo, nō tñ putrescit. in corruptione solum propria rei natura intima destruitur: at putredo est via in corruptionem, putrediniq; additur, & calor, & foetor; hinc febris & fetor a nomē, quod nō à phædina, licet vtraq; partem corrumpat; quoniam hæc sine putredine, illa cum putredine corrumpit. putredo igitur, & corruptio adinuicem differunt. His addo quod quandoq; humores corporis nostri alienam subeunt naturam; semper corrumpuntur, at non semper putrescunt. hoc ex inductione patere potest. In epilepsia per consensum à digito pedis, vel à crurē, vel à manu, vel à quocunq; alio particulari membro (cuiusmodi aliquando nos, testante experientia, vidimus) genita est materia perniciosa, venenatam naturam gerens in loco primario affecto, at hoc ne ex putredine & an ex corruptione & non herculè ex putredine; quoniam cum humores nostri corporis ex putredine concipiant

*Corruptio humorū, p quā acquirunt prauā qualitātē, non est putredo.*

*Corruptio qd differat à putredine.*

*Humores, cū prauā qualitatem suscipiūt, semper corrumpuntur, at non semper putrescunt.*

cipiunt igneum calorem ad sensum in parte læsa, & ante pa-  
 roxismi inuasionem, dum materia hæc putresceret, perci-  
 peretur caliditas, eaq; cum molestia. quod tamē nec ratio,  
 nec experientia comprobare potest, imò nisi perciperent  
 ægrotantes in inuasionē epilepsiæ motum illum à parte læ-  
 sa, siue sit aura quædam, siue qualitas, nulla adesset con-  
 iectura, qua inueniri posset pars primariò affecta. In vteri  
 præfocatiõe materia, à qua vapor ille malignus, qui vel cor,  
 vel cerebrum, vel diaphragma petit, eleuatur, procul dubio  
 verè in vtero non putrescit, licet in eodem verè corrupta  
 sit. si enim putresceret, caloris sensum eò inueheret. quod  
 tamen nequaquam verum est: immo experientia oppositū  
 persuadet. non solum enim ibi nullus percipitur calor, sed  
 frigiditas, & non tantū illius partis, sed etiam totius cor-  
 poris, satis insignis frequenter apparet, quam subsequi ex  
 putrido humore nō est possibile. Sed quid magis? in his,  
 qui subita morte necati sunt ex materia venenata effusa su-  
 pra cor, corruptio humorū proculdubio certissima est, at nō  
 putredo. nam si à putredine hoc esset, cum hæc materia om-  
 nium sit perniciosissima, maximè deberet putrescere; at  
 quomodò potest tanta esse putredo in partibus internis,  
 præcipuè circa cor in thorace ipso, vbi tales materiæ potis-  
 simum suam habent sedem, sine vllō caloris sensu? hoc pro-  
 fectò fieri non potest: & tamen hi subito de medio tollun-  
 tur, nulla præexistente sensibili læsione: constat igitur ve-  
 nenatam adipisci naturam humores, cum corrumpuntur,  
 qui tamen nō necessariò putrescunt. His habitis rem ipsam  
 aggredior. Materia, quæ in pestilenti febre putrescit, cor  
 eo tēpore mala affligit qualitatē, quo vix incipit putredo.  
 hoc autem firmum est indiciū, prauam hanc qualitatem  
 aliunde, quàm ex putredine, ortum habere. nam incipiente  
 febre ipsa, in ipsiusq; primò principio, & insultu, in quo  
 & febris est pestilens, & perniciosa qualitate cor petit: tunc  
 putredo, quæ est incipiens, non potest esse summa. si enim

morbi non ab augmento, nec à statu, sed ab ipso principio, in quo omnia sunt imbecilliora, incipiunt, non in prima febris pestilentis inuasionem poterit esse summa putredo. præterea si ignis omnium agentium validissimus ligna concremādo non potest eorum substantiam unico ictu ignescere, sed prius partes exteriores, & sicciores, mox & interiores adurit; quid de putredine, quæ longè imbecillior agens est, asserendum erit? hæc enim non in instanti totam humoris substantiam, sed eo ordine, quo & palæ, & stipulæ, & virgulæ, & ligna simul mixta concremantur; ita prius partes humorum tenuiores, & accendi faciliores, & ad putrescendum aptiores, postmodum & solidiores, & intimiores populatur. impossibileque est, quod uni ictu oculi profunda, summa, sordidaque simul in re una fiat putredo, eo statim summa putredine putrescente. Quod idem exteriora omnia putrescentia attestantur, & indicant. nam quicquid extra hominem putrescit, prius leui, & superficiali (ut ita dicam) postea labe ingrauescente, summa, & sordida, profundaque putrescit putredine. nihil autem in totum, & in intima rei substantia statim putredinem summam concipit, nec concipere potest. putredo enim, cum ex mutua actione, & passionem actiuarum, passiuarumque qualitatum fiat, non potest subito ad summam peruenire gradum, sed necessario primò leuior sit, postea augetur, inualescitque; & prout passivæ qualitates dominium maius suscipiunt supra primas, magisque humidum euagatur, ita intensior, & maior euadit. Quare cum à principio non possit esse summa putredo, à principio autem prava qualitas affligat, ab ipsa summa putredine prava hæc qualitas non dependet, sed à venenata humorum natura, quam ex corruptione oriri iam docuimus. At si quis per summam putredinem non tam intelligat, quæ intimam rei substantiam populatur, sed eam, cuiuscunque sit partis, quæ sordida, & prava est, nec etiam hinc conijcere potest malam hanc, perniciosamque qualitatem à summa dependere putredine; quoniam si hoc esset à putredine, contingeret, vel quia

*An mala qualitas febris pestilentis consistat in sordida, & prava putredine.*

vulgaris

vulgaris putredo ad hoc satis, vel quid aliud necessario addendum esset. nō herculē vulgaris putredo satis esse potest, quia hinc oēs febres putridæ essent pestilentes: at quid est hoc aliud, quod requiritur? vel extensio, vel intensio putredinis. non extensio, quia febres synochæ inter continuas sunt micissimæ, in quibus tamen putredo in maiori est mole, quàm in ceteris omnibus. an igitur intensio? certè ista intensio in gradu, si in inuasionē febris reperitur, vel à causis efficientibus, vel à materiali prouenit. causæ efficientes sunt duæ, scilicet vel putrida occurrētia, vel obstructio. obstructio nō potest esse sufficiens causa huius sordidæ putredinis: tū quā est causa cōmunis ceteris febribus putridis, ob quā tamen, licet aliquando sit contumacissima, & validissima, non redduntur pestilentes; tum etiam quia multæ pestilentes febres, vel nullis, vel minimis præsentibus, obstructionibus generantur, cuiusmodi eæ sunt, quæ ex contagio, & in pestilenti aeris statu inuaduntur. Nec etiam putrida occurrentia possunt esse causa totalis huiusce prauæ putredinis. quoniā licet hoc possit in febribus, quæ ex contagio, pestilentiq; aere contingunt (hoc tamen à veritate dissonum est) imaginari: nihilominus in illis, quæ inter sporades morbos eueniunt, nihil tale fingere possumus, cū nulla dentur in his putrescentia, quæ adhæsit tantum, & per fomitem humores in putredinem deducant. relinquitur igitur sola materialis causa, tanquam sufficiens ad dandā tam malam putredinem; hæc materialis causa vel sunt humores, vel superfluitas corporis nostri. hæc duo autem, cum tam sordidam subeunt putredinem, vnde hoc habent? certè cū sunt in naturali statu, nullus sanè mentis assereret, hanc mutationem ea posse inire; quoniam cum nec causæ putredinis efficientes ad hoc agendum sint aptæ, ipsaq; materia per naturalem essentiā ad hoc possit resistere, quomodo possent tantam recipere putredinem? Si autem non retineant naturalem statum, hoc est, vel quia aliquam subierint tempe-

*Putredinis  
causa efficien  
tes.*

*Putredinis  
februm mate  
rialis causa.*

ramenti mutationeni. & tunc si putrescant, vulgari putredine tantum afficiuntur. quod idem in cæteris febribus putridis quotidie euenit, vel etiam substantiæ, & tunc corruptionem patiuntur, eoq; tempore forsitan possunt hanc sordidam putredinem inire, aptaq; sunt, vt summè, & profundè putrescant. Sed quid tunc erit? demonstratum est, humores; excrementaq; corporis nostri per corruptionem extraneam inire naturam, nostramq; inimicam: quare cum hæc ad putredinem deuenient, mala illa qualitas, quæ in febre pestilenti cor petit, per corruptionem iam erat genita. cui tantum hoc additur, quod per putredinem ad agendum promouetur, excitaturq;: nõ igitur licet in principio, in insultuq; febris pestilentis summa, sordidaq; adsit putredo, ab hac qualitas ea mala dependet, nec generatur, sed à materia corrupta à putredine excitata deueniet. His omnibus certissimè addo argumentum. Si febris pestilens, eiusq; perniciofa qualitas in vnica consisteret putredine, fomes per contagium, vel ex contagio ægrotans, aerq; in pestilenti aeris statu per putredinem eadem inducerent. quod cum longè à veritate dissi deat, firmissimum sit indicium, qualitatem malignam in vnica non consistere putredine. qui enim pestilenti febre ex cõtagio laborat, cum alterum inficit, siue hoc sit immediatè, siue per fomitem, non per putredinem hoc agit: cum enim putredo sit communis omnium mixtorum passio, hincq; accidat, vt quod à putrido tangitur, putridum fiat, si actio cõtagiosa esset per putredinem, omnia contacta (præcipuè autem fomitem ipsum, qui tamen per menses, & annos immunis ab omni putredine seruetur) & non tantum hominè, putrefaceret; & si non æquè cito hæc, vt illa, tamen omnia tempore conuenienti posset putrefacere. quod tamen falsum est; idem de aere pestilenti hominem coinquinanti est asserendum: quia si per putredinem hic ageret, pestes omnes generales omni animalium generi, & non particulares vni particulari essent; æque enim in omnia putredinem inueheret

*Febres pestilentis perniciosa qualitas nõ consistit in putredine.*

heret, cuius tamen oppositum experientia testatur, qua pestis vni animalium generi nocere, & alteri non communicari videmus. non igitur per putredinē hęc inficiunt; at si non per putredinem, qua ratione id agunt? mala agunt qualitate, quæ non ex putredine, sed ex corruptione orta inimica humanæ naturæ facta est. sicutq; ex corruptione orta est, ita & corruptionē inducit, hincq; in altero conformē progignit ex consimili corruptione qualitatem. quæ ideo homini, & omnibus animalibus est perniciosa; quoniam quod vni est venenum, nō omnibus est venenum, sicuti taxus non ruminantibus animalibus lethalis est, quæ non est ruminantibus, cicuta homini perniciosa, quæ sturno alimentum est, & plura consimilia sunt. hinc autem ex aere fiunt pestes huic speciei particulares, & non illi, quoniam diuersam, & non eandem semper subit corruptionem. per hanc autem adipiscitur naturam huic animali, per aliam alteri inimicam. Pariter in contagio facta est corruptio, quæ homini, & non ceteris animalibus est lethalis. hincq; contagio infectus solum hominem, & non cætera corrumpit. Quod si in infecto ex contagio, & in coinquinato ex aere pestilenti subsequatur febris superueniente putredine, non est, quod nō præcesserit & corruptio, & mala qualitas; idē enim in his contingit, quod & in gangrænâ. in hac enim prius corrumpitur pars gangrænata, postea putrescit. ita in febribus his pestilentibus prius corrumpuntur, postea putrescunt, humores. Quod autem & corruptio semper præcedat putredinem, quodq; mala hæc qualitas non à putredine dependeat, hinc confirmari potest, quod nec infectus ex contagio, nec aer pestilens semper, cum hominem inficiunt, febrem inducunt. nam infectus ex peste certè necessario egrotat, at non necessario febricitat, multiq; ex contagio, & ex aere pestilenti laborarunt nulla concomitante febre, in quibus tamen semper fuit humorum corruptio, at non putredo, quod clarè monstrat hæc agentia non per

*Pestis quare  
vni animalis  
speciei noceat,  
& nō alteri.*

*Corruptio in  
pestilenti febre  
putredinē præcedit.*



*Febres pestilē-  
tes, in quibus  
nullū apparet  
putredinis si-  
gnum, quales  
sint, & quare  
hoc contingat.*

putredinem, sed per malam qualitatem ex corruptione agere, malamq; hanc qualitatem nō in putredine, sed in corruptione consistere, quæ semper laborantes peste, siue febricitent, siue nō febricitent, concomitatur. Hincq; accidit, quod quando in febre pestilenti affectus pestilens à sanguinis prauitate ortum habet, sicuti in caritate annonæ contingere cōsuevit, vena sc̄cta, statim sanguis apparet corruptus, qui non ex putredine, quæ adhuc leuis est, & incipiens, sed ex corruptione malus est; vnde postea cum putrescat, febris edit pestilentem. Ad horum confirmationem hoc vltimum addam. Medicus artifex est sensatus, morbosq; intimos per signa dijudicat, vnde maior huius nostræ artis pars coniecturalis dicta est. cum igitur hac via procedat ars nostra, si hæc praua qualitas in summa consistit putredine, sicuti prauæ qualitatis signa clara apparent, ita & summæ putredinis inditia certa adesse deberent: at infinitæ contingunt febres pestilentes, quæ nullum, vel minimum summæ putredinis signum nec in pulsu, nec in lotio, nec in excrementis cæteris præbent. cum autem absint hæc signa, qua via, nisi forsan obstinata, peruicaciq; sententia, erit iudicandum in his summā adesse putredinem? at dicent, febres hæ non putridæ, sed hecticæ sunt, ideoq; signa hæc in his non sunt necessaria, cū putredo nō in humoribus, sed in cordis substantia sit; ideoq; & pulsus, & vrina ab his, quæ in sanis visuntur, non longè distant. quoniam partes solidæ non æquè, vt humores, per excrementa suā proferunt, manifestant vel læsionem. At certe hoc figmentum est: nam si cor in sui substantia hanc putredinem conciperet, quam excogitare medicinam ad eius salutem ars nostra posset? nullā profectò. si enim nec erysipilas, nec inflammationem, nec vlcus potest cor tolerare, tantò minus putredinem tolerabit. quare nemo huic febrim generi superuivere posset; cuius tamen oppositum quotidiana demonstrat experientia. nam ex his, qui pestilenti febre laborant, multò facilius, pluresq; ex his euadūt,

si rectè



si rectè curentur, qui nullum putredinis signum habent, quam hi, in quibus multa summæ putredinis adsunt indicia, cum autem & multi ex huiusmodi febribus liberentur, multique his superuiuant, necessariò concludendum erit, nec putredinem in cordis substantia esse, nec in summa putredine, cuius nulla extant indicia, prauam hanc consistere qualitatē. Quamuis autem in consimili febre, ubi vel nulla, vel minima putredinis indicia apparēt, in pluribusque alijs in prima saltem inuasiōe negatum sit summā adesse putredinem, affirmandum tamen est in vnaquaque pestilenti febre malignam putredinem reperiri. Nec idem est dicere malignam, & summam putredinem. Summa enim est, cum intenditur ad summum gradum: quod accidit, cum qualitates passiuæ supra actiuas omninò dominantur, humidumq; cum à calore interno amplius nullo regatur pacto, liberè euagatur. vnde & graecolentia, & foetor succedit. maligna autem dicitur, cum materia, quæ malam iam qualitatem, corruptionemq; conceperit, licet ad summum non peruenerit putrescendi gradum, putrescat. huic enim excitatur omnis iam concepta labes, ad agendumq; facilè promouetur. hanc malignā putredinē in omni febriū pestilētum genere ponimus: summā autē negamus, non quia summa in aliquibus possit adesse, sed quia hæc in omnibus nec reperitur, nec ab hac pestilentis febris essentia dependet. in qua autē febre hæc dabitur, nil aliud proferet, quàm maiore morbi sæuitiā, discriminēq;: quò enim maiore concipit materia corrupta putredinē morbus inde genitus eo semper grauior, ac sæuior redditur, & causatur.

*In omni febre pestilenti maligna adest autredo.*

*Putredo summa, & putredo maligna differunt, et huius ratio, et causa.*

*An in febre pestilenti vel cordis humiditates, vel humores in eiusdem ventriculi existentes necessariò putrescāt.*

*Cap. V I I I.*

**I** Vdicarunt nonnulli, pro certoq; affirmarunt febrem pestilentem in duobus tantum consistere, quorū primum est,

est, quòd summa sit putredo in humoribus, à quibus ipsa pendet: alterum, quòd humores hi ea summa putredine putrescentes in ventriculis cordis, tanquam in foco, vel si non in eius ventriculis, ipsius saltem cordis humiditates putrescant, summam putredinem dicunt, sæuities symptomatum clarè indicat: quòd autem putredo sit vel in humoribus cordis, vel in eius humiditatibus, significant & eius generationis modus, & superuenientia symptomata, & cordis validæ, & prauæ affectiones. nam vtplurimum generantur hæ febres ex aeris inquinati, & corrupti inspiratione: hic autem aer primò petit cor, igitur vel cordis substantia, vel humores necessariò ipsius cordis afficiuntur. ac substantia tantum in hæctica, igitur in omni putrida febre pestilenti, vel cordis humores, vel eiusdem humiditatis putrescunt; hoc idem indicant & symptomata, & cordis affectiones: nam in his febribus, quàm primò virtus cadit, superueniunt syncopæ, adsunt æstuationes ingentes, & inquietudines, nullo existente loco alio particulari affecto, magnæ accedunt. igitur in his febribus materia putrescens sedem habet in corde, tanquam in foco. Sententiæ hæc satis probabilis videtur, nequaquam tamen vera est. nam quòd necessario in eiusmodi febribus maligna, sed non summa putredo requiratur, ex præmonstratis satis liquet: quòd autem in omni febre pestilenti in corde tanquam in foco materia putrescat, nec experimento, nec rationi consonum videtur, Experimentum quidem contrarium dicat; quoniam in colica illa pestilentia, quæ Pauli tempore viguit, totamq; Italiam, nonnullasq; alias Romano Imperio subditas regiones populata est, profectò materiã nō in uentriculis cordis, sed in ipsis intestinis crassiorib<sup>9</sup> tãquã in foco habebat. Viderūt patres nostri annis illis celeberrimis millesimo quingentesimo vigesimo octauo, & nono phrenitides pestilentes plurimas, lethargicasq; passionēs, nonnullasq; pleuritides, at certè in his & in cerebro, & in pleura materia tanquã in foco,

*In febre pestilenti materiã in corde tanquã in foco putrescere, non est vniuersaliter verum.*

foco, nō herculè in cordis ventriculis putrescebat, vidimus & nos consimiles morbos pestilentes, quorum materia sanè non in corde ipso, sed alibi sedem habebat. Bubones, carbunculi, tumoresq; alij consimiles pestilentes dum sunt affectus primarii, sæpè pestilentem febrem inducunt. at in hac certè in inguinibus, non in corde materia putrescens tamquā in foco reperitur. plures alij reperiuntur pestilètes morbi, quorum nullus in corde causam febris habet, sed in quouis alio particulari morbo, quos (quoniam rectè considerāti antiquiorum dicta patere possunt) non recensebo. Et si phrenitico illi, qui in Thaso tertia die peremptus est, quem tamen pestilenti affectu non laborasse affirmo, ut in ferius probabitur, non phrenitis, quæ symptomatis vice superuenit, sed virulentorum humorum copia, & mala qualitas in causa mortis fuit, non est, quòd in omni pestilenti morbo locorum particularium affectus semper symptomatum vice consequantur, supponantq; alteram præcedere in corpore malam dispositionem. huius enim phrenitici casus est particularis, à quo solo vniuersalem deducere conclusionem non licet. Præterea sicuti mors tertia die in isto accelerans indicium esse potest non ex phrenitide, quæ non ita hominem citò perimit, sed ex febre praua ab humoribus virulentis pendente cum periisse: ita in prædictis casibus circuitus proprius morborum proprium typum seruantiū, indèq; vel in mortem, vel ad salutem terminatium sufficiens signum sit, quòd loci primario affecti, & non symptomatis vice sint læsi, quòdq; in illis materia tanquam in foco sedē habeat, illincq; tota vis morbi, tãquam à proprio fonte emanet. nec virtutis casus, nec syncopæ, aliaq; consimilia aptū possunt esse indicium ad significandam in corde, tanquam in foco, putredinem. quoniam licet hæ sint propriæ cordis passiones, non tamen semper primario affecto corde generantur. nec proprietas passionis semper affectionē primariam includit; sicuti enim epilepsia à digito pedis sit propria

*Lib. pri. Epid.  
sect. 3. sex. 25*

*Cordis propriæ  
affectiones nō  
sæpè sūt pri-  
mario affecto  
corde.*

priè affecto cerebro, sed non primariò. ita in febre pestilen-  
 ti symptomata illa superueniètia indicant quidem cordis  
 propriam, at non primariam affectionem. nam potest alibi  
 materia putrescere, quæ tamen ad cor qualitatem calidam,  
 & perniciosam vnà transmittens ea praua inducat sympto-  
 mata, propriè quidem, at secundariò affecto corde. Aestua-  
 tiones etiam illæ, & inquietudines à multiplici possunt cau-  
 sa prouenire, sicuti affecto ore ventriculi, alijsq; visceribus,  
 vel existente materia putrida in vasis magnis propè cor, &  
 à consimilibus affectibus; quare nec necessariò indicant ma-  
 teriam in corde, tanquam in foco putrescere. Nec harum  
 febrium per inspirationem generationis modus hoc idem  
 sufficienter demonstrare, aut persuadere potest; quoniam  
 causa hæc ad omnes non est vniuersalis: quæ enim inter spo-  
 rades morbos connumerantur, & quæ per contagium eue-  
 niunt, nullam talem generationem, sed longè diuersam  
 habent. Non negandum quidem est, quòd aliquandò ma-  
 teria in corde tanquam in foco putrescat, quod potissimum  
 affirmamus contingere posse in pestilenti aeris statu, dum  
 inspiratus aer in corde ipso corruptionem, & malam quali-  
 tatem inuehendo est in causa putredinis vel humorum, vel  
 humiditatum ipsius cordis. non tamen hoc vniuersaliter ve-  
 rum esse in omni febrium pestilentum genere est asserendū.  
 nam cum materia in huiusmodi febribus putrescens ad cæ-  
 tera venena proportionem habeat, ita & ipsis conformem  
 naturam retinet. Venena autem omnia licèt cor lædant,  
 hincq; mors sæpè in veneno infectis succedat: non tamè om-  
 nia hæc, primò cor ipsum, sed multa sunt, quæ ante cor pri-  
 mò alias petunt partes. sicuti Cantharides, quæ primo ve-  
 sicam, solatrum furiosum, quod primò cerebrum, lepus-  
 marinum, quod primò pulmonem petit, vltimò autè om-  
 nia hæc & cor ipsum inuadunt, vnde vitam terminare pos-  
 sint. consimiliter in febre pestilenti, licèt multoties prima-  
 ria affectio sit in corde ipso, non tamen hoc semper cōtin-  
 git,

*Venena omnia  
 licèt lædāt cor,  
 & mortem in  
 ferre possint,  
 non tamè om-  
 nia cor ipsum  
 primo petunt.*

git, sed & in alijs partibus esse potest, à quibus tamen, & affectio ipsi cordi, excitante hanc putredine, communicari queat, nec hoc præter rationem; quoniam si in corde ipso, quod omnium membrorum nobilissimum, & validissimū existit, potest tanta, & talis generari putredo; quid prohibet in cæteris corporis humani partibus, quæ omnes corde ad resistendum causis morbificis sunt imbecilliores, consimilem fieri affectum; unde communicata deinceps cordi mala illa qualitate febris pestilens generetur? Non igitur ad constituendam febris pestilentis essentiam requiritur, quòd mala illa putredo in corde, tanquam in foco reperiatur, sed sat erit, quòd in eo sit loco, à quo possit pernicio sa qualitas cordi communicari, per quam à cæteris febribus distinguitur, per quamq; ab iisdem diuersa est. Relinquitur ergo, quòd febris pestilens ea sit, quæ non calore tantū putrido, sed etiam pernicio sa qualitate cor affligens generationē habeat ex putredine maligna, quæ vel in corde, vel in alia corporis parte, unde praua illa qualitas cordi communicari possit, sedem habeat.

- d. 13. p. 157  
 1501. 15. 2. 15. 15.  
 . 1501. 15.

*Febris pestilens  
 que sit.*

*De differentijs febris pestilentis à subiecto. Cap. IX.*

**D**Eclarata febris pestilentis essentia, ad eius differētiās descendo, quæ cum sint multe, & diuersæ, diuersumq; studium requirant, omnes percurrā, initium ab eis sumens, quæ à subiecto tanquam præcipuæ, & principalissimæ capiuntur. Summæ omnium febrium differentiæ à subiecto sumuntur: prout enim hoc, vel illud in calefacto esse constitutum est, ita etiam febrium diuersa prodeunt genera. subiectum hoc triplex est, sicuti tria sunt ea, ex quibus humanum corpus est constitutum; nam vel spiritus, vel humores, vel partes solidæ sunt eæ, à quibus calefactis febres specificantur: hinc enim factum est, ut aliæ diariæ, & synochæ, aliæ putridæ, aliæ sint hecticæ febres. cum autem ex horum subiectorum diuersitate diuersa ita fiant febrium genera,

*Febris ephæ-  
mera pestilens  
an detur.*

nera, considerandum est, an febres pestilentes per hæc eadem subiecta distinguantur, & an, quemadmodum febrium non pestilentium tres sunt differentiæ, scilicet diariæ, putridæ, & hæctica, cõsimiliter etiam detur febris pestilens ephæmera, putrida, & hæctica. Quod detur febris pestilens putrida, adeo clarè liquet, ut nec declaratione, nec probationo egeat. de ephæmera hæctica maior est difficultas. Superioribus annis in Anglia, Germaniâq; inferiori, & circa finitimas illas regiones febris pestilens insolens genus apparuit, quod speciem ephæmeræ præferebat; quâprimùm hæc inuadebat, concidebant vires, pulsus ad inæqualitatem, celeritatem, & frequentiam mutabantur, hypothymia incidebat, tantusq; superueniebat sudor, ut huic modus non esset, ita ad vnâ, vel alteram diem perseverabant, unde vel statim mortem oppetebant: vel si salui futuri essent, languor diuturnus, cordisq; molestæ affectiones superueniebant, superdurabantq;. Quoniam febris hæc ita citò terminabatur, à sudoreq; illo concomitata erat, iudicatum est, quod perniciofa illa, & pestilens qualitas in spiritibus tantum insideret, indeq; dictum est, febrem illam inter ephæmeras recensendam esse. Quæ tamen sententia nõ ita indiscriminatim est recipienda. nã ratione quidem temporis, eò quod per vnâ tantum, vel ad summum ad alteram perduret diem, potest diaria vocari: sed ratione subiecti, eò quod spiritus tantum in ea sint in calefacto esse, in ipsisq; solis qualitas insideat pestilens, non ita asserendum est. symptomata enim omnia ipsam febrem tum concomitantia, tum subsequencia certò demonstrant, hanc affectionem perniciosam in solis nõ consistere spiritibus. Casus enim ille virtutis, pulsusq; mutatio, & hypothymia, cæteri q; cordis affectus, qui huic febri generi alsidentes videri possunt, si à solis spiritibus malè affectis dependerent (cum spirituum substantia vaga sit, & dissipabilis, continuèq; semper iisdem regenerentur) cessante febre, perfecta subsequeretur sanitas. cuiusmodi. n. syn-  
copæ



copæ illæ, quæ alteratis spiritibus à venenata materia contingunt, extincto veneno, regeneratisq; spiritibus tolluntur, virtutesq; hinc ad pristinum regrediuntur statum; consimiliter in febre ista, si à solis spiritibus hæc euenirent, cessante febre, dissipatisq; per vnam, vel alteram diem spiritibus illis malè affectis, cum liceat de nouo perfectos, purosq; regenerare, nec virtutes ita diu concussæ, nec cordis adeo præuæ affectiones subsequerentur; Item palpitatio illa cordis, tremorq; ad plures annos se extendens; languorq; ille diuturnus certissimo sunt argumento, malam illam pestilentē qualitatem in alio subiecto, quā tenui, & dissipabili, cuiuscumque modi spiritus sunt, consedisse, aliundeq; quā ex materia instabili fluxaq; ortū habuisse; sicuti enim hinc affectiones diuturnæ generantur: ita manifestum est indicium qualitatem illam malignam insedisse in subiecto, quod non tantum non dissuat facile, sed quod diu etiam possit persistere. huiusmodi autem cum non sint spiritus, nec hi erunt propriū huius qualitatis subiectum. Sudor etiam ille adeo copiosus, malusq; vt vires ex superflua eius euacuatione, digestioneq; videntur labefactari, aliquandoq; in totum extinguī, non solos spiritus, sed etiam partes alias affectas fuisse, certissimo potest esse argumento. si enim à solis spiritibus hoc esset, vt contingit in syncope, sudor hic semper malus esset, malumq; semper prognosticaretur, at sanatio contrarium indicat; illi enim ab hac febre tantum liberantur, quibus non modo sponte, sed & arte, dum cardiacis remedijs cor tutantur, prolicetur sudor, quibusq; cōtinuè excipitur, si cui autem supprimatur, nulla arte sanari potest. Quare cum copiosissimus sit in hac febre sudor, ab eiusq; euacuatione sanitas dependeat, signum est per sudorem materiam malam, perniciosāq; in qua febris, & maligna qualitas insideat, educi. hanc autem non posse esse spiritus, nulla eget demonstratione. Non igitur erit inter ephemerās hæc febris recensenda, eo quod spiritus tantum sint affecti, quoniam

& cordis



*Febris pestilens, quæ visa est ephemera, quare unice tantum duresc.*

*Febris pestilens hectica qualis.*

& cordis substantia, & humores etiâ, quorum pars tenuior, torrida q; humiditates præcipuè venenatam concipiunt labem, cuius indicium est præ sente febre sudor copiosus, & virium casus, post febrem autem languor diuturnus, cordisq; palpitatione duratura, in febre huiusmodi prava, & maligna affecti sunt qualitate. Et si vnico tantum, vel ad summum altero perseverat die, hoc nō ex subiecto, sed ex propria veneni qualitate, cuius vis est subita, & summa causatur. & quemadmodum ex proprietate innata humorum à petuita quotidiana, à bile tertiana, & non è conversò, fit febris; ita ex proprietate huius vagantis veneni vnica fit tantum accessio, secundam nunquam transcendens diem. quod venenum, quasi tumultuariam invehens accessionem, & spiritus & humores, partesq; solidas simul aggreditur, & popudatur, simulq; à proprietate vnâ tantum edit accessionem, cui si non mors, saltem virium debilitas maxima subsequatur. hæc de ephemera. ad hecticam devenio. Suppositum est antiquum, duplicem esse pestilentem febrem, alteram putridam, alteram hecticam, & pravam utrarumq; qualitatem in summa consistere e putredine. sed illius in humoribus, huius in substantia cordis insidere. sicut enim hectica simplex à simplici putrida in hoc differt, quod in putrida cor ab humoribus, qui in calefacto constituti sunt, incalescit; in hectica autem non incalescit, sed calefactum est, similiter in pestilenti putrida cor à prava illa, summaq; putredine, quæ in humoribus insidet, affligitur, alteraturq; in hectica autē cor non ab illa mala qualitate, & putredine alteratur, sed alteratum est, eamq; labem in sui ipsius substantia concepit, adeo quod hectica pestilens ea erit, in qua cor ipsum, & calorem, & putredinem in propria substantia concepit; hocque in tacto esse, & non in fieri. quoniam autem hæc febris in habitu est, non aliunde generatur, sed iam facta est, ideo qui hac febre laborant, nullum habent caloris sensum, nec se febrile sentiunt, febrisq; uniformis est, nullam accessionis in-

uasionem

uationem recipiens. His apponitur errore ad alias etiam pestilentes febres traductus specialis casus, in quo hoc asseritur, quod si in febre ista, dum cor una cum mala illa putredine positum est in calefacto esse, eueniat, quod quæ in ventriculis cordis continentur, tanto sint frigidiora, quanto cor ipsum ultra naturalem gradum factum est calidius, tunc pulsus nullam fere mutationem recipiant, præterquam ad celeritatem quandam, & minimam, ita ut valde similis sit sanorum pulsui: hincque fit, ut cum æger se febrile non percipiat, nec accessioneis vlla sensibilis inuasio reperiatur, pulsusque sit sanorum pulsui similis, difficillima sit harum febrium cognitio, sæpèque inde agrotantes, dum sanos se esse credunt, in mortem præcipiti ducantur cursu. Sententia hæc de pestilenti hectica discriminis admodum plena est. si enim in ipsa putredine pestilens hic affectus, ut asserunt, consistit, sique à putrescente aere, ut dicunt, huiusmodi febres generantur, difficile est imaginari, cum humores ratione humiditatis eorum propriæ sint ad putrescendum magis, quam cor ipsum, parati, putredinem eam potius in cordis substantia, quam in humoribus firmari, nec admodum probabile est, cum cor ex innata temperie sit siccius, habeatque corpus compactum, solidum, & febrosissimum, unde omnibus iniurijs externis potest facile resistere, ipsummet qualiter pestilentem, & putridam in se ipsum recipere, non autem humores; humidum enim facile omnium formarum susceptivum est, sicuti siccum difficile, licet hoc firmitus, diutiusque quam illud, susceptas conseruet, hincque provenit, quod multas putridas quotidie, raro hecticas videmus, putridæque facile sanentur, hecticae autem non ita; Cum autem unica tantum ponatur causa harum hecticarum pestilentium, nimirum aeris putrescentis inspiratio, causaque hæc omnes cordis partes & contenta, & continentia pariter attingat, non crediderim potius cordis substantiam, quæ nullum ferè morbi genus primario ob eius tum fortitudinem, tum nobilita-

*Febris hectica pestilens, quare habeat aliquid quando pulsus similes sanorum pulsibus.*

*Febris pestilens hectica an datur.*

tem patitur, quàm humores in eius ventriculis contentos putredinem concipere: si tamen detur, quòd per inspirationem aeris pestilentis pestilens hæctica generetur, quòd ego forsitan negare auserim, cum eius sim sententiæ, quòd aer pestilens non per putredinem, nec putrefaciendo pestem in hominem inducat; quoniam si hoc esset, cum putredo sit omnium mixtorum passio, non tantum homines, sed etiam omne animantium genus, plantarumq; omnes species, & alias rerum differentias simul populetur; si, inquam, hoc detur, nunquam etiam dabitur hæctica sine putrida, tum quoniam humores ad patiendum sunt promptiores, tum etiam quoniam patiente cordis substantia, impossibile est præservare humores existentes in ejus ventriculis ab eadē putredine; quòd enim tangitur à putrido, putridum fit, eoq; magis, quòd contactum ad putrescendū habilius est, hocq; etiam facilius parte ea patiente, per quam cetera tum reguntur, tum conservantur. Casus autem illius hæctici, in quo ponuntur contenta tantò frigidiora, quantò corde ipsum corpus est calidius; certè (liceat hoc fateri) potius est imaginari, quàm quòd vlla possit experientia, aut ratione firmari; proportio enim illa mente quidem concipi potest. at ratio non dicat, quòd membrum calidissimum, spirituumq; opulentissimum, continuoq; agitatum motu humores ad eo frigidos in integra contineat sanitatē, cuiusmodi ante huius febris pestilentis invasionē necessariò deberent esse. At si detur, tales humores in eo tunc contineri, nulli dubiū, quòd continuo contactu, & alteratione cor ipsum ad frigidum permutabunt, siq; intemperies erit valida, vires concident; si non ita, saltem pulsus ad parvitatem, tarditatem, & raritatem conuertentur; intemperiesq; hæc siue sit in fieri, siue in facto esse, cum in ipso residebit corde, cum præsentia eorumdem frigidorum humorum ad putrescendum cor ipsum inhabile reddet. frigida enim difficilior, quàm calida, putrescunt, ad putrescentiaq; magis, quàm hæc, impropor-

tionata sunt, in habentibus enim symbolum facilior est transitus. quare stante hac inhabilitate, non ita facilè credatur hecticam pestilentem in tali corde generari, si enim hoc esset, quid cæteris, in quibus nec frigiditas hæc tutela, nec inhabilitas ad putrescendum inuenitur, contingeret? certo cum oēs pariter eundē pestilentē inspirent aerē, homines cæteri proculdubio hac eadē pestilenti hectica laborarent. sed cū clarè sensui pateat, non oēs, nec plurimos ita vagāte etiā peste affectos esse, quid de hac positione sit statuendum, pateat. Aliud mirabile in casu isto additur. Videlicet, quod in tali hectica pulsus similis est pulsui sanorū, nec in quantitate ullo modo mutatur; qm̄ fit moderatus ex cōtrariorum actione tātūm ad magnitudinē operante caliditate, quantū ad paruitatē, frigiditate, similiterq; in alijs pulsus differētijs eodem contingente. Sed stante hac eorū positione, quod in tali hectica cordis substantia, & qualitatē pestilentē, & ipsam putredinem conceperit, difficillimum est iudicare, quod talis fiat pulsus: si enim vnaquæq; intēperies valida, ex qua cordis vires concidunt, pulsus edunt debiles, & ideò ad paruitatem mutantur, quid putrescente cordis substantia erit cogitandum? num poterunt humores illi frigidi robōrare cor putredine affectum, indeq; debilitatum, ita vt moderatus fiat pulsus inter languidū, & vehemētē? sed quæ modē ratio potest esse in magnitudine pulsus, cū humores frigidi pulsus edant paruos, putrescensq; cordis substantia, indeq; virtutibus existentibus labefactatis languidos faciat? hic quid poterit magnos creare pulsus? at dices, calor intensus, sed hoc nec verum est, nec fieri potest; magnitudo enim pulsus non à calore, sed à virtute valida concurrente bono arteriæ statu, vsq; generatur: nisi enim vires constent, licet summa adsit necessitas, nūquā magnifient pulsus. quare cum nec ratione humorum contentorum, nec ratione substantiæ cordis putrescentis magnus possit esse pulsus, immo ad paruitatem inclinare debeat, non poterit in quan-

*An in febre  
pestilenti hecti-  
ca possit esse  
pulsus modera-  
tus.*

titate vlla moderatio succedere. Sed si etiam omnia hæc concedamus, verumq; sit dari febrem hanc hecticam, dariq; propositum casum, cum omnes hæc febres insanabiles sint, in mortemq; omnes terminentur, ars nostra de his sollicita esse nõ debet, nec aliquid moliri conetur circa partem istã, tanquam de egritudine, cuius vires supra omne artis ingenium, supraq; omne naturę robur eminet, raroq; contingit, temporeq; eo, quo ars nostra minimum pollet. Hæc de hectica, ad putridam redeo, quæ sola inter febres pestilentes certò relinquitur, quæq; sola à nobis venit consideranda.

*De differentijs febris pestilentis à materia putrescente, et à loco, in quo eadem putrescit. Cap. X.*

**F**ebrium putridarum differentiæ aliæ à materia putrescente, aliæ à diuersitate loci, in quo hæc putrescit, sumuntur. à materia quidem, quoniam in hac sanguis, in illa bilis, vel sit flaua, vel nigra, in alia autem pituita putrescit; proutq; vel hic, vel ille putrescit humor, diuersa oriuntur febrium putridarum genera. A loco autem, quoniam vel hæc materia in loco particulari conculcata putrescit, tuncq; fit febris symptomatrica putrida ab affectu particulari nomen habēs, vel in ventriculis cordis, & in maiorib. vasis, vel in minoribus, vel circa viscera, extraq; venas. tunc fit febris interpolata, cum hoc modo, hocq; in loco putrescit. cum autem ceteris modis, locisq; illis, fiunt continuæ. Has easdem omnes differentias Videlicet tum à materia, tum à loco febres pestilentes recipiunt. A materia quidem primò, quoniam in aliquibus sanguis, in aliquibus ceteri putrescunt humores, à loco autem, quoniam hæc eadem vel in vno conculcata loco, vel in maioribus venis, circa cor ipsum, vel in minoribus, vel circa viscera, extraq; venas putrescunt. Si humores hi, ubicunq; putrescant, pestilentem febrem sunt causaturi, prius labem, & corruptionem, sicuti præmonstratum est, aliquam concipere debent, siue hoc ex præceden-

ti anno-

*Febris pestilens differentia à materia, & à loco.*

ti annona, seu ex malo victus regimine, siue ab aere infecto, seu ab alia causa interna, externaue fuerit: cum autem ad putredinem deueniēt, ratione diuersitatis ipsorum, rationeq; loci diuersa prodeunt febrium pestilentum genera. si sanguis, siue in loco particulari conculcatus, siue in maioribus venis putrescat, semper febrem prodit continuam, synochis proportionem respondentem. si putrescat bilis conculcata, symptomaticam causat febrem, tertianis consimilem. si in vasis maioribus, circaq; cor, causum. si in venis minoribus, tertianam continuam. si circa viscera, extraq; venas, tertianam edit intermittentem. si autē melancholicus humor conculcatus, proportionatam quartanę symptomaticam generat febrem, si intra venas, continuam quartanam. si extra, intermittentem. si verò pituita conculcata ad putredinem deueniat, febrem generat symptomaticam quotidianam. si intra venas, quotidianam continuam. si extra interpolatā. Cum sanguinem, vel in venis, vel in aliquo loco conculcatum putrescere dico, & propriē dictum sanguinem à cæteris distinctum humoribus, & totam massam sanguinis ex quatuor humoribus compositam etiam intelligo. Cum autem bilem vtrinq; & pituitam, seu conculcatas, seu in venis deuenire ad putredinem assero, per bilem flauam sanguinis calidiorem, & tenuiorem partem. per atram crassiore, & terrestriorem. per pituitam autem crudiores intelligo; non enim intra venas synceri, & separati dantur humores, sicuti extra venas, circaq; viscera sæpe reperiuntur, vbi secreti, puriq; sepius reconduntur, reponunturq; à quibus intermittentes postea generantur febres. A materia igitur hæc febrium pestilentum sumuntur differentiæ, quod aliæ synocharum, aliæ tertianarum, aliæ quotidianarum speciem referūt. A loco autem, quod hæc synocha, illæ caustionides, aliæ continuæ, aliæ intermittentes euadunt. Quò ad differentias à materia, nemini dubium fit, cum vnumquodq; humoris girus simplici putrescat putredine, indeq; varias fe-

*In febre pestilenti posse omne humorū genus putrescere*



## P. SALII DIVERSI.

brium species generet, hæc eadem putrescentia posse fe-  
bres edere pestilentes. hæc enim non sunt immunia à cor-  
ruptione, nihilq; his datum est, à quo ita præseruari possint,  
vt incorrupta remaneant. quare si casu labẽ aliquam conce-  
perint, nihil prohibet, cum ad putredinem deuenient, indẽ  
excitata maligna, & praua qualitate, febres generari pesti-  
lentes. Quod pariter non vnicus putrescens humor (vt ne n  
nulli sensere) sed omnes possint esse in causa febris pestilen-  
tis, symptomatũ diuersitas, eorum deniq; proprietates pro-  
prios insequens humores, certo sunt argumento, sopor, vi-  
gilæ, deliria, stupiditas, sitis intensa, & aliquando nulla,  
inquietudo, mæstitia, cæteraq; accidentia, (quæ adeo sunt  
diuersa, & opposita) diuersitatem humorum peccantium  
indicant. & prout hoc symptoma hunc, vel illum consequi-  
tur humorẽ; ita etiã hunc vel illum putrescere demonstrat.  
Hoc idem confirmari hoc potest, quod non vnus humoris  
tantum est semper supra alios dominium. sed aliquando  
sanguis, aliquando bilis, sit vel flaua, vel nigra, aliquando  
pituita supra alios dominatur humores: cum autem concipi-  
tur labes aliqua, facilius est humorem superabundantem  
hanc pati, quàm cæteros, vt qui grauior sit naturæ, diffici-  
liusq; ab eâ regatur: concepta autem labe facile pestilens  
subsequitur febris, quæ postea à superabundanti, putre-  
scentiq; humore specificabitur. omnes igitur humores, con-  
stitutum sit, cum aliquam senserint corruptionem, putre-  
rintq; pestilentem edere febrẽ, hincq; aliàs synochas esse,  
alias tertianas, alias quartanas, alias quotidianas. hæc quò  
ad differẽtias à materia. Quò ad differẽtias autem à loco,  
maior impendit difficultas. Scio antiquissimam esse sen-  
tentiam, fereq; ab omnibus receptã, febres pestilentes oēs  
esse cõtinuas, cõtinuasq; necessariò esse; quoniã hæ oēs peri-  
culosæ, & lethales existunt, intermittentes autem omnes ca-  
rent periculo. Cuius tamen oppositum, cum hanc ipsam  
rem non coniuuentibus considerarem oculis, & ratio, &  
antiquio-

*An omnis fe-  
bris pestilens  
sit continua.*

antiquorum scripta, & experientia me docuerunt. Constitutum quidem est, ab omnibusq; receptum, humores in ventriculis cordis existentes in pestilenti aliquando putrescere febre: at si in membro principali, omniumq; nobilissimo, ac validissimo talis cōcipi potest putredo, eò magis hoc cōtingere poterit in quacunq; alia corporis nostri parte, præcipuè autem longè à vasis illis internis maioribus, vbi minus vigent spiritus, minusq; viget calor innatus: cum autè talis possit in omni parte accendi putredo, si extra venas hoc contigerit, non necessariò febris erit continua, sed intermittens. hoc idem confirmare potest, quòd quemadmodum non semper circa cor, & in venis maioribus venenatæ materiæ, quæ hominem affligunt, generantur, sed quandoq; in distantibus membris; vnde à digito pedis, & à crure, & à manu epilepsiam videmus, pariter non semper in partibus illis internis putrescens materia pestilentem procreat febrem: sed cum extra venas, circaq; viscera quispiā humor labem, corruptelamq; conceperit, ad putredinem si deveniat, febrem necessariò prodet pestilentem, at non omninò continuam, sed interpolatam. Quòd autem præcipuè circa viscera, quæ in interiori reconduntur ventre, possit tanta generari humorum corruptio, ut ad putredinem devenientes febrem generent pestilentem, nulli admirandū videatur, cum hoc in loco propriè sit sentina, & colluies omnium humorum, excrementorumq;: hinc autem facilis est corruptio, & putredo. quæ si possibilis est in ipso corde, eiusq; ventriculis, vbi fons vitæ, calor innatus, spiritusq; potissimum resident omnesq; vires, & vitales, & naturales sunt validissimæ, eò magis possibilis in his partibus erit, in quibus tanta humorum congestio, & miscella reperitur, in quibusq; nec tot spiritus, nec tātus calor, nec vires adeo validæ vigent: cum autem in partibus his putredo humoribus iam labe aliqua inquinatis superuenerit, nō febris continua, quia extra venas materia putrescit, sed interpola-

*Febrem pestilentem intermittē dari.*

ta causabitur, quæ tamen non simplex putrida, sed pestilens erit. Ad huius confirmationem hoc addo. Senserunt artis nostræ proceres experientia edocti dari pestem à nulla concomitatam febre: cum autem & febris continua pestilens detur, deturq; pestis sine vlla febre, nemini mirandum sit, si etiam detur febris intermittens cum pestilenti affectu. cum enim pestis non necessario febrem includat, nec necessario etiam superueniens febris debet esse continua, sed diuersificabitur ab eo loco, in quo materia putrescens febrem accedit. & si hoc illi videatur mirabile, magis admirari hic poterit, quòd pestis sine febre reperiri possit. stante autem (vt rei euentus demonstrat, vtq; auctores dignissimi comprobant) peste sine febre, constituitur etiam pestilentem affectum cum febre intermittente dari. Et si dictū fuerit, omnes intermittentes febres periculo vacare; vt quæ non ex inflammatione aliqua, nec ex maligna humorum putredine occasionem habeant. quod innuere videtur, nullā dari pestilentem febrem, quæ interpolata sit, cū nulla pestilens careat periculo, in omniq; febre pestilenti maligna adsit putredo. Hic animaduertantur duo, primum, quod omnes febres, quæ in quietem puram desinunt, quæ affligunt cor calore tantum putrido, nihil in se discriminis habent, veraq; est ea sententia in sensu isto. quoniam nō habent fomitem, quo ipsum cor, & validè, & continuè lacefant. at si hanc eandem materiam ob corruptionem aliquā contingat venenatam naturam adipisci, nihil prohibet, dum per putredinem in singulis accessionibus illa mala qualitas excitatur, quin violentiam in cor inferant, simulq; lēSIONē admodum periculosā. Et si pestilens affectus, cui nulla coniuncta sit febris, sine aliqua putredine, sed sola venenata, & perniciofa natura lethalis est, nec sit mirum, quòd per putredinem excitata mala qualitas in febre interpolata, in qua materia iam labem adepta putrescat, periculum ægrotanti afferat. Et si in corpore humano generantur humores leth-

*An omnis febris intermittens periculo nacet.*

*Lib. 4. Aph. com. 44.*

lethalibus venenis proportionē habentes, qui dum ad cor, vel sola qualitate, vel propria substantia erumpunt, paucissimis horis, & aliquando subito in mortem patientes precipitant, multo erit facilius, materiam, quæ iam labem conceperit, dum in paroxismo per putredinem commouetur, qualitatem perniciosam ad cor transnittere, hincq; mortis aliquando imminere periculum. per putredinē enim in hac materia contingit perinde, vt in ceno, rebusq; consimilibus fetidis euenit. hæc enim, dum quiescunt, nulloq; motu stimulantur, sæpe nullū de se odorē malum producit; quæ eadē si commoueātur, agitenturq;, tātus inde fetor emanat, vt vix sustineri queat. consimiliter hæc materiæ, quæ labem aliquam perniciosam concepere, dū quiescunt, nulloq; motu agitantur, nullā de se produunt actionē: quæ si ex putredine commouentur, & ex ebullitione per putredinem genita agitentur, tūc excitatur illa mala qualitas, quæ sopita iacebat, ad corq; transmissa, cū ei sit inimica, aduerseturq;, idē adeo affligit, la cessitq;, vt vix eā sustinere, ac tolerare queat. sicutiq; iisdē rebus iterū quiescentibus, à nulloq; motu tentatis fetor imminuitur, nec amplius inde tantus emanat prauus odor, nihilq; mali redolere videtur, ita in febribus istis pestilētib; cessante putredine singulo quonq; paroxismo mala qualitas in declinatione accessionis continuē semper minus affligit, accedenteq; integrā quiete, nullū eius vestigiū superest. Quare (vt ad id, quod notauimus, redeā) animaduertatur, quod sententia illa, quæ habet, oēs febres in quietē desinentes, vacare periculo, intelligitur de febribus illis, quæ calore tantū putrido, non autē venenata cor natura affligunt. Animaduertatur secundò, dū dicitur, intermittentes febres ex maligna putredine occasionem non habere, quod sententia hæc duplicem potest habere sensum, alterū, quod in his febribus nihil malignum, prauumq; putrescat; alterū, quod hæc febres à maligna, summaq; putredine ortum non habeant. primum dictum falsum est, secundum verum. non enim in intermittētib; febribus

*Febris intermittentes ex maligna putredine ortum non habere, quomodo intelligenda.*

bribus est ea ingens, summaq; putredo, quæ malignam, perniciosamq; inuhere possit naturam, tum ratione materiæ, tum ratione loci. ratione materiæ quidem; quoniam in his potius synceri peccant humores, quàm sanguinis partes, his proportionem respondentem. hi autem synceri humores non ita, vt sanguinis partes, ad putrescendum sunt apti. ratione autem loci; quoniam extra venas, intra quas multa viget humiditas, quæ putredinis intensæ maior est occasio, ad putredinem deueniunt. At licet hi humores extra venas putrescentes, à quibus interpolatæ febres dependent, non eam summam, malignamq; in proprijs locis putredinem concipere possint; nihil prohibet tamen hos eosdem humores eò corruptionis quâdoq; deuenisse, vt perniciosam adipiscantur naturam: vnde cum hi postea putredinem concipiunt, non ex putredine malignâ generant qualitatem, sed per putredinem eam, malignam, quæ prius erat sopita, qualitatem excitantes, febrem edunt pestilentem: tuncq; in ea maligna adesse putredo dicitur; non quia humores summam, malignamq; conceperit putredinem, sed quia materia iam maligna, & perniciosa in ea putrescat. Quapropter verum erit, quod in nulla febre intermittente sit summa, & maligna putredo, quod tamen non tollit, quod in eadem non possit materia corrupta, & perniciosa putrescere, ratione cuius febris edatur pestilens. Hanc eandem sententiam, & antiquorû scripta, & experientia confirmare potest. Nam testatur Hippocrates in peste illa, quæ vniuersaliter ætate sua nationes plures populata est, vulgasse & tertianas, & quartanas, & quotidianas, quas nomine nocturnarum appellat; nec est quod has febres intelligat tertianas, quartanas, & quotidianas continuas; quoniam, & continuas propria voce subiungens enumerat, clareq; hoc dicto illas intermittentes à cõtinuis distinguit. Consimiles febres pestilentes, præcipuè autem tertianas, sæpius ego diligentissimè earum formam, & naturam perspicuus obseruaui; quiq; non conuiuentibus oculis

*Maligna putredo quæ sit.*

*Lib. 3. Epid.  
sect. 3. tex. 64*

lis artem hanc consumabunt, hoc idem aliquando animadu-  
uertent. Vidi ego quandoq; nonnullas tertianas, in quarū  
principio, dum leue aliquod frigus, vel horror adesset, tan-  
ta caloris retrocessio eueniebat, vt caro prægélida esset, fa-  
ciesq; confimillima morituro appareret, pulsusq; adeo mi-  
nimus, vt omninò nullus videretur, subsequeretur postea  
calor, qui tamen nec in augmento, nec in statu ad tactū va-  
lidus, nec acer percipiebatur; immo caro vel tepido calo-  
re, vel subfrigida vsque ad declinationem perseverabat, pul-  
sus accenso calore magis apparebat, sed paruus, inæqualis,  
frequens, & admodum imbecillis erat; continuè autē a prin-  
cipio vsque ad statū hæc concomitabantur, videlicet sitis,  
quæ aliquādo in exhausta erat, anxietas, timor maximus, in-  
quietudo ingens, vt loco contineri non possent, & sensus ali-  
quādo caloris maximus, cū tamen ad tactū vel nullus, vel  
paruus adesset, animi defectus, sudores aliqui frigidi circa  
frontem, cordis vel palpitatio, vel tremor. hæc autem per-  
seuerabant vsque ad declinationem, accedente declinatio-  
ne omnia symptomata mitescebant primò: demum cum ad  
integram deueniret febris quietem, omnia cessabant; pari-  
ter pulsus, qui in prima inuasionē fere delitescēbat, in cæte-  
ris autem temporibus erat frequens, paruus, & inæqua-  
lis, imbecillusq; incipiente declinatione magis eleuabatur;  
proutq; declinatio magis procedebat, magis etiā hic lau-  
dabilior euadebat, ita vt in integra quiete ad naturalem sta-  
tum ferè regrederetur, calorq; qui semiuidebatur extin-  
ctus, declinante febre magis apparebat, calidiorq; caro de  
crescente febre, quā in statu ipso, erat. has febres vidi ali-  
quando protrahi ad sexdecim, quandoq; ad decem & octo  
horas, interdum paulò plus, nunquam tamen viginti qua-  
tuor excedere, animaduerti. In nonnullisq; huiusce generis  
febris hoc peculiare obseruauī, quòd nox accessiōē præ-  
cedens, vltra, quā credi potest, fuerat inquieta, cum ta-  
men non febrerent. Notauī etiā harū febrium nonnullas  
aliquandò

animaduerte  
hæc omnia



aliquando per spontaneam vomitationem terminari, hocq;  
 in tertia saepe, ad summum in quarta vidi accessione. materia  
 educta colore erat vel æruginosa, vel ferruginea, vel lla-  
 rhodes, vel subnigra, quantitate aliquando ad selsibram, ali-  
 quando ad libram, aliquando ad selsquiliam ascendebat.  
 semel autem copiosissimam vidi in tertia accessione eiectā,  
 ita ut peluim satis amplam excederet. qua euacuatione fa-  
 ctum est, ut cum eger tunc temporis & sibi, & astatibus mo-  
 riturus videretur, vocatusq; adesset ad vltima animi reme-  
 dia sacerdos, statim ad naturalem statum redierit, & reuo-  
 cato ad exteriora calore, & pulsu redintegrato, & ceteris  
 alijs omnibus malis symptomatibus in totum quiescētibus,  
 febris, quæ tunc in statu videbatur esse, subsequente statim  
 brevissima declinatione, in totum sublata est; ita ut perfe-  
 ctè sanatus ex ea euacuatione fuerit. Febres prædictæ, om-  
 nesq; ceteræ his consimiles mea sententia inter pestilentes  
 recensendæ sunt: quoniam omnia symptomata has febres  
 concomitantia testantur in his putrescere materiā maligna,  
 & pernicioſa qualitate peccantem. Materia autem consimi-  
 lis, cum morbum prodit, sicuti non semper necessariò fe-  
 brem edit; quoniam potest pestilentem affectum sine fe-  
 bre causare, pariter etiam cum febrem causat, non necessa-  
 riò semper continuam generat. si enim de ratione huius ma-  
 teriei esset causare pestilentes cum febre continua affectus,  
 omnes, qui talibus laborarent affectibus, continuè febricitet.  
 At Hermocrates, qui consimili morbo affligebatur, à deci-  
 ma quarta die vsque ad decimam septimam, & à vigesima,  
 vsque ad vigesimam quartam sine febre laborabat. non igitur  
 ubi pestilens est affectus cum febre, necessariò febris est  
 continua. quod si continua necessariò esse non debet, nihil  
 prohibet etiā interpolatā esse, qualem nos saepe vidimus,  
 qualemq; esse symptomata omnia præarrata testantur.  
 Nec casus hos intermittentium febrium, quas inter pesti-  
 lentes recensemus, cogitet quis esse consimiles illis, in qui-  
 bus

bus & ante accessiōem, & in accessiōe ipsa licet agrotantes nutrire; quoniam febres, in quibus hoc non licet tantum, sed etiam est necessarium, sunt admodum à prædictis differentes: hæ enim in temperaturis siccis, ubi squalidi abundant, acresq; vapores, quæq; facile resolvuntur, osque ventriculi imbecille habent, solum eveniunt, hiq; cito, nulloq; ferè negotio ex solo assumpto cibo à symptomatibus superuenientibus liberantur. At istæ, quas enumeravi, in omni temperatura, in omni sexu, & in omni etate contingere vidi, nec hi solo cibo iuvantur, sed alexipharmacis, hisq; remedijs, quæ malam possunt qualitatem extinguere, vel materiei peccantis educatione sanantur. Quare differunt hæ febres, distinguunturq; a se inuicem omnino. hæq; verè sunt, at nō illæ, pestilentes. Quapropter inter differentias pestilentis febris numerandæ sunt, & intermittentes, ut quæ experimēto, sensuq; ipso aliquando adesse cognoscuntur, nec ratione refelluntur, & ab historijs antiquissimis confirmantur.

De his Gal.  
lib. 10. Meth.

*De differentijs febris pestilentis à causis. Cap. XI.*

**D**ifferentiæ à causis, quarum diligentissima debet esse perscrutatio, declarandæ succedunt. Causæ febris pestilētis omnia ea dicuntur, quæ corruptionē talem in corpus humanū inuehere possunt, ut humores exinde venenatā cōcipiant naturā. Vnde cum ad putredinem postea deueniunt, non putrido tantum calore, sed etiā maligna, & petniciosa qualitate cor ipsum fatigant. Causæ hæ duplices sunt, aliæ externæ, aliæ internæ. Ab externis incipientes harū tria ponimus gēnera. primū erunt omnia ad hoc apta ad intra corpus nostrum assumpta. secundum erit aer tum inspiratus, tum nobis circumfus. tertium erit eorum, qui consimili affectu laborant, contactus. Ad primum genus reducuntur omnia cibaria, quæ viciatam habent naturā, quæve corruptionē aliquam, vel putredinem sensere, sicuti frumēta, legumina, cerealia omnia semina, quæ rubiginem passa sunt,

Febris pestilētis cause extēri, quos sit, & que.

Cibus, & potus quemodo possint esse causa febris pestilētis.

fa sunt, & quæ, quoniam vel diutius, vel malè recondita fue-  
 re, ideo contraxere labem aliquam, sicuti etiam carnes diu-  
 tius mactatæ, vel quæ eorum sint animalium, quæ nō gla-  
 dio, sed vi morbi interemptæ sunt, aut quæ saltem morbida  
 fuerint, fructus etiam vel horarij, vel alterius generis, qui  
 vel corruptionem senserint, vel ad eandem sint proclives,  
 vel qui saltem facili in prauum conuertantur succum. con-  
 similiter etiam omnia, quæ in hominis alimentum veniunt,  
 dum eadem hæc patiuntur, pestilentis febris causæ esse pos-  
 sunt. Ad hoc idem genus referatur omnis vitiatus potus, si  
 ne hic sit vinum corruptum, & qui labem aliquam senserit,  
 siue sit aqua, quæ hoc idem passa sit, vel quia immunditias  
 seu vrbs, seu domus recipiat, vel quia ex stagnatibus facta  
 sit, vel quia in ea stirpium aliqua, & præcipuè quæ virosam  
 inferant qualitatem, sicuti Nerion, cannabis, linum, buxus,  
 brassicæ, Isaris, nucum folia, & consimiles plantæ macera-  
 tæ fuerint, vel quia præterlabatur loca metalla, quorum  
 maligna sit natura, sicuti quæ chalcantum, aeris æruginē, &  
 consimilia diluat. sub hoc eodem genere continentur etiā  
 omnia ea medicamenta, siue sint alterantia, siue euacuatia,  
 quæ in corpus assumpta, dum sua frustratur operatione, nec  
 a natura eiecta sunt, nouam subeuntia alterationem, in alie-  
 nam, & perniciosam transmutantur substantiam, hincq; alie-  
 na nobis facta, inimicaq; naturæ humanæ labē sæpe aliquā,  
 & tantam aliquando inferunt, vt ex ea pestilentes progigni-  
 tur febres. huiusmodi nonnullas successisse vidi, dum ab im-  
 prudenti artifice importuna exhibita forent medicamēta,  
 vel à ministro antiqua, & obsoleta, & quæ aliquando non-  
 nullam senserint corruptionem, fuerint præparata. Hoc idē  
 & deleteria agunt pharmaca, quæ euidentē inferentia noxā  
 sæpe febrem edunt pestilentem, hæc q; non tantum vidi in  
 potu exhibita hoc fecisse, sed & vidi, & animaduerti hæc ea-  
 dem, dum per clystere essent iniecta, febrem hanc non tan-  
 tum protulisse, sed etiam in mortem ægotantem præcipi-  
 tasse

*Medicamenta,  
 quō possint es-  
 se causa febris  
 pestilentis.*

*venenata phar-  
 maca posse  
 causare febrem  
 pestilentem, et  
 quomodo.*

taſſe has autē febres à venenatis cauſas pharmacis peſti-  
lentes appello; quoniā omniū horum eadem eſt eſſentia, vi-  
delicet cordis læſio non à calore tantū putrido, ſed à qua-  
litate venenata, cuius ratione febris ſolum eſt, & vocatur  
peſtilens. hæc de primo genere cauſarum externarum. Al-  
 terum genus erat aer vel nobis circumſuſus, vel inſpiratus:  
 hic autem quemadmodum variam ſuſcipit mutationē, ita  
 etiam varijs modis febrem edere peſtilentem poteſt. Aer  
 tripliciter immutatur, alias enim in primis qualitatibus,  
 alias ſuſceptis ad intra, ſc̄ varijs exhalationibus, alias in pro-  
 pria ſubſtantia mutationē patitur. In primis qualitatibus  
 hoc tripliciter contingit, ſcilicet vel dum in vno eodemq;  
 tempore aer vehementem patitur alterationem, ſicuti cum  
 in caliditate, vel frigiditate, ceterisq; qualitatibus nimium  
 excēdit, vel dum ex varia, diuerſaq; temporum mutatione  
 alia moleſta ſubſequitur tranſmutatio, quemadmodum cū  
 præcedente hyeme ſicca, & aquilonia vere autem pluuiſo,  
 & aſtrali ſubſequentē, aſtas adueniens morbiſda fuerit,  
 moleſosq; progignet lethales morbos, vel cum anni plura  
 tempora ſe inuicem ſubſequentia aliquam vnā, eandemq;  
 omnia ſeruabunt conſtitutionem, ſicuti cū totus annus erit  
 vel aſtrinus, vel aquilonius, vel alio modo ſibi ſemper cō-  
 ſimilis. Hiſ tribus modis alteratus aer, vbi in vnoquoq;  
 horum excēſſus aderit, conſequetur aptitudinem ad fe-  
 bres inducēdum peſtilentes, præcipuē autem in corporibus  
 ijs, quæ ex prauo victus regime humores ad corruptela  
 patatos congeſſerint. Cum enim aer hiſce tribus modis  
 tranſmutatur, ſemper conſuevit morbos epidimios, vulga-  
 resq; inducere, nam hi omnes ex prædictis, vbi nulla ſubſit  
 pernicies, aeris alterationibus generantur, quod ſi in hiſ al-  
 terationibus ſit excēſſus, cum omnis excēſſus violentiam na-  
 turę inferat noſtrę, poterit hic aer alteratus aliquando cor-  
 ruptionem in humores inducere, eoſdemq; in putredinem  
 potiſſimum vbi patientis aderit diſpoſitio, præcipitare. Ta-  
 les

*Aer quod ma-  
dis immutetur*

*Aer cū immu-  
tatur i primis  
qualitatibus  
quod tripliciter  
hoc cōtingat.*

*Aer quando  
morbos Epidi-  
mios inducat.*

*Aer in primis  
qualitatib. im-  
mutatus quan-  
do poſſit eſſe  
cauſa febris  
ſilicet.*

*Aer in primis  
qualitatib. im-  
mutatus an  
possit inducere  
pestem, &  
quando.*

*Aer immuta-  
tus à prauis  
exhalationib.,  
quomodo cau-  
set vel pestem,  
vel pestilentē  
febrem.*

*Aer quomodo  
immutatur à  
prauis exha-  
lationibus.*

les autem aeris alterationes possunt quidem aliquas in ali-  
quibus generare pestilentes febres: vnde vidimus aliquan-  
do in calidissima æstate, aliquando in pluuioso autumno, ali-  
quando in varia, & in æquali temporum constitutione mul-  
tas nulla præsentē peste febres vulgasse pestilentes, hæ ta-  
men pestem inducere non possunt, vt quæ epidimios sim-  
pliciter morbos, non autē pestilentes inuohere valeant, præ-  
ter calidam, & humidam aeris constitutionem, quæ si diu  
perseueret, pluresq; anni partes eodem modo constituat,  
apta ad holce procreandos pestilentes morbos erit, hæc de  
prima aeris alteratione. Secundo alteratur modo aer,  
dum exhalationes, & inquinamenta aliqua aliundè sulci-  
pit; sicuti cum ex aquis, vel stagnantibus, vel quomo-  
dolibet malè affectis, aliteruē corruptis, ex barathris, ex  
specubus, ex cadaueribus vel humanis, vel aliorum anima-  
lium inscuptis, rebusq; alijs consimilibus vel inquinatis, vel  
putridis vaporaciones malæ attolluntur, quæ ad intra aerē  
susceptæ, eundem coinquinant, in putredinemq; modo le-  
uiorē, modò maiorem ipsum disponendo, & præcipitando,  
eum ad prauam, perniciosamq; naturam permutant. Vn-  
de hic aer postea humana corpora offendens non ea am-  
plius nuda lædet qualitate, sed totius proprietate essentiæ;  
cuiuscemodi sunt, & agunt venena, quæ non à temperamen-  
to proprio, sed ab innata vi naturali actionem, & violentiā  
hanc habeant. quæ praua & perniciosa natura, quoniam non  
in puncto consistit, idcirco prout magis, vel minus altera-  
tus, labefactatusq; est aer, diuersimodè in corpora agit hu-  
mana: vnde euenit, vt modò vulgares, modò pestilentes  
progignat morbos. hinc videmus vrbes, & loca, quæ ratio-  
ne vaporacionum aquæ stagnantis & prauæ inficiuntur, pa-  
ti etiam in saluberrima aeris constitutione agitudines plu-  
rimas, quæ tamen nō erunt pestilentes, nec admodum lethā-  
les, cum aeris alteratio non ita valida erit, si tamen corpo-  
rum dispositio lex humorū corruptela, & prauitate parata  
erit,

erit, plurimas eo tempore pestilentes edere potest febres. Si autem contingat aeris alterationem ex tali causa sauiorem esse, aer hoc modo alteratus, & immutatus nō tantum pestilentes in aliquibus edere potest febres, sed etiam pestē ipsam quandoq; inuhere consuevit, tandiuq; hæc perdurare solita est, quamdiu materia subiecta consimiles suggerat exhalationes, quamdiuq; eæ, quæ in ære genitæ sunt, aeriq; permixtæ, vel igne, vel vehementi ventorum agitatione, vel diuersa temporum varietate fuerint consumptæ. cum enim aer eosce morbos ex permissione harū expirationum, non autem quia vel in qualitatibus, vel in substantia sit permixtatus, edere consueuerit, iisdem inquinamentis consumptis, cessabunt & morbi illi: & aer, qui ex ea inquinamentorum permissione perniciosam adeptus erat naturam, aptus iterum erit ad pabulum, & conseruationem caloris nostri. Tertia aeris alteratio, & transmutatio est, cum in propria corrumpitur substantia. corruptio autem non semper est vniformis, aliàs enim huius generis, aliàs alterius reperitur, aliàsq; magis, aliàs minus praua procreatur. ex diuersitate generis corruptelæ euenit, vt aer modò huic animalū generi, modò illi naturā nanciscatur inimicā, aduersamq;: ex prauitate autē vel maiori, vel minori hoc cōsequitur, quòd aer modò vulgares tantum, at non pestilentes, modò vulgares, & pestilentes simul iuuehat morbos. hinc habemus aliquando vagasse aeris constitutiones, quæ vel ouibus tantum, vel bobus, vel alteri quadrupedum speciei, ceteris intactis animantibus, immanem, & truce[m] peperere noxam. quod non aliunde contingere potuit, quam ex diuersa aeris corruptione. sicuti enim cetera exteriora non vniformiter corrumpuntur, sed modò hanc, modò illam adipiscuntur corruptionem; ita & aer diuersimodè, cum in propria transmutatur substantia, afficitur. quæ substantia, prout gradū hunc corruptionis, vel illum nanciscitur, modò naturam vni animantium generi, modò alteri oppositam, & noxiam acqui-

E ret,

*Pestis causata ab aere inquinato ex prauis exhalationibus quandoque ducet.*

*Aeris immutatio in propria substantia.*

*Aer quare inuuehat pestem modò vni animalium speciei, modò alteri generi.*



ret, vnde modò hanc speciẽ, modò illam tangit, alteratq; . in qua alteratione hoc succedit: quòd si corruptio ea , quæ vni animantiũ generi aduersatur, admodũ praua nõ sit læsio, tantũ vulgaris subsequitur: si autẽ sit sçuior, verè pestẽ inducendõ, idẽ animatium genus in perniciem ducit; cum autẽ talis aeris constitutio vnicum animantiũ genus inficit, cætera, licèt ab eisdẽ morbis intacta permaneãt, semper tñ nonnihil læsionis persentiunt. Quod de cæteris animantibus loquor , hoc idẽ in ea corruptione, in qua aer homini naturã adeptus est inimicã, intelligatur. cum. n. leuem tantũ corruptionẽ passus est, tunc epidimios, vulgaresq; solũ, non pestilentes, edere consuevit, sicuti anno proximẽ elapso millesimo quingentesimo octuagesimo factũ est, in quo ex corruptione aëris, leui tñ per vniuersam Europam, & ad exteras vsq; nationes vagarunt morbi illi, qui à vulgaribus diuerso nomine appellati, vnicam tñ formã tantũ in omnibus regionibus habuere . Hi accedebant cum febre in aliquibus valida, in aliquibus leui, cum capitis grauedine : superueniebat distillatione admodum molesta , quæ in thoracem decumbebat. hinc oriebatur tussis vehemens, ex qua in principio excreabant patientes tenuia, & cruda, sitis vt plurimum pauca, vel nulla erat , inappetẽtia magna, & gustatus serè abolitio, vel saltem deprauatio cõcomitabatur, quæ, cessante etiã febre , talis per multos dies in pluribus perseuerabat , vt vix nonnulli ad pristinum statum regrederentur , notabilisq; lassitudo , & corporis imbecillitas quiescente febre subsequeretur. febris vt plurimum in quarta, & ante quartam terminabat , sed tussis in multis per plures, & plures dies superdurabat, & vix tandem hi concocta expuebant. hi morbi vt plurimum erant salubres, in sanitatemq; omnes terminabantur , præter eos, qui valetudinarios, vel debiles, vel senes, vel qui angusto essent thorace, & distillationibus obnoxij, vel infirmos, vel eos, qui prauo utebantur victu, quique in ægritudine ipsa ausi sunt indiscriminatim, & sine ratione viuere,

*Aer, cum leuẽ  
corruptionem  
patitur, nõ pe  
stilent, sed tñ  
Epidimios  
generat mor  
bos.*

*Exemplũ Epi  
dimie à leui  
aeris corru  
ptione.*

*Historia Epi  
dimie anni.*

1580.

viuere, aggrediebantur. hi enim ferè omnes in pernitiè egro-  
rantium defierunt. Huiusmodi ægritudines non ex alia  
ortæ sunt causa, quàm ex quadam leui aeris corruptione,  
qua antipathiam quandam ad cerebrum adeptus erat. Vn-  
de succedebat, & distillatio, & rufæis, & affectus thoracis, &  
gustatus læsio, & virium animalium languor, cæteraq; om-  
nia. Tantaq; fuit huius corruptionis in agendo efficacia,  
vt vix inuenire queas, qui ab ijs morbis fuerit immunis; om-  
nes enim pariter & ætates, & sexus, & quascunq; hominum  
conditiones aggressa est. quæ sicuti in actione efficax fuit, si  
pariter in prauitate fuisset intensa, hincq; non leuis, sed vali-  
da, & ingens fuisset corruptio, in internecionem fere omniū  
hominum delisset; ita vt nulla clades, nulla hominū ruina,  
nullū etiā humani generis flagellū, quorū meminerint histo-  
riæ, huic æquiparari potuisset. Quoniam autem non praua,  
nec ingens, sed leuis fuit hæc corruptio, ideo tantū Epidi-  
mias, non pestilentes protulit morbos; hincq; humani gene-  
ris damnum, nō ruina subsequuta est. Nec alicui dubiū sit, hæc  
Epidimiam ex sola aeris in propria substantia corruptione  
contigisse, quoniā non ex inquinamentis, aut exhalationibus  
prauis aliunde susceptis hoc cōtingere potuit, cū nihil horū  
præcesserit, per totq; regiones hæc vagauerit, citòq; ab vna  
ad aliam peragrauerit, semperq; præcedentē ab omni labe  
syncerā reliquerit. quod, si horū ratione hoc factum foret,  
cuenire non potuisset; quoniam inquinamenta illa, & prauæ  
illæ exhalationes in loco proprio diutius, & maiori cum cla-  
de, & ruina suā protulissent actionē, & per tot regiones pe-  
ragrādo cōsumptæ fuissent, vel mutatione temporū, vel vio-  
lencia ventorū, vel alia causā externa dissolvente, & dissipa-  
te aeris exhalationes. At hæc Epidimia à partibus Occidēta-  
libus vltima hyeme incipiēs, & motū habēs Orientē versus,  
cōtinuēq; à regione in regionē propinquā transmigrās nec  
ineūte Vere, nec eo procedēte, nec etiā aduentate Æstate,  
immo nec sub cane, nec etiā subsequēte Autumno vnquā à

*Epidimiā an-  
ni 1580. fuisse  
causatam à  
sola aeris in  
propria sub-  
stantia corru-  
ptione, sed le-  
ui.*

proprio motu cessauit. quinimo & tēpore frigidiori, & calidiori, & flante tam Austro, quā Borea, & pluuioso, & sereno cēlo peragrauit hæc omnes Europæ regiones, & omnia indiscriminatim loca, siue sint sublimia, & montuosa, siue infima, & paludosa, siue mediā, & tam quæ respiciunt Orientem, quā quæ Occasum, seu alium cæli litum. Quod etiam clarissimum est indicium, hoc non à primis potuisse ortum habere qualitatibus; quoniam si in omni aeris conlutione, si in omni cæli statu, si in omni anni parte, & omni regione suas hæc deprompsit æqualiter vires; igitur hoc nō à primis potuit oriri qualitatibus; sed tantum hoc licuit gigni à sola aeris in propria substantia transmutatione: quæ (vt iam dictum est) fuit leuis quædam corruptio. cuius corruptionis ratione aer prauā adeptus qualitatem, antipathiā ad cerebrum, quæ humanum genus vniuersè afflixit, habuit. Quam eandem prauam, & perniciosam aeris qualitatem, vltra homines, sensere etiam cetera viuētia; hinc aues illæ, quæ exteris terras statim temporibus adire solent, hac aeris prauitate incitatæ, has nostras partes fugientes ad alias regiones ante tempus euolarunt, & quæ super arbores nidi ficant, & dormiūt, super ipsam terram, & in locis infimis, altiora cauentes, nocte degebant. bruta autem animantia, quæ ex herbarum, & arborum germinibus, ac folijs victitant, eadem auersabantur, quoniam hæc sub dio posita ab aere circumstanti aliquialiter infecta erant, quæ omnia prauitatis, & corruptionis aeris (quæ tamen leuis fuit) indubitata erant inditia, & argumenta. Si autem contingat aerem in propria substantia transmutari non leui, sed praua, & ingenti corruptione: tunc propriam naturam, ex qua ad tutelam caloris nostri aptus erat, amittit, & alteram nostræ improportionatā, contrariamq; adipiscitur, tuncq; vi sua, venenataq; adepta qualitate, morbos non Epidimios tantum, sed & pestilētes inuehit, tuncq; pestilentes inducere cōsuevit febres, nec has tantum, sed & pestem etiam ipsam procreare potest. Et hoc,

*Aer in propria substantia immutatus cū ingenti corruptione causat & febres pestilentes, & pestem;*

hoc, quoniam contactu suo, siue per inspirationem, siue per insensibilem arteriarum attractionem hominem petens, in eo corruptionem aliam humorū inuehit; qui si putrescant, febrem postea, de qua agimus, produunt pestilentem. Animaduertatur autem, dum assero corrumpi graui corruptione aerem, quòd de aere hoc infimo; & qui rationem habet mixti, sit sermo, & quòd intelligatur semper non totali vniuersam corruptione aerem corrumpi; quia si totalem pateretur hic corruptionem, duo mala consequerentur; alterum quòd omnes pestes ex aere omni viuentium generi, quod inspirando vitam ducat, essent còmunēs; alterum quòd vllus nec homo, nec animans huic pesti superuiuere posset. quoniam hinc non venenatam tantum naturam adipisceretur aer, sed etiam venenum ipsum fieret, ex quo omnibus animantibus eundem inspirantibus esset quid mortiferum. quod cum nec Deus, nec Natura ad conseruationem orbis permittat, asserendum est, aerem non totaliter corrumpi, nec venenum per corruptionem fieri, sed tantum venenatam adipisci naturam, per quam aptitudinem ad corrumpendū, & generandum quasi venenum in corporibus humanis, & præcipuè (hoc semper suppono) dispositis consequatur.

Corruptio hæc aeris non est qualitatis alicuius intensio, vel remissio, non admixtio alicuius inquinamenti, non putredo, sed est solius intime aeris naturæ, eiusque propriæ substantiæ corruptio, qua quid aliud ab eo, quod erat, factus est. sicut enim, homo vi gladij peremptus corruptus est, nec eius corruptio est qualitatū immutatio, nec alienæ substantiæ permixtio, nec putredo, sed est propriæ substantiæ transmutatio, qua quid aliud ab eo, quod erat, factus est, illud idem de hac aeris corruptione asserendum esse affirmo. licet autem corruptio hæc nullum eorū sit: attamen ab omnibus prædictis causis progigni potest. nam & homo, cum æstuat, vel cum ultra modum refrigeratur, sæpe corrumpitur. quod idem & patitur ex assumpto veneno, & inducta

*Aerem corrum-  
pi quemodo in  
sele, cundū sit,*

*Aeris corruptio  
quid sit.*

*Exemplum  
corruptionis*

*Aeris corruptio  
a quibus  
causis generetur.*

etiam putredine ingenti, vel in humores, vel in partes solidaſ principales. pariter & aer in exceſſu primarum qualitatum conſtitutus aliquando corrumpitur, vt confirmat peſſis à Thucydide enarrata, quę ex aeris immodica caliditate ortum habuit. Similiter cum viroſas exhalationes aliunde ſuſcipit: ſi hæ diutius attollantur, longioriſq; tempore in aëre permiſta permaneant, poſſunt hæ in aërem corruptelam aliquam inuehere. per putredinem etiã poteſt hæc corruptio cauſari; cuiuſmodi in omnia mixta per putredinẽ corruptiuntur, cũ putrefactio ſit corruptio, ita & per putredinẽ aer poteſt corruptionẽ admittere, putrefactioq; aeris in corruptionẽ terminabitur. putrefcere autẽ aërẽ dico, tum quoniã omnia elemẽta præter ignem poſſunt putrefcere, tũ etiam quoniã hic aer, qui nos ambit, rationem habet mixti, dum nequaquã purus nec re, nec ratione inueniri poſſit: mixtorum autem propria eſt paſſio putrefactio, quare & hic aer putrefcere poterit. putrefcens autem hic aer tandẽ corrumperetur; quapropter ex aeris putrefactione eiũdẽ generabitur corruptio, quę corruptio ſicuti omnium, tum elementorũ, tũ eorũ, quę ex elementis compaãta ſunt, cõmunis eſt affectio, per eandemq; in alienã pinnia trãſmutantur naturã, ita & hæc paſſio aëri competet, per eandemq; alienam nanciscitur naturam: qua ratione inimicus homini factus, non amplius ad eius eſt aptus tutelam, ſed potius eiũs perneciẽ affectans peſtilentes procreat morbos. Hęc aeris putredo aliàs ex diuturna conſtitutione oritur calida, & humida, aliàs ob ſuſceptas exhalationes putridas, diuque in eodem retentas, quę putredo non eſt id, quo ſemper agit aer, dũ vel peſtem, vel peſtilentiẽ inducit febrem. terminante enim putredine in corruptionẽ, hacq; ipſa, cum motus ſit, habeatq; eſſe in fieri, non permanente, aer per eam diutius agere non poterit: at peſſis & per annum, & ultra perſeuerariſſe experientia, & antiquitas teſtata eſt. tandiu autem hic putrefactionis motus non poterit antiquari, quin in corruptionẽ

*Aer per putredinem quo modo poſſit corrumpi.*

*Aeris putredo vnde inducitur.*

*Putredo in aere diu perſeuerare nõ poſeſt.*

nem terminantur, immo cum aer substantiæ sit defflabilis, vage, & tenuis, concepta in eo putredo citissimè terminabitur, citissimæq; corruptio huic succedet: nō enim est inaginabile, nec ratione aliquo modo cōfirmari potest, quod i putrefactip in aere per tot annos, per quos pestes, perdarare nouimus, conseruari possit. Nec est, si causas putredinis diu perseuerent, quod putredo etiam diu perseueret, cum enim quid putruit, etiam si putredinis causæ continuè eundē affectum foueant in eo, nec diuturnior conseruari, nec noua inuehi potest putredo; immo quod magis, validæ, & perscurantes sunt putredinis causæ, eò, velocius res putrescit, citiusque (quoniam violentior est putredo) terminatur, adueniente corruptione, cuiusmodi enim si cadaver in loco calido, & humido, constitutione aeris simili existente, reponatur, nō diuturnior est eius putredo, sed velociter putrescit, citiq; hæc putredo corruptione terminatur; nec si ibidem diutius permaneat, ideo poterit denuo putrescere, quoniam corruptio adueniens putredinē terminauit, ita & aer si vel ex calida, & humida constitutione, vel ex putridis evaporationibus putrescat, nō ideo diuturnior erit eius putredo; quoniam præsentēs sint causæ, continuèq; putredinem eam foueant, sed quò hæc causæ erunt, validiores, eò citius concepta terminabitur putredo, adueniente corruptione, quare nō ratione materiæ putrescentis, nec ratione causarum diuturna poterit in aere putredo firmari. Vnde patet, quod aer, dum ex putredine corrumpitur, nō semper per putredine pestem, vel pestilentē inducit febrem; quoniam putredo necessariò citò terminatur: at morbi isti longiori temporis spatio ab aere infecto prægignuntur, ac producuntur: quod cum nō sit ratione putredinis, hoc erit (vt iam præmohstratū est) ratione corruptionis, cuius occasione alienam adeptus aer naturam, perniciem humano generi molitur. Corruptio hæc nō tantum ab excessu primarum qualitatum, vel à permixtione putridarū, prauarumue

*Aeris corruptio aliquādo à causis supe-*



*rioribus nō cō  
tribus in  
ferioribus cau  
satur.*

exhalationum, vel ab ipsius aeris putrefactione generatur, sed aliquādo etiam ab astris, nihil inferioribus causis ad hoc conferentibus, ab eorumq; motu, & lumine in aera male agentibus. hæc enim, dum hæc inferiora suis fouent operationibus, in eodem diuersos imprimunt effectus, proutq; varia sydera, vel in idem coeunt, vel ad diuersa respiciunt, hos modò effectus, modò illos produnt. non enim eiusdē semper sunt actiones, nec semper ab eisdem eadem emanant virtutes, sed varias & diuersas depromunt, prout varij sunt eorum aspectus, ortus, occasus, & ad alia sydera situs diuersus. hinc autem euenit, vt non omnes æstates sint eodem modò calidæ, nec omnes hyemes sint eodem modò frigidæ, euenitq; vt non semper serenam æstatem, nec semper tempestuosam afferant hyemem. sed modò hanc illius tēperici, & status, modò illam alterius faciant. Quod si contingat, hæc astra (vide proculdubio) omnis inferiorum virtus regitur, & gubernatur) male in aera agere, prauosq; eorum esse aspectus, hinc poterit aeris eiusdem subleuari corruptio. sicut enim elongatio, & approximatō tum solis, tum Zodiaci est in causa generationis, & corruptionis omnium horum inferiorū, nec alicui mirum sit vel hinc, vel ab alijs syderibus quomodolibet se habētibus aeris causari corruptionem, à qua præcipue vniuersales pestes oriuntur, simulq; multæ pestilentes procreantur febres; inducta simul corruptione in humores corporis humani, qua venenis extrinsecus confimilem vim, & naturam adipiscuntur. Hæc aeris corruptio, ex qua huiusmodi pestilentes consequuntur constitutiones, sæpe euenit nulla præcedente, nec aeris mala intemperie, nec diuina temporum mutatione, nec vllis præsentibus corruptis, vel putridis exhalationibus, nullamq; habet euidentem causam præter syderum actiones; ideoq; quoniam ad hæc inducendam pestem non concurrunt hæc inferiora, sequuntur hæc pestilentes constitutiones tam hyeme, quam æstate, tam sub calido, quam sub frigido celo, tam

*autem, si  
est, quod  
est, quod  
est, quod*

*exhalationibus*

*4 3*

*lo, tam*

lo; tam austro, quam Borea flante. cuiusmodi visum est in præcedenti Epidimia, licet nullo modo fuerit pestilens, cuiusq; nulla præcedens manifesta causa innotuit, unde à solo celo ortum eam habuisse, credendum est, ut nonnulli Astro-nomiæ professores prælagierunt, & testati sunt. Hæ autem syderum, cæliq; actiones, & maximè pestilentes sæpius præueniunt tum ex naturæ providentia, tum ex nutu Dei: ex naturæ quidè providentia, sicuti in Aegypto, quæ, quoniam hominum feracissima est, tantumq; ut etiam octavo nati mensis ibi vitales sint, hoc patitur, ut ibidem hic contingit periodus, ut vndoque decimo, seu paulò plus, vel minus anno vigeat, & vagetur pestis ad tollendam. superabundantè hominum multitudinem. Ex nutu autem Dei maximè contingunt ad profliganda, puniendaq; humani generis scelera, cuiusmodi ex sacris literis nonnullas nouimus pestes à Deo immissas in solam peccati poenam, & punitionem. hinc etiam apud Homerum ex rapta filia Sacerdotis Apollinis Chryseide, ex eiusdemq; sacerdotis iniuria ab Agamemnone illata legimus Græcum exercitum immanem, trucemq; inuasisse pestem. Corruptio igitur aeris aliàs ab inferioribus, aliàs à superioribus inducitur causis, tuncq; aer ipse in alienam transmutatus naturam perniciofa qualitate in agendo deleteria æquat medicamenta. Cuiusmodi autem hæc venena in omnibus hominibus, nec eodem modo, nec eadè agunt velocitate, & violentia, sed hos citius, & vehemētius, qui prauitatem humorum congesserunt, vel debilia habeant principalia membra, illos autem tardius, & leuius, qui sano sunt corpore, quique robur naturæ habeant, ita & corruptio ista aeris, omnesq; aliæ causæ, quæ vel pestem, vel pestilentè possunt inducere febrem, non semper equali in omnes homines agunt efficacia. Sed ubi plura concurrant ad eundem producendum effectum aptiora, ibi plurimum conferunt suæ perniciiei, ibique admodum sauiunt, sicuti si corruptio hæc in constitutione calida, & humida, in loco prauis euaporationi-

*Pestes à superioribus causis inducuntur quare contingunt.*

*origines etc*

*Aeris corruptio quare non aequaliter in omnes sauiat homines.*

porationibus scatente, ubiq; homines malis abundant humoribus, eueniat, tunc maximè sæpiente pestilenti constitutione, ad internecionem fere omnium habitantium perducitur. at ubi hæc inuicem nõ adiguntur, licet perniciēs ad sit, vageturq; y non tanta tñ. subsequitur clades. quę enim ad hanc inferendam labem non conueniunt, vicem gerunt tutelę, qua homines non ita facilè à causis læsionem inferentibus patiuntur. Vbi enim erit aer nullis inquinamentis permixtus; cælumq; fuerit benè temperatum, vel saltem aquilonium, nullaq; præcedat mala victus ratio, soliq; abũdant laudabiles succi, hæc omnia ad minuendam pestis sæuitiem conferent. quod idem & de cæteris causis. hoc idem agentibus censendum est. omnes enim quo ad plures simul erunt, maiorem inferent labem, quò autem minores, pactioresq; poterunt & minus sæuire. & hæc de secundo externarum causarum genere sufficiant; Tertia enumerabatur causa, eorũ nẽpò qui consimili laborant morbo, contactus. hic autem vulgari, & proprio nomine appellatur. contagiũ morbiq; qui hac eueniunt ratione, omnes contagiosi dicti sunt. causa hæc ad hosce morbos generandos potentissima est, vimq; habet ferè insuperabilem. vix enim quis à contagioso, ubi contagium accesserit, potest euadere morbo. Plures autem sunt huiusmodi generis morbi; sicuti scabies, lepra, Elephantiasis, mentagra antiquorũ, lues venerea, rabies, tinea puerorum, plitũs, ophthalmia, nonnulliq; alij, quibus præcipuè adnumeretur pestis, & pestilẽs febris, quorum aliquando præcipua est causa contagium ipsum, hocq; ea ratione huius febris est causa; quoniam hoc mediãte ab uno in alterum tantã humorum corruptio inuehitur, ut venenatam concipiant naturam, cuius merito postea putrescentes iidem cor. perniciofa, & maligna petunt qualitate. Animaduertatur autẽ, quòd dum dicimus morbos listos contagiosos esse, non tales hos esse ideo asserimus, quia semper ex contagio inuehantur. nam & sponte aliquando possunt euenire,

De contagio.

Contagiosi  
morbi.

Contagiũ quo  
modo causet  
febrem pestilẽ  
cem.

Cõtagogi mor  
bi non semper  
per contagium  
inducuntur.

euēire, maximeq; eorum maior portio: sed quoniam his præsentibus, si accedat contagium, facile ab vno in alterū consimilis morbi sit transitus, ideò contagiosi dicti sunt: Vnde scabies, tinea, lepra, & nonnulli alij ex his morbis in aliquibus quidem, nullo accedente contagio, possunt sponte oriri, cum tamen alteri deinceps contagio, mediante facile communicari possint. quod idem de peste, & febre pestilenti est asserendum. Hoc tamen pestilentibus morbis est peculiare, quod licet vt plurimum sint contagiosi, nō tamen semper, nec necessariò tales sunt. dantur enim quidam pestilentes morbi contagiosi, & quidam etiam non contagiosi, quemadmodum & historiæ, & experientia ipsa testatur, ex historijs quidem hoc pateat, quoniam & Hippocrætes, & Galenus, cæteri q; tunc temporis nobilissimi artis nostræ profectores, dum nonnullæ pestes maximè saeuirent, maximeq; popularentur, indiscriminatim, nullaq; habitæ contagij ratione; ad inuisendos, curandos, & pertractandos egros progrediebantur; nec laborantium contactum vitarunt ipsi, nec alios vitare commonuerunt. quod firmissimum sit argumentum pestilentes tunc vagasse affectus, qui tale contagium (qualo in peste patres nostri, etasq; nostra obseruauit) cōiunctum non haberent; non enim credendum est, si hoc adfuisse, præclarissimos hosce artis nostræ procures hoc latuisse, cū idiorarū, vulgariūq; virorum, vbi eius vis, vegetur, notitiam nequaquā fugiat. adeò enim manifesta est eius, pernities, vt sensum nullo pacto laterè possit. Hoc idem exterius confirmāt nationes. nam & in Syria, & in Aegypto, & in Asia minori, multisq; alijs Imperio Turcarum subditis principijs sæpè vagantur pestilentes morbi, in quibus nulla cōtagij nec suspicio, nec timor adest. alloquutus sum ego homines tunc dignos, qui in Aegypto, partimq; in Syria habitauerunt, qui idem mihi retulerunt, dum ibi saeuissima vagaretur pestis, nullam habitam contagij rationem fuisse, immo ibidem nefandum existimari scelus consuetudinem vitare agro-

*Pestilentes morbi an semper sint cōtagiosi.*

æprotantium hoc idem quotidiana potest comprobare ex-  
 perientia. plurimi enim medicis singulis curandi occurrunt  
 pestilentes morbi, qui tamen alijs nulla cōmunicantur ra-  
 tione, sicuti præcipuè sunt pestilentes febres cū periculis  
 apparentes, licet apertissimū, maximūq; accedat contagiū.  
 Sed si inter febres, ac ægritudines pestilentes, ut posuimus,  
 nonnullæ sunt contagiosæ, nonnullæ autem nequaquam, qua  
 id ratione eveniat, declarandum est. quod ita explicandum  
 erit. Cum omnium febrium, ac ægritudinum pestilentū non  
 una, eademq; sit natura, sed aliæ deteriore, & intensiorem  
 malignitatem consequutæ sint, aliæ autem minus deteriore,  
 & magis remissam habeant, nec etiam earum omnium una,  
 eademq; erit efficacia. nam licet hæc omnes ad interitum de-  
 ducere hominem aptæ sint, non tamen eadem velocitate, &  
 vehementia id agunt. sed aliæ magis acutæ, & magis leuæ  
 sunt, aliæ autem minus. hoc inde provenit, quod prauitas, &  
 venenosa natura ex corruptione concepta in illis intensior  
 est, in istis remissior. intensio autem hæc, & remissio vel à de-  
 teriori, vel à minus prava corruptione causatur. in quibus. n.  
 corruptio non ita prava est, venenositas ex corruptione  
 concepta non ita intensa existit. in illis autem; in quibus  
 deterior est corruptio, venenositas admodum intensa resul-  
 tat. cum autem hæc admodum intensa est, non tantum effi-  
 cacissima est ad perdendum patientes, sed etiā eadem tan-  
 quam venenum, quod vel solo tactu, vel efflatu hominem in-  
 ficere aptum est, ceteris hominibus aliquo mediāte conta-  
 gio communicari poterit. cum enim corpus nostrum sit totū  
 conspirabile, & transpirabile, si concepta venenositas gra-  
 dum summum consequuta sit, à corpore affecto poterunt  
 seminaria, & inquinamenta eiusdem venenositatis ad extra  
 euaporare, & transmitti: quæ si alteri homini communicen-  
 tur, existent e earum natura valde prava, & admodū veneno-  
 sa, ac efficacissima, eundem inficere, & simili morbo coinqui-  
 nare poterunt. quæ tamen inquinamenta, & vaporaciones si

non insignem prauitatis, ac venenositatis gradū consequutæ perindè, ac prædictæ fuerint, nec eandem cū illis in agendo, vehementiā, nec in cōmunicando efficaciam habebunt. hincq; hoc succedit, quòd hæ ægritudines non erunt contagiosæ, illæ autem maximè. Hoc verum esse analogia quadam nos doceat virulentarum bestiarū venenositas, quæ cum in omnibus non sit eiusdem prauitatis, sed in alijs intensior, in alijs remissior existat, non eodem modo, nec eadem vehementia, nec eadem velocitate hæ homines perdunt. hinc aliqui per plures dies à fera virus eiaculante percussi superuiuant, alij breui pereunt. à scorpione ictus potest per plures dies viuere. ab Ammodite vsq; ad septimam perdurare visus est. Chersidrus intra tres dies. Aspis terrestris intra tres horas. Basiliscus subitò hominem perimit. Ex ijsdem autem animalibus virus eiaculantibus, si nonnulla existant, quæ summū venenositatis gradum consequuta sint, ea non tantum ictu, vel morfu, sed etiam tactu, & afflatu hominem inficere apta erunt. Dryinus, vbi quis eum calcauerit, illius pedes excoriat, & tumorem ingentem circa crura inducit. & quod magis mirandum videri poterit, manus Medici hunc curantis etiam inde excoriatur. Amphibynam si foemina vterum gerens transgrediatur, foetum malè perdit, & abortit. Basilisci sibilum, & afflatum nulla reptilia, ne dicam hominem, ferre possunt. Hæc & cætera similia non alia fiunt ratione, quam ob summum venenositatis gradum, qua hæc animalia dotata sunt. Venena etiam aut in potu hausta, aut vnà cum cibis assumpta, sint vel à natura, vel ab arte parata, similes habent differentias; quoniam omnia eiusdem sunt sæuicici, & vehementis. alia sunt, quæ nisi repetantur, non occidunt. alia semel exhibita hominem perdunt, alia pluribus mensibus, alia pluribus diebus, alia paucioribus, alia paucis horis, alia subitò & in instanti interimunt. Sed & præter ea, quæ per os exhibita mortē causare apta sunt, alia vehementiora hominū sceleratorum perfidia inuenit, quæ solo tactu, aut affla



tu occidunt. hinc audiuius Circulatorem ex solo odoratu gariofili ab emulo venenati statim interiisse. Legimusq; Io. Galeatium Mediolani Ducem, qui virtutū Comes prius fuerat vocatus, ex appposito super stapedem veneno, dum equitare vellet, peremptum fuisse. cuius exemplo summorū Principum ministri, qui vitæ eorum curam habent, & mensam, & sedem, & ephippia, & stapedes, & omnia ea, in quibus iidem quiescere, & morari debeant, detergenda, & emundanda esse iubent. Quemadmodum autem ex bestiis virus eiulantibus, & ex venenis nonnulla ob eximiam eorum venenositatem reperiuntur, quæ solo tactu, & afflatu hominē inficere possunt: ita etiam ex morbis pestilentibus (qui pestilentes idē sunt, quia naturam venenatam, id est, proportionē respondentem his, quæ à veneno causantur, sunt consequuti) deterrimā qualitatem, & malignitatem adepti sunt, quā possunt alijs solo tactu, & afflatu cōmunicare; quoniam horum morborum ratione ab ipsis ægrotantibus inquinamenta, & seminaria propriæ venenositatis ad extra euaporant, & transmittuntur, quæ alios petentia vel tactu, vel afflatu eodem inficere apta sunt: vnde sequitur, quod tales morbi, quod sæuiōres extiterint, eō magis communicabiles, & contagiosi erunt. vbi autē minus sæui, gradumq; venenositatis prædictis magis remissum habuerint, non ita cōmunicabiles, nec ita contagiosi existent. quæ venenositas nihilominus si remissa, apta tamē ad interitum deducere hominem fuerit, poterit non esse contagiosa. Vnde videmus pestes valdē seuas, valdē etiā esse contagiosas. quæ autem nō ita seuæ sunt, nec etiam de facili communicabiles esse. quæ tamen cōmunicatio non omnibus pestilentibus morbis est data: quoniam nō oēs cū corruptionis, & venenositatis gradum sunt adepti, ut per seminaria, & per vaporaciones ad extra transmissas, propriam prauitatem ceteris communicare queant. quod clarē apparet in febribus pestilentibus cum periculis apparētibus, ne dicam etiam in quibusdam pestilentibus constitutioni-

ruptionibus, quales fiunt apud exterarum gentes, sicuti in Aegypto, Syria, nonnullisq; alijs imperio Turcarum subditis provincijs, in quibus licet sæpe vagentur pestes, tamen contemperante natura, ac compensante huiusce morbi sæuitiem cum eiusdem crebritate, non ita sæuæ, nec ita atroces fiunt, quales in regionibus nostris, ubi contingant, accedere solent; & ideo quæ tales existunt, nec forsitan sunt, nec forsitan debent esse contagiosæ. quoniam in his non adest illa summa prauitas, quæ in ceteris reperitur. & ideo earundem ratione ab egrotantibus nequeunt illa inquinamenta adeo praua euaporare, ut cæteris communicata perniciem con similem in alios inferre possint. quæ eadem ratio, cum communis existat ceteris febribus putridis, est in causa, ut febres putridæ simplices, licet sæpe lethales existant, non sint tamen alijs solo tactu, vel afflatu comunicabiles. Hoc idem confirmat experientia, quæ testatur penes nos omnes pestilentes morbos, qui ex solo contagio comunicantur, esse cæteris omnibus deteriores, cum ab his vix ullus, nobilissimis etiam administratis medicamentis, saluari queat; Qui autem ex acre viatio vulgantur, & sub pestilenti coelo inuadunt, licet ut plurimum homines perdant, non tamen ita rebelles remedijs, perinde ac illi, existunt, unde videmus sub coelo pestilenti ex peste infectis plures, quam eo tempore, quo ex solo contagio inficiuntur, saluari, licetq; ab aere corrupto quandoq; succedant contagiosi morbi, hoc tamen nondum erit, nisi cum hi summam corruptionem, & venenositatem conceperint. quo tempore ex popularibus fiunt etiam contagiosi, qui tamen, si non eximiam venenositatem, & prauitatem acquisierint, non possunt esse contagiosi, licet adhuc sint lethales, & perniciosissimi morbi. & hinc liqueat, quare morbi pestilentes, licet omnes sint graues, & lethales, non tamen sint omnes æque contagiosi, nec omnes apti, ut per contactum, aut afflatum comunicentur, liqueatq; morbis pestilentibus simpliciter non esse proprium, ac inseparabile, ut nonnulli sensere,

*Probl. sect. pri  
ma probl. 7.*

*Morbi pestilē-  
tes contagiosi  
duplices sunt.*

ferre, contagiosos existere. Quamuis autem tales den-  
tur pestilentes morbi, videlicet, qui nullo pacto ex sui na-  
tura contagiosi appareant, attamen vigente peste, qua-  
lisunque ea sit pestis, tutius est (vt notauit Philosophus)  
consuetudinem egrotantium uitare, quam ad eos propè  
accedere. quod præcipuè ab his, qui deprauato sunt ha-  
bitu, obseruandum est. hinc enim facillè omnem hi concipi-  
unt labem, omnemq; causam externam morbos exci-  
tantem timere debent; vt hi, in quibus vitium internum  
facillè aliquo succedente fomite exultet, & seuiat. at il-  
li, qui sano sunt corpore, probisq; abundant humoribus,  
non ita in pestilentib. morbis, qui ex sui natura contagio-  
si non sint, congressum ægrotantium timere debet: licet sem-  
per pestilenti morbo laborantium conuersatio, ne inde cō-  
tagium contrahatur (vt monuit Galenus) perniciosa sit.  
Quemadmodum autem dantur, vt iam dictum est, pestilen-  
tes nonnulli morbi, qui sui natura nequaquā cōtagiosi sunt;  
ita & alij dantur, qui sunt contagiosi. Horum autē duplex  
est diuersitas; nam alij sunt & vulgares, & contagiosi simul,  
alij autem tantum contagiosi, & non vulgares. primi vagari  
te peste ex indispositione ad corruptionem ex inspirato ae-  
re facile inuadunt, & cōmunicantur. at secundi nulla præsen-  
te cōmuni peste ab vno in alterum transferuntur, hiq; tali-  
ter, eaq; ratione sunt contagiosi, vt nulla alia inuadant ratio-  
ne, quam ex contagio. consimilesq; sunt hi tum lvi Venereæ,  
tum rabiei. sicuti enim hi duo morbi nunquam sponte, que-  
cūq; morbifica præcedat causa, homini accedere videtur, sed  
semper ab alijs ex contagio communicari, obseruatum est:  
ita nonnulli dantur pestilentes morbi, qui nulla alia possunt  
ratione accedere, quam ex contagio. consimiles morbos  
viderunt patres nostri, nosque etiam ætate vidimus nostra,  
quemadmodum aliquando in nonnullis Italiæ ciuitatibus  
visum est, in quibus vagarunt sæuissimæ pestes ad interne-  
cionem omnium ferò, qui ea laborarunt. cum tamē nullus,  
qui

qui contagium non senferit, aut febrem pestilentem, aut pestem passus sit. Quamuis autem ad generationem horum morborum maxima polleat facultate contagium, non tamen existimet quispiam, quod contagium sit vel actio, vel impressio, vel affectio, vel corruptio aliqua, qua mediante tales generentur, fiantq; affectus; licet enim ex his pestilentes inducantur morbi, non tamen quid horum est contagiū. nam contagium nihil aliud est, quam aliquorum, vel saltem duorum contactus, quorum vnus in alterum, istius contactus ratione, similis gignatur morbus: qui tamen contactus solus non est sufficiens causa ad inducendum contagiosum morbum, nisi hæ conditiones, de quibus infra, accesserint; quare cum contagiū sit contactus, non qualitas aliqua erit, sed in prædicamento situs reponetur; vnde longe a prædictis distinguetur qualitatibus. Ad cuius contagij essentiam, & ad contagiosum morbum inferendum ultra contactum dictum requiritur, vt quæ se contangunt, vtraque in eodem comunicent morbo. alias, qui infestatur, at non hac ratione, aliquo affectu, non ex contagio, laborare dicitur: Vnde cum a serpente quis veneno inficitur, non ex contagio infectus vocabitur; quoniam licet serpens venenosus sit, non tamen venenatus. nec veneno laborare asseritur. nec cū à torpedine piscatoris manus, qui eam hasta mediante tetigerit, in stuporem inducitur, eam ex contagio affectam esse, censendum est; quoniam licet torpedo stuporem pariat, hō tamen ipsa stupore affecta est. At ex contagio infectum dicimus, qui morsus à cane rabido rabidus factus est; quoniam & in homine, & in cane idem morbus, videlicet rabies reperitur, hæc q; ab altero in alterum contagio mediante producitur. Contagium hoc, cuius merito vnus hominis morbus alteri homini comunicatur, duplex est; alterum immediatum, alterum mediatum. immediatum est, cum nullū inter illa duo interponitur corpus, sed immediatè vnum alterum contangit; vt cum quis accubando alteri, vel eundem

*Contagij quid sit.*

*— sine affectu —*

*— vel corruptio —*

*— vel actio —*

*— vel impressio —*

*— vel affectio —*

*— vel corruptio —*

*Contagij quod duplex.*

*— immediatum —*

*Contagium im-*

*mediatum qua-*

*le.*

contrectando eundem tangit, nullo alio mediante corpore;  
 ab hocq; cōtagio facillima supra omnes est morborum, qui  
 ex cōtagio inuehuntur, communicatio; & in hoc proprius,  
 & verus est cōtactus; tanguntur. n. ea propriè, quorū extre-  
 ma sunt simul. Mediatū autē duplex est; aliās. n. per fomitem  
 quis ex cōtagio patitur, aliās ex aere per fomitem hoc contin-  
 gere dicimus; ut per vestes, p. lintheamina, & per alia, quę po-  
 rosa existunt, facile malā recipiūt patientis qualitātē, sicuti  
 præcipuè ea, quę ex lana, ex gessio, & simili materia cōficiū-  
 tur. quę autē non ita porosa sunt, sed solida, nō possunt ita  
 facile fomitis vicē gerere; sicuti ferrū, argentum, aurū, & te-  
 taq; metalla. cū enim hæc sint substantiæ cōpactæ, ac densis-  
 simæ, nō ita alienas recipiunt, vel qualitātes, vel vaporatio-  
 nes. Quod si vagāte peste visum sit ex solis cōtrectatis pecu-  
 nijs aliquos in peste incidisse, hoc nō ratione metalli, nihil  
 sanè huius qualitatis recipiētis, sed ratiōe sorditiei ex cōtre-  
 ctatione adhaerentis proculdubio contigisse potuit. ex aere  
 autē, & non per fomitem mediatū est cōtagiū, ut si quis aerē  
 inspiraret ab infecto ægrotante alteratum. ut cū quis in lo-  
 co, vbi phthisicus, vel pestilēti affectus morbo degit, inhabitet.  
 ex eo. n. inspirato aere simul etiā & alter eodē inficitur mor-  
 bo. & in his duobus cōtagij modis adest etiā verus cōtactus;  
 quoniam tūc fomies, tum aer corpora contangens ea infi-  
 cit; nequaquam tamen est proprius; quoniam hæc duo, cum  
 nō sint viuentia, cōtagioso morbo nō laborant; sed gerūt  
 vicē infecti animantis, à quo deciditur qualitas, & morbus  
 per cōtagiū cōmunicandus. Quare triplex erit cōtagium,  
 primū immediatū, secundū per fomitem, tertiu, & vltimum  
 ex aere. hisq; tribus modis dictis, hoc erit aptum mediū ad  
 producendū, tum ipsam febrē pestilentiā, tum ceteros cōtagio-  
 los morbos. Quamvis autē cōtagiū ad hosce procreandos  
 morbos, tanta polleat facultate, ipsius tamē nulla ad horū  
 morborū procreationē erit vera, & positiva actio: cum. n. cō-  
 tagiū, nec substantia sit, nec qualitas, quarū proprium est age-

*Contagium me-*

*diatū duplex.*

*Cōtagium per*  
*fomitē quale.*

*Cōtagiū fomes*  
*quæ possint es-*  
*se, vel nō esse.*

*Contagij in in-*  
*ducen- tis mor-*  
*bis nullā esse*  
*actionem.*

re, verè ipsi nō cōpetet actio. quare nec in aliquō genere efficiētis causæ reponi poterit; sed tātū contagiū ad hęc cōcurrer, tanquā causa, sine qua non. si. n. cōtagiū tollas, facile erit homines à contagio so. (quatenus cōtagiosus est) pr̄seruare morbo: quō tñ posito, nulla nec actio, nec causa efficiēs morbi ponitur, sed tantum id, quo mediāte, & actio imprimi, & causa agere potest. Ad quā imprimēdā actionē triahęce necessariō requirūtur, primō dominiū agētis sup̄a passum, secundō patientis pr̄paratio, tertiō quōd tātū tēporis sint simul, vt agere, & pati adinuicem possint. Ad dominiū agentis requiritur nō tantū eius efficiētia in agēdo, sed etiā quātitas debita eius, quod agere debet. Vnde habemus deleteria venena, licet vehementissima sint, à nostroq; calore insuperabilia, si in minimā sumantur quantitate, licet à corpore humano non euincantur, nullam tñ læsionē in idē edere possent: eademq; ratione quamuis omnium agentū ignis sit maxime actiuus, si eius scintillā corpus tāgat, non tamē vrit. Ad patientis pr̄parationē requiritur non tātū ex humorū pr̄paratione, sed etiā ex proprietate naturæ innata, & oꝛgulta dispositio. hinc Marfi, & Psylli à venenō, & à serpentibus non fuerunt læsi. digitus Pyrrhi ab igne non fuit concretus. hincq; in cōtagiosa, & læua peste visę sunt familiæ, quæ etiā manifesto accedēre contagio, ab omni læsione immunes fuerunt, sicuti anno illo celeberrimo 1528. experientia testata est in familia, & agnatione mea: quæ licet familiæ, amicis, & affinibus peste extinctis cōmunicauerit, nullum tñ eius vestigiū perferensit. quam admodum in oppositū aliæ familiæ extiterūt, quæ ex leuissima occasione p̄ hanc innatā, & occultam dispositionem oēs ad vnū extinctæ sunt.

Ad tēporis spatiū licet nō diurnitas omnino requiratur, tñ necessaria est aliqua tēporis mora. hinc super ardentissimā flammam immunes ab igne pertransimus, mahusq; in eadem apponimus, dum hoc citō, & cū velocitate agimus: quod idem de contagioso asserendum est affectu: quoniam

Contagio me-  
diantē si inu-  
cendū est mor-  
bus tria requi-  
runtur.



*Contagio mediante si intro ducitur morbus, à quo fit actio.*

licet facilis sit in hoc transitus, non tamen, cum hoc sit motus, potest in instanti fieri. Efficacia igitur, & quantitas agentis, dispositio patientis, cum ex præparatione humorum, cum etiam ex innata vi, & mora conueniens pro debito tempore requiruntur ad generandos contagiosos morbos. Quibus tribus positis, necessario imprimetur actio, hincq; contagio mediante vnus morbus alteri facile communicabitur: dū autem hæc fit communicatio morbi, alterq; alterum inficit, actio non à contagio, sed à diuersis pendet qualitatibus, quæ in priori ægotante sedem habent. hoc autem alteri morbum communicabit, vel per primas qualitates; vt si summe calidus alteri accubaret, in illum eandem potest imprimere qualitatem, vel per secundas, vt ratione putrefactionis: cum quis enim, vel membrum, vel humores intensè putridos gerat, contangens alterum consimilem ei communicabit putredinem. nam quod tangitur à putrido putridum fit, vel per qualitates occultas, quæ à proprietate agunt tantum; vt si rabidus homo alterum mordeat, rabiem & illi impartietur, quod non à primis, vel secundis ortum habet qualitatibus, sed ab occultis: quæ proprietate quadam liquidorum abominationem, ceteraq; symptomata faua rabido homini propria inducere possunt. Hæ autem qualitates, dū per contagiū ab vno in alterum gignuntur, non ita transferuntur, vt primi qualitas in secundum traducatur; quoniam accidens de subiecto in subiectū migrare non potest, sed per vehiculum quoddā, in quo insidet, alteri adherere possunt, quo adhæsu mediante ad consimilem hic transmutatur qualitas, vnde cōsimilis priori alter generatur morbus. Hoc vehiculum aliquando est corpus, aliquando est vapor, & seminarium quoddam insensibile. corpus est, vt in scabie, in lepra, in tinea, & similibus, in quibus sordities quædam, quæ vestis, & indumenta inquinantur, aptum est medium ad communicandos eosdem morbos. Vapor autem, & seminarium insensibile, vt in Elephantiasi, in ophtalmia, & in febre pestilenti.

*Contagio mediante qualitas agens p quod agat.*

*In cōtagio vehiculum qualis agentis quod sit.*

lenti. hinc enim vaporaciones attolluntur, quæ sensu nullo pacto iudicari possunt, quæ si alterum petant, siue hoc immediatè, siue per fomitem, siue ex aere eueniat, in eundem cōsimilem possunt introducere morbum. Et vapor iste, qui est vehiculum huiusce prauæ qualitatis in morbis hisce pestilentibus, subtilis admodum est. hinc effugit sensum, & facillimè, & citissimè penetrat. tenax est, vnde facile adhæret, & difficulter à fomite, nisi perfletur, geluq; vel igne purgetur, euellitur. humanoq; generi tota sui substantia aduersatur, vnde non tantum lædit, sed etiam hominem necat. Et hæ vaporaciones, cum huiusce sint naturæ, hoc habent, quod si in substantia porosa, aptaq; ad eius conseruationem insideat, per mukum & loci, & temporis spatium conseruari poterunt. hinc ex longinquis nationibus pestilenti morbo infectis aduectæ vestes, & linteamina ad aliam remotam regionem pestem adduxere. hincq; reservatæ in peste, vel ex lana, vel ex canabi, vel ex lino, vel ex simili materia res confectæ post multum temporis spatium nouam inducere pestem. quare hinc pateat non ad contagium, sed ad prædictas qualitates in inducendis contagiosis morbis competere actionem. Cum autem inter pestilentes febres nonnullæ sint contagiosæ, actio quidem, qua ab vno in alterum communicatur, non contagij erit, sed eius tantum prauæ qualitatis, qua ultra calorem putridum cor lacessunt, & praua hæc qualitas insidet in materia corrupta, quæ iam ex corruptione naturam cōsimilem deleterijs pharmacis adepta est. ab hac autem materia putrescente sicuti excitantur, & eleuantur intra corpus ipsum vapores mali, qui petentes cor eius omnes vires perniciose labefaciunt qualitates; ita & alij, cum corpus nostrum sit totum conspirabile, & transpirabile, ex corpore extramittuntur, qui contagio præsentè, siue hoc sit immediatum, siue mediatum, cōsimilem in altero possunt pronam inuehere qualitatem, simulq; febrem causare pestilentē. Vnde non absq; ratione enumerandum.

*Vehiculū prauæ qualitatis in febribus pestilentibus quale sit.*

*Præuæ vaporaciones pestilentium morborū in quibus rebus assa possint seruari.*

*Febris pestilens ex cōtagio causata & quomodo sit.*

*In febre pestilenti genita ex cōtagio à qua sit actio hanc introducens.*

*Febris pestilens ex contagio nō à putredine causatur.*

inter causas externas venit contagium, non quidem tanquā causa aliquid positiuè efficiens, sed solum tanquam causa, sine qua non, tertiumq; verè hoc erit externarum causarum genus, à quo pestilentes progignuntur febres. Cum autem contagio mediante alterius in alterum generatur pestilē febris, actio hæc non à primis, nec secundis prouenit qualitatibus: sed ab illis tantum, quæ in substantia interna insidentes, qualitates occultæ, proprietatesq; ignotæ vocantur. hæc enim actio causatur, prouenitq; inde noua affectio, nō quia infectus pestilenti febre per intemperie calidā, aut frigidā agat, nec quia per putrefactionē, vel per aliam secundum ordinis qualitatem morbum inuehat, sed tantum ratione perniciosæ qualitatis, quæ in corruptione intimæ rei substantiæ consistit: quæ sicuti nec sensu, ita nec ratione, sed solo experimēto cognosci potest. Quod verò hæc actio à qualitate occulta, quæ à rei intima substantia ortū habet, pēdeat, satis ex dictis, & ex his, quæ præmōstrata sunt, patere potest. quod autē non à qualitatibus primis contagio mediante hæc pestilentes inducantur febres, minima eget probatione, cū nihil ultra propriū gradū agere possit. quod verò nec à secundis, videlicet à putrefactione, inducantur, ex prædictis etiam satis liquere potest. cū enim essentia pestilentis febris nō in putredine consistat, nec in contagio, pestilentis febris actio erit à putredine. cui hoc addo, quod si per putredinē febris induceretur pestilens, actioq; hæc à putredine penderet, dum per fomitem hæc introducit febris, non posset (cum id quod à putrido tāgitur putridū fiat) nō putrescere, & fomes ipse. quod à veritate tamē, hoc dictate experiētia, lōgō diffonum est. nam seminaria pestis per menses, & annos in fomite reseruantur, nulla admissa putredine in fomite ipso. præterea ab ipsomet egrotante aliquando per longum temporis spatium contrectantur multa, quales sint fructus horarij: qui cū in putredinem maximè, sicut quid aliud, proclives sint, nullum tamen putredinis vestigium hæc nec reseruant,

nant, nec recipiunt, nihilominus malam illam, perniciosamq; admittunt qualitatem: qua sic ratione, vt hæc alteri, si ad contrectandum, vel ad comedendum exhibeantur, statim pestilentem in eum inducant febrem; vnde pateat non per putredinem, aliamuè qualitatem manifestam, contagio mediante generari pestilentes febres, sed ratione tantum qualitatis occultæ, quæ in substantia insidet corrupta, quam sæpius adnotauimus, declarauimusq; naturam perniciosorum, ac deleteriorum pharmacorum æquare, contagium igitur erit aptum medium, quo talis fiat impressio; eritq; vltra alias duas declaratas causas tertia externa, de quibus hæc satis sint. Nunc internas aggredior. causæ internæ febris pestilentis in duplici sunt discrimine, nam aliæ sunt propinquæ, aliæ remotæ; remotas vocamus pleteram, cacochymiam, obstructions; sub plectora nunc non omnem abundantiam bonorum succorum intelligimus, sed eam tantum, in qua vires grauantur: quæ cum non ita rectè à natura regatur, faciliè corruptionem, & putredinem concipit. sub cacochymia autem, & abundantia prauorum succorum, eorundemq; vitiosa qualitas reponitur; cum enim hi vel quantitate superfluunt, vel qualitate peccant, facillimè & corrumpuntur, & putrescunt. huius cacochymie, quodcunque peccatum in sex rebus non naturalibus eueniat, potest esse causa. attamen inter has, vltra prauam alimenti rationem, quæ sit potentissima, adnotaui, hanc esse nimiam Venerè, hinc enim virtutibus internis labefactatis, prauo generantur humores, qui in omnem perniciosam sunt procliuës corruptionem. hincq; euenit, vt qui nimium, & vltra vires Veneri indulgent, vt plurimùm in hæc febres incidunt, hiq; vt experientia cognoui, minimè omnium saluantur. Obstructio autem omnium causarum febres inducentium euidentissima est. conclusa enim materia in loco calido, & humido, si quid transpirationem prohibeat, facillimè putrescit. si quid autem transpirationem hanc prohibet, hoc po-

*Febris pestilē  
tis causæ inter  
næ quot sint.*

*Febris pestilen  
tis causæ remo  
tæ internæ.*

*Plectora.*

*Cacochymia.*

*Venus nimia  
est potens cau  
sa in inducen  
da febre pesti  
lenti.*

*An ad genera-  
dam febrē pe-  
stilentem pro-  
pter cōcurrāt  
obstructiones.*

tissimum obstructions agunt. Vnde omnium febrium pu-  
tridarum hæc præcipua assignatur causa. An autem ad ge-  
nerationem febris pestilentis necessariò semper concu-  
rat obstructio, non ita apud omnes constat. sed res ita ex-  
plicanda est. Omnis febris pestilens, quæ inter sporades  
eueniat morbos, necessariò pro sui generatione obstructio-  
nem, tanquam causam præcipuam, requirit; quoniam ab  
internis tantū causis ortum habet. quæ autem vel in pesti-  
lenti aeris statu, vel ex contagio generantur, non necessa-  
riò talem habent causam: ex sola enim aeris corrupti inspi-  
ratione, vel ex solo contagio concipitur venenata qualitas,  
qua humores corporis à propria natura desciscentes spon-  
te in putredinem dilabuntur. idemq; contingit, quod in  
horarijs fructibus, alijsq; rebus, quæ sui natura putrescibi-  
les sunt. hæ enim, licet diutius perslentur, à putredine tamē  
præseruari nō possunt. consimiliter humores illi, cum qua-  
litate illam perniciosam conceperint, nec rectē à calore  
naturali tunc imbecilli ex oppugnatione eiusdem qualita-  
tis facto regantur, procliues in putredinē redduntur. hincq;  
licet nulla sit præsens obstructio, tamē necessariò putredo,  
indeq; febris superuenit. Vnde in contagiosis hisce mor-  
bis, ac in constitutione pestilenti multos laborare nouimus,  
quorum corpora potentia, laxa, & transpirabilia erant, in  
quibusq; nec copia, nec vitiosa erat humorum qualitas, sed  
optima truebantur valetudine: nec in consimilem vnquā hī  
incidissent, cum causæ hæ internæ abessent, morbum, nisi  
illæ externæ, validissimæq; concitassent, & præcipitassent  
eos in eam humorum corruptionem, qua & perniciosa, &  
putrescibiles (cum à natura amplius rectē non regantur) fa-  
cti, pestilentem possunt inducere febrem. qua tamen indu-  
cta, & genita, cum humores illi corrupti, & putrescentes à  
natura amplius non regantur, solent ijdem malè dispositi,  
& cōmoti obstructions nonnullas causare; indeq; febrem  
ipsam augere, tuncq; concurrat etiam in his febribus aliquo  
paçto

pactò pro causa obstructio ipsa, quæ licet à principio nec  
 præsens, nec causa morbi fuerit, subsequitur tamen, & ab hu-  
 moribus labe pestilenti iniquitatis fouetur. In pestilenti etiã  
 statu aliquando & obstructiones concurrent, sed non pri-  
 mariò, ad causandam febrem pestilentem: hoc enim tunc  
 accidit, cum corpora malè affecta, præsentè obstructiõne  
 febres non pestilentes patiuntur, quibus si vel contagium,  
 vel inspiratio aeris corrupti accedat, iam conceptæ ex ob-  
 structione putredini illa infligitur perniciofa qualitas, cuius  
 meritò ex non pestilenti pestilens euadit febris: tunc tamẽ  
 obstructio non habet rationem causæ, sed occasionis tan-  
 tùm, videturq; præcedens, & non coniuncta causa ipsius fe-  
 bris pestilentis. non igitur in omni febrium pestilentium ge-  
 nere, licet in omnibus reperiatur, requiritur, & necessaria est  
 obstructio, sed in his tantùm, quæ inter sporades contin-  
 gunt morbos. hæc de causis internis remotis. Causæ autẽ  
 internæ proximæ sunt humores corrupti, & putrescentes; *Febbris pestilen-*  
 corruptio in his humoribus est necessaria; quoniam hinc *tis causæ inter*  
 malam, & perniciosam qualitatem adipiscuntur; putredo *na proxima.*  
 autem requiritur, quoniam hinc febris generatur, cum au-  
 tem hæc duo simul vniuntur, videlicet tum corruptio, tum  
 putredo, tunc necessario febris subsequitur pestilens, mala  
 enim qualitas ex corruptione ingenta à putredine exera-  
 tur, tuncq; cor ipsum non tantùm calore illius humoris pu-  
 trido, sed ab eiusdem etiã praua lèditur qualitate. Qui  
 autem sint hi humores putrescentes, nunc non referam; quo-  
 niam in superioribus, quæ hanc partem attingunt, satis cla-  
 rè præmonstrata sunt; vbi docuimus omne humoris corru-  
 pti genus, ubicunq; putrescat, posse febrem procreare pe-  
 stilentem. nec referre, an hoc sit sanguis, vel bilis, siue sit  
 nigra, siue flaua, seu alterius generis, vel pituita, dummodo  
 iam ex corruptione, cum ad putredinem deueniat, malam  
 aliqua n conceperit qualitatem. Humores igitur corporis  
 humani in hac positi constitutione, quicunq; fuerint; vide-  
 licet



licet tum corrupti, tum putrefacti, proxima sunt causa februm pestilentialium; quoniamq; proxima sunt causa, hinc factum est, ut pro diuersitate humoris peccantis diuersa februm pestilentum sint genera, diuersaq; simul ad hæc symptomata succedant. ab his enim humoribus corruptis, & putrescentibus, sicuti cæterę, ita & pestilentes. Specificantur febres, proutq; diuersi sunt inter se, & essentia, & qualitate; ita & varias produnt affectiones, variaq; inducunt symptomata. & hæc de causis febrium pestilentialium tum externis, tum internis, quæ sufficiant de differentijs a causis.

*De differentijs febris pestilentis ab intenso & remisso, & a coniunctis. Cap. XII.*

**A**liæ sunt differentiæ febris pestilentis enumerandæ, quæ sicuti ultimo loco recensendæ veniunt, ita & minoris sunt, quàm prædictę, discriminis. harum quædam ab intenso, & remisso sumuntur, quædam autem a coniunctis. quæ ab intenso, & remisso accidunt, differentię sunt satis euidentes; quoniam non omnes febres pestilentes sunt eiusdę naturę, & qualitatis; aliæ. n. sunt maiores, alię minores, aliæ deteriores, aliæ minus malignæ. licetq; dictum sit febris pestilentis essentiam, in praua, & perniciosa consistere qualitate, quæ vna cum calore putrido cor affligat, tamen nec praua hæc qualitas, nec calor hic putridus in puncto consistunt, sed latitudinem habent non mediocrem. nam praua illa qualitas modò minus, modò magis est perniciosa, calorq; ille putridus modò intensus, modò remissus est. ex quo succedit, quod non omnes febres pestilentes vniformes sint, sed aliæ sunt sæuiiores, aliæ mitiores. sæuiiores quidem, vbi venenata superabundat, & supereminet qualitas, mitiores autem, vbi hæc eadem remissa est; aliæ autem maiores, aliæ minores sunt, maiores quidem, vbi plurimum est caloris putridi, minores autem, cum oppositum contingit. Vnde quatuor istarum febrium hæc differentiæ statuuntur.

*Præua qualitas febris pestilentis latitudinem habet.*

*Februm pestilentium differentiæ*

tur. quoniam aliæ sunt vehementes, & plurimū malignæ: aliæ quæ debiles eandē cōsequuntur malignitatē. aliæ sunt magnæ, sed quæ minimū prauitatis habeant, sicuti eæ, quædam debiles febres sunt, quæ pariter minimū in se prauitatis retineāt. Consimilē huic differentiæ (& hoc vt clarius res pateat) alterā habēt febres pestulentes: nam cū duo sint in febre ista, quā alterum est qualitas perniciosa, alterū est putredo. sicut maligna illa qualitas non in puncto consistit, sed modō maior est, modō minor; ita & putredo quandoq; est intensior, quādoq; minus intensa. Vnde si contingat, vt & qualitas illa venenata in summo sit gradu, simulq; multa sit putredo, tunc saeuissima gignitur febris pestilens. in qua ratione quidē prauitatis vitales virtutes admodū labefactantur, rationē autem summę putredinis & ceteræ læduntur facultates, lætq; sublequantur symptomata. Vnde in hac febre virtus lāguida est, & ratione putredinis (prout vapores putridi, vel materiæ putridæ hanc, aut illā petūt partem) sequuntur dolores vel capitis, vel ventriculi, vel dorsi, vel alterius partis, sequuntur & vigiliæ, & sopores, & inappetentiæ, & sitis inexausta, & inquietudines, & cetera omnia symptomata, quæ putridā consueuerit sequi materiā, a taliq; febre citissimē necantur egrotantes. Aliquando autē in hac febre putredo quidē est summa, & praua illa qualitas remissa, tuncq; febris est molesta admodum ratione putredinis, sed non adeo saua, cum non ita in hac, vt in superiori, vitalis facultas ratione prauæ qualitatis remissæ succumbat. Quandoq; verò putredo non est tanta, sed perniciosa illa qualitas est maior, tuncque fit febris, quæ ratione putredinis non ita mala prodit symptomata; sed cum acuta sit venenositas illa, vires concidunt magis, fitq; febris, quæ mitior quidem prædictis apparet, sed non minus periculi, quā superior continet. quandoq; autem in tantum remissa est putredo, vt ferē nulla sit: perniciosa autem, & praua illa qualitas admodum intensa est, & tunc fit febris, quæ nec egrotanti videtur molesta

quod ad magnitudinem, et quod ad prauam qualitatem.

Febris pestilens  
tū differentiā  
quod ad putredinem, et prauam  
qualitatem.

leſta, immo benè ſe habere opinantur, nec aſtantibus timenda, ſed miſis in totum primo apparer. aſpectu, cum tamen exitialis admodum ſit: nam ab adaucta illa venenata qualitate vires proſternuntur, corq; omninò obruitur, licet nullum adhuc ſenſibile ſymptoma, quod vel ab ægro tante, vel ab aſtantibus poſſit dignoſci, quod inde pro-  
uenit, quoniam remiſſa putredo nullum acci- dens edit moleſtum. hæque febres ſæpe q ægrotantibus, aſtanti-  
busque, & multoties etiam imprudentibus impo-  
nunt medicis, qui ex ſenſibili ægrotantium leſione morbos me-  
tiuntur, cum facilè ad interitum nullo nec cruditiſ, nec prauitatis humorum ſigno præſente; immo omni-  
bus ſup. a ſalutem atteſtantibus hominem ducant. quod idè ſæpe obſeruati in prima huius ordinis contigiffe differentia,  
in qua dum ex opportunis remedijs putredo euicta eſſet, ſi-  
gnaq; futuræ ſalutis apparuiſſent, mors tamen ineuitabili-  
tèr à non correcta praua qualitate ſubſequēbatur, hæc de  
differentijs ab intenſo & remiſſo. Quò autem ad differen-  
tias à coniunctis, hæ ſunt euidentiffimæ, ac plurimę, nam  
nullum eſt malum ſymptoma, nec vllum morborū exitialiū  
genus, quod cum hac febre non coniungatur: quò ad ſym-  
ptomata, & ſitis, & vigiliæ, & ſopor, & appetitus proſtra-  
tio, & nauſeæ, & vomitus, & ſyncopæ, & virium languor,  
& ſingultus, & inquietudines, & alui fluxiones, & ſudores  
vel ſuperflui, vel mali, & capitis dolor, & delirium, pluri-  
maq; alia conſimilia his febribus ſuperueniunt ſymptoma-  
ta, quæ tñ ipſis non ſunt propria, nec inſeparabilia; nã in alijs  
febriū generibus hæc etiã euenire ſolet: cumq; his eueniunt,  
non ſemper omnia, nec ſemper eodè accidunt modo, ſed ali-  
quando hoc illi feбри, aliquãdo alterum, & non hoc alteri ſu-  
peruenit. His tñ omnibus ſymptomatibus vnū additur tan-  
tū, quod propriū eſt febris peſtilentis, quodq; in nullo alio  
febris genere contingere conſuevit. Hoc autem eſt macu-  
larum genus diuerſum, quod excepta facie ſolet ſæpe cate-

*Febris peſtilen-  
tis differentie  
à coniunctis.*

*Macule febril-  
bus peſtilentib.  
contingentes.*

*Macule in fe-  
bre peſtilenti*

ras corporis partes occupare, & hæ colore differunt inter se; quoniam aliæ sunt rubæ, aliæ pallidæ, aliæ puniceæ, aliæ virides, aliæ nigrae: quemadmodum autem non eiusdem semper sunt coloris, ita non in eadem semper sunt magnitudine. nam aliquando satis amplæ sunt, ita ut æquent mensuram palmarum, vel cubiti, vel etiam his maiorem: unde nonnunquam magnam corporis partem, sicuti dorsum, coxas, crura, brachia inficiunt: aliquando sunt minores, ita ut appareant esse vibices, & liuores ex flagellis inducti: quandoque autem sunt parvæ, & pulicum moribus satis similes existunt, & hæ ut plurimum circa spinam, & in dorso, ac in regione thoracis apparere solent. vocanturque à nostris Peticulæ, seu Pestichie; hæque inter ea, quæ præter naturam de nouo emergunt, sunt recensendæ: antiquorum enim sæcula nec tale quid videre, nec huius meminere. omnia enim ea his consimilia, quæ huiusmodi febribus ipsi accidere adnotarunt, siue papulæ, siue exanthemata dicantur, longè ab his maculis differunt; illa enim in genere tumorum referuntur, habentque eminentiam, & ad supurationem, vel exulcerationem quandoque deueniunt, quorum nullum in his maculis reperitur; quare nouum symptomatum genus erit, notum tamen & nobis, & patribus nostris. Et hæ maculæ sicuti nec colore, nec quantitate semper sunt uniformes; ita etiam nec numero. nam aliquando plures, aliquando pauciores existunt. Quæ omnia de peticulis ipsis potissimum consideranda duco. Noui nam præstantes viros, qui arbitrati sunt non omnes febres, in quibus peticulæ appareant, pestilentes esse, hæducti ratione, quod pestilentes febres cacochimiæ, non sanguinis plethoriæ sequantur. quare eas febres, in quibus hæ maculæ rubræ conspiciantur, quam his sanguinis multitudo iungitur, non esse pestilentes affirmant. sed illas tantum, in quibus hæ nigrae, violaceæ, liuidæ, alteriusve prauis coloris existant; quoniam tales cacochimiæ præferunt, pestilentes appellant. At si ceteri humores à sanguine distincti naturam à nobis extraneam, per quam aduersantem humano generi qualita-

quas corporis partes occupant.

Macularum febris pestilens differetia à colore, & quantitate, & numero.

An omnes febres peticulis apparatus sint ex genere pestilentialium.

tem adipiscuntur, inire possunt, quid prohibet sanguinem ipsum hanc eandem inire posse? nihil sanè, cum & in quantitatibus, & in substantia perinde ac alij humores ab eo discreti, pati earundem passionum mutationem queat. quā mutationem cum sanguis consequutus fuerit, æquē ut illi, cum ad putredinem deuenierit, pestilentes procreabit febres. Quam veritatem nec Auicenna, nec Aetius, nec Paulus ex Ruso negarunt, attestantes à sanguine pestilentes aliquādo generari febres. Vnde Princeps hæc in curatione habebat. Si autē materia vincens fuerit sanguinea, fiat phlebotomia. Aetius autem cum Paulo ex intentione Rusi hæc referebat. Quibus sanguis abundat, his vena secetur. Si autem à sanguine possunt generari pestilentes febres, cur negandū erit eas, in quibus peticulæ rubicundo colore infectæ, quia his multitudo sanguinis iuncta est, apparent, esse pestilentes? sunt (ut mea fert sententia) à ratione iam explicata, & ab auctoritate prædictorum virorum confirmata, hæc etiā febres pestilentes, sed à cæteris in hoc differentes existunt, quod hæc, quoniam in ipsis materia minus praua, & minus, quàm in cæteris maligna peccat, ideo minus, quàm cæteræ aliæ, detrimenti, & periculi minantur ipsis ægrotantibus. benigniores enim sunt maculæ, & peticulæ rubicundæ, quàm omnes aliæ; quia etiam à benigniori humore, videlicet à sanguine ipso, procreantur. Quare maculas has omnes, cuiuscunq; extiterint coloris, inseparabile esse ignum pestilentis febris, hasque necessariò pestilentem significare affectum, constituo. Aduertatur tamen, quod licet hæc maculæ inter propria febrium pestilentum symptomata recenscantur, nō tamen earum inseparabile symptoma est. quoniam licet hæc, ubiuis eueniant, semper necessariò certum sint febris pestilentis inditium, nō tamen in omni febre pestilenti necessariò eueniunt. plurimæ enim sunt illæ, in quibus hæc maculæ non apparent, paucissimæ autem, quibus superueniunt. Hæc de symptomatibus. Quò autem ad morbos, qui cum febre

*Morbi diversi  
possint con-*

febre pestilenti contingunt, idem, quod de symptomati-  
bus dictum est, affirmatur, sicuti enim omnia prava sympto-  
mata possunt his febribus coniungi, ita plurimi exitiales  
morbi solent eisdem febribus connecti, sicuti anginae, pleu-  
ritides, phrenitides, iecoris inflammationes, colicae passio-  
nes, apertae, oris prava ulcera, partium putredines, absces-  
sus, inflammationes, erysipilata, consimiliaq; his omnia pra-  
ua, sed duo praecipue subsequuntur morbi; alter est carbun-  
culus, alter bubo pestilens; vel parotis pestibus. cumq; mor-  
bi isti cum febribus his coniunguntur, semper res deteriori  
se habent statu: proutq; membrum lesum erit nobilius, inde  
etiam semper maius impendet periculum, ab hisq; morbis,  
qui febre pestilenti connectuntur, tanta harum diversitas ge-  
neratur, ut plures harum species videantur, cum tamen non  
ratione morborum additorum, sed propriae eius essentiae  
verge debeant constitui differentiae; nam nec etiam prauitas  
morborum febre pestilenti coniunctorum ab eorum vnica  
pendet essentia, sed a pernitiōsa, & venenata humorū qua-  
litate, qui in pestilenti febre putredinem concepere. hi enim,  
ubi putruerint, quocunq; repant, ibi prauam insigunt quali-  
tatem, morbusq; inde genitus non a morbi ipsius essentia,  
sed ab exitialibus illis succis malignitatem, & pernitiem  
cōsequitur. & haec de differentiis febriu pestilentiu sufficiat.

*De signis futuram febrem pestilentem indicantibus.*

Cap. XIII.

**D**Eclarauimus febris pestilentis essentiam, eiusque diffe-  
rentias enumerauimus. nunc reliquum est, ut ad ter-  
tium principale accedamus, signaq; eiusdem recenseamus;  
ut huius perfectam assequamur notitiam. nisi enim haec pars  
duabus praedictis adderetur, omnis profectio labor, omnisq;  
conatus tum in superioribus adhibitus, tum in inferioribus  
sumendus inuutilis esset. haec enim morbum patefaciunt, ostē-  
duntq; quo ignoto omnis medici diligētia frustratur. Sciē-  
dum



*et si signis  
demonstratiuis*

dum tamen est, quòd pars ista de signis, ferè tota coniecturalis est, rariq; sunt morbi, in quibus demonstratiua habeantur signa; cuius ratione ars nostra coniecturalis dicta est. quapropter difficillimum erit hanc de signis partem demonstratiuis firmare rationibus. in tanta tamen rerum difficultate nòs conabimur quàm proximè ad veritatem accedere, remq; ipsam certis adeò fulciemus rationibus, vt in exponendis signis quàm còmodissimè ad veram, & determinatam rei essentiaè cognitionem perueniamus, certoq; esse, vel non esse febrem pestilentem poterimus affirmare.

*Febris pestilens  
signa tripla  
sunt.*

*Signa futura  
febris pestilen-  
tis à quib. &  
à quo sumuntur.*

Rem igitur ipsam aggredientes dicimus signa hæc in triplici posita esse discrimine. alia enim futurum morbum indicant, alia præsentem demonstrant, alia præteritum rememorantur. Hæc tria signorum genera necessariò ponenda sunt; quoniam à primis præseruatio, à secundis curatio, ab ultimis præcautio quædam in cæteris, qui febrem non laborant, sumitur. Prima signa, videlicet ea, quæ futuram febrem pestilentem prænunciant, à tribus capiuntur, scilicet à corporis dispositione, à præsentia causarum, & à quibusdam medijs dispositionibus. Hic autem animaduertatur, quòd dum signa februm pestilentum recensemus, nò pestis vel futuræ, vel præsentis, vel transactæ, sed febris tantum pestilens, de qua nostra est speculatio, signa declarare intendimus. quæ licet nonnullis cum peste eadem visa sit, longè tamen ab ea differt, quamuis enim & pestis, & pestilens febris aliquando concurrant, tamen & pestis sine febre, & febris pestilens sine peste datur, vnaq; sine altera reperitur. Quare ponentes signa febris pestilentis, non signa pestis, sed febris tantum, circa quam versamur, recensebimus. Huius igitur signa declarantes dicimus ea, quæ futuram febrem pestilentem denunciant, à tribus sumi, scilicet, à corporum præparatione, à causarum præsentia, & à medijs quibusdam dispositionibus. Adest in corpore ad febrem pestilentem præparatio, cum homines prauos, qui vel iam

*Corpora præ-  
parata ad fe-  
brem pestilentem  
quæ sunt.*

*corrupti*

*corrupti*

corrupti sunt, vel in corruptionem proclives congersere succos: sicut illi, qui praua videntes victus ratione gulæ indulsere, vel necessitate coacti ex cibariis mali succi se repleuere. vnde quibus & fungi, & horarij fructus, & carnes diu maceratae, & legumina semiputrida, & frumenta, quæ rubiginem sensere, & vinum immutatum, & aquæ vel stagnantes, vel quomodolibet viciatae, & omnia herbarum, & radicum in caritate annonæ genera, & consimilia in vfu fuerunt, omnes ad hunc morbum paratos nouerimus. Vltra hos & illi, qui supra vires bonitate succorum grauati sunt, in hanc febrem sunt proclives, dum vel iterum ingurgitant, vel inordinatè, & intempestiuè se replent. moles enim hæc humorum cum sic à natura regi non possit, faciliè concipit corruptelam aliquam, malignamq; adipiscitur qualitatem. plures etiam alij, qui nec prauis abundant humoribus, nec vltra vires grauati sunt, ad hanc capefcendam febrem disponuntur, dum vel à molestis animi accidentibus agitantur, vel nimium Veneri operam dant. has duas ego præcipuè occasiones obseruaui, à quibus inuecta in bonos humores corruptela, faciliè febres subsequuntur pestilentes. animi enim accidentia spiritus à proprijs distrahunt operationibus. Venus autem nimia omnes virtutes labefactat/ quare ex his duobus, præcipuè autem ex nimia Venere, corpora ad huius generis febrem maximè disponuntur. nā distractis spiritibus, virtutibusq; labefactatis, faciliè humores in aliam transeunt naturam, corruptionē aliquam consequuti. Qui etiam habent corpora imbecilla, debiliaq; ab ortu mēbra receperint principalia; & qui vel ex hausto veneno, vel ex prauis cibarijs, vel ex potu corrupto, vel ex aere viciato labem in visceribus, & principalibus membris contraxere, omnes corpora ad febrem pestilentem faciliè suscipiendam possident. hi enim ab omni etiam leuissima causa maximè labefactantur, lētionemq; vltra, quàm credi possit, semper maiorem admittunt, minimoq; negotio in his omnia humo-

*Cause præcipuè disponentes corpora ad febrem pestilentem.*

*Corpora dor-  
sa, et rara quo  
modo disposi-  
ta sint febrī pe-  
stilentī.*

rum genera corruptelam, & vitium contrahunt. Qui autē  
temperamenti sunt humidi; & qui corpora calida, & humi-  
da vel ab ortu, vel ex accidenti habent, cū hæc faciliē omnē  
cōcipiant putredinē, faciliē etiā ad omnē corruptionē dispo-  
nuntur, hincq; in febres pestilētes proclives sunt. Corpora  
etiā rara, & laxos habētia meatus, cū omnibus externis cau-  
sis faciliē cedant, prona ad febrem pestilentem capeſcendā  
sunt, vbi externæ causæ vigeant, & vagentur. Corpora verō  
densa, & angustos habētia poros, facillimē ex internis cau-  
sis in febrē hanc incidūt. hæc q; licet opposita sint, pariter tñ  
pro causarū diuersitatē pestilenti febrī sunt opportuna. hæc  
de corporū præparatione, à qua prima sumebantur indicia  
futuræ pestilentis febris. Secūda capiebātur à præsentia cau-  
sarū, quæ vbi præstō sint, facillimē febris potest subsequi pe-  
stilens. Causæ autem hæ erunt vel intemperatū cœlū, præ-  
cipuē autem calidum, & humidum, vel aeris pestilēs status,  
vel contagium vagans, vel aquarum inundatio, vel earundē  
stagnantium corruptio, vel multorum hominum, seu anima-  
lium cadauera insepulta; vel ex antris, specubusq; prauæ ex-  
pirationes, vel exhalationes ex terrā inquinata, vel locorū,  
vrbium, regionumue immunditię, excrementaq; non expur-  
gata. Vbi igitur harum causarum aliqua fuerint præstō, fa-  
ciliē coniectare poterimus futuram pestilentem febrem. hæc  
enim omnes, & singulę causæ multa vi pollent ad inducen-  
dum hoc morbi genus. Vnde ex harū præsentia faciliē mor-  
bum hunc futurum esse, coniectare poterimus. Quod si his  
omnibus medię quædam dispositiones; à quibus tertia fu-  
turę febris indicia sumi diximus; superaddantur, poterimus  
certō conijcere pestilentem febrem subsequituram esse. cū  
enim viderimus posita corporum præparatione, præsen-  
tiāq; causarum, adesse in homine mestitiā insolitam, timo-  
remq; inexplicabilem, colorem faciei immutatum; ad obla-  
ta non benē se habere, insomnijsq; prauis perturbari, lassitu-  
dinem adesse spontaneam, siti molestari, nauseam pati, vigi-  
lijs

his affligi, non poterimus, stantibus his medijs ad morbum dispositionibus, non coniectare febrem imminere pestilentem, hæc enim indicant iam corruptionem aliquam concipere humores corporis, alienâq; adipisci naturam, paratosq; in putredinem esse, unde postea putrescentes febrem pestilentem edere possint. Hæc de signis, quæ futuram hanc febrem prænunciant.

*De signis communibus, & proprijs febris pestilentis.*  
*Cap. XIII.*

**S**igna, quæ præsentem attestantur pestilentem febrem, veniunt declaranda, quorum diligentissima debet esse inquisitio, quoniam hinc cognitio habetur morbi, quæ non habita, nec recta, nec fidelis potest subsequi cura. Iosigna autem hæc non omnia eiusdem sunt facultatis, nec eiusdem certitudinis, sed diuersa existunt, aliæq; fidem plenior, alia minorem habent, distinguuntur autem in triplici ordine, nam alia sunt omnibus communia, sed non propria, alia autem propria, sed non communia, alia autem indifferencia, quoniam nec semper, nec omnibus, sed aliquando, & aliquibus conueniunt. Primum signorum genus, quod commune omnibus est, licet non proprium, sumitur à propria febris pestilentis essentia, quæ sicuti vna est, communisq; omnibus febribus pestilentibus, & ipsis propriis, ita vnum profert signorum genus, quod omnibus commune est. huius autem febris essentia in maligna, & venenata consistit qualitate, quæ vnâ cum calore putrido cor affligit, alteratq; corde verò ita patiente, necessario immutantur pulsus. hi enim & ortu, & facultate à corde ipso dependent. Unde ipso læso, consequitur necessario & in pulsibus ipsis immutatio, quæ autem sit ista pulsus immutatio, quæ ad febrem subsequitur pestilentem, clarè patebit, consideratis causis lædentibus. Duo sunt in hac febre, quæ cor ipsum lædunt, alterum est calor putridus, alterum est perniciofa, & venenata

*Signum cõmu  
ne omnib; fe  
brib; pestilent  
ibus, qualis est  
calor putridus*

*Signum febris  
pestilentis sum  
ptum à puls.*

qualitas. dum cor à calore putrido tantum alteratur, inca-  
lescitq; necessario primò immutatur pulsus ad magnitudi-  
nem modò maiorem, modò minorem, prout maior, vel mi-  
nor est caliditas: cum enim ratione auctè caliditatis maior  
requiratur refrigeratio, indè necessario pulsus primò ad ex-  
cipiendam maiorem aeris frigidi quantitatem, in magnitu-  
dinem attolluntur; què si non satis sit ad refrigerium rece-  
pti caloris, secundò ad celeritatem mutantur. quòd si nec  
celeritas satisfaciât, necessario frequentes evadunt. si autè  
huic calori superaddatur prava, & venenata qualitas, non  
amplius hoc ordine pulsus immutantur: sed primum, quòd  
accedit, est frequentia: cum enim maligna hæc, & pernicio-  
sa qualitas nò per intemperiem aliquam, sed à propria eius  
substantia cor la dat, eiusq; naturæ, ac substantiæ inimica sit,  
& veneni vicem gerat: hinc maximè & alteratis spiritibus,  
imminutisq;, & facultatibus omnibus labefactatis, labor  
cordis succedit: nam dum alterantur spiritus à venenata  
qualitate, imminuuntur etiam. quibus imminutis, & pern-  
ciosa qualitate alteratis, cordis facultates labefaciuntur. dū  
autem hæc contingunt, quemadmodum in subita trepida-  
tione omnia raptim, & cum festinatione fiunt, pariter in tan-  
ta cordis concussione ad frequentiam immutantur pulsus,  
qua semper actione, cum vehementer cor laborat, arteriæ  
maximam eius indicant lesionem: hinc in cardiacis, in  
syncopis, in maximis æstuationibus pulsus eduntur frequen-  
tes; quoniam in his maximè cor laborat. quod idem cum  
in febre contingat pestilenti, non mirum est, si in his præci-  
puè pulsus ad frequentiam imminuentur; in his enim cor à  
venenata lèsum qualitate maximè laborat, affligiturq;. Vn-  
de ad hanc propulsandam noxam cogitur frequentem ede-  
re motum: hocq; vitur, tanquam eo, quo in defectu alia-  
rum mutationum, ubiq; aliæ nò satisfaciunt mutationes, vi  
consueverit. hæc; in re idem sagax agit natura, quod faciūt  
Medici rectè artem exercentes; sicuti enim hi extremis mor-  
bis

*quod est morbus  
Frequentia cu  
vehementer  
cor laborat, sè  
p additur pul-  
sus.*

*quod est morbus*

bis extrema statim adhibent remedia; ita natura in supremis  
 hisce cordis affectibus, non quòd ex cognitione hoc agat,  
 sed necessitate ducta, ad ultimam deuenit pulsus mutatio-  
 nem; videlicet ad frequentiam. Frequentia autem hæc mo-  
 dò has, modò alias sibi adiungit pulsus differentias; dum n-  
 in principio ipsius febris praua illa, & maligna qualitas pe-  
 tit cor vna cum calore putrido, & dum labefactantur co te-  
 pore cordis facultates, nondum tamen concussæ sunt, pul-  
 sus sunt statim frequentes quidem, sed etiam & magni, & ce-  
 leres; dū enim fit alteratio a venenata illa qualitate; dumq;  
 fit pugna, ac resistit natura, cum vires adhuc consistent, pul-  
 sus ob auctam necessitatem redduntur & magni, & celeres.  
 quare in principio pestilentis febris, dū adhuc fit actio, pul-  
 sus erunt frequentes, magni, celeres, & non languidi. sola  
 tamen frequentia pulsus ab inuasionē febris assumpta erit  
signum peculiare huiusce febris, hæc q; semper maior erit;  
quàm ex ratione caloris adacti; ita vt supra magnitudinē,  
& celeritatem multum excedat frequentia; proportio. qua  
 rectè considerata, & mente commensurata clare apparebit,  
 febrem esse pestilentem, dum frequentia supra alias differē-  
 tias vel duplam, vel sesquialteram habebit proportionem.  
 Facta autem, impressaq; in cor ipsum actione a qualitate  
 uenenata (quoniam hinc spiritus, & facultates omnes con-  
 cussæ remanent) pulsus redduntur frequentes, parui, cele-  
 res, & languidi; cum enim amplius non in suo robore con-  
 stent vires, necessariò & languidi, & parui euadunt, nō po-  
 tente natura in magnitudinem attollere arteriam; ob penu-  
 riamq; spirituum semper frequentiores euadunt, celeres ta-  
 men adhuc perseuerant, nondum ad imbecillitatem maxi-  
 mam redacta natura, vigenteq; adhuc calore, ob cuius ne-  
 cessitatem semper maior & celeritas, & frequentia cre-  
 scit; dum præcipuè per magnitudinem imminutam pulsus  
 proportionata non subsequatur frigidioris aeris inspiratio.  
 Quod si adhuc inualescente perniciosa, & venenata illa qua-



litate vires prosterantur: tunc pulsus sunt frequentiores admodum, & parui, & languidi, & tardi, sed qui celeritatis imaginem ob frequentiam, & parvitatem admodum auctam præbeant, in summaque (ut unico dicam verbo) prostratis à maligna illa qualitate viribus pulsus sunt forticantes. Quæ propter in pauci febris pestilentis tempore semper pulsus erunt frequentes, sed modò has, modò illas habebit additas pro ratione, & constantia virium, & invalescentiæ venenatæ qualitatibus differentiis. Vnumque hoc erit signum omnibus hisce febribus commune, quod possit febrem ætèro attestari pestilentem. Secundum signorum genus febris pestilentis præsentiam attestantium, quod diximus proprium esse his, sed non omnibus commune, sunt maculæ illæ, de quibus inter differentias egimus, videlicet & magnæ illæ, & mediocres, & illæ minimæ, quæ peticulæ, vel pestichia à recentioribus appellatæ, à nonnullis alijs inproprie transumpto nomine examiniatæ dictæ sunt. Cum hæ apparent maculæ, firmissimum est argumentum, febrem existens pestilentem non aliunde eum hæc generantur, quàm ex venenata, & præua sanguinis, vel aliorum humorum qualitate, cui coniuncta etiam sit putredo, & ut vni dicatur verbo, ex solo pestilenti generantur affectu. Apparent quidem sæpe his minimis aliæ, & in colore, & in quantitate, & in omni altera earum differentia consimiles maculæ, quæ & cum febre aliquando, & aliquando sine febre eveniunt, quæ tamen huiusce non sunt ordinis, nec peticulæ, seu pestichia dici possunt, licet imprudentes nonnulli medici à colore, & similitudine prædictarum decepti, has inter periculas aliquando recenscant, nā hæc non à pestilenti aliquo oriuntur affectu, sed à sanguinis tenuitate, qui agitur, vel à calore, vel ab excrementis facultate extra capillares venas in cutem efflorescit, extramittiturque, in quo casu illud idem contingit, quod in echinomatæ, & in sugillatis evenit, attractio ad cutem à capillaribus venis sanguine, unde præcipue hoc symptomatum genus contingit

*Signum febris pestilentis proprium, sed non commune.*

*Macula in febribus pestilentibus apparētis unde causentur.*

*Macula quando similis petiiculis apparentes, in quo ab his differāt & à quibus causis oritur.*

tingit in his, qui. simul sanguinis parum ex eius tenuitate, factusq; ipso aquoso patiuntur. hocq; potissimum adnotari euenit in lienosis, in diuturnis viscerum obstructionibus, in antiquis illeniis, in omnibusq; ijs, et in summa die, qui ex viscerum debilitate sanguinem generant aquosum, quicq; ex inobedientie iecoris in rachexiant prodiues sunt, in his enim generatur sanguis tenuior, ab expultriceq; virtute excratus modo per nares plurimum fluit, modo per aliam partem, modo etiam à capillaribus exiens venit in partes cutaneas transmittitur, ubi retentus proprium amittens calorem in alienum permutatur, factusq; vel liuidus, vel niger, vel purpureus varias profert harum macularum diffinitiones, quæ nullo modo nec essentia, nec causis cum his, quæ febrem possident attestantur, coincidunt, conformantur uel, sed diuersæ sunt, nihil plius præferentes, quam sanguinis tenuitatem aquosam, & iecoris imbecillitatem. Hæ autem maculæ, quæ febrium pæssendum signa sunt, ab unica quidem proueniunt causa, scilicet ab humoribus putrescentibus, perniciosaq; inquinatis qualitate, sed diuersimodè, & diuersæ apparent. diuersimodè quidem, quoniam aliquando criticè, aliquando symptomaticè eueniunt criticæ, cum vel in parte, vel in totum superata putredine, prauaq; correctæ qualitate. natura corruptum humorem ab internis ad exteriorem transmittit, tuncq; semper sequitur alleviatio morbi symptomaticæ autem, cum natura stimulata vel à oppia, vel à praua qualitate, ante putredinis coctionem, & prauæ qualitatis correctionem ad partes cutaneas portionem materię peccantis transmittit. Vnde euenit, ut cum nec coctio præcedat, nec perniciosa qualitas sit evicta, nullum hinc subsequatur iudicium, immo cum facta sit maxima morbi corruptio, colluctatio, non separato bono à malo, naturæ cuiusq; populi, quam vincatis hoc sic signum debilitat, et in maligna hinc succedit, multis in hac actione spiritibus resolutis, cum hacq; debilitate adhuc causæ morbificæ vigent, quæ

deh. in. l. u. m. m.  
v. m. m. m. m. m.  
v. m. m. m. m. m.  
v. m. m. m. m. m.  
v. m. m. m. m. m.

et. m. m. m. m. m.  
et. m. m. m. m. m.  
Macula. i. feb.  
p. s. i. l. u. m. m. m.  
u. m. m. m. m. m.  
p. a. r. e. n. t. e. t. q. u. a.  
d. o. b. e. n. e. , &  
q. u. a. n. d. o. m. a. l. e.

v. m. m. m. m. m.  
v. m. m. m. m. m.  
v. m. m. m. m. m.

*macularū feb.  
pestilētis diuer-  
fitas in colore,  
& huius can-  
sa.*

*Macularum  
diuersitas in  
quantitate,  
& numero.  
- quā bonū rati-  
onē hāc, ut  
- & omni-  
- bus obiectis*

*Macula febris  
pestilentis quā  
do appareant.*

si ante pugnam hanc non potuerunt à naturā superari, nunc addita maiori virium imbecillitate, multò minus videntur domari posse. sicq; dum symptomaticæ hæ maculæ appa-  
rent, non solum non bonum, sed prauum existit indicium. Diuersæ autem sunt maculæ istæ ob diuersitatem colorum eas concomitantium; aliquando enim sunt rubæ, aliquan-  
do virides, aliquando liuidæ, aliquando puniceæ; aliquan-  
do nigrae. hi colores à diuersitate produunt materiei peccā-  
tis, quæ prout est magis sanguinea, vel magis biliosa, vel ma-  
gis melancholica, vel magis pituosa, potius hunc colorem, quàm illum habent. à sanguine puriori fiunt rubæ, & hæ sunt benigniores. à pituitoso fiunt liuidæ, & hæ minus benignæ; à bilioso fiunt puniceæ vel virides, & hæ sunt deteriores. à melancholico & exusto fiunt nigrae, & hæ omnium pèssimæ. Diuersæ etiā sunt hæ maculæ quantitate; quoniam, quandoq; pauciores, quandoq; plures, quandoq; maiores, quandoq; minores existant. cum plures sunt, & maiores, & coloris benignioris, citiusq; apparuerint, magnum afferunt leua-  
men, naturæq; victoriam prænunciant. sin autem pauciores; minores, prauis coloris, & symptomaticè accesserint, natu-  
ram succumbere indicant, ipsamq; vel à multa perniciosi humoris copia grauata, vel à maligna qualitate. nimium stimulatam ad hanc edendam actionem demonstrant. harū autem differentias omnes siue has, siue illas pro modo; nu-  
mero, quantitate, colore, & alijs circumstantiis considera-  
re, & commensurare oportet. Aliquando etiam hæ macu-  
læ, postquam apparuerunt, retrocedunt, obliteranturq;. quod semper malum est, cum indicent morbosam mate-  
riam ab exterioribus ad interiora verti, quod in quocunq; casu semper inaleum est. Quæ prout est, ratiō, maculas has (quomodocunq; appareant) semper febrem attestari pesti-  
lentem; hæc quæ certissimum esse huius febris indicium: que tamen maculæ licet necessariò hanc febrem attestentur, non tamē omnes huius generis; vt iam diximus, febres, nec eas,

in quibus apparent, semper concomitantur, & quoniam non in principio, sed in progressu morbi euenire solent. non enim una cum febre pestilenti statim coniunguntur, ita ut eorum sit pathognomicum signum, sed post apparent, nam aliquando in quarta, aliquando in septima, aliquando in nona, vel in altera indicatoria die, si ad bonum fuerit excretio, superuenire solent. aliquando autem & in alijs diebus, cum minus fida, & minus fuerit utilis ista transmissio, etiam apparere solent, nunquam tamen prima visum est die, vel saltem rarissime, nec in primo febris insultu has apparuisse, & si tunc appareant, pessimum essent indicium, cum tunc nulla possit esse morbi nec coniectura, nec correctio, quare hæ macule poterunt confirmare, quidam febrem esse pestilentem, sed indicare eam a principio non possunt, & ideo, ut iam dictum est, hæ erunt huiusce febris signum quidem proprium, sed non commune, nec inseparabile.

*De signis febris pestilentis sumptis à qualitate caloris.*

*Cap. XV.*

**P**Ositis signis communibus, & proprijs ad indifferentia signa descendendo, quæ in multiplici sunt ordine; nam alia à qualitate caloris, alia à lorio, alia à symptomatibus, alia à superuenientibus affectibus, alia à causis sumuntur, primum genus, quod à qualitate caloris desumptum est, maxime est animaduertendum; quoniam licet non omnibus febribus pestilentibus hoc sit commune, plures tamen, & omnes ferè cōsequitur, hoc autem signum huiuscemodi est, quod calor in his febribus nec acer, nec multus, nec intensus apparet, sed potius ad tactum mitis est, & remissus. unde nec calidi, nec perurētes tangentibus vidētur: quod inde provenit, quoniam ad internam calorem, & spiritus retrocedunt, à quibus partes exteriores destituta, vel tepidi fiunt caloris, vel subfrigidæ, vel etiam quandoq; frigida apparent; hoc autē licet ferè perpetuū sit, aliquando tamen non solet esse in prima febris

inuasio.

*Signum pestilentis febris sumptum à calore.*

*Calor febris pestilentis qualis esse solet, et quomodo variat.*

inuaſione, dum adhuc vires à qualitate illa venenata, & pernicioſa non ſunt admodum labefactatæ, & præcipue ſi humorum in hac ſabre multa vigeat putredo: nam dum adhuc vires non ſunt admodum laſæ, nondum ad intra calore, & ſpiritibus concentratis, ſeu violentia attractis, partes exteriores caliditatem humori putreſcenti proportionatam continent. Vnde ſi bilis putreſcat, calor eſt acerrimus: ſi pleuritæ, caliditas eſt ſumoſa, non aeris: ſi melancholicus humor, aeris quidem eſt calor, ſed non tantum, quantum eſt in putredine bilis. ſi ſanguis, calor eſt minus, quam in cæteris, morbidæ, quandammodo præſert (ut ita dicam) mites ſcientiæ. Hic autem calor in principio febris peſtilentis, dum adhuc non in corde impreſſa eſſet mala illa qualitas, reſervatus ſæpe excellentibus impoſuit medicis, qui opinantes calorem in omnibus hiſce febribus non eſſe vehementem, peſtilentem febrem non peſtilentem iudicarunt, indeque malè, ac ſine ratione adhibitis remedijs in mortem agrotantes ipſos præcipitarunt. Calorem etiam putreſcenti humori proportionatum ultra principium conſervari aliquando in nonnullis febribus peſtilentibus, obſervavi, eumque ad ſtatum vique perſeuerare, quo tempore ſi res malè terminatura erat, tunc cito reſcedere primo, poſtmodum ſi ſigeflori incipiebat, viriutibusque eadem mori tandem ſubſequebatur, ſi autem libere poſt ſtatu quidem, dum valida eſſet morbi, & naturæ pugna, calor aliquantulum caloris remiſſionem accipiebat, nonquam tamen in totum mitterebatur, unde conſtantibus viribus ſuperata putredine, ac evicta mala illa, & pernicioſa qualitate, ſalus accedebat. hicque eſt baſis ille, in quo multa videntes putredine calidiſſi homines minime quid præſens qualitas adepti ſunt. In hiſ tamè quibus caſibus, videlicet & in eo, in quo in principio tantum, & in iſto, in quo uſque ad ſtatu calor humori putreſcenti proportionatus reſervatur, hoc unum ſolet præcipue ad eſſe, quod narium extremitas, auriculaeque, & extremi pedes vel non ſunt

Quò ad calorem  
quid ſit notan-  
dum pro cogni-  
tione febris pe-  
ſtilentis.

oilum

ad



ad tactum calidi, vel saltem ceteris corporis partibus caliditatem proportionatam non retinent, & hoc optimè, & diligenter animadvertatur, quoniam ubi alia nonnulla sunt febrem pestilentem attestantia signa, licet calor caliditatem in se habeat intensam, & mordacem, si extremæ illæ partes potius, vel non fuerint calidae, vel caliditatem ceteris corporis partibus non proportionatam habeant, febrem eam pestilentem esse, poterunt indicare. Quare hoc signum à qualitate caloris sumptum maximè à nobis considerandum venit, videlicet, quod calor in febre pestilenti, paucis exceptis dictis casibus, non est nec intensus, nec mordax, nec acris, sed potius mitis, & remissus ad tactum apparet. Unde non abs ratione artis nostræ procures dixerunt, febrem pestilentem exterius quietam esse, cum tamen interius omnia conturbet, viderique satis mihi esse, cum sanè hominè perdat, quia est autem exterius quietam, & mitem esse ratione caloris remissi, qui nec ad tactum mordax, nec acris apparet. An autem sicuti calor in externis est remissus in hac febre, identidem sit in internis, non ita liquet. dictum quidem est antiquum, quod febres hæc non sunt calore vehementes: attamen sententia hæc tota discriminis plena est. si enim de externo calore sit sermo, non est, verum omnes pestilentes febres calore non esse vehementes, nam dantur nonnulli casus, sicuti iam notauimus, in quibus calor ad tactum intensus, mordax, & acris reperitur: si autem de interno loquamur, in febribus istis aliquando ægri magno interius (hoc idè Galeno, & Thucidide, & experientia attestante) flagrant incēdio, quare de neutro poterit calore verificari propositio illa, indeque proposita difficultas indeterminata relinquetur, sed res ita explicanda venit, omne humoris genus, sicuti iam præmonstratum est, febrem edere potest pestilentem. Si autem humores, cum non eiusdem sint temperamēti, nec naturæ, nec etiam vniuersimodum generabunt calorem, sed diuersum, qui vniuscuiusque naturæ propriæ proportionatus sit

*An in febre pestilenti sit remissus calor es extra, et intra.*

*Lib. 9. de sympt. med. facul. cap. de febris.*



fit, vnde putrescente pituita, non tantum ad extra, sed etiam ad intra erit remissa caliditas. si autem putrescat bilis, ad intra calores maximi vigent, interioraq; vruntur, licetq; in huiusmodi febre exteriora aliquando frigeant, interne tamen partes magno flagrant incendio, fiuntque febres lyppiriis consimiles. pariter si melancholica, quæ aliorum humorum est combustio, in hac febre ad putredinem deueniat, calorem ad intra acerrimum generat. si verò sanguis, non tantum facit incendium, quod quidem licet magnum sit, non tamen tam acrimoniam, quæ in bile, & melancholia putrescente reperitur, accendit. quare ratione materię putrescentis modò remissa, modò intensa in partibus interioribus erit caliditas. Dictum etiam est, quòd putredo humorum non in puncto consistit, sed sicut pernicioſa qualitas in febre hac modò est maior, modò est minor, ita & putredo modò magis intensa, modò magis remissa est. Vnde animaduertatur, si leuis est putredo, calor, etiam quòd in materia calida, & acri fundetur, erit remissus. & tunc eo magis, quò materia minus calida, & minus actis, vt pituita, putrescens erit. si autem putredo intendatur, validaq; sit, calor, licet in materia frigida, & non acri fundetur, erit intensus, eoque magis, quò materia magis calida, & magis acris, sicuti est ipsa bilis, putrescet. quapropter calor iste gradum consequetur putredinis, & pro ratione ipsius modò internæ partes maiori, modò minori flagrabunt incendio, modòq; calor erit magis, modò minus remissus. quapropter in partibus internis semper varius in febre pestilenti persentietur calor. & hoc duplici de causa. scilicet & ratione diuersitatis putrescentis materię, & ratione diuersitatis ipsius putredinis. Hanc autem caloris interni diuersitatem quotidiana comprobatur experientia. aliqui enim febricitantes adeò interne vruntur, vt nec subtilium vestimentorum, nec linteorum velamenta, neq; aliud quicquam præter nuditatem ferre possint. aliqui autem licet ardorem aliquem per sen-

persentiant, non tamen admodum calore, ut primi cruciantur. nonnulli alij, nec calorem, nec ardorem patiuntur, sed sicuti exterius, ita interiori quieti sunt. hoc autem vnde fieri possit, ex declaratis liqueat.

*De signis febris pestilentis sumptis a lotio. Cap. XVI.*

**S**ecundum signorum genus a lotio sumptum declarandum sequitur, & nō abs ratione. cū enim febris sit passio cordis, & arteriarum, hecque cum venis cōmunicent, in quibus humores putrescentes, & præcipue in putrida continuā continentur, necessariō videretur sequi vrinę immutatio, hec nō sunt potissimum eorū, quæ in venis, & arterijs abundant, & peccant, humorum indicium. quare cum ex suppositis omne humoris genus possit in febre ista putrescere, non vnius generis tantū in febre pestilenti lotium erit, sed diuersum pro diuersitate humoris, & pro diuersitate concoctionis, & affectionis eiusdem, & pro diuersitate putredinis apparebit. Albior apparebit vrinā, abundante pituita. flauior, & crocea, rubea, ignea, abundante bile. rubicundior, abundante sanguine. remittuntur prædicti omnes colores, abundante melancholia. Tenuis apparebit aliquando, & est indicium summæ cruditatis, summæque imbecillitatis. turbidæ aliquando apparent ex maxima ebullitione, suntque similes lotio iumentorum. quandoque sunt liuidi coloris (hocque sæpè in his febribus contingere solet) plumbique colorem referunt, & tunc sunt signum vel extinctionis caloris, vel maxime humorum aduersionis. quandoque sunt nigre, & hæc ultimam indicant perniciem, habentes eandem cum liuidis, sed deteriorem, causam. nonnquam sunt fetidæ, & hoc ex maxima corruptione, & putredine. quandoque oleosæ vel substantia, vel colore oleū referentes, & hoc ratione colliquationis. quandoque admodū spumosæ, & hoc ratione crudorum spirituum in materia tepaci ex multa ebullitione genitorum. & ut in summa dicam, omne

*Latium quale possit esse in febre pestilenti.*

*Lotium quare  
in febre pesti-  
lenti aliquādo  
vel nullam su-  
beat, vel mini-  
mam mutatio-  
nem.*

*Lotium quare  
in febre pesti-  
lenti aliquādo  
vel nullam su-  
beat, vel mini-  
mam mutatio-  
nem.*

*Febris pestilen-  
tis cur nullum  
signum sit à lo-  
tio.*



locij prauum, & detestabile genus potest in hac contingere febris, sed ex diuersis, vt notauimus, causis. Quandoque autem vrinæ in hac febre nullam, vel minimam in se prauitatem continent, suntq; quàm simillimæ vrinis sanorum, & hoc ex leui euenit putredine, quæ in humoribus peccantibus reperitur, non autem ex timore naturæ non audentis, vel ex eiusdem otio non agentis supra materiam peccantem, unde non hac pugna, quoniam natura nec à consilio, nec ex intentione, sed necessario semper agit, ex proportioneq; materię semper propriam, quàm potest, edit actiō nem. Quapropter à lotio in febre pestilenti nullum erit determinatum signum, nihilq; certi ab hoc habere poterimus, cum omnia bona, malaq; simul lotia febrem hanc cōcomitari possint, quò febrem aliquam esse pestilentem demonstrare valeamus. Cur autem febres pestilentes à lotio nullū habeant determinatum signum, curq; omnia vrinæ genera febrem hanc cōcomitari possint, ita explicandū à nobis erit. Febris pestilens, vt sæpius diximus, duo habet præcipua; alterū est pernitiōsa, & venenata qualitas, alterū est putredo, quæ pestilens, à praua illa pendet qualitate. quæ autem febris à putredine, praua illa qualitas in nullo consistit temperamento, nec ab vlla sensibili qualitate, sed ab intima tantum rei substantia prouenit. sicutq; venenū non colore, non sapore, non odore, nec alia manifesta qualitate, sed sola experientia (quoniam non ratione primarum, nec aliarum, quæ sensibus subiacent, qualitarum agit) cognoscimus; pariter praua illa, & pernitiōsa, quæ in humore in febribus pestilentibus putrescente insidet, natura nulla alia potest via, quàm ex lēione ipsa dignosci, nullumq; aliud profert in corpore humano signum: quoniam nec ratione temperamenti, nec ratione alicuius sensibilis qualitatis suam profert actionem, quæ actio à sola rei ipsius intima pendet substantia. hincq; euenit, necessarioq; cōsequitur, quòd lotium supra malam hanc, & prauam qualitatem nullo pa-

&o possit esse necessarium, & proprium indicium, quoniam  
 sicuti hæc nulla sensibili agit qualitate, sed à sola rei pro-  
 prietate, & substantia; ita nullum aliud possit sensibile e-  
 re signum præter lesionem ipsam, qua vires, & præcipue  
 vitales labefactantur. sicutq; supra venenum, quod à pro-  
 pria agat substantia, assumptum, lotium nihil indicare po-  
 test; quoniam hoc ratione antipathia, & non qualitatum  
 sensibilium agit; ita in febre ista à lotio nihil certi asser-  
 mari potest; quoniam materia in huiusmodi febre pec-  
 cans naturam veneni, eiusque efficaciam, modumq; agen-  
 di repræsentans, in urinam determinatam non potest in-  
 uehere. mutationem, qua ipsa urina propriè sit febris pe-  
 stilentis certum indicium. quare concludatur nec lotium  
 in febre pestilenti à prava qualitate ullam mutationem pa-  
 ri, nec supra eandem aliquid certo attestari posse. Alte-  
 rum, quod in febre pestilenti adesse diximus, est putredo.  
 putredo autem cum sit humorum, humorum verò dispo-  
 sitiones, & qualitates in corpore nostro existentium cum  
 urina ipsa demonstrare possit, quoniam & ab his decidi-  
 tur, eorumque varietates, & passionis repræsentant, ideo  
 lotium supra hanc alteram febris pestilentis qualitate m  
 quid certi attestari poterit. quoniam autem humores in  
 hac febre peccantes, non vnus sunt generis, & quoniam  
 eorundem putredo non est vniformis, ideo nec lotium in  
 hac febre vnus tantum potest esse speciei, sed diuersum,  
 prout & diuersi peccabunt humores, & prout putredo va-  
 ria succedet: hincque euenit, vt in hac febre lotia modò  
 sint tenuia, modò crassa, & turbida, modò alba, modò cro-  
 cea, modò flammæa, modò rubicunda, modò liuida, mo-  
 dò nigra, modò fetida, & modò etiam laudabilia, vt ali-  
 quando similia admodum lotio eorum, qui inculpara de-  
 gunt sanitate, videantur: quod non ex alia prouenit cau-  
 sa, quam ex diuersitate humorum peccantium, & ex di-  
 uersitate putredinis. qua propter lotia in febre pestilenti ap-  
 parentia

303 1 1 1 1 1  
 1 1 1 1 1 1 1  
 1 1 1 1 1 1 1  
 1 1 1 1 1 1 1  
 1 1 1 1 1 1 1  
 1 1 1 1 1 1 1

Lotium in fe-  
 bre pestilenti  
 quod iudicari  
 possit.

*Lotiū in febre  
pestilenti qua-  
re aliquādo sit  
sanorum lotio  
similis, et tamē  
agri tendāt ad  
mortem.*



parentia non supra malam qualitatem, sed supra humo-  
res, & putredinis modum aliquid indicabunt. sicutq; prauā  
illā qualitatem a sola virtutum lesione. (quæ ex proprijs, vt  
iam declarauimus, dignoscitur signis) cognoscimus; ita  
qui peccent humores, qualisq; sit eorundem putredo, a lo-  
tio habebimus. De huius in hac perniciosa febre ad malum  
permutatione nullus adhuc dubitauit, cum pro cōfesso ha-  
beatur, omnia mala hanc febrem concomitari posse. sed vni  
cum remanet, quod viros excellentissimos in maximos tra-  
xit errores, scrupulū de lotio, Videlicet. cur in hac febre vri-  
na laudabilis quādoq; appareat, curq; sit admodū sanorum  
lotio similis, tendentibus tamen ad mortē egrotantibus ip-  
sis, nihilq; securitatis portēdētibus cōtioneis signis. Hoc scru-  
pulum ita tollendum est. cum valida est putredo in humori-  
bus, necessariō immutatur lotium, pro rationeq; putredinis  
ita diuersum prodit: vnde modō vnā habet, modō alterā  
speciem. si autem levis sit putredo, nō necessariō immutatio  
in vrina sequitur, sed quādoq; nullam videtur subire, vel  
saltem minimam mutationem. Vnde in puris tertianis, quæ  
dubio procul a putrescentibus oriuntur humoribus, vbi le-  
uis est putredo, lotium sanorum lotio simillimū sæpē vide-  
mus, & a prima accessione vsq; ad tertiā, nisi intercedat er-  
ror, vrina sæpe apparet admodum laudabilis, hoc idem ani-  
maduertī in alijs cōtingere putridis, dum vel ratione humo-  
rum, vel ratione rectæ curationis non valida, nec intensā  
subsequeretur putredo. Quod idem dum in febre euenit  
pestilenti, non necessariō sequitur vrinæ sensibilis immuta-  
tio, sed in eodē ferē statu permanet; vt parum absit a sano-  
rum lotio, illiq; quā simillimā appareat. & hoc quoniam  
ratione putredinis non est facta in vrina notabilis contur-  
batio, nec tāta facta est humorum agitatio, vt ab his ad alie-  
nam possit lotium alterari qualitatem. cum hac autem leui  
putredine potest valida consociati praua, & maligna quali-  
tas, sicuti iam inter differentias huiusce febris asseruimus,  
ratione

ratione cuius perniciosæ qualitatis obruta, & cōcussa virtutes oēs, præcipuè autē vitales, concidunt, vnde mors postea facile subsequitur. hiq; non ratione putredinis, quæ minima est; sed ratione prauæ qualitatis, quæ admodum viget, pereunt. Nec mirum sit in febribus pestilentibus ægrotantes aliquando magis ex maligna periclitari qualitate, quàm ex putredine: tum quoniam magis à natura nostra dissidet praua illa qualitas, quàm putredo: tum etiam quoniam materiæ confimiles, quæ prauam adeptæ sunt qualitatem, sæpè absque vlla putredine homines in mortem præcipites ducunt, veneni efficaciam æquantes. Quapropter cum in febre pestilenti (vt iam dictū est) duo sint; alterum putredo, alterum praua qualitas, ab hisque duobus ægrotanti mortis immineat periculum, non mirum sit, lotio leuem putredinem attestante, coctionemq; præferente, ægrum à perniciosa necari qualitate. cum enim hæc necessariò non includat putredinem, nec putredo malam qualitatem, non tantum poterit aliquando vtraq; simul esse pariter intensa, vel remissa, sed quandoq; poterit esse putredo ingens; minima autem illa perniciosa qualitas, & è conuerso poterit illa qualitas maligna validissima esse, leuissima existente putredine, in hocq; casu periculum mortis à praua qualitate, in altero autem à putredine magis imminet. Hanc sententiam experientia confirmat. Curantur quandoque febres aliquæ pestilentes, quæ (sicuti pluries animaduertimus) à principio inuadentes à diuersis, prauisque symptomatibus concomitantur, cuiuscemodi sunt dolor capitis, ventriculi, dorsi, sitis inexhausta, inquietudo maxima, calor vehemens, vigiliæ, colliquationes, & cetera huiuscemodi symptomata, simulq; cum his adest lotium turbidum, crassum, & rubicundum, vel alterius prauis coloris. quæ febres, dū ex parte opportunis tractantur remedijs, solent vel in septima, vel in nona, vel in altera critica die mitescere, quiescētibuscq; prædictis omnibus prauis sym-

*In feb. pestilenti aliquando ægrotantes magis periclitantur ex praua qualitate, quàm ex putredine.*

H

promati.



ptomatibus, succedunt lotia boni coloris, substantiæ laudabilis, & quæ coctionem manifestam præferant, & tamen paucis post diebus, dū omnia silent mala, dumq; securitatē, & salutē portendit lotium, egrotantes vitā cum morte commutāt; hoc nō alia euenit ratione, quā quoniam licet euicta sit putredo, vt lotiū, infallibile coctionis, vel cruditatis signū vtque terminatio prauorum symptomatum attestatur, non tñ superata est perniciosa illa qualitas, cuius ratione iam fatigata natura in domanda putredine, vires ex nō correctā malignitate facili concidunt, vnde mors ægrotantis subsequitur. Hicque, dū pereunt, nō vi putredinis, quæ iam euicta est (aliās in declinatione vniuersali sparsa existente materia mors succedere posset) sed ex perniciosæ qualitatis violentia adhuc indomita, & vigente extinguuntur. Nā dum à prima huiusce febris inuasionē ægrotantes tot prauis conflantur symptomatibus, hæc vi putredinis (cuius ista sunt soboles, & effectus proprii) patiuntur, non autē à praua hæc pendēt qualitate, cuius operationes nō mediātē sensibili alteratione, sed p solos effectus patefiunt: ab hac. n. facultates oēs, & præcipuē vitales, nulla præsentē sensibili alteratione, labefactātur, huiusq; est opus propriū earū virtutū debilitas, sicuti putredinis iā enarrata symptomata. vnde correctā putredine hæc quiescunt, lotiumq; coctionem attestatur: at perniciosa, & maligna nō superata qualitate, vires eadem extinguuntur, à quarum coincidentia mors postea inuitabiliter succedit. Quapropter cum hæc duo, videlicet, mala qualitas, & putredo febrem constituent pestilentem, cumq; altera intendi cum alterius remissione possit, non sit mirum si vel domita, vel leui existente putredine, in febre pestilenti aliquando lotium laudabile adeo appareat, vt parum à sanorū vrina abesse videatur. quod licet salutem rationem præmonstratæ coctionis portendat, tamen in hac febre infidū est signū; quoniam nihil supra perniciosam, & prauam qualitatem, cuius violentia sæpe necantur ægrotantes, attestatur. Hinc

*Lotiū in febre  
pestilenti quæ  
re sit infidum  
signum.*

autem

autem eorum pateat error, qui dum in febrē pestilenti lotiū vident laudabile, simileq; sanōrum lotio, iudicant febrem eam pestilentem, non putridam, sed hecticam esse. in solaq; hectica tale apparere posse lotium affirmant; cum in hac, nō in humoribus, super quos attestatur lotium, peccatum sit, sed in ipsa solida cordis substantia febris insideat, in eadem putredinoso fixo existente calore. à qua cordis substantia cum nihil excidatur in febre, nec per excrementa, propriam patefacere posse læsionem, dicunt. Sed hæc sententia nequaquam recipienda venit. si enim tale lotium pestilentem hecticā attestaretur, procul dubio ex huiuscemodi omnes perirent febre. cum enim ex simplici confirmata hectica omnes moriantur, quis recepta in substantia cordis putredine, & praua illa qualitate, posset salutem sperare? at falsum est omnes eas febres pestilentes ( in quibus putredinis vestigium nullum vel ex lotio, vel ex alijs apparet) in mortem terminare. immo testor ego inter febres pestilentes eas præcipuè, in quibus sola præualet maligna qualitas, nullumq; vel minimum putredinis adest indicium, (quæ tamen ab his hecticæ necessario iudicantur) faciliè sanari, hæcque inter omnes, si recta, non autem mala (vt consueuerunt multi hanc exercentes artem) ratione tractentur, facilem præcipuè recipere curationem. immo paucissimi ex his, qui tali laborant febre, pereunt, & non sine ratione; in hac enim febre sola viget praua qualitas, at in cæteris ultra malignitatem additur & putredo maior, pro cuius ratione maius etiam impendet ægrotanti periculum, & medico in medendo discrimen. longè enim difficilior est cum duobus, quàm cum vnico pugnare inimico. Vnde cū in illis pestilentibus febribus, in quibus vigeat putredo, duo naturæ validè aduersentur; in eis autem, in quibus vel dormita, vel leuis est putredo, vnica resistat mala qualitas, hæc multò facilius, quàm illæ, curationem recipient, in hisq; magis, quàm in illis, ægrotantes salutem sperare poterunt.

*Febres pestilē-  
tes, quæ mites  
videntur, quæ  
ve tales sint.*

multò enim facilius, dum à putredine non concomitatur, superari potest illa mala qualitas, quàm si eadem eidem cōiuncta foret putredini. talesq; febres præcipuè mites apparent, & sæpè ægrotantes, astantesq;, & medicos nōnunquā eludunt; quoniam non præfente vāida humorum putredine, praua non subsequuntur symptomata, indeque ægrotantes non anguntur, nec cruciantur; ideoq; & sibiipfis, & ceteris, dum benè se habere existimant, imponunt, cum tamen à praua, & perniciofa illa qualitate vires omnes, & præcipuè vitales, labefactentur; nifiq; hi ab excellenti, expertoq; curentur medico, etiam sensim nulla sentibili, & dolorosa alteratione extinguuntur. Hic autem animaduertatur, dum diximus, inter febres pestilentes eas mites, benignasq; apparere, in quibus, quoniam vel levis, vel domita est putredo, nulla subsequantur molesta symptomata, quòd non omnis febris pestilens, quæ mitis videatur ratione levis, vel domita putredinis talis apparet. sed alij dantur casus, in quibus ingens viget putredo, multaq; adest humorum prauitas, & tamen ægrotantes bellè habere videntur, vel cum non febricitent, vel perparum, videturq; morbus in totum benignus, cum tamen in totum sit exitialis. hoc euenit, cum nativus calor nō ob timorem, quoniam natura nihil à consilio agit, sed præ imbecillitate à concoctione abstinet. vbi enim à praua, & perniciofa qualitate vires admodum debilitantur, natura imbecillis facta coctionem materiæ non aggreditur, humoremq;, qui morbum excitauit, non attingit. vnde non tētata coctione, nec labor sequitur, febrisq; vel nulla, vel minima est. idemq; euenit, quòd in exterioribus, in quibus, dum partes à praua tentantur fluxione, natura præ infirmitate humoris morbum excitantis coctionem non attingit. vnde cum dolores, & febres in sanici generatione contingāt, pariterq; in humorum coctione, non tentante coctionem natura, nec labor, nec dolor sequitur, febrisq; vel minima, vel nulla succedit.

cedit. hoc sæpe in febre euenit pestilenti, ubi euicta natura, præ infirmitateq; impotens, coctionem materiæ peccantis non aggreditur. hincque in hac omnia praua, dum enim coctio tentatur, ista eueniunt, quiescunt symptomata, omniaq; silent mala, vt ægri interim se bene habere fateantur, & tamen hoc est indicium certissimum non profligati morbi, in quo suffocatur, extinguiturq; calor innatus. hicque est solus casus, in quo pulsus sanorum pulsui similis apparet; quoniam in tali casu contingit aliquando, ægrotantes (vt in Hermocrate visum est) non febri- citare, vel saltem minimam pati febrem. Vnde cum vel leuissima, vel nulla in hoc casu possit adesse febris, minima sequitur pulsus immutatio, videnturque omnino similes sanorum pulsui. similes dixi; quoniam semper aliqua adest differentia præter naturam, nunquamq; in totum sunt naturales. & qui rem optimè perpédet, semper aliquā animad uertent in febre pestilenti pulsus frequentiam. quæ tamen in casu isto minima erit; quoniam febris ferè nulla concomitatur. hinc igitur euenit, vt febres pestilentes aliquando aspectu mites & salubres, cum tamen lethales sint, appareant, vtque simul salubria habeant signa, quæ tamen nullam securitatem certò promittere possunt.

*In quibus feb. pestilentib. p. d. sus sit similis sanorū pulsui.*

*Lib. 3. Epist. sect. 1. com. 8.*

*De signis febris pestilentis sumptis à Symptomatibus.*

*Cap. XVII.*

**S**uccedit tertiū signorum genus à symptomatibus sumptum, quod in triplici reperitur discrimine; aliud enim ab affectionibus immutatis, aliud ab excretis, vel retētis immodicè, seu præter naturam, aliud ab actione læsa capitur. Ab affectionibus immutatis primū symptomatum febrem pestilentem attestantiū genus sumitur, dum qualitates sensibiles immutantur. Vnde à visibilibus signum huiusce febris habetur, dum color ægrotantis, præcipuè autē in facie erysipelatosus apparet, vel herpetibus depatien-

*Symptomata ab affectio-ibus immutatis cōsequētia feb. pest. entum.*

H 3 tibus

tribus est cōsimilis, qui à valida prouenit putredine, vel est rubicundus ex sanguinis abundantia, vel flauus ex bilis copia, seu ex maxima exustione, vel liuidus à caloris concentratione, seu extinctione, vel niger ex superflua adustione, aut mortificatione, qui iidē colores vltra faciem sunt in lingua inspicendi; nam vbi hæc nigra est, acutam; & validam indicat febrem, magnumq; intus adesse incendium (nisi melancholicus, à quo nigro tingatur colore lingua, abundet circa viscera humor) attestatur. vbi flaua, multam adesse flammam etiam indicat, sed non tantam, quantam nigra demonstrat. vbi rubea, minus attestatur malum. Ab acidilibus autem potest esse, signum vox immutata, tremula, parua, quæ ex spiritalium instrumentorum, quæ in tali febrium genere sapius labefactantur, prouenit læsione. suspiria etiam crebra, quæ à graui cordis offensa originem habent. Ab olfactilibus maximum est indicium, si foetidū expirent, vel si foetidum sudent, vel si etiam malè totum oleat corpus; quoniam hoc maximæ, vel confirmatæ corruptionis, ac putredinis est signum. A gustabilibus potest indicium sumi, si febricitantes putridum aut cibando, aut non cibando in ore percipiunt saporem: quod ab imbibitis in ventriculi substantia corruptis humoribus causatur, vel ab eisdem circa viscera decumbentibus, à quibus ad superiora halitus euaporet foetidus, qui palatum, & linguam inficiens imaginem corrupti, & foetidi alimenti præbet, generatur. A tactilibus præcipuum sumitur indicium, si percipiatur calor ægrotantis putredinosus; idest, qui rei putrescentis calori assimilatur. qui calor nec verbo, nec scriptura, sed sola experientia dignosci potest. si etiam caro vel frigida, vel subfrigida, vel saltem tepida, febre valida existēte, percipiatur, firmisimum poterit esse indicium malignæ febris, si etiam lingua aspera, duray contractay sentiat, hoc idem aliquando potest indicare, cum hoc à multa, & mala in internis partibus existente flamma causetur. Secun-  
dum

dum signorū genus à symptomatibus sumptum capitur ab his, quæ vel à corpore excernuntur, vel in eo præter naturam detinētur. Hæc autem in triplici sunt differentia; alia enim tota substantia, alia qualitatibus, alia quantitativibus à naturali statu egressa sunt. A primis coniecturam febris pestilentis habere possumus, dum sanguis, cuius excretio tota substantia est præter naturam, sincerus stillat è naribus. stillatio enim sanguinis è naribus semper malū portendit, & præcipue, ubi sincerus appareat sincerus autē dicitur ille, qui nec humiditatem ad mixtam habet, & qui niger est. hoc autem contingit, dum maxima existente adustione, natura vel à copia, vel à prava stimulatā qualitate sanguinem peccantem tentat excernere. mensum etiam stillatio in mulieribus, & præcipue, si à principio morbi contingant, sanguisq; sincerus sit, hoc idem attestari potest. quod idem hæmorrhoidum similis fluxio potest affirmare, cum ab eadem possit provenire causa. sanguinis etiam per aluum euacuatio aliquandō febres has perniciosas concomitari solet. talis autem sanguis non tantum totā substantia, sed etiam qualitate alienus à natura est; nam sanguis iste vel niger est, vel fuscus, vel pallorem quendam, vel virorem etiam habet, aliquandoq; foetidus est, aliquandō odorē inexplicabilem, & aliquando nullum habet. substantiæ quandoq; est crassioris, quandoq; tenuioris, aliquandōq; in maxima educitur copia, ut ego viderim nonnunquā ad tres, & quattuor ascendisse, & emanasse libras. hicq; sanguis duplici solet ratione in his febribus excerni, aliās quidem decretoriè, aliās autem tabescentiæ, seu liquationis more. hæcque sanguinis euacuatio non ab hæmorrhoidibus internis, ut malè multi indicant, sed à superioribus venis, aliquandoq; ab ipso iecore, ut commixtio cum excrementis alui maxima demonstrat, coloresq; diuersi, qui non tantum à propria sanguinis substantia, sed etiam à longo, per quem fluit, ductu causantur. talis autem sanguinis fluxus generatur, dum natura vel po-

*Symptomata ab excretis, vel retentis præter naturam consequentia febris pestilentem.*

*Sanguinis stillatio qualis.*

*Sanguinis euacuatio quæ, et qualis in febris pestilenti.*



tens morbum euincit, vel dum stimolata à praua sanguinis qualitate excretionem tentat peccantis materiei, vel dum colliquatione humorum, & partium etiam aliquando solidarum, seu à pernicioſa qualitate, seu ab intenſa putredine genita humores ipſi acrimonia acquiſita ſibi ipſis vias ad exitū recludunt, nihil operante natura ad eorū ornatum ob eorundem prauitatem, & ob eiufdem receptionis ineptitudinem. A ſecundis indicium febris peſtilentis habere poſſumus, dum excrementa, quæcunq; ſint, prauis qualitatibus prædita ſunt, vnde colores nigri, liuidi, virides, fuſci, cæteri; conſimiles, ſiue cum lotio, ſiue cum alui excrementis, ſiue cum vomitibus poſſunt febrem hanc aliquando atteſtari. ſimiliter etiam foetores; & mali odores in eiſdem excrementis aliquam febris huiuſce coniecturam facere poſſunt. præcipue autem ſi vel lotium, vel ea, quæ euomuntur (& hoc magis prauitatē febris confirmat) foetida ſunt. quod idem indicare poſſunt ſudores foetidi. hæc; omnia, vt de ſanguine dictū eſt, vel decretoriè, vel tabeſcētiae more euenire poſſunt; iſta autē, quæ vel prauum odorem, vel malū colorem acceperunt, talia facta ſunt, vel ob exceſſum qualitatum, vel ob putredinem inſignem, vel ob prauā qualitatem, propter quam omnem materia naturę fugit ornatum. Ultra odorē, & colorē ſolet in excrementis alui altera aſeſe qualitatum immutatio, admodum febris peſtilēti familiaris, dū exigua, glutinoſa, leuiāq; excernuntur, quæ modò album, modò pallidum, modò ſubcroceum, modò ſubuiridem, modò ſilauū referunt colorē, talisq; euacuatio à Græcis Syntexis, à noſtris colliquatio dicitur: quæ licet febribus ardentibus, dū calore intenſo humores, & corpus torrent, aliquādo eueniat, vt plurimū tñ in febre cōtingit peſtilēti. Talis autē deiectione nō tenuis, & aquoſa eſt, ſed corpulenta, ob conſumptos ichores. exigua, quoniā hic minimè aſt alui fluxus ſuperfluus. glutinoſa, propter caliditatem materiei prædominantem, vnde ſit lenta, leuiſ, non aſpera, nec inæqualis propter

*Excrementorum  
qualitates in  
feb. peſtilenti-  
bus contingen-  
tes.*

*Colliquatio in  
feb. peſtilenti  
vnde cauſetur  
& eius differē-  
tiæ.*

propter vehementem consumptionem, vnde tota materia æqualem passa est alterationē, nec eius pars vlla imperpeſſa ſupereſt. alba eſt, dum pinguedo tantū ab igneo calore, non tamen admodum maligno, abſumitur. ſubcrocea exiſtit, dum pinguedo vel à caliditate vehemētiore patitur, vel ipſa ſemiputris eſt. ſubviridis autem apparet propter bilis rubiginosæ consumptionem. flaua autem eſt, dum colliquatio à vehementiori fit calore, vnde colliquatur caro mollis, vel materia aliqua, quæ iam prauam adepta eſt qualitatem, qualis eſt pinguedo vetuſta, & ſemiputris. Hæ autem deiectiones in hiſce febribus vt plurimum ſolent eſſe foetidæ, & graueolentes ob putredinem ingentem; aliquando tamen parum quid redolent, & ſæpe ego animaduerti in nōnullis febribus peſtilentibus, admodūq; malignis, tales deiectiones non tantū non foetidi, ſed nec etiā vilius ferè eſſe odoris, & hoc præcipuè, dum eſſent albidiores. Tales deiectiones colliquefactæ nō in omni febriū peſtilētū eueniunt genere, ſed in hiſ tantū, in quibus calor putridus, putredoq; ipſa admodum viget, & dominatur. In quibus etiam febribus euenire ſolent ſudores admodū copioſi, qui non ab excretionem ichoroſæ partis, ſed à colliquatione, vel humorum, vel pinguedinis, vel carnis, & partium ſolidarum cauſantur, dum colliquatio illa non per aluum tranſmittitur, ſed in halitus. reſoluitur, ad cutimq; tranſfertur, & tunc multi, & copioſi contingunt ſudores, talesq; ſudores ſæpe graueolentes eſſe conſueuerunt, vbi maligna aſſit colliquatio. ab eadē autem cauſa ſolet aliquando (colliquatis nō pinguedine, & carne, vel alijs ſolidis partibus, ſed tantū humoribus ipſis in venis exiſtentibus, dum colliquata materia nec ad ventrem, nec ad cutim trāſfertur) lotij multitudo maxima apparere, vbi renes valida vi polleant attractrice. cuius ſi oppoſitum contingat, videlicet, quòd renes nec ſint ſani, nec ſeroſam poſſint attrahere materiam, ſubitaneos hydro-pum ſtatus inducunt. retenta enim hæc materia, ad abdo-

*Sudoris in feb. peſtilenti contingentiſ diſſe rentia, et cauſa.*

*Excretionum  
quantitate pec-  
cātium in feb.  
pestilenti diffē-  
rentia, & cau-  
sa.*

mēq; decumbens, affectum Alciti consimilem generat: si au-  
tem validè attrahant renes, tanta multitudo lotij emergit,  
vt viderim ego semel in nobili egrotante per spatium quin-  
que horarum lotium colore venetum, odore foetidum, ad li-  
bras plusquam viginti excretum, indeq; agrū sæpius in syn-  
copem incidisse, subitoq; adeo emaciātū, vt videretur, non  
per quatuor dies, sed per quatuor menses, ægrotasse: qui cū  
inde similis ferè in totum sceletō factus fuerit, nocte se-  
quente conuulsus expirauit. A tertiis coniecturam febris  
pestilentis habere possumus, si lotium, quale sæpius notauī,  
in nimia exeat quantitate: quod non aliunde euenit, quàm  
ex humorum in venis existentium colliquatione. similiter  
intempestiui, & superflui sudores, frigidi præcipuè, pos-  
sunt malignam attestari febrem. hi enim sæpe diaphoriti-  
ce euacuantur, indicantque colliquari substantias solidas,  
quæ cum in habitum resoluuntur, dum ad cutim transferū-  
tur, in sudores superfluos immutātur. sudores autē hi aliquā-  
do sunt vniuersales in toto corpore, & tales viriū omnimo-  
dam prostrationem portendunt, aliquando autem tantum  
circa frontem, quandoq; verò & circa frontem, & collum,  
nonnunquam etiam & vltra frontem, & collum in thorace  
solum apparent, hique siuè calidi, siuè frigidi sint, dete-  
riores tamen sunt frigidi, extinctionem enim caloris indi-  
cant, semper malum prognosticantur. fiunt enim hi, dū na-  
tura maxinè laborat, à prauaq; affligitur qualitate. vnde  
vt plurimum in pestilentibus febribus tales consueuerunt  
sudores apparere. omnis etiam humoris superflua per aluū  
potest hanc febrem concomitari euacuatio, vt bilis vtriusq;,  
vel pituitæ, vel sanguinis; & hoc cōtingit, vel dum natura im-  
becilli facta, à retentrice non continētur humores facultate,  
vel dum à copia, aut praua stimolata qualitate excretrix fa-  
cultas præualeat, vnde supra modū educuntur, & hinc sæpè  
febribus istis coniunguntur lientericæ, diarheæ, dysentericæ,  
& tenasmi. Fiunt etiam in hac febre vomitus, cuiuscunque  
sint

sint humoris, & materie, superflui, & hoc, dū à praua qualitate, & copia stimulatus ventriculus alleviationem humorum eò decumbentium per vomitum tentat. Mensium etiā perfluuiū aliquando vidi concomitari febrem pestilentem, cum natura non potest regere sanguinem prauū, pessimaq; infectum qualitate. sicut autem omnis superflua euacuatio potest huic febrī annecti; ita omnis (cuiuscunq; sit excrementi) suppressio potest consimiliter huic adiungi febrī, vnde sæpe ultra alui, mensium, sudoris suppressionem, solet lotij retentio apparere, quæ inter omnes suppressiones omnium est pessima. nam hæc à deteriori, quam illæ, prouenit causa, & minus artificij, quàm illæ, ad eius prouocationem admittit. Tertium signorum genus à symptomatibus, quæ febrem pestilentem aliquando concomitari solent, sumitur ab actione læsa. actiones autem triplices sunt, aliæ animales, aliæ vitales, aliæ naturales. Animales in triplici sunt discrimine, quædam enim sunt sensitivæ, quædam moriuar, quædam restrictes. Vnde inter læsiones actionum sensitivarum, prima, quæ solet consequi, est gustatus infectio, aliàs enim debilitatur; vt vix quid gustare queant, aliàs deprauatur, vt omnia assumpta prauis saporis, corruptaq; ipsis videantur; aliàs autem aboletur, vt nihil saporis persentiant, & hoc vel à praua illa qualitate inficiente gustus instrumenta, vel à vaporibus putridis eadem perentibus prouenit. In actione autem tactus in febre pestilenti sæpè consequi consuevit maxima eius deprauatio, dum extremæ partes, extremæq; vel subfrigidæ sunt, vel omnino frigidæ, ipsi tamen, in eisdem, magnum persentiunt calorem, aliquandoq; tantum, vt nec valde subtilium vestimentorum, nec linteolorum velamenta, nihilque aliud præter nuditatem ferre possint. Ad tactum referuntur etiam omnia dolorum genera, cuiuscunq; sit partis, vnde inter læsiones tactus recēsebimus dolores, qui præcipuè concomitari solent hoc genus febris, hi autem sunt præcipuè cordis dolores; quoniam

*Symptomata  
febris pestilen  
tis sumpta ab  
actione læsa.*

*Symptomata  
sumpta ab actione  
gustus læsa.*

*Sympt. sumpta  
ab actione tactus læsa.*

in hoc

in hoc principalis fit à praua qualitate lēſio ventriculi, qui vel à praua qualitate, vel à malis vaporibus, vel à materia putrida eò decumbente generantur, aliquando etiā capitis, eò tranſmiſſis prauis vaporibus, cētera autē partes dolere poſſunt, ſed nō ea ratione, qua fiat dolor ratione febris mali gnę, niſi fuerit febris ſymptomatica à loco affecto: in vniuerſo tamen corpore, præcipuē autem in mēbris exterioribus, ſicuti circa brachia, humeros, coxas, crura ſolet adeſſe dolor quidam admodum moleſtus, ſimilis ei, qui laſſitudine, vel cerola cauſatur, tuncq; ſibi videntur egri habere membra, ac ſi praua contuſione affecta eſſent, quod à materia acri, & mala putreſcente, partesq; illas ſenſitiuas petente, & non in halitum diſperſa cauſatur. ſepeque affectio iſta in principio febris peſtilentis apparere ſolet. In auditu autem ſolent cōtingere tinnitus, obauditiones, & ſurditates, quæ ſolent eſſe inter principalia, & præcipua febris peſtilentis ſigna. rari enim ſunt, qui hac laborent febre, qui non patiantur iſta, & hoc à vaporibus ſpirituofiſ, & flatuoſis à materia putreſcente ad caput eleuatis. In odoratu aliquando euenit, vt vel ex toto odoratum amittant, vel foetidum ſemper odorare videantur, quod vel ab ingenti corruptione, vel a praua qualitate, vel à virtutum extinctione euenire ſolet. In viſu raro offenduntur, tamen cum malè habent, hoc ſolet ferè perpetuum eſſe, vt à lumine lædantur, lucemq; auſugiant, & hoc, cū vires admodum labefactatæ ſunt, ſpiribus enim exinanitis oculi lucem non tolerant. & hæc de lēſionibus ſenſibilium actionū. Ad quas, vltra prædicta ſymptomata duo alia, quæ circa primum ſenſorium, quod eſt omnium commune, conſiſtunt, reducuntur, quorum alterum eſt (vigilia, alterum ſopor, quæ ſæpe febre peſtilentem concomitari ſolent) vigilia quidem, dum à praua eleuantur materia vapores acres, qui perentes cerebrum, vellicant membranas, cuiusque humiditates conſumunt. ſopor autem, dum frigidi vapores, & praua madefaciunt cerebrum, ſimulque ſpiritus reſoluunt

*Symptomata  
ſumpta ab ac-  
tione auditus  
leſa.*

*Sympt. ſumpta  
ab actione odo-  
ratus leſa.*

*Symp. ſumpta  
ab actione vi-  
ſus leſa.*

*Sympt. feb. pe-  
ſtilentis circa  
primum ſenſo-  
rium.*

resoluūt animales. cui simile solet euenire symptoma admodum periculosum, dum extinctis, vel imminutis à praua qualitate spiritibus, & viribus labefactatis in somnum profundum videntur febricitantes admodum propensi, quæ affectio non somnus est, sed vigilandi impotentia. & hæc de symptomatibus contingentibus in facultate sensitiva. In moriua autem pauca eueniunt febrem pestilentem consequentia, inter quæ potissimum habet locum (& hoc maximè in principio morbi) inquietudo ingens, stimulata virtute à praua qualitate, & a materia putrescente. solet etiam frequens osecitatio, & pandiculatio aliquando coniungi cum hac febre, vbi transmissis spiritibus flatuosis vel ad maxillas, vel ad cætera membra, tentat natura eorum discussionem. rarò his additur vel tremor, vel rigor, nisi febris sit ex interpollatis tussis solet aliquando adesse, vbi additur aliqua distillatio, generalis autem ferè omnibus est prauus affectus in virtute moriua thoracis, scilicet, anhelitus diminutio. omnes enim hac febre laborantes ob vires imminutas, & necessitatem præsentem ut plurimum habere consueuerunt anhelitum frequentem, & paruum; paruum ob imbecillitatem, frequentem autem ob necessitatem; vbi enim est febris, ibi semper aucta est necessitas. Inter restrictum autem facultatum symptomata hæc quandoq; solent concomitari febrem pestilentem, videlicet, deliria varia vel læsa imaginatione, vel cogitatione, & hæc vel à praua qualitate, vel à vaporibus putridis, vel à materia maligna illuc transmissa: hæc autem deliria aliquando leuia sunt, aliquando sæua, aliquando mediocria. quod tum ex diuersitate, & potentia causarum provenit, tum etiam ab humorum peccantium differētia. prout enim hic magis, vel minus calidus, & minus, vel magis acris; ita etiam diuersa prodeunt delirij genera. In hac febre etiam memoria aliquando torpet, aliquando aboletur: vnde visi sunt aliqui, qui ex hac febre sanati præteritorū nihil meminere, aliquando

*Sympt. supra  
ab actione læsa  
virtutis motus.*

*Sympt. supra p  
ab actione læsa  
virtutum restrictum.*



*Sympt. sūpta  
à læsa aëione  
virtutis vita-  
lis.*

*Sympt. sūpta  
ab aëione læ-  
sa virtutis na-  
turalis.*

do etiam deprauatur, & hinc aliud delirij genus. quæ omnia a prædictis, vel consimilibus proueniunt causis. Et hæc de symptomatibus consequentibus à læsione actio- num facultatis animalis. symptomata autem, quæ hanc febrem concomitantia sumuntur ab actione læsa virtu- tis vitalis, sunt cordis debilitas, tremor, palpitatio, & eiusdem dolor, ac suspiria crebra, & his consimilia, quæ cor vel à mala lædi qualitate, vel à prauis affligi humo- ribus attestantur. ad quæ consequitur necessariò pulsus immutatio, de qua satis abundè iam dictum est. Quæ au- tem ab actione læsa virtutis naturalis sumuntur, vnde fe- brem pestilentem coniectare possimus, sunt nausea inanis sæpe causata à praua qualitate, & non à materia ventricu- lū lædente. vomitus cibi, & quandoque etiam malorum hu- morum, & præcipuè corruptorum, & foetidorum eò de- cumbentium, frequens singultus, qui sæpius in huiuscemo- di febre non a materia, sed à sola generatur maligna quali- tate. oris ventriculi, prauæ indispositiones, & aliquando tanta appetitus prostratio, vt malint ægrotantes mori, quàm comedere. additur aliquando sit in exhausta, vbi putre- scant humores calidi, qui obsederint ventriculi vel caui- tatem, vel substantiam, vel circumstantes partes. quòd si in his locis nō sit materia peccans, sitis non adeò erit molestæ, & solo potu leniri poterit aliquando. at prior non ex potu, sed ex euacuatione, vel temperamento tollitur. quādoq; autē nulla est sitis, lingua tamen arida, & siccata existere, & hoc cū vis naturalis à perniciosa extinguitur facultate.

*De Signis febris Pestilentis sumptis à superuenientibus  
affectibus. Cap. XVIII.*

**Q**uartum signorū genus a superuenientibus affectibus sumptum declarandum succedit, quod licet plurima comprehendat mala, tamen nō omnia recensenda veniunt, sed affectus illi præter naturam tantum, qui vel sæpissimè cum

cum febre pestilenti apparent, vel qui rarissimè sine hac febre videntur, sunt enumerandi. inter quos primum habent locum exanthemata ipsa, à nostris papulæ dicta, quæ dū apparent, ratò sine febre pestilenti inuenies. hæc autem tū colore, tum magnitudine, tum modo, tum sine, tum numero inter se differunt. Colore quidem; quoniā alba alia sunt à sanguine pituoso, alia rubra à puriori sanguine, alia flaua à bile, alia punicea ab exusta bile, alia liuida vel à maxima exustione, vel mortificatione, alia nigra à consimili, sed deteriori causa. Magnitudine; quoniam alia pusilla sunt, vt milij magnitudinem non attingant, vel saltem æquent: alia paulò maiora quantitatem milij parum excedentia: alia autem paulò maiorem magnitudinem habentia, quæ tamen rarò vitæ maioris magnitudinem superent: alia autem magna, & notabilis quantitatis. Modo autem differunt; quoniam alia criticè, alia symptomaticè, alia medio extramittuntur modo. criticè illa apparent, quæ concocta materia, & superante natura eueniunt. symptomaticè, quæ cruda existente materia, eademq; à natura non superata, nec exornata fiunt. medio modo, quæ generantur, dum materia ex parte cōcocta à natura potèti extramittitur. Fine autem differunt; quoniam alia, postquam apparuere, retrocedunt, quod pessimum est signum: alia resoluuntur, & sæpè ad bonum terminantur: alia autem suppurant, quod etiam, si alia addantur bona, desiderandum est. alia autem vlcérantur, quod non aliundè, quàm à prauitate materiæ, prouenit. Numero autem; quoniam aliquando pauca, & rara, & hoc vel à paucitate peccantis materiæ, vel à debilitate agentis; aliquando plura à contraria causa; aliquando autem adeò numero sa sunt, vt locus in cute ab hac materia immunis vix reperiatur. & hæc nisi vires sint validissimæ, rarò salutem afferunt; potius enim ab his suffocatur, quàm releuetur, natura. & hic animaduertatur, quòd hæc exanthemata, vt iam superius notauimus, non coincidunt cum pestichijs iam inter propria si

*Exanthemata,  
quæ accidunt  
in feb. pestilen  
ti, differentiæ,  
& causæ.*

*Exanthemata  
antiquorū nō  
sunt pesti-bia  
nostrorum tē-  
porum.*

gna

*Oris pustula.*

*Oris vlcera.*

*Aphæ in feb.  
pestilenti con-  
tingentes, quæ,  
& quot eorū  
differentia, et  
causa.*

*Lib. 5. Meth.  
cap. 12.*

*Vlcera praua.*

gna enarratis. quoniam hæc exanthemata in genere tumor reponuntur, illæ autē cutis tantum maculæ sunt. & hæc de exanthematibus. Alius consimilis affectus sæpè febrem concomitatur pestilentem, & sunt pustulæ in ore apparentes, quæ omnes prædictas exanthematū differentias recipiunt. hæcque aliquando adeo sæuæ sunt, ut cibum, & potum ægrotautes vix tolerant, in teneraq; ætate sæpè mortem asserunt, cum sibi ipsis vim ad percipiendum cibum non inferant. Ad has pustulas sæpe subsequuntur vlcera, quæ maximam ægrotautibus asserunt molestiam, ciboq; sumendo sunt impedimento, motū linguæ, & præcipuè deglutionem impediunt. aliquando autem non præcedentibus his pustulis generantur vlcera, à Græcis aphæ appellatæ, in ore, quarum plures sunt differentiæ; aliæ enim sunt superficiariæ, aliæ profundæ, aliæ mundæ, aliæ sordidæ, aliæ benignæ, aliæ malignæ, aliæ sine crusta, aliæ cum crusta; & crusta aliquando est alba, aliquando est flaua, aliquando liuida, aliquando nigra. quæ sunt profundæ, sordidæ, malignæ, & cum crusta præcipuè nigra, sunt deteriores; sūt enim vel à vaporibus, vel à materia valde praua, & perniciofa: quæ opposito modo se habent, sunt leuiore. in febre autem pestilenti hæc vlcera occupare solent & labia, & linguam, & palatum, & fauces. tamen hoc præcipuum animaduerti, quod in faucibus specialiter generantur, rariq; sunt illi ægrotautes, qui in hac febre summam, & sordidam vnā cum praua qualitate habeant putredinem, qui in faucibus vlcera hæc non patiantur: quæ aliquando adeo læua sunt, ut depalcentia fiant, simulq; cum faucibus etiam asperam attingant arteriam. Vnde post recuperatam ex febre pestilenti sanitatem. visi sunt ægrotautes, qui vel in phthisim terminarunt, vel à phthisi maximò cum labore præseruati fuere. Non tantum autem in ore, sed etiam in alijs corporis partibus solent cum huiusmodi febre praua generari vlcera, & præcipuè in his, qui cutaneas patiuntur affectiones; in his enim febre accedente

dente pestilenti, omnis cutis levis affectus solet in prauum commutari vlcus. solent etiam saepe subsequi ad has febres apostemata mala, quæ varia inter se sunt, tamen præcipue carbunculi apparere solent, hique tumores modo in hac parte, modo in illa generari consuevunt, potissimum tamen circa corpora glandosa eueniunt, & hoc quoniam expultrix facultas à praua qualitate stimulata à partibus nobilioribus, & internis ad exteriora perniciosam extrahit materiam: vnde à cerebro ad glandulas post aures, à corde ad axillas, à iecore ad inguina materia hæc transmittitur. vnde & parotides, & bubones, & phygetla, & cæteri huiusmodi tumores sæpè in febre apparent pestilenti, hique omnes tumores maligni sunt, raroque ad bonum terminantur; immo sæpè retrocedunt, quod in causa velocis mortis esse solet. cum enim causentur à materia corrupta, praua, & perniciofa, retrocedentes solent calorem innatum extinguere, vitamq; vnà abolere. si autem non retrocedant, & criticè geniti fuerint, rectaque ratione ab artifice prudenti æger tractetur, aliquando possunt salutem impertire. hæc de superuenientibus affectibus. Vltimum relinquitur signorum genus declarandum, à causis desumptum, quod maximè à diligenti erit Medico considerandum; vbi enim nouerimus in febricitante causas eas, quæ febrem possunt accendere pestilentem, præcessisse, maximum habebimus febris pestilentis argumentum. Quæ autem sint causæ istæ iam diffusè satis in differentiis à causis enarrauimus, vbi duplices posuimus, externas scilicet, & internas, omnesque has distinctè considerauimus, vim omnium, & efficaciam exprimentes. quare pro perfecta horum signorum cognitione ad caput illud de differentiis à causis recurrendum erit. quibus cognitis ex præsentia, vel absentia earundem causarum supra febrem poterimus coniectare pestilentem.

*Carbunculi.*

*Parotides.  
Bubones.*

*De signis præteritam febrem fuisse pestilentem attestantibus.*

*Cap. XIX.*

**T**ertia signorum genera, quæ rememoratiua (quoniam eorum est officium præteritam febrem fuisse pestilentem declarare) appellauimus, nunc recensenda veniunt. quorum breuissima erit enarratio, tum quoniam speculatio de causis, & de signis iam habita hoc munere satis, superq; fungi potest, tum quoniam signa hæc ponenda pauca admodum sunt, & sensui satis patere possunt. Inter quæ primū habeat locum maculæ illæ, de quibus inter causas, & signa egimus, ubi enim nouerimus ægrotantem in febre maculis infectum fuisse, seu fuerint illæ maiores, seu mediocres, seu minime, semper coniectare supra pestilentem poterimus febrem. quæ eedem maculæ aliquando non uiuo, sed mortuo superueniunt ægrotanti. quamprimum enim extincti sunt nonnulli, statim eorum cōmaculantur corpora perindeq; ea apparēt, ac si flagellis asperrimis percussa fuissent. alijs autem apparent liuores maximi, alijs autem minimæ superueniunt maculæ, moribus pulicū simillimæ. Et hæ maculæ omnes sunt variæ, & diuersæ colore inter se, ut dictum iam est. & nō tantum aliquæ corporis partes cōmaculantur, sed etiam aliquādo vniuersum corpus vno eodemq; colore inficitur, ut ego semel in quodam vidi ægrotante, qui cum violentia febris pestiferæ extinctus fuisset, post mortem adeo in toto corpore virore infectus est, ut in succo porri infusus totus videretur. Cū igitur contigerit hoc, videlicet, quod post mortem febricitantis succedant huiuscemodi maculæ in eius corpore, erit quodammodo indicium febrem eam pestilentem fuisse. dixi quodammodo; quoniam hoc non est demōstratiuū signum, cū ijs, qui ex assumpto veneno necati sunt, eadem consueuerint superuenire signa. quæ paritas signorum potest esse validum paritatis prauæ qualitatis, & eorūdem efficaciz indicium. Vnde in hac paritate diligēs Medi-

*Maculæ in febricitantibus. attestantur febrem esse pestilentem.*

*Maculæ cadaveribus superuenientes attestantur febrem fuisse pestilentem.*

*Macularū cadaveribus consingentium differentia, & causa.*

cus discernere debet, si quid tale contingat, an à veneno, an  
 à pestilenti affectu hoc sit factum, quod faciliè consequetur,  
 ac conijciat, si præcedentia omnia considerauerit, causasq;  
 & signa pestilentis febris rememorauerit. Solet etiam in  
 strangulatis, & suffocatis cōmaculari corpus. sed hos ab illis  
 erit facile discernere, tum ex præcedentibus, tū etiam quo-  
 niam in his maculæ superuenientes semper nigri sunt colo-  
 ris. at in his pestilentibus affectibus cuiuscunq; possunt qua-  
 litatis esse. Hæ autē maculæ in cādauiere humano, vbi agro-  
 tantes vi pestilentis affectus perierint, solent superuenire;  
 quoniam extincto calore innato (à quo oēs virtutes, & na-  
 turales, & animales, & vitales, si non in esse, saltem in cōser-  
 uari dependent) omnis internus calor, quicumque fuerit, seu  
 naturalis, seu præter naturam, à partibus intimis ad extimas,  
 & externas euaporat: vnde sæpenumero videmus eos, qui  
 ad tactum frigidi ante obitum erant (cum non per resolutio-  
 nem, sed per extinctionem pereunt, vbi in eis plurimus in  
 internis partibus abundat calor) post mortem calefieri. In  
 tali autem caloris euaporatione à partibus interioribus ad  
 exteriores hoc euenit, vt à partibus internis humores om-  
 nes, & præcipuè ichores, tum sanguinis, tum ceterorum hu-  
 morum, quorum hi partes subtiliores sunt, cum nulla vi re-  
 tentrice amplius regantur, vnà cum calore ducantur ad  
 partes externas. vnde cum in cuti propter eius densitatem  
 necessariò firmentur, ab omniq; calore destituantur, cumq;  
 hic in totum euaporet, ille non, propter cutis densitatem, &  
 eorundem crassitiem, pro ratione humoris peccantis diuer-  
 simodè ipsam cutim inficiant. Hoc autem tantum fit ratio-  
 ne euaporationis caloris, & ratione, qua humores ad partes  
 exteriores vnà cum eodem calore omnes transfundantur,  
 non autem virtutis expulsiuæ merito eosdem ichores ad cu-  
 tim expellente, vt nonnulli celebres viri sensere. cum enim  
 ad extinctionem caloris innati omnes virtutes corporis hu-  
 mani viuentis aboleantur, quid potest retinere, ac retardare



virtutem expulsiuam in cadauere à præterea si expulsiua vi-  
tus in viuente animali, dum adhuc omnes virtutes vigerent,  
non potuit hanc prauam materiam ab internis ad exteriora  
transmittere, quo pacto iudicari potest hoc eius fieri ratio-  
ne potest mortem? quod affirmare nil aliud est, quàm asse-  
rere virtutem hanc naturalem in viuente, quàm in inortuo,  
debiliorem esse. quæ tamen sententia nequaquam admit-  
tenda est: cum vigente, non autem extincto calore virtutes  
naturales operentur, quæ omnes pariter in morte ipsa ex-  
tinguuntur. Immo motus materierum ad partes cutaneas indi-  
cat non amplius tunc regihos humores à natura. hincq; fit, vt  
cū amplius à retentrica vi non retineantur, vagetur hoc motu.  
& hoc non modò, sed etiam vt omnis materia in vijs ductu  
existens per se sponte dilabatur: vnde per sedes materie, quæ in  
viis communibus reperiebantur, sponte descendunt, per  
nares autem, & per aures, & per os, quæ in cavitatibus ca-  
pitis, thoracis, & ventriculi residebant. quod, si quid aliud,  
virtuti expulsiuæ attribui poterat, quod tamen cum longè à  
veritate dissonum sit, sed hoc tantum contingat ratione abo-  
litæ virtutis naturalis, & præcipuè retentricis, vnde excre-  
menta à nulla vi amplius reguntur, nec ei etiam istorum icho-  
rum ad inficienda corpora motus attribuitur. sicuti nec etiã,  
(quod ad confirmandam eam sententiã, quod in cadauere hu-  
mano aliqua vis expulsiua reſeruetur, facere videbatur) ei  
attribui debet augmentatio pilorum, & vnguium in cada-  
uere; cum in hoc nulla sit, nec possit esse auctio vera, sed ap-  
parens tantum, quæ contingit; quoniam absumptis, & de-  
pressis carnibus ob exclusionem spirituum, & vaporum (quo-  
rum proprium est dilatare, diffundere, & ampliare) iidem  
pili, & eadem vngues ad sensum longiores esse videntur.  
Maculæ autem illæ, quæ in hominibus à veneno extinctis  
apparent, easdem cū præcedentibus habent causas, in hocq;  
tantum differunt, quod in his ichores prauis geniti sunt ra-  
tione veneni assumpti, at in illis ratione causarum, de qui-  
bus

*An in cadaue-  
ribus vis ali-  
qua expulsiua  
reſeruetur.*

*Macularum, quæ  
in extinctis à  
veneno appa-  
rent, causa,*

bus in præcedentibus diffusè egimus. cui hoc addatur, quòd non omne venenum potest has maculas generare, sed illud tantum, quod paucis horis, vel diebus suam prodit actione: quoniam hoc, vt superius etiam notauì debere fieri, non per resolutionem, sed per extinctionem, & violentiam hominem iugulat. non est tamen, quòd venenum illud, quod pedetentim, & diurno agit tempore, aliquando non inficiat corpus etiam vel viuens, vel mortuum, sed sententia mea, tunc non erunt maculæ in corpore isto, sed sicuti notauì in pestilenti nonnunquam euenire febre, ita in hoc propter æqualem factam in vniuerso corpore ob temporis diurnitatem transmutationem validam, vniuersum corpus vno, & eodem inficietur colore, sicuti vel viridi, vel flauo, vel liuido, vel nigro, ita vt nonnulli hos effectus, dum in viuente homine apparent, ad aliquam isteritiæ speciem referant: quod tamen à veneno hoc factum esse, expertus Medicus, diligensq; in perscrutandis rerum causis dignoscere poterit. sicutiq; in viuente corpore venenum agere hoc potest, consimiliter & post mortem aliquando vniuersa cutis his eisdem coloribus ratione assumpti veneni inficietur. In suffocatis autem, & strangulatis maculæ illæ nigre, & liuores illi non his rationibus fiunt, sed quoniam in angustia illa spiritus introclusi, & humores, quātum fieri potest, agitantur, & diffunduntur, vt necessariò vasa aliqua interna distrahantur, & lacerentur ex violentia illa. cuiuscemodi autem in conflictu illo maximo vasa interna patiuntur, ita & externa adeò pati solent, vt eorundem aliqua aperiantur, à quibus tenuior pars sanguinis, sicuti in echymomate euenit, refundans extra capillares venas ad cutim, ibi extrauenatus, & refrigeratus liuores, & maculas illas nigras generat, hæcque dicta sint, vt harum macularum causæ pateant. ex quibus etiam hoc liqueat verum esse in cadaueribus, cuius contrarium quidam sensere, iudicantes ratione, qua cadauera frigida fiant, ab eis nihil euaporare mali, cauendum esse; quo-

*Venenū, quòd maculas in cadaueribus inducit, qualo existat.*

*Macularum, quæ in strangulatis, & suffocatis apparēt, causæ.*

*Ex cadaueribus prauas exhalationes euaporare, si pestis sint existimata.*

*Odor febrē pe  
silem indi  
cans.*

niam ab his prauæ euaporant exhalationes, quibus medi-  
antibus alteri communicari idem potest affectus. quod  
clarè apparet ex motu illo prauarum materiæ ab inter-  
nis ad externa vnà cum calore euaporante. & hæc de macu-  
lis, prout febrem fuisse pestilentem declarare possunt, suffi-  
ciant. Hanc eandem attestari valent & exanthemata illa, de  
quibus inter signa egimus, præcipuèq; si prauis fuerint colo-  
ris, pariter & bubones, & parotides prauæ, & carbunculi  
dicti, & quiscunq; alius tumor, qui tetri sit coloris, vel odo-  
ris. Qui odor non tantum ratione tumorum, sed etiam to-  
tius corporis optimè est aduertendus, & non solum in ca-  
daveribus, sed etiam in ægrotantibus, dum vitam degunt fe-  
bricitantes huiuscemodi febre; solet enim in hisce ægrotan-  
tibus, dum malè habent, teter quidam odor exhalare, qui  
nonnunquam accidit etiam in his febribus, quæ inter spora-  
des, ac sine peste eueniunt. & hic odor, quando apparet, exi-  
tialissimum inter omnia mala est signum, ut ego sæpius no-  
taui, qui nullum vidi eorum, à quo talis transpiret odor, sal-  
uari, & non abs ratione, cum hic odor signum sit confirmatę  
& intentissimæ corruptionis, & putredinis. quis autem, aut  
qual sit odor iste, sola experientia docere potest. Vnde in  
ambiguitate, & discrimine cognoscendi hosce morbos, dū  
de pestilentibus dubitaretur affectibus, visi sunt nonnulli  
idiotæ, & vulgares, qui hac docti experientia ex solo isto  
odore veritatem ipsam perfectius attigerunt, quàm exper-  
tissimi Medici. Aliquando autem verè iugulati sunt ægro-  
tantes à pestilenti hac febre, & tamen nec maculæ, nec exan-  
themata, nec tumores ulli, nec prauus aliquis odor in eis ap-  
paret, & tunc pro vera eius cognitione, cum superuenientia  
ob eorum absentiam hoc attestari nō possint, sufficiant ea,  
quæ dicta sunt, dum causas, & præcedentia, & consequentia  
signa eiusdem pertractauimus.

Nunc ſupereſt, declarata febris peſtilentis eſſentia, eiſdemq; differentijs, ac ſignis explicatis, vt curationē iplius aggrediamur: quæ curatio licet propriè dicatur ea, quæ tantum præſenti morbo debetur, tamen cum præſervare ab imminēti morbo, ab eodemq; in futurum hominem præcavere, ſit quidā curandi modus; ideò nos ſub hoc codē curationis capite, & præſervationem ab imminente febre peſtifera, & præcuſtodiam ab eadem, illam indicātibus nobis ſignis futurę febris, hanc autem rememoratiuis, ponemus, incipientesq; à præſervatione rem ita explicabimus. Cum morbus quiſlibet ſic imminet, & ab eodem quiſpiam eſt præſervandus, omnis Medici intentio ad remotionem cauſarum verti debet. in hoc enim à curatione præſervatio differt, quòd curatio morbum factum, præſervatio autē eiſdem cauſas, cumque imminētem reſpicit. Vndè cum voluerimus hominem ab imminente febre peſtifera præſervare, eiſdem cauſas removere debemus. cauſæ autem iſtę, quarum remotioni in præſervatione ab huiuſcemodi febre intendere debemus, in duplici ſunt diſcrimine; alię internę ſunt, alię externę. internę ſunt, plethora, cacoſchymia, & obſtructiones. externę autem ſunt, aer quomodolibet vitiatuſ, & contagium vagans. à primis habemus corporum præparationem, à ſecundis cauſarum externarum præſentiā. quibus duobus exiſtentibus, facillimuſ eſt in febrem hanc lapſuſ; eòque magis, ſi corpora alterā prædictis præcedentē diſpoſitionem habuerint, per quam omnem externam impreſſionem facilè ſuſcipiunt; vt ſi corpora ſint, vel à natura, ex accidenti ve humida, vel excremētōſa, vel debilia, vel laxa & rara, vigentibus cauſis externis. vel anguſta, & denſa, internis. Quapropter præſervationi intendētes, hæc tria animadvertere, & conſiderare debemus, ſcilicet corporū diſpoſitionem, quæ ſi procliuſ ſit ad labem iſtam, contra-

*In præſervatio  
ne quid indica  
tur.*

*Corpora humi  
da quomodo p  
seruanda a se  
bre pestilenti.*

rijs agendo illam remouere, sin autem opposita, conserua-  
re debemus. secundò præsentiam causarum externarũ, qui-  
bus, quantum fieri poterit, arte resistendum erit. tertio cau-  
sas internas, quas Medicus propria virtute abolere, & amo-  
uere debet, si potest. Incipientes autem à corporum dispo-  
sitione, dicimus corpora humida, seu à natura, seu ex acci-  
denti talia fuerint, omni viâ, rationali tamẽ, exsiccãda esse.  
quæ autem sicciora sunt, in eodem statu conseruanda esse.  
Vndè humidis corporibus præscribemus vitandam esse om-  
nem satietatem, & ingluuiem, victum pleniorẽ, largiorẽq;  
potum, præcipuè autẽ fugienda esse omnia ea, quæ in victu  
corpus humectare possunt, sicuti pepones, melopepones, cu-  
curbitæ, citruli, nuces virides, lactuca, malua, fabæ virides,  
horarij omnes fructus, aginæ carnes, & eorũ animantium,  
quæ in aquis degunt; pisces, & præcipuè molles, & nõ friabi-  
les, aquæ potus, & reliqua huiuscemodi. caueãt etiã ab otio,  
à locis aquosis, humidis, ab aere cõsimili, & præcipuè noctur-  
no, à ventis austrinis, à longo & profundo somno, potissi-  
mũ meridiano, à balneis, & ceteris externis causis humecta-  
re potentibus; fugiant etiã omnẽ cibi præparationẽ hume-  
ctantem. & (vt vnico verbo rem concludam) vitentur om-  
nia ea, quæ tum actu, tum potentia humidum corpus red-  
dere valeant. Parcè autem viuant, potusq; sit multò, quàm  
consueuerit, minor. & vinum sit antiquum, tenue, nõ aquo-  
sum, non tamen valde generosum, nè indè humores accen-  
dantur. carnes sint laudabiles, & boni succi, præcipuè au-  
tem syluestres, vel sint ex quadrupedibus, vel ex auibus,  
sintq; præparatæ, vt exsiccare, nõ humectare possint. pisces ali-  
qui saliti, vt sardæ, alicæ, aphig, & cõsimiles in hunc vsum  
venire possunt. exercitium sit non violentum, sed quid pa-  
rum supra moderatum, tempestiuãq; fiat hora. somni sint  
nocturni, & breues, & non statim à cibo, nec super mol-  
le stratum decumbant. habitent loca sicca, sublimia, & ab au-  
stro auersa, in constitutione celi humida ad ignem tempe-  
ratum

ratum accedant, negotijs, & curis se dedant, at non molestis. Si autem fuerint corpora excrementosa, leni via ab excrementis expurganda erunt. per excrementa nunc intelligo non humiores, sed cibi, & potus excrementa tantum crassiora, siue sicca, siue aquosa fuerint, cuiusmodi sunt reliquæ cibi in ventriculo crudiores relicte, alui excrementa retenta, & lotium non ita profluens. Ventriculus à reliquiis illis expurgabitur, vel vomitu, si facilis sit, vel ex assumptione mellis rosacei, & oximellis simplicis, in futurum cauendo, ne super crudum crudus superingeratur cibus, vitando omnia difficilia concoctu, & excrementosa. Aluus autem lubrica paretur, assumendo ante cibum caricæ, passulæ, prunæ damascenæ costæ, sebesten, iura pullorum, addito saccharo, & consimilia, quæ sint lenia, & suauia, abstineantque ab astringentibus, & austeris, præterquam in vltima mensa. panis autem in tali genere victus sit recens, non calidus tamen, nec ab utriculis illis in præparatione expurgatus; ita enim facile aluum lenit. Quod si hæc non satis sint, veniant aliquando in usum clysteria mollia ex iuribus pullorum, ex decoctionibus herbarum mollientium; cum oleis eiusdem naturæ, calefacientibus hyeme, æstate refrigerantibus, addendo vel saccari, vel mellis rosacei portionem. Quod si etiam non nihil hyeræ simplicis nonnunquam accipiant, & ventriculum expurgabunt, & ventris simul crassiora excrementa deiicient. Lotium prouocabitur ex usu feminum communium frigidorum æstate, hyeme autem, & temporibus non æstuantibus radicibus petroselinæ, appij, smirni, & similibus, vinoque tenui, antiquo, minimeque adstringenti, nec dulci. Si autem corpora debilia erunt, eorundem imbecillitatis causas attendere oportet, quibus pro diuersitate vniuscuiusque resistendum erit. Vnde his, qui ex nimia Venere imbecillitatem hanc contraxere, optima victus ratio erit præscribenda, ita ut in eorundem usum veniant cibaria optimi nutrimenti, concoctu facilia, quaque minimè sint excrementosa, &

*Corpora excrementosa quomodo præseruanda à febre pestilenti.*

*Corpora debilia quomodo præseruanda à febre pestilenti.*



la, & hæc in quantitate moderata semper administrentur, nè ventriculus ultra vires grauetur, neq; vnquam ante præcedentis cibi coctionem nouus superassumatur. hique in quiete, & hilari vita viuant, à Venereq; non tantum, sed etiã ab omni mulierum congressu caueant, siq; ex vsu Veneris alicuius membri imbecillitatem contraxerint, ea summuenda erit, & eiusdem intemperiem tollendo, & idem proprijs medicamentis roborando. Qui autẽ ob molesta animi accidentia nonnihil passi sunt, vitent curas, negotia, contemplationes, studia, solitudinem, & similia, quæ animum anxium reddere possint. hilares viuant, societates lætas querant, sonos, & cantus audiant. & si cordis passiones adessent (vt luspiria, tremores, & dolores, vel consimiles cordis affectus) cordi per propria prospiciatur medicamenta. eisq; ratio viuendi præscribatur, quæ humores melancholicos non ita generare possit: vnde vitent omnia crassa, & terrena alimenta, cuiusmodi sunt bubulæ carnes, ceruinæ, leporinæ, cochleæ, & pisces crassiores, & maximè ex omnibus his, quæ sale condita sunt. vitent brassicas, lentes, & omnia, quæ huiusce sunt temperamenti. abstineãt à vinis nigris, crassis, & etiam generosis, & potentibus; & quantum fieri potest in actionibus, in conuersationibus, in sermonibus, & in omni vitæ parte laxatum animum habeant. Corpora autem, quæ ex hausto veneno labem aliquam in visceribus contraxere (vnde faciliè tam externis, quàm internis iniurijs cedunt) alexipharmacis præseruanda sunt, quæ particulatim membrum læsum respiciant. hoc enim solet contingere, quòd non semper à veneno assumpto necentur homines. & hoc tunc euenit, quando vel vomitu reiectum, vel cū excrementis, priusquam iniuria corpus affecerit, deiectum, vel vi medicamentorum superatum, vel in minima quantitate assumptum suam nõ potuit perniciosam prodere actionem. in quibus casibus licet optima fauente fortuna saluentur homines, hoc tamen solet consequi, quòd aliqua vena

*Venena licet  
semper mortẽ  
non inferant,  
tamen læsionẽ  
notabilẽ inducere solent.*

ni vis in aliquod principalium membrorum permeans, licet non mortem, tamen lētionem euidentem inferat. qua concepta euenit, vt sapissimē qui venenum deleterium hauserunt, quamuis incolumes euaserint, persentiant tamen offensam aliquam per interualla. rarique sunt illi, qui hausti veneni nonnulla signa, & vestigia non retineant. quod non aliundē efficitur, quā ex impressa labe in aliquo viscere; quæ labe solis alexipharmacis, quæ membrū, in quo ea infederit, respiciant, tollenda erit. alioquin erit facile, vt illi à causis externis, cum hæ præsentēs erunt, ob præsentem dispositionem in febrem pestilētem traducantur. Si quis autem nō ex hausto veneno, sed ex prauis cibarijs, vel ex corrupto potu, vel ex aere vitiatō (sicuti contingit his, qui propē stagnantes aquas degunt) similē labem, & indispositionem in visceribus contraxerit, remota causa erit succurrendum membro patienti: & prout praua illa dispositio indicabit, ita diuersa erunt adhibenda remedia, cum hac semper consideratione, vt in promptu sumantur ea, quæ à proprietate possunt læsum membrum iuuare. Quod idem agē dum est in his, qui ab ortu debilia receperint membra principalia. quoniam semper in curatione horum membrorum non solum, quæ præsentem intemperiem, affectumq; amouere possunt, veniunt accipienda, sed ea præsertim, quæ illud idem membrum respiciant, & à proprietate roborare possint, quorum sylua expertis Medicæ artis professoribus nota est. Corpora autem laxa, & rara, cum faciliē externis iniuriis pateant, erunt præseruanda, dum eis præscribatur eadem victus ratio, quam diximus in humidis temperaturis, & habitibus seruandam esse. Corpora verò densa, & angustos habentia meatus, quoniam hæc faciliē in pestilentem febrem incidere possunt, dum causæ internæ in promptu sunt; ideo quid in his Medicus moliri debeat, ex inferioribus patebit, dum plenitudinis, cacoehymię, & obstructionum, quæ omnia in tali habitu sunt discriminis plena;

curatione.

*Corpora laxa  
et rara quomodo  
præseruanda à feb. pesti  
lenti.*

*Corp. densa, &  
angustos habē  
tia meatus quo  
præseruanda à  
feb. pestilenti.*

curationem enarrabimus. Remota hac in huiusmodi corporibus præuia dispositione ad remotionem causarum descendamus; has duplices esse diximus, nam aliæ externæ sunt, aliæ internæ. Ab externis exordientes, cum has posuerimus duas esse, alteram aerem quomodolibet vitiatum, alteram contagium vagans, primò aer veniat considerandus. hic triplici via potest corpora in pestilentem febrè præcipitare, scilicet, vel cum patitur in proprio temperamento excessum, vel coinquinatus fuerit à susceptis ad intra, si prauis exhalationibus, vel cum in propria substantia sit immutatus. quibus omnibus pro posse arte Medica resistendum erit, vt si eius violentiam in totum superare non valeamus, saltem pro parte minuamus. licèt enim Deus Opt. Max. Deus misericordiæ, & consolationis, ad quem semper in omni calamitate primò est confugiendum, solus possit aeri dominari, statimq; eius vitia auertere. Medicus tamen implorato prius diuino auxilio, multa mala, quæ ab aere pendent, arte Medica, cui solum annuente Deo prodesse licet, inhibere potest. & hic, si non omninò hoc valeat, pollet tamen multa mala, quæ hinc deriuant, & grauiora fierent, ex arte leuiora reddere. Quapropter cū nouerit Medicus primò aerem in qualitatibus primis excessum pati, tentabit corpora humana ab eisdem rationabili via tueri: vnde cum aer in caliditate excefferit, summeq; calidus existens corpora facile accendat, omni ingenio aerem quidem primò refrigerare, secundò autem corpora ab eadem caliditate defendere conabitur. Refrigerabitur aer, si flabellis agitetur, si asperfusionibus aquæ frigidaë madesiat, si irrorentur pauimenta aqua rosacea, & aceto, si parietes ormentur pannis lineis infusis in eisdem, vel consimilibus liquoribus, si in thalamis ponantur diluculò herbarum folia, quæ tū refrigerandi vim habeant, tum quæ ante solis ortum collecta fuerint. sicuti si in sternatur solum foliis rosarum, capreolis, & folijs vitium, lactucis, nymphaea, papaueris folijs, & capitibus, inty-

*Corpora quò  
sint præseruan  
da à febre pe  
stilenti immi  
nente ratione  
aeris vitiiati.*

*Corpora quò  
præseruanda in  
aere calidiori.*

*Aeris calidi  
tas quomodo  
corrigena.*

bis,

bit, & confimilibus. si etiam componantur in cubiculo rami e falicibus, & harundines, vel confimiles plantæ dicto modo collectæ: quæ omnia subindè commutanda sunt, quoniam siccata lædunt, maleq; olent. quod idem de aqua frigida agendum est; cum enim calefacta est, immutetur, de vaseq; in vas alterū frigida transfundatur leui via perinde, ac si ex fonticulo emanaret; ita enim facile aer ad frigidum alterabitur. Dum autem hoc modo alteratur aer, corpora humana ab intensa tuebimur caliditate, si cæterę quinque res non naturales ad frigidum declinabunt. Aer enim adeo potens est in alterandis corporibus nostris, ut cum sint sex res nobis necessario occurrentes, si aer peccet in vno excessu, omnes reliquæ huic opponi, & in contrarium declinare debent. quare victus in tali statu tam quod ad potū, quam quod ad cibum refrigerans præscribatur. excrementa omnia educantur, præcipue autem calidorum sit opportuna & lenis euacuatio. quies imperetur, motus enim calefacit. somnus sit longus, vigilię autem nimie fugiantur. animi accidentia, quæ sanguinem accendere possunt, omnia vitentur, sicut ira, & exandescencia. sit istorum habitatio propè fontes, flumina, & aquas fluentes. non in tabulatis hi degant, sed in inferiori domus parte, potiusq; in montibus, quam in conuallibus, & cæpestribus locis; quæ tamen loca Austro auersa, Aquilonem tantum respiciant. quo flante ex ea parte fenestrę, & alię domus partes apertę pateant, hominumq; multitudo ingredi prohibeatur. Si autem aer in excessu qualitatibus humidę peccauerit, exsiccandus erit, corporaq; ab eius humiditate tuenda erūt. exsiccabitur aer igne accenso tum per vias publicas, tum etiam intra priuatas domos, cum hac tamen distinctione, quod æstatis tempore parcior sit ignis, nec propè loca habitata accendatur ille, qui in locis publicis fieri debet. qui autem in proprijs domicilijs accendendus est, parcior similiter, & non præsentē, sed absente habitatore. qui cubiculum non ingrediatur, nisi igne extincto. Si autem

*Corpora quò  
preseruāda in  
aere humidiori.*

*Aeris humiditas  
quomodo  
corrigenā.*

in hyeme, vel temporibus frigidioribus hoc fieri contingat, contraria omnia parentur, videlicet, vt ignis propius, & abundantior fiat. ligna autem concremanda erunt sicca, vt non sit fumosus ignis, apparenturq; eo in loco, ex quo ratione vnetorū magis possit euentari, & exsiccari aer loci illius. licet autē in vijs publicis omnia lignorū genera, quæ prauū non edant odorem, possint in vsum venire, ea tamen sunt magis laudabilia, quæ odorata sunt, cuiuscemodi est laurus, cupressus, abies, pinus, iuniperus, rosmarinus coronarius, sauiua, mirtus, erica, & similia, quorum materia etiam apta est pro cubiculis alterandis, si temporā erunt frigidiora. si autem erunt calidiora, eligenda veniunt nonnulla alia leuiora, quæ non ita calefacere aerem possint, sed eorum facultas sit potius refrigerandi, sicuti sunt sandali, cuiuscunq; sint generis, flores rosarum, venularis, cortices citriorum, arantiorum, cidoniorum, quæ vel accendantur super ignem ex uite, seu salice factum, vel ex eisdem in thalamis sustumigia quomodolibet parentur. Homines autem temporibus frigidioribus ad ignes hosce accedant sæpius, cauentes tamen ab omni excessu, eoque genere victus vtantur, quē diximus præscribendum esse humidis temperaturis; ita enim faciliè aeris humiditatem oppugnantes eiusdem perniciem euitabunt. De excessu aeris frigido sermonem non habeo; tum quoniam vnicuiq; notum est, quomodo quisq; à frigore tueri se debeat; tum quoniam hæc causa ad producendā hanc febrem inepta est, indeque rarò temporibus frigidioribus tales febres vagare videmus. quod idem de excessu siccitatis ferè dicendum est. immo talis aer videtur esse tutela corporum etiam maximè in hanc febrem procliuiū. quòd si quandoq; contingat hinc lædi corpora, hoc non ex sola aeris siccitate, sed cum ei additus fuerit excessiuus calor, euenire potest. quod cum fuerit, petantur remedia ex superioribus, vbi docuimus, quomodo in aeris immoderata caliditate sint homines custodiendi, & hæc de aere in primis qualitatibus

litatibus peccante. Si autem aer vitiatuſ fuerit à ſuſceptis ad intra ſe prauis exhalationibus, duo erunt peragenda; alterum ſubiectam materiam, à qua eæ expirationes attolluntur, remouere, alterum eas exhalationes iam genitas diſperdere. pro primo faciet, ſi occasione aquarum ſtagnantium hæ genitæ ſint, vel eis ſuperinducere aquas fluētes, vel eaſdem exſiccare, cuiuſmodi conſultum fuit in patria mea, circa cuius mœnia ſtagnabant aquæ in ſoſſis publicis; vnde hæ æſtate putreſcentes erant in cauſa, vt in fine æſtatis, & in autumno plurimæ ſingulis annis vigerent peſtilentes febres. his exſiccatis, experientia, & rei euentus comprobauit rectè conſultum fuiſſe, cum non amplius ita vigeant, nec vagentur. ſi autem aquę corruptæ fuerint in cauſa harum expirationum, ſicuti eę, in quibus linum, buxus, canabis, nerion, iſatis, braſſicæ, & nucum, conſimiliumq; plātatum folia macerata fuerint, vel in quibus iſatis ſuccus concretus, & elaboratus infuſus fuerit, vel quid ſimile, quod prauam in ſe qualitatem, vel viroſam naturam habeat, iniectum fuerit; ſi aquę erunt fluentes, extrahantur ea, quæ malè impoſita ſunt, ſinaturq; aquæ proprio curſu expurgari. ſi autem ſint ſtagnantes, ſuperinducatur aqua pura. quod ſi non poterit fieri, omni ingenio, & cum maiori, quàm fieri poſſit, celeritate exſiccetur. Si verò ex barathris, vel ſpecubus adapertis hæc inquinamenta attolluntur, quamprimùm claudantur, ſi fieri poterit, expirationibusq; via præcludatur; ſin minus, maxima, & ingens lignorum ſtrues congeſta ſuper hæc accendatur, ad intraq; loca illa immittatur. Si verò cadauera ſeu humana, ſeu aliorum animalium inſepulta, à quibus deterimæ inter omnes expirationes attolluntur, harum fuerint in cauſa, vel igne; longè tamen ab habitatis locis, & ratione ſumi pernicioſi, & ratione tētri odoris concrementur, vel in profundis ſoſſis ſepeliantur, quibus ſuperimponatur vel argiloſa terra, vel calx copioſa. quoniā etiam ſuperimpoſita terra vulgaris non omnimodam prohibet tranſpirationem.

*Aer vitiatuſ à ſuſceptis ad intra ſe prauis exhalationibus quomodo corrigendus.*



nem, vnde fit, vt circa sepulchra, & cimiteria adium sacrarum prauæ semper exhalationes expirent, maleq; semper ibi habitetur. Quod si in causa harum expirationum sint aliæ res putridæ & corruptæ, eodẽ modo remoueantur, animaduertendo semper, quod omnia ea, quæ prauis sunt odoris, & malè olent, aerẽ inquinare prauis exhalationibus possunt, & maximè si multa sint. malus enim odor indicat in materia putrida malam vigere qualitatem. Quapropter semper optimum erit in Ciuitatibus expurgare vias publicas à cæno, & à stercorebus animantium, à cloacis, & ab omni immunditia. quod idem & intra priuatas domos peragendum est, curando, ne quid fordidum, putridum, vel malè olens, vel aptum prauam spirare exhalationem in cubiculis, & thalamis, & alijs domesticis locis retineatur. Remota autem his modis materia, à qua prauæ expirant exhalationes, reliquum est, vt inquinamenta ad intra aerem suscepta disperdantur, consumanturq; hoc fiet vel à natura, quando ingenti ventorum agitatione aerem commouendo ea dissipabit, seu cum diuersa temporum successione, eadem ad nihilum rediget, vel ab arte, si ignis modo, & forma prædicta accendatur, dum aeris humiditatem superfluam temperare doceremus. ignis enim, sicuti aeris humiditatem, ita & prauas intra eum existentes exhalationes disperdere potest. Et sicuti ars potest aerem ab his inquinamentis igne expurgare, similiter poterit etiam fortasse ad imitationem naturæ aliquo vehementi motu eundem purificare. Vnde credo ego, quod maximè in tali casu possit proficere, si tormenta illa bellica maiora sæpius excussa vi ignis fuerint. nam cum hæc validissimè aerẽ, & ad distans commoueant, vt indicio est, & sonitus maximus ab eis concitatus, & terræ etiam circumstantis tremor, apta erunt, si sæpius iterentur, ad aeris validam purificationem, poteruntq; aerem ab illis inquinamentis ea disperdendo emundare. & hæc de correctione aeris ratione prauarum exhalationum

*Inquinamenta  
ad intra aerem  
suscepta quo-  
modo disperdenda sint.*

tationum inquinati. si autem aer in propria substantia fuerit immutatus, cum hæc corruptio aliàs ab inferioribus causis, aliàs à superioribus generetur, pro vtriusq; ratione diuersimodè agendum erit; si enim ab inferioribus causis pendeat talis corruptio, primò erunt hæ causæ amouendæ, deum in bonum aer alterandus erit. quare si ratione primarum qualitatuum excedentium hoc contigerit, fiant ea, quæ dicta sunt pro temperando aere in primis qualitatibus peccante. si autem hoc eueniat à permixtione putridarum, prauarumq; exhalationum, eadem, quæ in harum curatione diximus, seruentur. si verò ratione putredinis eiusdem aeris hoc fiat, putredinis causæ, quantum arte fieri poterit, temperentur, & amouantur; prædictaq; omnia prodesse in consimili casu possunt, si rationabili methodo in vsum veniant. Remora autem corruptionis causa, aer alteretur. hæc autem alteratio nō in contemperamento primarū, secundarumq; consistit qualitatuum, sed in oppugnanda praua, & maligna natura ex prædictis causis in aere genita; quæ sicuti virosam in se qualitatem habet, ita & remedia nobilia, & à qualitate interna agentia administranda erunt. Vnde ignis, qui omnium agentium naturalium validissimus est, potētissimusq; in alterando aere, fiat non ex quacunq; materia, sed tantum ex rebus odoratis, quæ suauitate odoris prauam illam qualitatem retunderet, ac remouere possint. Quapropter in hunc vsum veniant tantum ligna illa, quæ suauissimè redolere queant, & accenso igne pro maiori odoris suauitate fiant; flores, ramusculi, virgulta, aromata, vnguenta, olea odorata ipsis superinfundantur, & in priuatis habitationibus parentur suffomigia vel sicca, vel humida, & calida, seu frigida pro ratione temporis, & constitutionis anni. quæ formantur vel ex materia solida, vel ex aquis odoratis cum aromatibus, lignis, gummis, & aliis rebus suaue olentibus. horum sylua magna est, plurimiq; sunt auctores, qui harum compositionis diuersas doceant, Vnde vnique, qui recta me-

*Aer in propria substantia vitatus quō corrigendus sit,*

rhodo hanc nostrā profiteatur artē, plurima sibi opportuno tempore opportuna facile erit parare remedia, quā de re ad particularia nō descēdo. sed hoc vnū tantū addā, quōd ē fortasse violētia motus aeris, eiusq; agitatio valida prodesse possit; qm̄ seminaria illa, & inquinamēta ea, quæ in aere deteriora sunt, possunt à tali causa dissolui. vnde nec in casu ē isto nō laudo vsū tormentorū bellicorū, si sæpius & sæpius excutiātur, & maximē eā partē versus, à qua malū magis instare videtur. Si verò aer corruptionē à superioribus causis

*Aere corrupto à superioribus causis existēte, quid agendum sit.*

patiatur, celsitusq; demissa sit hæc lues, omnia tentanda sunt, quæ superius enarrata sūt proficere in superāda aeris praua qualitate, & omnia pro posse viriū humanarū experienda sunt, nihil tū prodesse poterit, nisi annuēte Deo, qui in peccati poenā, & ad hominis emēdationē talia flagella parare cōsuevit. Vnde hic præcipuē Diuinū (vt oīs eius à nobis auertatur ira) implorandū est auxiliū, sancti eius inuocādi, vota faciēda, supplicatiōes indicēda, sed præ omnibus antea cta est emendāda vita, Sacrosanctisq; Ecclesiæ sacramentis in remediū animę tū pro emundatione, tū pro præseruatione à peccato adhibitis, ad Deū summa cū humilitate & deuotione preces effundendæ sunt; ita. n. Diuina placabitur ira, eiusq; flagella à nobis auertētur, & aeris salubritas, per quā diu conseruari valeamus, cōcedetur: vnde in trāquilla, & incolumi vita eius seruitio læti vacare poterimus. Cū autē

*Contagio vagante, quomodo præparandi homines.*

contagiū vagans præsens erit, caueant homines frequentia multitudinis, societates, negotia, habitationes locorum, vbi vigeat morbus, nihil contrectent eorum, quæ ab ægrotantibus tacta sint, vel in eorū venerint vsū, & nō tantū ægrotantiū, sed etiā astantiū ministrorū, & omnium rerum eisdē inserviētiū contactū, & consuetudinem fugiant, ita. n. à febre pestilenti, si per contagium solum inuadat, præseruari poterūt. Quoniam autem aliquando necessitate coacti, vel mala fortuna ducti homines consuetudinem in locis illis, vbi contagium viget, habent, vel in aere vitiato habitāt, licetq;

sicetq; omnia, quæ pro propulsanda aeris praua qualitate agenda sunt, facta sint, nec tamen ea potuerit superari, ideò quid his faciendum sit, enarrare debemus. Hilares hi uiuant, domi omnia munda habeant, & præcipuè vestimenta, quæ admittis sertis, floribus, corticibus, & ramulculis rerum refrigerantium, & siccantium, ac suauè olentium, admista tamen portiuncula, quæ ad penetrationem prædictorum faciat, alicuius aromatis reposita fuerint, sæpiusq; in vestiendo permutentur, & ablata, vel reposita sæpius euententur, & baculis concutiantur. linea autem indumenta cū lota fuerint, & medio modo exsiccata, irrorentur aqua rosacea, & postea ad usum siccata reponantur. Vitentur potissimum pellicea, gossipina, & lanea; quoniam hæc facilius omne inquinamentum admittunt, & conseruant; diluant nares, & aures aliquo grato odoramento; gestent chyrothecas ab vnguentario suauis liquore delibutas, in quorum preparatione vitentur ea, quæ summum & grauem odorem habeant, qualem præcipuè zibettum dictum habet; sæpius manius abluant aceto rosaceo, & aqua rosacea simul mixtis; componantur pillæ odoratæ, quæ ex diuersa sint materia, prout diuersus est animi status, & diuersa aeris constitutio, manibusq; ad odorandum gestentur, in quem usum etiam venire possunt Citria, poma aurantea, cidonia mala, & alia consimilia odorata manibus gestata; sordida omnia, & malè olentia reiiciantur de thalamis, excrementa statim exportentur; nec in victu vllum eduliorū genus veniat, quod prauum sit odoris, sicuti allium, cepa, porrum, radices acriores, & consimilia; quoniam hæc tetra illo odore & interius, & exterius hominem conturbant. Temperatè hi uiuant, cibarijs optimi succi vtantur, abstineant à generosis, & potenti bus vinis, nihilq; eorum, quæ prauum succum generare possunt, in hunc usum admittant, sicuti sunt horarij fructus, radices, & herbæ acriores, olera malè olentia, vitiata alimēta, malè preparata, potissimum autem omnia pinguiā, &

*In pestilenti aeris statu, vel contagio quomodo homines regere se debeant.*

36. 11. 1. 1. 1. 1.  
37. 1. 1. 1. 1. 1.  
- 0. 1. 1. 1. 1. 1.  
25. 1. 1. 1. 1. 1.  
- 32. 1. 1. 1. 1. 1.

*Medicamenta  
exterius admi-  
nistranda in p-  
servatione a  
feb. pestilenti.*

*Venenata me-  
dicamenta ex-  
terius applica-  
ta an faciāt ad  
præservatiōē  
a feb. pestilēti.*

*Lib. 5. de sim-  
pl. med. facul.  
cap. 18.*

oleosa, exercitiū sit leue, & temperatū, & hora cōuenienti fa-  
ctū, fiatq; in aere, qui arte sit expurgatus. somni mediocres  
sint, pro cuius cōsideratiōe maxima habeatur lecti ratio, cū  
in eo diutius morari hōmo debeat. hic. n. præparetur. odora-  
mentis, & mundus sit ab omni sordicie, linteaminaq; nitida  
sint, & sæpius permūtetur, nec ad intra cubiculū aer noctur-  
nus ingredi permittat. Veneris vīsus fugiat, balnea virētur,  
mundum tñ sit corpus ab omni sordicie, & immunditiā. Præ-  
scripta autē tali victus ratione, veniāt ad præservatiōē in  
vsum medicamēta; quæ duorū sunt generū, alia. n. exterius  
applicātur, alia interius sumuntur. Exterius erunt epithema-  
ta, inunctiōes, linimēta, emplastra, faccūli ex floribus, ex tro-  
matibus, ex radicibus, ex gūmis, pulueribusq; diversis forma-  
ti, supraq; regiōē cordis appositū. An autē ad præcauendā  
aeris pestilētē qualitātē faciāt & resvenētatæ extērius ap-  
positæ, sicuti arsenicū cristallinū, auri pigmētū, & sublimatū  
cordi appositum, satis dubiū esse potest, cū alexi pharmaca  
venena esse nō debeant, ac esse possint, tñ experientia hoc at-  
testatur proficū esse. alloquutus sū ego homines, qui huic  
solo præcipuē remedio attribuit, se fuisse in pestilenti aeris  
statu, dū alios curarēt, & pertractarēt, saluatos, & præserua-  
tos. quod etiā forsan rationē aliquam habere potest, cū n.  
aer prauus in pestilēti statu semper inspiretur, indeq; ad cor  
transmeet, appositum hoc remediū rationē cōsimilis ve-  
nenatæ qualitatis potest internam similiter venenatam ex-  
trahere; eandemq; ratione caliditatis, cum sit causticæ fa-  
cultatis, ad extra euocare. Deleteria enim venēna (dicebat  
diuiniſsimus Galenus) euacuantur a foris impositis medica-  
mentis duplici via, nempē aut caliditate attractiōem ino-  
lientibus, aut totius substantiæ similitudine. cuius rationē  
experientia testatur percussos a scorpione ab eodē appo-  
sito sanari. Cur autem in pestilenti aeris statu prædicta, &  
nō alterius generis venēna possint hominē præseruare,  
forsan hoc ea erit ratione; quia ultra venenatam qualitātē,  
quam

quā possident, sunt etiam summè sicca. vnde vehēmentia exsiccationis possunt quamq; humiditatem, & corruptionem noxiam, discutiendo omnia inquinamenta pestis, disperdere, indeq; cor tum discutiendo exterius, tum ab internis caliditate, & similitudine attrahendo immune à pestilenti affectu reddere. A cuius analogia permotus, & arguens etiam in tali casu laudarem omnia ab interioribus ad exteriora prauos humores attrahentia, sicuti rubificantia, vesicatoria, exulcerantia, & consimilia rationabili via apposita, & præparata, quorum merito Ichores prauis in corpore existentes, cum omnium humorum ad corruptionē sint paratissimi, extra ducantur, continuoq; ductu euacuentur. Quapropter non sit mirum, cur in pestilenti constitutione homines, qui vlcerationes, & cauteria habeant, aliis facilius præseruentur. Interius autem sumantur ea medicamenta, quæ resistere prauæ qualitati, & venenatæ, eandemq; superare valeant, quæ in duplici sunt differentia, alia enim sunt simplicia, alia composita. Simplicia erunt bolus armena, terra Melitenfis, Anatolia, sigillata, lapis bezearticus, dictamnus albus, ruta capraria, ruta communis, heptaphyllon, pentaphyllon, tormentilla, citri semina, eiusdemq; cortex, & aciditas, Valeriana, calendula, scordeum, acetosa, Eleniū, Gentiana, Zedoaria, Angelica, imperatoria, aristolochia, dictamnus Creticus, asclēpias, Vincentosicum dictum, agrimonias, stabiosa, melissa, rosæ, iuniperi, & lauri bacca, lapilli preciosi, inter quos præcipuè primū habeat locū smaragdus, margaritæ, corrallos de corde cerui, cornu ceruinū, cornu Vnicornis, & plura alia consimilia, ex quibus vel pulueres parari possunt, qui vel cum vino, vel cum aqua, vel cū vino aqua temperato, vel cum iure (prout celi constitutio, anni tempus, regio, & assumentis temperamentum, & status indicabunt) sumantur, vel ex herbis succi exprimantur, qui depurati in potum accipiantur. Composita autem diuersa sunt; alia enim simpliciora, alia magis composita sunt.

*Medicamenta  
interius sumen-  
da in præserua-  
tione à feb. pe-  
stilenti.*



Simpliciora erunt, ut conferua citri, conferua acetosae, conferua scordei, conferua scabiosae, saccharum rosatum, syrupi parati ex succis praedictarum plantarum, dianthos, pulueres ex terris, lapidibus, radicibus, herbarum folijs, seminibus, & margaritis quomodolibet facti, Diataffaron, Mithridatij, pluraque alia, quae ex simplicibus facile parabilia sunt. Composita autem maiora, erunt confectiones magnae, sicuti Theriaca, Mithridatum, Antidotus è sanguinibus, Ellectuarium de gemmis, Diamargariton. plurimae aliae antiodoti tum ab antiquis, tum à recentioribus inuenta, & in usum expositae; quarum descriptiones ab eis petantur, rectaeque ratione in usum veniant, semper respiciendo coeli statum, anni tempus, regionem, & assumentis temperamentum, eiusdemque facilitatem, vel difficultatem in assumendis medicamentis. hinc enim habebitur praeparationis qualitas, & an suaui, vel insuaui sint propinanda. Qui urinam humanam propriam, & quorundam brutorum animantium (inter quas omnibus praefereendam ducunt hircinam) pro antidoto ad praeservandum laudauerunt, & si vile sit medicamentum, adeo tamen immundum, & sordidum, ac incivile proposuerunt, ut censeam in tanta salutarium remediorum copia civiles, ac modestos homines ab his merito abstinere posse. His ita pro praeservatione respectu causarum externarum explicatis, ad internas sermo transferatur. Internae sunt plethora, cacochymia, & obstructions, plethoram intelligo plenitudinem quò ad vires, quoniam haec est ea, à qua periculum corruptionis ratione, qua à gravatis viribus humores facile non reguntur, impendet. Hanc ferè omnes scribentes docent venae sectione tollendam esse: quae sententia indifferenter non est recipienda, quoniam haec semper, & in omni casu non convenit. hac autem distinctione vel veniat, vel non veniat in usum, sectio haec sub cælo salubri vere, & aëre humo admittatur, ac in media æstate, vel hyeme, & in regionibus, ac constitutionibus, vel calidioribus, vel frigidioribus

Plenitudo quibus tollenda sit in praeservatione à feb. pestilenti.

Venae sectio an conveniat in praeservatione à feb. pestilenti.

dioribus non est admittenda : hinc enim corpus nimis refri-  
geratur, illinc autem nimium absumitur, nec tutum est cor-  
pora sana his impendentibus euacuare. Si autem pestilens  
aeris status fuerit, nunquam pro tollenda plenitudine, quò  
ad vires venæ sectio mea sententia in usum veniat, cū enim  
euacuatio hæc plurimum exhauriat spiritus, plurimumq;  
corporis humores commoueat, facilius inspiratus aer pesti-  
lentem imprimet actionem, difficiliusq; si morbus super-  
ueniat, ab eodem patiens ob vires ex sectione venæ labefa-  
ctatas euadet; cuiusmodi enim in his, qui post sectam venā  
venenum hauserunt, facilius hoc penetrat, difficiliusq; hi  
ab eodem liberantur: quod maximè animaduertant hi, qui  
veneni suspicionem habent, pariter sub cælo pestilēti hi, qui  
sano corpore venæ sectionem admittunt, aeris prauam, &  
venenatam qualitatem facilius concipiunt, ab eaque dete-  
rius habent, maioriq; cum discrimine saluari possunt: qua-  
re non sit mirum, si Galenus nusquam in præseruatione a fe-  
bre pestilenti venæ sectionis meminit, quod attestari potest,  
illam in tali casu eum abhorruisse, & ideo nec conuenire, &  
maxime cum docuerit plenitudinem hanc non semper vene-  
sectione tolli debere. sicuti quando vel ratione humorū in  
corpore existentium, vel ratione constitutionis aeris, vel ra-  
tione temporis anni, vel ratione habitus mollis, & tempe-  
raturæ humidæ, vel ratione alicuius alterius affectus time-  
tur superuentura virium labefactatio. quæ cum maximè ti-  
menda sit, maximeq; immineat sub pestilenti cælo, à confi-  
nili doceat à venæ sectione in tali aeris statu à nobis absti-  
nendum esse, eoq; magis, quòd facile inedia pariori, ac  
tenuiori victu, lubricantibus alium, ac mundificantibus san-  
guinem grauata naturam exonerare possumus. hinc enim  
tenuēs humorum partes halitu dissipare, crassiores attenua-  
re, corpus pertium reddere, & excrementa facile excludere  
poterimus, quibus plenitudinē imminuere primò, post-  
modum etiam in totum de medio tollere, alleuiata natura,

*Lib. p. de disse-  
feb. cap. 4.*

*Lib. de sang.  
mittendi ratio  
ne. cap. 6.*

*plenitudo quod  
ad vires non  
seper tollitur  
sectione venæ.*

valebimus; nec hinc virium labefactatio timenda est, nec per hoc in interna trāsitus pestilentis affectus tradetur. immo hinc vires exonerata natura, nec admissa aliqua spirituum resolutione, validiores factæ corpus exuberanti materia leuius redditum, superfluitatibusq; inedia exsiccatum facile regent, ab omniq; iniuria externa idē tuebuntur; quod est id forsā, quod dicebat Galenus, docens corpora humida exsiccanda esse, taliq; via à pestilenti posse præseruari febre. nam talis plethora potius habet rationem excrementosæ abundantia, quàm plenitudinis optimi sanguinis. Qui autem docuere secandam esse venam, abundante sanguine, vel errarunt, si loquuti sunt de hac plenitudine: vel superflui fuere, si de simplici abundantia boni sanguinis sermonē habuerunt; tum quoniam ab hac febris pestilens non impendet, tum quoniam bonum est in hominibus sanguine abundare, cum ab hoc præcipuè vita, & eius dependeat conseruatio. Qui si redundet adeò, vt vasa destendat, factaq; sit ab eò plenitudo quò ad vasa, licet hac soluenda sit venæ sectione, tamen non est casus noster; quia hinc non febris pestilens, sed vasorū diruptio, caloris natui extinctio, & inopinata, ac repentina mors subsequi solet. Quamuis autem sub cælo pestilenti plethora quò ad vires venæ sectione tollenda non sit, tamen considerantes ipsius causas aliquando aliquas adinittimus sanguinis minutiones; si enim non ratione victus tantum, sed etiam ratione, qua aliqua consueta sanguinis euacuatio cohibita fuerit, incidat hæc plenitudo, ultra præscriptam viuendi rationem adhibitam, quæcunq; sit illa solita euacuatio, prouocetur. Vnde si mulieribus hoc ratione suppressionis mensium eueniat, laudo inferiorum venarum sectionem, quæ cum non ita spiritus, vt in cubito, exhauriat, potest absque impendente discrimine simul leuare naturam, mensesq; proritare. quod idem assero in his, quibus hæmorrhoidum consueta excretio retenta fuerit. nam his prouocandæ sunt; cuiuscemodi etiā in his, qui per

*A plenitudine  
boni sanguinis  
non impendet  
feb. pestilens.*

*Plenitudo quò  
ad vires sub  
pestilenti cælo  
quando sit tollenda  
sanguinis  
uisione.*

interualla,

interualla, & maximè florenti ætate sanguinis per nâres fluxum patiuntur, idem agendum esse confirmo. ad quas tamen euacuationes non præexistente cōsuetudine nunquam absque noua, & instante indicatōne descenderem: Caco-  
chymia succedit tollenda, quæ duplicem habet differentiā, nam aliquando quantitate, aliquando qualitate humores peccant. quantitate, cum supra alios, vel supra consuetam naturæ portionem redundant. qualitate cum in proprio temperamento excedunt, vel in propria substantia peccant. Vtrisque debetur purgatio, & cum hoc discrimine, quod in illa sat est primo periculum, & fluidum reddere corpus, sed in hac ultra hoc, & consemperandi sunt humores, eorumq; substantia moderanda, postea purgandum est; concocta enim euacuare, fluidaq; ante expurgationem corpora facere oportet. Quæ autem debeant esse ista, quæ in vsum tum pro concoctione, tum pro eductione veniunt, indicabunt humores peccantes, quorum singuli habent propria medicamenta. hæc autem cum hac consideratione exhibenda erunt, vt præcipuè ita concoquentia in vsum veniant, quæ putredini, & corruptioni resistere queant, vt in bile acetosa, citri succus. in pituita scordeum, dictamus albus. in melancholia fumaria, borago, & consimilia alia, quæ simul cum his, quæ bezeartica habeant facultatem, permiscenda erunt. Pharmacum autem exhibendum indicabit & humoris species, & qualitas, & locus, ubi infederit. ab humoris specie habebimus, quod medicamentum assumendum sit, videlicet, an quod bilem, an quod pituitam, an quod melancholiam educat. à qualitate habebimus, an debeat esse id, quod humores tenues, vel id, quod crassos euacuet, à loco autem, an id quod à remotis, an id, quod à proximis ducat locis, & an validius, vel imbecillius esse debeat. in qua tamē exhibitione hoc animaduertito, quod leuia potius, quàm graua, & ea, quæ nullam habent deleteriam, & prauam, malignamue qualitatem semper eligantur pharmaca; immo cū his aliqua bezeartica, & quæ vim

*Cacochymia,  
ex qua imminet  
febris pestilens  
quomodo tollenda  
sit.*

*Utrum sit  
periculum  
in illa*

*Utrum sit  
periculum  
in illa*

propulsandi prauam qualitatem habeant, nunquam non sunt permiscenda, ne ex euacuatione vlla subsequatur iactura. facta autem humoris peccantis educatione, aliqua exhibeantur antidoti ad riuendandam corporis molem cum hac consideratione, vt pro ratione habitus, complexionis, ætatis, regionis, & loci conueniant; nam non omnia omni tempore, & loco congruunt. calidiores enim antidoti nec in media ætate, nec in regione calidiori, nec loco soli expósito, nec temperatura, & habitui eiusdem qualitatis sunt commoda, quare summa cum animaduersione hæc petra æstetur, & exhibeantur, vide modò simplicia, modò temperata, modò diuersimodè preparata, & composita, non autem vnico semper, eodèq; pacto admittantur. Obstructiones, quæ inter causas internas tertio loco enumeratæ sunt, veniunt considerandæ non tanquam præsentēs, sed tanquam futuræ. vbi enim præsentēs sunt, obstructiones, si non pestilēs, saltem vulgaris subsequitur febris, pro rationeq; obstructionis, & materiæ contentæ modò huius generis, modò illius gignitur, si enim obstructiones prauæ, & materia contenta fuerit suavis, excitatur vel diaria, vel synocha sine putredine, quod si oppositum contingat, videlicet, quòd obstructiones sint validiores, & materia contenta ignea, & acris, fumosa, vel fuliginosa, putrida succedit febris. Vnum tamen casum excipio, scilicet cum sanguis optimus abundat nullo inquinatus humore superfluo, corpusq; leuiter sit obstructum, inquieteq; degat, nam in talibus non febris, sed plethorica superuenit dispositio, remanentibus his, quæ exercitati excerni oportebat: hoc. n. excepto casu obstructionibus præsentibus semper febris subsequitur, quare cū intēdamus corpora sana, & non morbida, præseruare, iure dictū est has obstructiones a nobis non tanquam præsentēs, sed tanquam futuras considerandas esse. Si autem vt futuræ considerari debeant, ab earum causis indicationes remouendi eas desumendæ sunt. Causæ autē obstructionum tres sunt, scilicet

animi morbi  
- humi duo x3  
- iudicij iudicij  
- morbi morbi  
- morbi morbi

*Obstructiones  
quomodo tollē  
de sunt sub pe  
stilentī cælo.*

*Lib. de caus.  
morb. cap. 3.*

scilicet multitudo, crassities, & lentor humorum peccantium. quare si futuras obstructions impedire voluerimus, causas has submovere conabimur. multitudo, quibus tolli debeat, ex præcedentibus habetur crassities incidentibus, & aperiētibus; lentor autē obstergentibus reſolvatur. quæ autem illa sint, non recuseo; quoniā hæc, & similia artem hanc cū ratione exercenti patere debent, pluriūq; horum est syllogis, à quibus selecta accipere debemus; caventes semper, ne ea, quæ pravi odoris, maleque qualitatē sint, in hūc vsum veniant; sed ea, quæ magis suavia, magis domestica, & magis familiaria, & quorum natura benignior est, & nostræ acōmoda, accipienda sunt; quoniā præſervationem tentantes nec hominē conturbare, nec ei ullam noxā inferre debemus, sed victu, & medicamentis facilioribus hoc agentes periculum, & patens reddere corpus totum debemus, ut inde omnis excrementorum moles facilè excludi, & exterminari queat. & hæc de præſervatione à pestilenti febre sufficiant. De præcustodia autē, quam alijs debemus, vbi novērīmus quempīū tali febre extinctum fuisse, pauca erunt dicenda; cum ea, quæ dicta sunt pro præſervatione, in utilitatem huius partis assumi possint. quibus hoc vnum tantū addatur, quod si contagij non fuerit suspicio, nec celum sit vllō pestilenti affectu inquinatū, sat erit omnia mūda reddere, ac si contagij, vel aeris pestilētis suspicio vlla aderit, vestes, linteamina, ceteraq; suppellectilia, quæ in vsum egrotantis venerunt, euitentur, ventis Aquiloniis exponantur, fluenti aqua depurētur, liquoribus odoratis irrorentur, sub dio locētur, baculis agitētur, igne odorato suffumigentur. & si valida fuerit suspicio, vel lint res, quæ supradictas præparationes, & expurgationes nō admittant, comburantur, altātes, & ministri in locis separatis secludantur, & à pestilenti febre antidotis muniātur, domus expurgētur, cubiculi emundētur, tandēq; omnia pestis inquinamēta discutiātur, ac dissipentur, ita in columas, & intacti ceteri homines ab hac lre cōservabuntur.

*Præcustodia,  
qua alijs debetur,  
vbi quis  
feb. pestilenti  
sit mortuus.*

*Summ. lib. 7  
209  
103*



*De Curatione febris pestilentis, Et an in eâ sit secunda  
venæ. Cap. XXI.*

**H**is de præseruatione, & de præcustodia explicatis, tã-  
dem ad ipsam curationem, in cuius gratiam ferè om-  
nia prædicta enarrata sunt, descendamus. Febris hæc du-  
pliciter euenire consuevit, aliàs sub cælo pestilenti, & hæc  
habet causam præcedentem connexam, aliàs sub cælo salu-  
bri, & hæc habet tantum causam internam. communicant  
hæ in eodem; quoniam in vtrisque ultra putredinem adest ve-  
nenata, & perniciofa qualitas, quæ earum proprius est cha-  
racterisimus, per quam ab alijs hæ differunt putridis feбри-  
bus; sed ab inuicem in hoc distant, quòd praua hæ quali-  
tas, quæ à corruptis humoribus pendet, in primis à causa  
externa, in secundis ab interna procedit; corruptio enim hu-  
morum, à qua ista pernicies emanat, sub pestilenti coelo ab  
infecto aere solum in ipsos humores introducitur. at in his,  
quæ sub coelo salubri contingunt, labes ipsa non ab aere,  
nec à causa externa, vbi hoc contagij ratione nõ contingat,  
sed ab intima humorum ipsorum prauitate dependet. qua-  
re vnica erit, eademq; ambarum essentia, & per consequens  
vnica, eademq; curatio, cum hac tamen distinctione, quòd  
in pestilenti aeris statu, quantum poterimus, aeris prauita-  
ti, & seiciei erit resistendũ, vt prauæ qualitatis tum efficien-  
tem, tam conseruantem tollamus causam: quoniam autem  
de hoc satis, superq; abundè actum est, dum de præseruatio-  
ne ageremus, illuc recurratur, vt huic indicationi satisfaciamus,  
descendamusq; ad ponendam, declarandamq; cura-  
tionem. In hac febre ultra intemperiem calidam, & siccam,  
omnibus febribus communem, sunt duo præcipua; alterum  
est perniciofa, & praua qualitas, alterum est putredo, qui-  
bus positis hæ indicationes erunt desumendæ, quæ febris,  
est refrigerandum, & humectandum, quæ venenata adest  
qualitas, remittenda proprijs antidotis, & superada est, quæ  
putredo

*Febris pestilẽ-  
tis intentiones  
curatiua.*

putredo inest, & putredo hæc in materia corrupta fundatur quod in totum putruit, est euacuandum, quod nondum confirmatum est putridum, est exsiccandum, & alterandum, & temperandum: quoniam autem putredo hæc ab obstructione vel causatur, vel fouetur, ideo hæc tollenda. Et quoniam obstructionis causa est, vel plenitudo, vel crassities, vel lentor humorum; ideo materia minoranda est quâ multa, attenuanda quâ crassa, abitergenda quâ lenta. His habitis indicationibus, quo ordine omnia exequi debeamus, rectè consideranti patere potest. cū enim via resolutiua omnes inuentæ sint, à quibus ordiendum, & progrediendum sit, innotescet: sed ut rem ipsam clarè, & breuiter exponamus, rectè agemus, si ita ordinatè in explicandis indicationibus procedemus, videlicet, ut primò minoranda sit materia, secundò exobstruendum, tertio alterandum, exsiccandum, temperandum, & euacuandum, vltimò erit refrigerandum; & humectandum. His indicationibus an arte possimus satisfacere, vel non, & an egrotantes saluari, vel nō saluari debeant, licet auctorum morborū, (inter quos connumeretur & febris pestilens, quæ licet ex longis, ut experientia multoties, ut quæ Hippocrates testati sunt, esse possit, tamen ut plurimū est acuta, & aliquādo acutissima existit) nō ita certæ sint prænunciationes aut salutis, aut mortis, poterit tamen in his Medicus faciliè futurum euentum præagere; cum enim hi morbi huiusce sint naturæ, ut plurimi ex his male terminentur, plurimosq; perdant; tamen si rectissimè à prudētī artifice tractentur, ideo mortem potius, quàm salutem prognosticando ex hisce febribus semper malum prænunciare debet, potissimū vbi nouerit perniciosam qualitatem præualere, corruptionemq; ac putredinem esse in signem. rarò enim in consimili casu salus consequi consuevit, cum vires hinc succumbere, non resistere queant. Si tamen venenata illa qualitas non ita valida, nec putredo ei connexa intensa sit, profectò si prudens, exercitatusq; & nō dormi-

*Prognosticum*

*Lib. 2. aph. 19*

*Lib. 3. Epid.  
pos. 3. 64. &  
65.*

*Indicationes eu  
rativæ in feb.  
pestilenti qua  
via exequen  
da.*

dormitans sit Medicus, salutem quoquo pacto præfagire debet, cum hinc non obruantur vires, sed adhuc possint resistere, morbumq; forsitan facile, cum ab arte opportunum subsequetur auxilium, superare. Vbi autem remissa erit venenata qualitas, at putredo insignis: vel ex aduerso vbi intensa erit qualitas perniciofa, at putredo remissa, erunt quidē omnes hi casus lethales, non tamen in periculo pares; temper enim à qualitate venenata maius, quàm à putredine, impendet discrimen. In his tamen omnibus & vires omnes, potissimum vitales, & ægrotantis habitus, & victus præcedens, & anni tempus, & aeris constitutio, & regio, & an vagentur tales morbi, & quo pacto vt plurimū terminari consueverit, & similia omnia consideranda sunt: vt omnibus his ante oculos positis, facilius possit Medicus vel certam salutem, vel certam mortem, quantum fieri poterit, prognosticari, dixi, quātum fieri potest; quoniam in hisce morbis aliquādo fiunt subitæ mutationes, vel propter subitam permutationem in iudicatione factam, vel quia noxius humor à loco nobili ad ignobilem, vel ab ignobili ad nobilem subito transfertur. Qui duo casus solent Medicum prognosticantem mendacem reddere, statumq; morbi in contrariam dispositionem permutare. ex quo apparet in talibus morbis certas non esse prænunciationes, & maximè quæ sunt salutis, cum hic sit incertus motus, & hi morbi vt plurimum in perniciem ægrotantium terminare soleant. & hæc de prognostico. quo posito superest, vt quibus remediis indicationibus prædictis satisfaciendum sit, enarremus. Prima erat indicatio minoratio materiæ, hanc duplici via possumus tentare; altera est sectio venæ, altera est pharmacia, de vtraq; sermonem habeamus; quoniam de vtraq; maximæ instant difficultates. Incipiens à sectione venę inuenio duas sententias ex toto oppositas. Communiter medicinam facientes docent omnes secandam esse venam, his rationibus innixi, videlicet, quoniam huiuscemodi febris est ex genere putrida

*Minorationi  
materiæ qua  
vix sati facit  
dum in feb. pe  
silenti.*

*Venæ sectio an  
cōueniat in fe  
bre pestilenti.*

fum; quoniam hæc morbus est magnus; quoniam cum hac  
 obstructiones adduntur, quoniam cum hac febre sæpe con-  
 citantur phlegmones, & tumores tum interni, tum externi;  
 quoniam ex his plurimæ sunt ardentes, si non exterius, inte-  
 rius saltem, in quibus omnibus casibus ex Galeni sententia  
 semper secanda est vena. quibus rationibus addunt Aui-  
 cennæ non spernendam auctoritatem, qui sequutus Aetiū,  
 Paulum, & Ruffum Ephesium monuit in hisce febribus se-  
 ctionem venæ conuenire, & plurimum prodesse posse. In  
 opposita sententia sunt celeberrimi viri, qui artis nostræ  
 studia tum docendo, tum scribendo illustrarunt, hi conside-  
 rantes formam specificam huius febris, eiusdemq; vltimam  
 differentiam, per quam in esse pestilentiali constituitur, nil  
 aliud esse, quàm venenatam qualitatem, qua vitales faculta-  
 tes summoperè labefactantur, & malè simul alteratis, & dis-  
 sipatis ab ea spiritibus, cordeq; in omnibus malè affecto, ar-  
 bitrantur febrem hanc solis antidotis debere tolli, nō autem  
 venæ sectione, vt pote remedio, quod vires deijcere, non  
 autem perniciosam illā qualitatem vllō pacto domare pos-  
 sit; immo sicuti veneno assumpto, dicunt, si venam secueris,  
 non solum nec secundum rationem, nec rectè feceris; qui-  
 nimò omnes sic agendo perimes, cum in ebibitis venenis se-  
 ctio venæ præsentaneam afferat mortem (quod animaduer-  
 rant hi, qui hausti veneni suspicionē habent) ita in febre ista,  
 cum eius essentia in venenata qualitate consistat, nihil dete-  
 rius sectione venæ administrari poterit, quæ (addatur &  
 hæc ratio) cum sanguinem omnium humorum benigniorē  
 partem educat, nec venenatam qualitatem vllō modo tem-  
 peret, est in causa, vt perniciosa hæc labes commoto, & im-  
 minuto sanguine magis concitetur, ferociaq; maiori inuale-  
 scat; cui sententiæ adstipulatur & testimonium eorū, qui  
 artem Medicam annis illis celeberrimis millesimo quingen-  
 tesimo octauo, & vigesimo nono profitebantur. hi enim as-  
 seruerunt omnes eos, quibus secta erat vena, interiisse, in-  
 deq;

*Veneno assum-  
 pto secta vena  
 patientes sol-  
 lis.*

deq; adeò infamatum fuisse hoc auxilium; vt etiam ægri è admitteretur in his, qui pestilenti morbo non laborarent. Ad dunt hi supream rationem dicentes, vltra magnitudinem morbi requiritur & viriù fortitudo ad indicandam venę sectionem; at in febre pestilenti vix virtus valida esse potest, vt quę ratione venenatę qualitatis. si non succubuerit, saltē labatur; nam solent pestilentes morbi virtutē celerrimē euertere. in qua virium labefactione iure venę sectio excludenda venit, solq; antidoti admittendę erunt. Neutra horum sententia, meo iudicio, rata est. Vltimi, qui solis alexipharmacis in curatione huius febris procedendum esse iudicarunt, solā perniciosam qualitatem attendunt, putredinem autem nihil pendunt: cuius tamen in talibus casibus maxima est habenda ratio, nisi enim hanc tollas, nec curari febris, quę est putrida, poterit. hanc autem vix curare queas, nisi multitudinē, quę & obstructiones causat, vel fouet, & quę naturę grauis est, minuas. quare antidotos quidem exhibebimus ad remittendam prauam illam, & perniciosam labem, tamen tollendę etiam putredini incumbemus. cuius causam remouere conabimur, dum euentationem exonerata naturā, & immixta materia tentabimus. Eorum autem sententia, qui in pestilenti febre venę sectionem admiserunt, & laudauerunt, vereor, ne in perniciem humani generis inuecta fuerit. Vltra enim testimonia celeberrimorum virorum, qui sectionem venę nocuā in hisce morbis se expertos esse monuerunt, etiā ratio ipsa dicat, ab ea in hisce febribus abstinendum esse. licet. n. febris hæc sit putrida, morbusq; sit magnus, cui coniectantur obstructiones, & phlegmones vel interni, vel externi; & consueuerit sæpius esse ex ardentibus, quę omnia venę sectione iuuantur, & ideo hac ratione videatur indicationem haberi mittendis sanguinis: tamen cum ex venenata, & praua qualitate vires in hac febre succumbant, nullo modo est admittenda. quid enim prodesse potest venę sectio, quę spiritus subito, & affatim exhaurit, indeq; vires deiecit.

vbi vires ipsæ vel sunt, vel futuræ sunt debiles: hoc semper docuit Galenus nunquam labantibus viribus secandam esse venam, & miror ego de excellentissimis viris, qui supponunt in febribus pestiferis quàm primum vires deijci; quoniam venenum huius materiæ totum cordis temperamentum destruat, & tamen hi postea doceant in iisdem secandam esse venam. Quod idem dum hi adstruere nituntur ex Hippocrate, qui in omni vehemente morbo detrahendū sanguinem docuit, indicatione à magnitudine morbi sumpta, monent, cū hic sit morbus cacoæthe, & ideo magnus, in huiusce generis febribus mittendum sanguinem esse. Nec tamen hi animaduertunt sub sententia ab Hippocrate in curatione acutorum morborum posita, per quam habet, secandam esse venam, vbi morbus vehemens fuerit, florueritq; ægrotantis ætas, & virium adfuerit robur, non includi pestilentes affectus, quos in principio suæ tractationis ab acutis morbis, quorum victus rationem, & curationem ipse ducturus erat, excluserat, & distinxerat, tãquam eos, quos sub eodem examine, & docendi forma non erat comprehensurus. Quos etiam ita à propria consideratione, & contemplatione, dum normam sectionis venæ traderet, exclusit Galenus, vt nusquam de eis minimum fuerit verbum. Vnde licet hæc febris sit morbus cacoæthe, & ideo magnus, nō tamen venæ sectionem admittit secundum Hippocratis, & Galeni principia; qui ambo, licet in cæteris morbis, qui sunt cacoæthe, venam secandam esse moneant, nunquam tamē sub norma secandæ venæ affectus pestilentes admiserunt; nec eorum in tali contemplatione meminerunt, & hoc non ex negligentia, aut ex obliuione, sed ex proposito, & maxima cum ratione fecerunt. cum enim huiuscemodi febris ex sui natura vitalem virtutem labefacitet, cordisq; temperamentum facilè evertat, ad indicendam autem venæ sectionem viriū robur adesse requiratur, certa ratione tale morborum genus silentio (dum morbos, in quibus venæ sectionis conueniat, docerent) prætereundum duxerunt; licet

*Lib. 4. de ratione vict. i acut. 19.*

*Pestilentes affectus nō veniunt sub regulis secandæ venæ traditis ab Hipp. & Gal.*

*Lib. p. de ratione vict. i acut. 9.*

L. enim



enim hic fit cacoæthe, & ideo magnus, tamen ratione viriū, quæ ab eo labefactari, & disperdi apte sunt, nullatenus venę sectionem admittit. Quare cum sub hac vniuersali positione hi affectus non comprehendantur, & vires in hac febre labare debeant, nec in eadem secanda erit vena. At, dicent hi, in principijs harum ægritudinum, dum morbus nondum acutus est, nec praua illa qualitas in totum suas deprompsit facultates, vires cōstant, tuncq; his constantibus, nundumq; deiectis, secanda erit vena, iuxta dogma illud antiquum Hippocratis. Cum morbi inchoant, si quid mouendum, moue. quare cum à morbo, cum magnus sit, indicationem sectionis venę habeamus, nec vires contra indicent, cum nec deiectæ, nec labefactatæ in principio febris sint, hanc iure admittere debemus. Sed dictum istud fallax est, & erroris plenum; quoniam præterquam quod regula hæc vniuersalis de indicatione venę sumpta à magnitudine morbi non includat pestilentes affectus, vt explicatum est, etiam ad indicandam sectionem venæ non tantum præsentēs, sed etiam futurę validæ vires concurrere debent. nam sicut in secanda vena non tantum magnitudinem præsentis morbi, sed & futuri, ac imminentis considerabat Galenus, eorumq; scilicet præsentis, & imminentis eandem habens rationem ab vtriusq; indicationem sectionis venę sumebat; similiter in sectione venę non solum quales sint præsentēs, sed & quales sint futuræ vires, perpendendum est; ita vt cum ad hanc actionem vires requirantur validę, non tantum quod præsentēs sint tales, sed & quod futuræ similes esse debeant, præuidendum est. Vnde in hydropo, in diabete, in henteria, in atrophia, & alijs etiam similibus affectibus licet hi sint morbi magni, viresq; consistent; quoniam tamen dubitatur de futura debilitate; ideo nullus auctor in curatione horū de hac meminit. hoc autem cum nō sit dubium in pestilenti febre, sed certum, quod vires labefactabuntur, debilesq; reddentur, ad quid tentare venę sectionem, quam vires debiles, certō subsequuturæ sunt?

Et

lib. 2. apb. 29  
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

Lib. 2. apb. 29

In indicatione  
 sectionis venæ  
 non tantum vi-  
 riū præsentia  
 habenda est  
 ratio, sed etiā fu-  
 turarum.

Lib. ij. Meth.  
 cap. 14.

Et si Galenus sub calidissimo celo, & in regione estuosa, & corpore laxo, & molli, & pingui, & albo, & graciliū venarum, morbo existente magno, & viribus constantibus prohibet, & abominatur sectionem venæ; quoniam dubitat de futura virium debilitate. & si idem, hanc virium imbecillitatem reformidās in magnis æstibus à sectione venę abstinet, abstinendumq; esse docet, etiam si morbus sit magnus, florensque etate sit eger, & vires simul consent, cur eundem in pestilenti febre audebimus nos procurare, in qua certi sumus de futuro virium languore? quare non est mirū, si Galenus in libro de cibis boni, & mali succi audaces eos vocat medicos, qui audebant in pestiferis illis febribus venam secare. nec mirum etiam sit, si idem Galenus, qui sæpius (obiter tamen, & non ex proposito) de pestilenti febre loquutus est, de eadem sermonem habens nunquam meminerit sectionis venę; quoniam placitis Hippocratis additus, proprijsque fundamentis innitens, cum nosset huic febrium generi virium imbecillitatem copulari, nec sectionē venę in harum curatione proponere, nec eam admittentes laudare poterat. cuius sectionis venę in hac febre si vquam meminisse debuisset, hoc fuerat, dum quali ex professo præseruationem huiuscē morbi doceret; cum ipse explicans in proprio libro rationem curandi per sanguinis missionem, monuisset ex Hippocrate eandem haberi rationem præsentis, & imminentis magni morbi, ac tradidisset quacunq; morbis præsentibus rectē peraguntur, aut incipientibus, aut imminentibus præuertenda, ac exequenda esse; quod cum non egerit, eiusque nec verbum in præseruatione pestilentis febris fecerit, firmum sit argumētum, ipsum hoc eandem esse in curatione admittendam censuisse. At instabunt hi ex sententia Galeni in historia Critonis in Thasō habitātis exposita, per quā innuere clarissimē videtur Galenus in pestilentibus morbis à principio secandā esse venā, dicēns non mirandū esse, si in Critone Hippocrates nō secuit venam; scias enim (inquit) ad plurimos eum, quos descij-

Lib. 4. de ratione vitz. in com. 19.

Lib. p. de diff. feb. cap. 4.

Lib. de cur. ratione per sang. miss. cap. 9.

Lib. p. Epid. sect. 3. com. 25.

plurimæ ægrotantes, morbo iam progresso, accersitum esse. per quæ verba clarè docet, quòd si ipse, vel Hippocrates in principio morbi adfuisse, venam illi secuisset: cuius ratione monent hi, nunquam à Medico cogitandum esse de sanguinis missione; quoniam timent virium languorem, ni si in principio morbi vocentur, tuncq; hanc administrandam esse, quamquam magna adsit in ægrotante prauitas humorum, à qua coniiciunt morbum pestilentem esse. Credo ego (parcant mihi hi celeberrimi Viri, quibus omnibus tam mortuis, quam viuentibus in hanc sententiam consentientibus lubentissimè, & iure cedo) hos in hac Galeni sententia hallucinatos fuisse, hocq; duplici de causa. primò quia arbitrati sunt Critonem, & omnes ægrotantes, qui cum ipso in eodem cathalogo descripti sunt, sub pestilenti ægrotasse constitutione. Secundò quia iudicarunt Critonem ipsum à pestilenti morbo detentum fuisse. quorum vtrunq; mea sententia falsum est, vt nunc clarissimè demonstrare conabor. Omnes ægri, quorum historiæ cum Critonis morbo enumeratæ sunt, in Thaso sub tempestate tertia ab Hippocrate descripta, laborauerunt, quod ex pluribus clarè apparet. primò quidem, cum in communi tempestatibus enarratione explicaret, quæ febribus ardentibus accidebant, dicebat, quòd quibus ritè, & largiter sanguis per nares erupisset, hi maximè omnium seruabantur. quod exemplo patuit Metonis. quibus autè stillauerit quarto, & quinto die, mortuos esse, in cuius testimonio præcipuè affert Philisci exemplum, cuius historia prima in ordine est enarrata, in qua hoc potissimum habetur, quòd quinto die ei stillauit sanguis è naribus, sexto autem mortuus est. dicebat etiam, quòd quibus sanguis non profluxerat, sed tubercula post aures apparuerunt, & non suppurauerunt, his in coxam grauitas decubuerat. cui simile in Clazomenio videri potest, in quo non fluente sanguine, & apparentibus tuberculis post aures, & non suppurantibus, coxæ dolor vehemens subsequutus est. subiungebat mulieres non ita, vt viros ea

*Crito, de quo  
Epid. an sub  
pestilenti con-  
stitutioni libe-  
rauerit.*

*ib. p. Epid.  
sect. 2. com.  
63.*

*Lib. p. sect. 3.  
tex. 23.*

*Lib. p. Epid.  
sect. 3. tex. 17*

*Lib. p. Epid.  
sect. 2. tex. 67*

*Lib. p. Epid.  
sect. 3. tex. 26*

*Lib. p. Epid.  
sect. 2. tex. 68*

*Lib. p. Epid.  
sect. 3. tex. 30*

constitu-

constitutione periclitari, ut Melidæ contigit, tamen vtero gerentes à partu in ægritudinem incidisse, quæ potissimum moriebantur: quod clare patuit ex historia tui uxoris Philini, tum uxoris Droimedæ, in quibus licet purgationes ritè processissent, & reliqua, quæ a puerperio requiruntur, rectè habuissent, tamen ardentiū febrium, quæ tunc vagabantur, violentia extinctæ fuerunt. Explicans etiam signa, quibus præcipuè egrotantes seruabantur, vltra sanguinis narium fluxum, de quo iam dictum est, addebatur eos, qui per ventrē turbida, & biliosa excreuissent, vel qui in dysenteriam incidissent, seruari. quod Clazonénio, qui iuxta Phrinichidæ puteum decumbebatur, contigit; hic enim saluatus est ex alui fluxione, qualis dysentericis euenire solet; pluraq; alia sunt, quorum particularis historia communi correspondet enarrationi, quæ, nè longior sim in re clara, prudens prætereo: liquet igitur egrotantes hos vnà cum Critone de scriptosea tempestate ægrotasse, quæ tertia in Thaso ab Hippocrate describitur: hoc autem habito, clare apparet hos ægros sub pestilenti cœlo non laborasse, cum enim tē pestas illa statum habuerit frigidum, & siccum, & ex parte inæqualem, indicium est certum nec potuisse esse pestilentē, hæc enim aeris constitutio licet morbos vulgares, non tamē pestilentes edere potest. Quod etiam tempestas illa nō fuerit pestilens, Hippocratis verba euidenter demonstrant, eum enim dixerit ea tempestate vulgasse ardentes febres, dicebat, vere, & astate plurimos hac febre laborantes super stites fuisse, quod non conuenit Epidemiis pestilentibus, solo autem autumnō plurimos perisse, ab æquinoctio verō usque ad Virgilias, & sub hiemem multos obiisse, testatur, cum tamen hæc multos, nec plurimos solum in pestilenti aeris statu, sed egrotantium maiorem partem mortem oppetere conueniat, præterea his febribus ardentibus, & phrenitide laborare, & periclitari non omnes asseuerabat, sed eos tantum, qui ætatis calidioris essent, ac naturæ, quæ dis-

Lib. p. sect. 3.  
tex. 20. et 27

Lib. p. Epid.  
sect. 2. tex. 79

Lib. p. Epid.  
sect. 3. tex. 26

Lib. p. Epid.  
sect. 2. tex. 68

Lib. p. Epid.  
sect. 2. tex. 68

Tex. 61.

Tex. 73.

Tex. 78.

facilem haberet habitus digestionem, & pestilens constitutio non unicā ætatem, nec unicā naturam, licet hanc facilius, quā illam, omnes tamen aggreditur. Quare hinc pateat tempestatem hanc pestilentem non fuisse, & ideo nec agrotantes illos ratione constitutionis aeris pestilentibus laborasse affectibus. Hoc explicato, perscrutemur, an Crito pestifero morbo detentus fuerit. quod non ex aere ambiente tali morbo potuerit laborare, ex præcedentibus satis liquet, quare cum ratione causæ externæ hoc non potuerit fieri, videamus, an ratione causæ internæ, videri licet ratione humorum propriorum, hoc factum fuerit. Affirmat hi morbum Critonis pestilentem fuisse, si non aeris merito, saltem humorum ratione ad intra corpus existentium; ducti verbis Galeni asserentis magnam in eis prauitatem fuisse, ratione cuius furiosa insania excitata est; prauitatis autem indicium existisse, quod pustulae nigrae statim in eo apparuissent. à qua prauitate arguunt; & concludunt morbum hunc fuisse pestilentem; At non hæc, sed opposita sententia à me probatur; quoniam si perpendamus Hippocratis historiam, & Galeni expositionem, duo tantum in Critone inuenimus, alterum materiæ copiam, alterum prauitatem. quod à copia materiæ affectus pestilens non causetur, liquet; quoniā si hoc esset, omnis morbus à multitudine, & copia pestilens esset, quod rationi, & sensui contradicit. Hoc idem de prauitate materiæ affirmo; si enim prauitas materiæ sufficiens causa esset ad constituendum pestilentem affectum, omnes morbi à bile atra, ab æruginosa, ab Isarode, à pituita salsa, & similibus prauis succis pendentes pestilentes essent: quod tamen sicut falsum est, ita nulla ratione, nullaq; antiquorum autoritate comprobari potest. prauitas quidem succorū vnum est ex his, per quæ disponuntur corpora ad pestilentem morbum, nisi tamen his addatur corruptio, quam superius satis, superq; abundè demonstrauimus necessariò concurrere in constituendo pestilenti affectu, nō potest illa ma-

la, &amp;

*Crito an pesti-  
lenti morbo la-  
borauerit.*

*Lib. p. Epid.*

*sect. 3, com. 25*

*Lib. p. Epid.*

*sect. 3, com. 25*

*Lib. p. Epid.*

*sect. 3, com. 25*

*Præuitas ma-  
teriæ an sit in-  
diciū sufficiens  
pestilentis mor-  
bi.*

la, & pernicioſa qualitas, per quā ab alijs ſpecificantur peſtil-  
lentes morbi, ex illo ſucco emanare. Vnde cum in Critone  
corruptionē prauorū humorū nullo pacto conijcere valea-  
mus, nō poſſumus nō negare, quōd peſtilēti morbo affectus  
non fuerit. fateor tū in hoc agrotate prauitatem inſignem fuiſſe,  
copiamq; humorū maximā. humores hi erant duplices, alter  
bilis acris, & mordax; mēra n. erat, & copioſe per aluū excre-  
ta fuit; alter erat bilis atra, quā natura cū ad crus deriuare  
molita eſſet, idq; membrū omnē humoris molem capere nō  
potuiſſet, reſiduū recurrens ad caput aſcendit; vnde duo cō-  
ſequuta ſunt, ſcilicet puſtula nigra, & inſania furioſa, & hoc  
iure, vt moriebāt Galenus, explicans Hippocratis locum do-  
centis, quæ in medicationibus educere oporteat, vbi decla-  
rabat ab atra bile fieri puſtulas nigras, & deliria; cui ira, te-  
meritas, atque inſanitas coniunguntur. Cum autem hi  
duo humores in Critone quātitate ſuperabūdantes, & qua-  
litate prauitate inſignes in principio morbi ita violenter cō-  
moti fuerint, vt deiectiones plures mēra, & bilioſa deſcen-  
dere; factuſq; fuerit in crure vſque ad talum abſceſſus à  
materia, cuius portio ad partes ſuperiores. recurrēs cerebrū  
occupauit, ita vt ſiſtul & ad ſuperiora, & ad inferiora mate-  
ria cōmoueretur, nō mirū, ſi celeri morte præuentus fuerit.  
in Critone. n. decretoria; nō decernētia, cū ſymptomata, &  
ſigna lethalia (vt puſtula nigra, & inſania furioſa) his anne-  
xa eſſent, lethalia exiſtētia, iuxta Hippocratis dogmata, mor-  
tem inſtare portendebant. qui etiam docebat, cruda, & in-  
cocta, atque in malos abſceſſus conuerſa, mortem aliquan-  
do indicare, vt factum eſt in caſu iſto, qui conſimilis eſt, &  
conformatur alteri eiſdē ſententiæ aſſerentis; Morbis qui-  
buſlibet incipientibus atra bilis ſiue ſupra exierit, ſiue intra  
lethale eſſe; licet enim in hoc nō exierit atra bilis, vel ſupra  
vel infra, ſupra tamen, & infra commota eſt, & partes ſupe-  
riores, & inferiores occupauit. qua ratione caſus hic ſum-  
mopere lethalis fuit. Mortuus eſt igitur Crito non vi peſti-

Lib. 4. Aph.  
com. 2.

Lib. 2. Epid.  
ſect. prima.

Lib. p. Epid.  
ſect. 2. tex.  
46.

Lib. 4. aph. 22



lentis morbi. Sed ex violentia prauorum succorum quantitate superabundantium cum natura à copia gravata, & à qualitate stimulata eorum tentaret excretionem, dum adhuc crudi, & nullo pacto ab eadem natura domiti essent. quare pateat, Galeni sententiam de sectione venæ in eius historia exponenda positam nullo pacto ad pestilentes posse protrahi febres. Sed quoniam sunt, & duo alia Galeni loca, quæ possent hi ad confirmandam eorum sententiam in medium proferre; ne ullus in hac re supersit scrupulus; ideo & de his duo verba habeamus, veritatemque rei patefaciamus. In historia mulieris, quæ apud Tisamenum decumbebat, dicebat in fine Hippocrates, nec erat remedium locus. per remedium admonet Galenus interpretandam esse venæ sectionem. igitur ubi locus sit, componefacit Galenus sanguinem mittendum esse. Similiter dum Hippocrates in historia Calui Larissei dicebat, nihil remedium est profectum, dubitabat Galenus, an per hæc verba posset coniecere, de tractu ne ei sit sanguis, vel non, cum sub nomine remedii possit dici, Hippocratem, missionem sanguinis appellasse. igitur & in hoc, & in illo agro venæ sectionem admittit Galenus, qui tamen pestilenti morbo laborauerunt, præcipue autem hic secundus, qui constitutioni verè pestilenti adscriptus est. At si rectè hæc loca perpēdamus, videbimus etiam ad rem nostram hæc eadem nihil pertinere. primò de muliere apud Tisamenum decumbente, quis affirmare potest eam pestilenti morbo detentam fuisse? cum nec appareat ex ipso Hippocrate, sub quo cælo ægrotauerit, affectusque, quo de tenta fuit, extiterit Ileus, ex inflammatione, intestinorum genitus, morbus ex sui natura perniciosissimus, ac lethalissimus, tamen si nullus addatur ei pestilens affectus; qui idem morbus etiam est acutissimus, ita ut sæpè eadem die, vel postridie mortem, vel saltè virium omnimodam prostrationem afferat, cuius ratione sepius in eo nec sectioni venæ, nec alteri remedio locus esse potest. De Cal-

Lib. 3. Epid.  
sect. 2. tex. 7.

Calui Larissei

Lib. 3. Epid.  
sect. 3. tex. 78

Caluus Laris-  
seus, de quo 3  
Epid. an labo-  
uerit pestilenti  
morbo, & sub  
pestilenti con-  
stitutione.

Calui Larissei

uo autem illo, sicut & de cæteris post pestilentem constitutionem in eodem catalogo descriptis, qui verba, & ordinem Hippocratis, Galeniq; expositionem rectè confiderauerit, non poterit non affirmare eos sub pestilenti cælo non ægrotasse, nec ex eorum esse numero, qui pestilentia: tempore languerunt, postquam enim Hippocrates communi enarratione & anni constitutionem, & cæli statum, & morbos sublequentes, pestemq; ipsam summo ordine explicasset, ante historias particulariū morborū subiungit hæc verba. De ægris post tempestatē, ex quibus clarè liquet non sub pestilenti cælo, sed post pestilentia ipsam hos omnes, quorū deinde particulares historias explicauit, ægrotasse, quod idem innuens clarè Galenus dicebat, sed cum hos ægros aliud morborum genus tenere, ac commemoratos ab eo in pestilenti constitutione, quod idem confirmare potissimum Anaxionis potest historia inter eas descripta, in qua nullum omnino pestilentis morbi adest, non dicam indiciū, sed nec coniectura. Quapropter miror, cum tam clare loquuri sint & Hippocrates, & Galenus, quomodo inueniunt, qui asserant hos ægros pestiferis morbis ægrotasse, sed magis mirandum est de eo, qui Philisci, Sileni, & Herophontis historias, tanquam exemplaria pestilēis morbi proposuit, cum toto cælo errauerit, indicans hos sub pestilenti cælo; & pestilenti affectu laborasse, cum neutrum horum veritati consonet, ut supra abundè monstratum est. Caluus autem iste, de quo ultimo loco dictum est, non ex pestifero morbo, sed ex affectu consimili ei, vi cuius & Crito extinctus fuit, necatus est; & ideo, ut vnde digressus sum, regrediar, licet in casibus prædictis ex Galeni mente venæ sectio probetur, non tamen hinc concludi potest in pestilēti febre; & in reliquis huiusmodi morbis sanguinis misisionem conuenire, quæ non tantum in expressis prædictis ægrotantibus à Galeno innuitur prodesse potuisse, sed etiā in multis alijs particularibus ægrotantibus, quorū historias enarrauit

lib. 3. Epid.  
 sect. 3. tex. 73

Lib. 3. Epid.  
 sect. 3. tex. 73

Lib. 3. Epid.  
 sect. 3. tex. 81

lib. 3. Epid.  
 sect. 3. tex. 81  
 lib. 3. Epid.  
 sect. 3. tex. 81

Lib. 3. Epid.  
sect. p. com. 3.

Lib. p. de diff.  
feb. cap. 4.

Lib. 3. Epid.  
sect. p. com. 3.

Lib. 3. Epid.

sect. p. com. 3.

Auicenna de  
sectione vene  
expositio, &  
examen.

tauit in Epidemijs Hippocrates, ab eo in expositione egritu-  
dinis Psychionis supponitur patratam fuisse, licet ne verbū  
quidem de ea ynquam fecerit, præterquam in Anaxionis  
historia, in qua ob roruitatem tarditatis sectionis venæ vsq;  
ad octauarū diem de eadem semel tantum sermonem ha-  
buit. Hinc igitur patet Galenum nunquam venæ sectio-  
nis meminisse pro curatione pestilentis febris, sicuti nec in  
præseruatione, quam ferè ex professo docens ne verbum  
quidem de ea habuit. Si autem Auicennas alterius fuit opi-  
nionis .s. vt sanguinis missionem pro cura pestilentis febris  
celebrauerit, non est, q. eius authoritati tantum tribuamus,  
vt rationem ipsam, & veritatem deseramus, & maximè cū  
à Paulo, Actio, & Ruffio hanc sententiam ipse non benè co-  
rum mentem assecutus, desumpserit. qui cum non de cura-  
tione, sicut ipse Auicennas intellexit, sed de præseruatione  
loquerentur, hanc proposuerunt, vnde id, quod ipsi in præ-  
seruando laudauerunt, illi in curando admisit. quæ tamen  
venæ sectio quantum in præseruatione etiam conueniat, su-  
perius explicauimus, multò magis addictus Galeno, & ratio-  
ni, quàm Paulo, & Actio, qui solum antiquorum dicta reci-  
tantes plus authoritatis antiquitati, quàm rationi, cu-  
ius non multum erant solliciti, tribuerunt. Sunt tamen,  
qui Auicennæ, prædictorumquæ authorum sententiam ex-  
ponentes, hancq; de vena in pestilenti febre secanda diffi-  
cultatem enodare tentantes, rem ita explicant. Febres pe-  
stilentes duplici inuadere solent ratione, aliæ ab initio pe-  
stilentes inuadunt, aliæ verò neque pestilentes inuadunt,  
neque vllas initio pestilentie notas secum ferunt, quæ tamè  
pestilentes futuræ sunt. In prioribus omnino propter virium  
sanguorem à venæ sectione abstinendum est. at in posterio-  
ribus, quas non pestilentes noueris, pestilentes tamen fu-  
turas esse suspicaris, vbi & sanguinis sit multitudo, & cæ-  
tera consentiant, constantibus adhuc (quantum febris pu-  
tridæ, sub cuius forma nunc tantum veniunt considerandæ  
huius-

huiusmodi febris ratio postulat) viribus secunda erit venena, cum in harum curatione nullum commodius, vtiliusve praesidium esse videatur sectione venae. hacque intentione, hisq; calibus tantum affectus, Aetii, & Paulum ex Rufo, quos imitatus est Avicenna, in pestilentibus febribus venae sectionem admisisse. Porro sententia haec, quae in duas secta est partes, quod ad primam cum nostrae, ac veritati, quantum mea fert opinio, consentiat, acceptanda erit. quod ad secundam, quoniam discriminis plena est, diligenti examine discutatur. Febres, quae nunc pestilentes invadunt, nec vllas infertio pestilentiae notas secum habent, quas tamen suspicatis futuras esse pestilentes, hoc habent ratione causarum vel externarum, vel intimarum. externae causae sunt contagiū, & coelum pestilens; internae sunt prauitas, & corruptio humorum. ubi hoc contigerit ratione causae externae, si contagium tollas, & ambientis aeris malam corrigas, quantum arte fieri poterit, qualitatem, dico, quod tales febres tantum veniunt curandae, tanquam putidae, non ut pestilentes: alias contagio vagante, & sub coelo pestilenti, quilibet morbus dicendus esset, longe à veritate, & ab experientia, pestilens; sique diligens sit Medicus, & aeger ei obediat, ac caveat ab externis causis, non erit suspicandum de febre pestilenti: si tamē aliqua ratione praedictarum causarum externarum praesentium superesset suspicio, nihilominus curationis huius febris, cum ea non sit pestilens, non coincidet curatione pestilentis febris; & ideo sectio venae, quae in hac competit, non potest dici competere febre pestilenti. Si autem contagium non inhibeatur, nec aeris prauitas corrigatur (quorum ratione immineat certò febris pestilens) dico in hac ratione superuenturi affectus pestilentis non esse (sicuti nec in praeservatione convenire diximus) secundam venam. quoniam ubi periclitandum sit de viribus, talis evacuationo omittenda est. ubi autem haec suspicio contigerit ratione causae internae, quia in febricitante adsint pravi, & corrupti

ob. d. d. d. d. d.  
d. d. d. d. d. d.  
d. d. d. d. d. d.

rupti humores, vel qui iam putruerint, vel qui iam putrescere incipiant, dico hanc febrem non tantum futuram, sed à principio etiam esse pestilentem, licet hoc ab initio non ita pateat. dicoq; in hac Medico, qui acerrimi sit iudicii, qui quæ possit illam febrem certò iudicare, ægrotantem indigere, nè indifferinatim parata remedia eum in mortem præcipitent: censeoq; in hac, perindè ac in priori, non esse secandam venam; si enim in priori non est, quia vires in ea labant, secunda vena, nec in posteriori, quæ verè erit pestilens, & cuius ratione vires labefactabuntur, & succumbet, eadem admittenda erit; non enim tantum, vbi vires languent, sed etiam vbi languidè necessariò futurae sint, venæ sectio excludenda venit, cuius merito Galenus in libro de cibis boni, & mali succi dicebat, nò absq; ratione Medicos tunc temporis in illis pestilentibus affectibus à venæ sectione abstinuisse, quandoquidem vires resolvebantur. si autè huiusmodi febris à principio nec pestilens, nec vlla pestilentie signa secum habere videatur, hoc non alia contingit ratione, nisi quia circa initia omnia imbecilliora apparent, & ideo cum in harum febrium initio totam non deprompserit materia peccans prætam qualitatem, cumq; nondum virtutes concussæ sint, non apparent pestilentes, quæ tamè à Medico præstanti pestilentes iudicari possent. quapropter credo ego hanc sententiam inuectam esse solum in excusationem eorum, qui tales febres à principio non integrè futuras esse pestilentes agnoscunt, indeq; sine ratione sectionem venæ administrant, quas si certò indicarent futuras esse pestilentes, non possum mihi persuadere, eos in eis venæ sectionem administraturos fore. At ultra hæc redarguat hos, & confirmet has febres ab initio esse pestilentes, numeratio dierum in hisce febribus facienda, per quam cognoscent febres has, quas ab initio non pestilentes supponunt, esse à prima invasione pestilentes, cum hæc dierum numeratio certos nos reddat tale genus febrium unicam esse

*Lib. de cib. boni,  
& mali succi  
p. in primo.*

esse egritudinem, & nō duos morbos; & quoniam & crises, & mutationes omnes à prima die numerabūtur. Cum autem afferunt has febres, quæ à principio nullas pestilentiaē notas secum ferunt, aliquando degenerare in pestilentes, vel hoc intelligunt in casu, in quo vnus morbus alteri superuenit: & tunc cum sint extra terminos presentis controuersiaē nihil ad nos facit dictum eorum. vel intelligunt in casu, in quo eadem febris, quæ non erat pestilens, pestilens euadat, & tunc dico hoc non posse contingere, nisi ex causis externis, de quibus abundè superius actum est, in quo casu demonstratum est, quando venæ sectio administranda veniat; si enim ex causa interna hoc contigerit, hoc non poterit esse ratione ipsius morbi, qui sui natura prauā nō est adeptus conditionem, sed hoc euenit tantūm ex Medici vel ignorantia, vel negligentia, seu ex ægrotantis inobedientia, aut ex importuna remediorum administratione, vel infelici, & malè fortunata occasione: quorū ratione licet materia putrescens prauam acquirens qualitatem febrem procreare queat pestilentem (quo casu licebit quidem stante priori febre secare venam) nihilominus hic non erit casus pestilentis febris, nec in eius contemplationem administranda veniet hæc sanguinis missio. Qui autem semper in his casibus (cum à principio febrem non pestilentem, quam morbi progressu postea pestilentem agnoscunt, indicarint) ad nouæ materiae motum refugiant, nunquam veræ declinationis indicia, nec veri status, nec aliorum temporum veram rationem habere possunt, sed penès hos semper omnia indistinctè, ac confusè manerent, semper imminente motu alterius nouæ putrescentis materiae, nec hinc vnquam vnitatem morborū seruare possent. quorum exempla plurima cum Hippocrates, & Galenus enumerauerint, in illis tamen nunquam ab eisdem ne minimum quidē huius nouæ materiae motus verbum factum est. Materia quidem pestilentis febris, quæ in loco ignobili, longèq; à principalibus membris putresce-



bat; ad nobilia loca, & principalia membra nonnunquam commouetur, ex morboq; qui salubris videbatur, lethale propalans casum, & agrotantes in extremum vitæ discrimen præcipitat: attamen hic vnica est materia peccans, & vnus est morbus, cui adaptari nullatenus nouæ motus materiæ potest, nihilominus hi sunt illi casus, in quibus inexperti Medici, qui febrem à principio integrè non cognouerunt, dū scititiem, & periculum ingens ex commotione materiæ ad loca nobilia, & principalia; dūq; signa clarissima (quæ prius non ita in summo erant) febris pestilentis ex virtutum concussione, & languore animaduertunt, ad nouæ materiæ motu confugientes ab imperitiâ non cogniti morbi se expedire nituntur. Quare si ex non pestilentibus pestilentes fiât febres, hoc non ex noua putrescente materia; sed ex causis prædictis, quibus eadem, quæ prius putrescebat, materia, nouam ex putredine, nouâ ve ex causa acquirat qualitatē, continget; vnde ex non pestilentibus in pestilentes degenerabunt, in quibus semper hoc axioma verum erit, nunquam ratione pestilentis affectus secundam esse venam. Ex his igitur liquet in febre pestilenti venæ sectionem nullatenus admittendam esse, sed cum veniat minoranda materia, sanguinemq; detrachere ad exonerandam naturā, & ad obstructions tollendas, & corpus euentandum non solum quandoq; conueniat, sed etiam nonnunquam necessitas in-  
 fiet, erit ne via, quā huic indicationi satisfacere absq; agrotantis discrimine, nec vires dissoluendo, nec spiritus exhauriendo queamus ē erit profectō, vt maturè hanc rem consideranti patere potest: Si enim sanguinem mittamus, qui nō per venam latam, nec affatim effluat, quorum ratione copiosa spirituum resolutio causatur, sed qui guttatim, & per angustas venas, per quas etiam consuescat natura nonnunquam sanguinem impurum, & mole grauantiem excernere, educatur; huic indicationi de minoranda materia turō, & cum utilitate ingenti facere satis poterimus, talis autem sanguinis

non inuolū-  
 -51 m dicitur  
 m. illoq; ex dicit  
 Sanguinis m-  
 fio ad minoran-  
 dā materiā in  
 feb. pest. qua  
 ria agenda sit

guinis missio erit per applicationem hirudinum ipsi venis  
 hemorrhoidalibus, quibus sæpe et in natura ad extirpan-  
 dum limosum, & copiosum sanguinem, quæ sanguinis mis-  
 sio ultra id, quod etiauat per loca conuenientia, & sæpe de-  
 siderata naturali excretioni, his omnibus donata est, quæ de-  
 siderare debemus in tali educatione; nam guttatim euacuat,  
 & per angustissimas venas sanguinem ducit, & maxime re-  
 uellit ab intimis partibus, in quibus solet incendium adesse,  
 & morbi fomes, & etiam à superioribus, ad quæ repens ma-  
 teria peccans solet diuersa producere sæua, & lotharia syti-  
 ptomata, in manibusq; nostris est, eam modò copiosiorum,  
 modò parciorem reddere, & eandem modò accelerare,  
 modò protrahere, sinendo, vt longiori tempore, & tiori bre-  
 ui eadem sanguinis quantitas educatur, quare talis sangui-  
 nis missio maxime cõueniens erit pro minoranda febris pe-  
 stilentis materia, à theq; pro tutissima, & vtilissima in huiusce-  
 modi pestilentibus morbis euacuatione celebratur, adeoq;  
 tuta est, vt etiã languentibus viribus in tali casu summa cõ-  
 utilitate à prudenti Medico administrari possit, vt millicies ex-  
 perientia, & felicissimo rei euentu ego expertus sum, inã  
 per hanc non tantum exonerata natura, sed etiam ore plsa à  
 corde materia, quæ praua, & maligna qualitate totipsum  
 obsederat, vires, quæ conciderat, roborantur, pulsusq; qui  
 paruus, & languidus erat, maior statim, ab hac euacuatione,  
 & vehementior factus est, quapropter adeò tuta est talis  
 sanguinis missio, vt non tantum eo tempore, quo vires nõ  
 sunt collapsæ, sed etiam cum languent, dummodò in totum  
 non sint prostrata; quoniam tunc nulla conueniens est euac-  
 uatio, tutò, & summa cum utilitate administrari potest.  
 Quemadmodum autem hanc hirudinum administrationem, et  
 quia spiritus, sicuti venæ sectio facere .o. fuit, non affu-  
 rim exhaurit, tum quia validè à partibus internis reuellere  
 potest, in primis, ac mirum in modum celebrò; similiter  
 & scarificationem partium inferiorum in huius febris cura-  
 tione,

Orib. lib. 7. col  
lect. medic. c.  
20.

*Cucurbitula in  
feb. pestilencie  
quibus parti-  
bus applican-  
de.*

tionē, quia & euacuat non dissipando spiritus, & multum ad reuellendum pollet, admodum opportunam censeo, quam Apollonius in ea vehemēti pestilentia, quæ Asiam peragrabat, in seipso (vt refert Oribasius) sceleriter expertus docuit alios prosperè hac vti, cuius merito multi, qui hanc in vsum receperunt, saluati sunt, præcipuè autem hi, in quibus signa plenitudinis extitissent, quibusq; hac mediante sanguinis copiam minuisent. Si autem casu detur, vt hæc fieri nō possint, deficientibus, aut hirudinibus, aut ministro idoneo, vel renuente egro, vel impedimento alio existente, succedant cucurbitulæ scarificatæ, quæ partibus superioribus nequaquam applicentur, sed inferioribus tantum, si cuti ad ilia, ad nates, & ad coxas, non autem ad spatulas, nec è regione thoracis, quoniam à corde reuellendum, & euacuandum, nō ad ipsum attrahendum est. licetq; aliquibus videatur in his locis appositæ cucurbitulas conuenire, quia à centro ad circumferentiam ducunt, indeq; materiam à corde ad extimas partes trahere possunt, tamen hoc pro confesso habeatur etiam multum nocuas esse, materiam, quæ reliquum corporis occupat, ad partes superiores, ad ipsumq; thoracem attrahendo. animaduertatur etiam ex hac appositione maiorem virium resolutionem in aliquibus succedere, ac timendam esse, quàm ex prædicta exposita hiru-  
dinum applicatione; quoniam per has violētus fit attractus, magnaq; fit agitatio humorum, & summa cum celeritate, (quorum nullum est in hirudinibus applicitis) fit hæc actio. quare vbi hæc applicari possint, semper potior, & eligenda magis est harum applicatio, quàm cucurbitularum. quæ tamen sæpe etiam post hiru-  
dines administrandæ veniunt, sicuti cum illæ minorationi materiæ in totum non satisfacere rint, vel habita e-  
minoratione adhuc validiorem à partibus internis desideramus, & tentamus reuulsionem, cuiusmodi est potissimum casus Russi, videlicet, cum calor naturalis suffocatur, partesq; exteriores refrigerantur, semper  
tamen

tamen habita hac consideratione, vt vires non admodum languidæ, & ferè prostratæ sint, & ad partes inferiores hæc apponantur. Si autè casu contingat, quòd proponatur mulier curanda, vel cui suppressi sint, vel cui insint menses, at non fluant, tunc dimissa euacuatione per hæmorrhoides deuenirem ad sectionem venarum inferiorum in talo ipso, à quibus non est timenda ea virium debilitas, nec ea spirituum resolutio, quæ à superiorum venarum sectione impendet. & si quoquo pacto virium languorem timerem, non ad sectionem earum venarum descenderem, sed ipsis, ac eisdem inferioribus venis hirudines validiores applicarem, ex hacq; eandem sperarem, quam ex priori euacuatione, vtilitatem in quo etiam casu admitterem cucurbitulas cõxis tantum, & partibus inferioribus, non supra cõxas appõsitæ; ita enim possemus & menses prolicere, & materiam minorare, & ab intimis, & superioribus reuellere. Quibus peractis si viderè partes superiores, sicuti cerebrum, à praua, & copiosa materia occupatas esse, laudarem; vt ad intra penitiores narium partes applicaretur hirudines, quarum ratione ita exoneratur cerebrum, totumq; corpus ita alleuiatur, vt viderim ego plurimos morti proximòs, & ferè solo prognostico de relinquendos, ex hoc vnico remedio saluos esse; hoc tamen summa cum ratione fiat, temporeq; opportuno, quoniam plurima remedia, licet nobilia; si indiscriminatim, & importunè adhibeantur, vt plurimum nõ salutem, sed mortem ægrotantibus afferre consueuerunt, & hæc de sanguinis missione.

*Mensibus in-  
stans quid  
agendum pro mi-  
noratione san-  
guinis.*

*Hirudines na-  
ribus applica-  
te quantum con-  
ferant, & quã-  
do hoc sit agē-  
dum.*

*An conueniat pharmacia pro minoranda materia in fe-  
bre pestilenti. Cap. XXI.*

**P**harmacia, alterum pro minoranda materia propositum remedium, considerata succedit, quam eorum, qui artem curatiuam docere profitentur, plurimi sentiunt à principio in hisce febribus administrandam esse, nulla expectata

M mate-

*Pharmacū an  
sit exhibendū  
in feb. pest. cru  
da existēte ma  
teria.*

*Lib. 4. Apho.  
com. ij.*

*Lib. 4. de tnen  
da valet. in  
prie.*

*Lib. 4. Aph.  
ij.*

materiei peccantis concoctione; quoniam; dicitur, si mate-  
ria turgens quamprimum est euacuanda, à principio morbi,  
dum adhuc est cruda, nè vagans per ambitum corporis tan-  
dem ad aliquam ex principalibus partem repat, eamq; occu-  
pet, tantò magis, vbi materia occupauerit cor vitæ fontem,  
(quod est ea pars, quæ principaliter à materia pestilēti affici-  
tur) quàm primum educenda erit, nulla eiusdem nec tenta-  
ta, nec præparata coctione. Quod eò magis agendum esse  
confirmant; quoniam materia in his febribus peccans toto  
genere à natura aliena est; cum enim sit corrupta, venena-  
tamq; qualitatem conceperit, omnino facta est à natura  
extranea: quod autem omninò à natura alienum est, & ex-  
traneum, nulla fieri ratione potest, vt id naturæ suæ gratiam  
recipiat; qua de re (vt docebat Galenus) in curatione lassitu-  
dinis vlcerosæ, educere id quamprimum tentandum est,  
æquè certè, vt quæ in ventre corrupta prorsus sunt, ea vel  
vomitione, vel deiectione expelli statim profectò est opti-  
mum. Præterea, addunt, materia in febre pestilenti peccās  
habet rationem veneni. cum autem venenū nō concoqui,  
cum concoctionem non recipiat, sed statim debeat è corpo-  
re educi; ideò & similiter in febre pestilenti materia peccās,  
quæ coctionem ratione venenatæ qualitatis non admittit,  
in corpore non sinatur quiescere, quia agendo semper pro-  
pria praua qualitate inficit, & corrumpit corpus, sed statim  
educatur. Accedit, quòd medicari in acutis eadem die, si ma-  
teria turgat, bonū est: at febris hæc vt plurimum est ex acu-  
tis, & in his materia turget. turget autem, quoniam non  
tantum ea, quæ de loco ad locum indeterminatè mouen-  
tur, sed ea etiam, quæ mouentur in loco propter eius ebul-  
litionem, turgent; & ideò, cum fiat ebullitio huius materiei  
in venis propè cor, vel in eius ventriculis, & inde turgat,  
à principio pharmaco statim euacuanda erit. Hoc idem qua-  
litas motus febris pestilentis indicare potest. nam cum in hi-  
sce morbis crises maiori ex parte ad malum tēdant, in mor-  
temq;

temq; non tantum hoc experientia, sed idem testante Galeno, terminentur, crislum utiq; medicus non expectare, sed ante crislum, & sic materia existente cruda, euacuare debet, neque tunc vana erit hæc euacuatio, aut periculosa, ut iudicandum est fore eam, quam crislum expectantes habebimus. Confirmant hoc Hippocratis, & Galeni auctoritate; nam Hippocrates narrans successum morborum pestilentium, dicebat, quod hi præcipue sanabantur, in quibus natura per suppurationem abscessum molita esset, aut quibus commode alius turbata erat, aut urinarum bonarum excretio superuenisset. Galenus autem, dum curationem ulcerum asperat arteria traderet, obiter meminit eorum, qui pestilentie temperie eodem vitio laborarunt, dicens. Hi mihi facile sanati videntur, quod præficcatum ijs, præpurgatumq; totum corpus fuerit, quippe cum & vomuerint ex ijs nonnulli, & omnibus venter profuxerit, ex quibus deducunt purgationes statim continere, cum testimonio & Hippocratis, & Galeni hi potissimum saluentur, quibus per aluum excrementorum copia excreta, & expurgata sit. Sententia hæc, quamvis ab excellentissimis viris recepta sit, probabilique ratione sit munita, ac videatur consona Hippocratis, ac Galeni doctrine, tamen meo iudicio non est admittenda, quoniam & rationi, & Galeni, ac Hippocratis placitis, ut euidētissime probabitur, contradicit. Clara est, & celebris illa Hippocratis sententia, quod concocta tantum medicari oporteat, neq; in principiis morborum unquam pharmaco, nisi materia turgeat, uti debemus. Hanc admiratur diuinissimus Galenus, huiusq; omni applausu sæpe adstipulatur, sæpiusq; eius, & in commentationibus, & in libris propriis mentionem fecit. Huius sententie ea est ratio; quoniam in principiis morborum, dum materia adhuc est cruda, cum bono malo admixtum est, calorq; præter naturam materie peccanti prædominatur. hinc fit, ut in principio morbi cruda existente materia, si pharmaco tentetur euacuatio, relucante calore

*Lib. 3. Epid.  
sect. 3. tex. 29*

*Lib. 5. Meth.  
cap. 12.*

*Lib. p. Apho:  
22.*

*Concocta quare tantum medicari oporteat, nisi in casu turget is materig.*



præter naturam, qui in materia peccante prædominatur, bonum, non malum, naturalis humor, non putrescens pharmaco cedat, indeque insons potius, quam peccans materia educatur, cuius ratione fastidia, anxietates, colliquationes membrorum, lucta, & labor virtutis succedit, quæ mala superuenientia solent in perniciem ægrotantium sæpe terminare: si autem contigerit materiam non mixtam, sed separatam esse, per corpusq; vagare, ut indeterminatè modo ad vnam partem, modo ad aliam commoueatur, quo casu turgere dicitur, pharmaco, nisi quid impedimento subfit, antequam vires dissoluantur, vel febris augeatur, vel ad aliquod membrum principale eadem materia decumbat, statim educenda erit: quo casu materiam cedentem, excretioniq; paratam, & naturam adiuuantem habebimus, cuius ratione nihil eorum, quæ in materia cruda, & mixta euacuanda superuenire diximus, timendum erit: hinc Diuinus ille senex summa cum ratione conclusit, nos debere tantum concocta medicari, à materia autem cruda pharmaco abstinendum esse, nisi eadem turgeat. Quam sententiam ita generalem expressit Hippocrates, ut eam Galenus in febrilibus morbis semper absque ulla limitatione seruandam docuerit: quare mirari non desino eos, qui præter Hippocratis, ac Galeni mentem hanc sententiam coarctare ausi sunt, ab hac excipientes pestilentes morbos, in quorum curatione monet hanc aphoristicâ doctrinâ non seruandâ esse, perinde, ac si Hippocrates, & Galenus nec hosce pestilentes morbos nouissent, nec eorum vnquam meminissent. sed stat hoc fundamentum (quod concocta tantum sint medicanda, nisi materia turgeat) firmum & stabile, ab omnibusq; qui Medicam artem summa cum ratione facere profitentur, acceptandû, sicutq; in ceteris febrilibus morbis, ita & pestilentibus obseruandû, quemadmodû nunc rationibus, & sententijs ex aduerso deductis satisfacientes expressè declarabimus. Duo in prima ratione habentur, alterum est, quod

quòd materia in febre pestilenti peccans cor nobilissimum  
 omniū membrorū occupauit, & ideo statim pharmaco eua-  
 cuanda est, alterum, quòd si materia turgens à principio  
 educenda est; antequā aliquod viscus principale obfesserit,  
 eò magis, vbi in viscere nobili est firmata, erit quamprimum  
 purgante medicamento soluenda. Primum contradicit tū  
 Hippocrati, tum Galeno. Hippocrati quidem; quoniam  
 nunquā ipse admittit pharmacum, nisi concocta materia,  
 vel eadem turgente in principijs morborum. at in casu no-  
 stro, nec materia est cocta, nec turget, vt inferius declarabi-  
 tur. Galeno autem, qui in cōmento Hippocratis dicebat,  
 Eos verò, qui sunt in aliqua corporis parte firmati, neque  
 vllō alio auxilio mouete oportet, neque medicamento pur-  
 gare conuenit ante coctionem. Secundum est purum so-  
 phisma; quoniam dicere materiam occupantem nobilissi-  
 mum viscus ideo statim pharmaco purgandam esse, quia ea  
 turgente statim euacuanda est ob timorem, ne ad illud re-  
 pat, in eoq; firmetur, est dicere, quòd siue materia turgeat,  
 siue firmata sit in principali viscere, aequaliter, pariq; ratione  
 pharmaco à principio sit educenda. quae sententia ex diame-  
 tro opponitur menti, & doctrinae Hippocratis, & Galeni,  
 qui semper docuerunt aliam esse rationem turgentis mate-  
 ria; aliam firmatæ. illamq; semper euacuandam à principio,  
 hanc autem nunquam, nisi coctā pharmaco tentandam es-  
 se; immo non alia ratione turgentem statim euacuari, nisi  
 quia, si in aliquod principale viscus postea crumpat, in eoq;  
 firmetur, non amplius potest, nisi concocta medicamento  
 purgante, educi. Cum autem nituntur confirmare materiā  
 pestilēis febris, cum omnino sit à natura aliena, & nequa-  
 quam coctionem admittat, statim etiam crudam existentē  
 euacuandam esse exposita Galeni sententia in curatione las-  
 citudinis vlcerosæ, dicentis, quod alienum omnino est, cum  
 naturæ suæ gratiam amplius recipere non possit, quāpri-  
 mum educere è corpore tentandum est. Animaduertant

*Occupato cor-  
 de à m̃a, an li-  
 ceat exhibere  
 pharmack, cru-  
 da ea existen-  
 te.*

*Lib. p. Aph.  
 com. 22.*

*sub 700 01307.*

*sub 700 01307.*

*An quod om-  
 nino à natura  
 alienum est, sta-  
 te cruditate sit  
 pharmaco sta-  
 tim educendu.*

*Putrescentis, & non putrescentis materiae sunt diuersae rationes quod ad purgationem faciendam.* hi aliam esse putrescentis materiae rationem, aliam non putrescentis, aliamque esse coctionem, de qua eo loco Galenus, & aliam, de qua Hippocrates, & Galenus simul aphorismo citato loquuti sunt. materia non putrescens, cum fuerit à natura aliena, sat erit, quod nullum pro sui euacuatione, vel ratione viarum, vel ratione propriae substantiae habeat impedimentum, videlicet, quod corpus fluidum, & apertum sit, & quod substantiae non sit crassioris, cuius ratione difficile moueatur; tunc enim statim est euacuanda, & facile nullo subsequente incommodo euacuabitur; quoniam à calore naturali, per quod pharmacum actuat, & cuius proprium est excrementa, & noxia, & inutilia expellere, talis euacuatio dirigitur, & perficitur, & in hac nulla est expectanda coctio; quoniam nulla indigemus in tali euacuatione, sed statim ad pharmacum accedendum est, & de hac loquutus est Galenus in cura lassitudinis vlcerosae, in qua lassitudine nec materia putrescit, nec morbum facit. At materia putrescens (quoniam reluctatur calor praeter naturam, qui in ea predominatur) non obedit medicamento, quoad à calore naturali non fuerit euicta, ab eaque cum ornatur, quem recipere potest, non habuerit; & ideo haec nunquam nisi concocta, & nisi vijs preparatis pharmaco est soluenda, ut est in casu, de quo loquimur, in quo etiam ea coctio materiae peccantis desideratur, de qua Galenus super locum Hippocratis dicentis, quae mala sequantur, ubi in morbis acutis ex vasorum inanitione ante vigorem ad sorbitiones aegri transeunt, in quo monet excrementa ea cruda vocari, quae à natura euicta non sunt, quae autem euicta, concocta dici; quae coctio tunc perficitur in excrementis, & humoribus peccantibus, cum natura causis morbificis fortior fuerit, easque suo robore permutauerit. ex quo humores expulsionem parati, non amplius reluctant, sed superato calore praeter naturam, facile, & absque villo aegrotantis discrimine medicamento cedunt, & de hac co-

ctione

cione loquuti sunt Hippocrates, & Galenus in aphorismo illo. Altera est coctio, dum ea, quæ cuncta à natura sunt, corpus postea nutrire possunt, quæ propriè dicitur, & verè est coctio, & de hac loquutus est Galenus in curatione lassitudinis ulcerosæ, in qua eius erat intentio, cum non morbos curare, sed sanitatem tueri intenderet, ea omnia, quæ corpus non nutrire, sed lædere possent, quoniam à natura aliena essent, euacuare; & ideo dicebat hæc nullam naturæ gratiam amplius recipere posse; quoniam nutritioni inepta erant: quare cum veram coctionem admittere non possent, inutiliaq; naturæ forent, quàmprimùm dicebat ipse, tentandum esse, ut à corpore educantur. quapropter pateat sententiam eam Galeni nihil sententiæ nostræ aduersari, nec posse pestilenti febri in villo adaptari. Quòd autem, cū in hac febre materia peccans veneni rationem habeat, sicuti venenum, statim è corpore educi debet, cum nec coctione, nec alterationem à natura recipere possit: & quò diutius id in corpore manet, eò magis lædere aptum sit, similiter hæc materia pharmaco, quàmprimū euacuanda veniat, ut quæ ratione venenatæ qualitatis nec coctionem, nec alterationem à natura admittat, moraq; diuturna hominem ad interitum ducat. dico ex hoc exemplo non concludi pharmaciam à principio in febre pestilenti administrandam esse, quoniam venenum quidem, dum est in intestinis, & in ventriculo, ac vijs communibus, omni ingenio statim euacuandum est; quoniam à natura nec coctionem, nec alterationem recipit. at si ad intra venas penetrauerit, humoresq; , & partes internas infecerit, nō pharmaco purgante, ex quo mors potius acceleraretur, quàm impediretur, quoniam vbi venenū progressum est, purgantia pharmaca, nisi à proprietate agant, agitando humores periculum adaugent, sed antidotis, & alexipharmacis agendum est. At in casu nostro nō in vijs ductuum adest materia peccans, sed circa viscera, & in venis, in quibus commixti sunt boni humores cum pra-

*Materia veneni rationē habens an statim pharmaco educenda sit, statē eius cruditate.*

*In venis nō datur scierus hu*

*mor, nisi in ca  
su turgentis ma  
terix.*

uis (nam ad intra venas non datur syncerus humor, nisi in casu turgentis materiæ) continetur, tuncq; licet materia adsit venenata qualitate infecta, deturq; indicatio, vt euacuetur, tamē in principio commodē euacuari non potest; cum nulla adhuc in eo facta sit alteratio à natura, nec bonum à malo sit separatū, & in ea prædominetur calor præter naturam, cuius ratione facilè non cedit medicamento. hæc q; materia, licet veneni naturam sapiat, non tamen (hoc animaduertatur) venenum est, in hisq; est disparitas magna; quoniam venenum à natura nunquam domari potest, sed solis antidotis superatur: at hæc materia alterationem, & coctionem à natura recipit, sæpiusq; ab eadē euincitur, etiam nullo adminiculante, vel per crism educta, vel per abscessum excreta, vel alio quouis modo suppurata, vt sæpius visum est, non dixerim in pestilentibus tantum febribus; quæ inter sporades accesserunt, sed etiam in his, quæ pestilentix tempore sæuierunt: vnde cum à natura hæc materia euinci possit, nec verè venenum sit, eiusdem concoctio expectanda ante pharmaci exhibitionem erit. Addebant hi in febre pestilenti materiam turgere ob eius ebullitionem circa viscera, & in venis magnis propè cor, vel in eius ventriculis, quæ cum sit sæpius ex morbis acutis, ideo hæc materia à principio erit in febribus his expurganda; quoniam medicari in valde acutis eadem die, si materia turgeat, bonum est. At hi decepti sunt, iudicantes in pestilenti febre semper materiam turgere, cum nequaquam semper turgeat, immo rarissimè turget. turget enim ea tantum, quæ ad exitum paratissima, ac ad euacuationem properans, vt in commetatione Epidimiarum dicebat Galenus, existit: & quæ, vt idem declarabat, dum Themisiones hyeram examinaret, cum in motu sit, excretioniq; propensa, nec firmam aliquam inclinationem, nec stationem ad vnam partem habet: at in febre pestilenti vt plurimum firmata est materia, & stationem firmam habet vel in corde, vel circa cor,

*Materia pec  
cans in feb. pe  
stilenti an vere  
turgeat.*

*Lib. 4. Apho.  
10.*

*Lib. 6. Epid.  
sect. 2. com. 9.*

*Lib. 8. de cõp.  
mod. secũdũ lo  
ca.*

*Materia tur  
gens quæ sit.*

vel circa viscera, vnde nec ad exitum parata est, nec ad excretionem properat, qua de re non est dicenda turgens, & cū non turgeat, pharmaco à principio, dum est cruda, licet febris hæc aliquando sit acutissima, non est mouenda. Ad id, quod asserunt in hisce febribus, ut plurimum prauas crises accidere, quas præuenire oporteat pharmacia, fateor in his sæpius nec coctionem, nec crises videri. & si hæc nō nunquā videantur, malè apparere, cum in perniciem egrotantium ut plurimum appareant. addo, tamen quandoque bonas videri crises, ex quibus saluentur etiam multi, ut experientia testatur, & quemadmodum Hippocratis, ac Galeni autoritate inferius comprobatur. Si autem crises proficue, & vtilis in his febribus aliquando superuenire consueuerint, non est, quod malas semper timere debeamus, ratione quarum pharmaco ante coctionem uti audeamus. immo ratio dicat, quod si morbus sui natura sit lethalis, pharmacūq; cocta nō existente materia, exhibeatur, virtus inrita purgatione, celerius, quàm non inrita, exoluetur; cum ad euacuationem materiæ crudæ consequantur ea symptomata, & mala, de quibus superius: vnde interitus egrotantium citius exhibito, quàm non exhibito pharmaco, procurabitur. Ad Hippocratis autoritatem nihil dicendum esset; quoniam qui non dormitante animo eius dictum considerabit, animaduertet Hippocratem per illud verbum, commodè, rem ipsam explicare, per quod non aliud secundum eius placita, & fundamenta vult significare, quàm qui bus cocta materia fluxus alui superuenerit, hi saluati sunt; quoniam ea commoda est euacuatio, quæ fit euicta materia à natura ipsa; cruda enim existente materia, & incipientibus morbis ipsis, si quid excernitur, nihil tunc excernitur naturę ratione, sed sunt omnia hæc casus præter naturam earum, quæ sunt in corpore, dispositionum; quo enim tempore à causis morbum facientibus natura grauatur, adest autem cruditas humorum, tunc aliquid bene euacuari est impos-

*An pharmaco  
sint præuenien  
dæ prauæ cri  
ses i feb. pesti.*

*Lib. 3. Epid.  
sect. 3. tex. 29*

*Hipp. & Gal.  
an efferint eu  
acuationes fa  
ctas in febre  
pest. cruda exi  
scenti m̃a esse  
vtilis.*



Lib. 4. aph.  
com. 21.

impossibile: quapropter commoda ab Hippocrate non dicitur, nisi ea euacuatio, quæ materia iam cocta existente, superuenit. Galeni autem sententia in oppositum adducta (dum habet eos saluatos fuisse, quibus corpus præficatum, & perpurgatum ratione fluxionis alui fuerit) nullo pacto potest intelligi nec de principiis morborum, nec de materia cruda, tum quoniam nè verbum quidem hoc in loco habet Galenus, per quod hæc innuere possit; tum quoniam hoc esset ex diametro oppositum eius doctrinæ, quæ omnem euacuationem cruda existente materia detestatur, sicuti infinitis in locis, præcipuè autem in libris de Crisibus apparet, quorum fundamenta, & rationes omnes corruerent, si hoc admitteretur. Si quis tamē Galeni libros reuoluerit, diligentiq; animo considerauerit, inueniet, Galenū hunc ipsum locum explicantem, & hoc præcipue, dum docet, quomodo deiectiones nigras malas esse, sit intelligendum; ibi enim particulariter mentionem habens huius pestilentia, de qua loquebatur in superiori loco, ac docens, quæ alui fluxiones in hac proficua fuissent, dicebat in morbis illis pestilentibus à principio, & in augmento fluente aluo excreta fuisse flaua, & rufa colore colliquamenta, quæ symptomatis vice, & colliquationis ratione procedebant, morbo autem consistente nigra deiecta fuisse, per quæ ægri saluabantur, cum à principio nunquam ad bonum fieri possint hæ excretiones, vnde hæc verba subiungebat. Quare ab initio quidem nunquam ad bonum sunt huiuscemodi deiectiones, magnam visceris læsionem ostendentes, ad morbos verò consistentes sequuntur sæpius, natura superfluitates expurgante. Quapropter hinc pateat autoritatem hanc Galeni non posse non ita intelligi, videlicet, eos saluatos esse, quibus aluus non in principiis morborum, sed eis consistentibus, cocta materia, & dominante natura, fluxerit: ex quo deduci non poterit in pestilenti febre statim à principio cruda existente materia exhibendum esse pharmacum.

cum. Constituamus igitur in hac febre pro minoranda materia non conuenire pharmacum. per pharmacum autem intelligatur id, quod electiuè purgat, de quo contro- uersa est quæstio; quoniam de leniente pharmaco alia po- test; & debet esse ratio: cum enim de sanguinis missione cogitauerimus, vel ad medicamenta alterantia, & conco- quentia deueniendum erit, nulli dubium est, q̃ lenità prius aluo, & vijs communibus ab excrementis expurgatis, hæc cogitanda erunt. Ista autem alui lenitio duplici potest pa- rari via, scilicet vel pharmaco lenienti, vel clysterio. quorū vtrunq; probō, sed hac distinctione habita, quod vbi tan- tum feces erunt, excludendę, clysteria præferantur: vbi autem & vię etiam superiores emundandę erunt ob præ- cedentes cruditates, seu propter aliquam aliam consimilem occasionem, vel alius admodum stiptica fuerit, in usum veniat potius pharmacum leniens, quàm clystere. clysteria non sint acria, quę erunt imponenda; quia exagitant mate- riam, & corpus calefaciunt, sed lenia, quę refrigerare, & prauę qualitatī simul aduersari possint; vt si pro decoctio- ne cum herbis lenientibus; & refrigerantibus admiscean- tur rosarum flores, dictami folia, iuniperi baccę, cortices citri, & consimilia, quorum magna est sylua, addito oleo violaceo, vel amigdarum dulcium cum melle rosaceo, vel saccharo rubeo. Pharmaca lenientia pauca sunt, quę in usum hunc venire possint. inter cętera erit Manna conuenientissi- ma, nisi ad intus magnum sit incendium, febrisq; sit ex ge- nere ardentium, quoniam tunc vitanda erit; cum enim sit quoddam mellis genus, facillè in corpore bilioso, & vbi sit incendium, vertitur in bilem. Syrupus rosatus solutius ma- ximè etiam mihi probatur; si recens sit, & rectissimè para- tus; quoniam ratione rosarum aduersatur prauę qualitatī, in moderata tamen exhibeatur quantitate; quoniam si plu- rimum eius in notabili quantitate assumatur, ex lenienti fit medicamentū electiuè purgans, vnde postea vitio res ver-

*Alui lenitio  
quibus procu-  
randa in feb.  
pestilenti.*

*Clysteria qua-  
lia esse debeat.*

*Lenititia phar-  
maca exhiben-  
da in feb. pesti-  
lenti.*

tere-

teretur. Agaricū etiam summopere cōmendo, parçè, & recta cum ratione sumptum. hic enim ad venena hausta efficac est antidotus, vnde & euacuando multum prodesse poterit. Epithymi, sēnæq; decoctio in iure pulli, vel stillatitia aqua confecta, additis floribus cordialibus, & quæ eorum nocumenta tollere possunt, à me etiam laudantur. Thamarindos etiam propono: sed quoniam vias exasperant, vbi obstructiones validæ sint, earumque sit timor, non ita tutò eorum vsum cōmendo. An casia cōueniat ratione humectationis propriæ, potest esse dubium. tamen eam etiā quandoq; admittere, at non solā, sed vel admixta Hyëra Galeni, vel speciebus de arrhodo, vel aliquo simili medicamento, quod possit eius humiditatem refrangere, membraq; interna roborare: hanc autem præcipuè exhibendam duco, vbi viæ exasperatæ forent, leniendumq; medicamentorū vsus desideraretur; quo casu excepto: eam omnino dimitterem. Hæc sunt ea pharmaca, quæ mihi probantur in casu nostro, quorum pro diuersitate materiæ peccantis, & assumentis status, vnum magis, quàm alterum à prudenti medico eligatur. in quorum vsu hoc repetā animaduertendum esse, vt solum abundantibus superfluitatibus, vel in ventriculo, vel in ceteris communibus ductuum vijs in vsum veniant. his enim non præsentibus, ad excludendas feces clisteria lenia: satisficient: quò casu si illa exhibeantur, poterit eorum vis ad intrā venas forsā permeare: ibique materiam crudam quoquo pacto exagitare. Medicamentum autem Ruffi, pillulas de tribus, cæteraq; similia pharmaca prudens prætereo; quoniam eorum caliditatem in principio huius febris timeo: Validiora autem prætermitto; quoniam lenientia tantum, & non cle-  
ctiue purgantia exhibenda esse, cōmendo.

*De concoquentibus, & alterantibus, & enacuantibus ad ministrandas in febre pestilenti. Cap. XXXIII.*

**I**mmixta materia, medicus ad tollendas obstructions, & ad residui coctionem, & alterationem accedat. obstructions tollentur per eadem remedia, per quæ coctio procurabitur; in quorum usu semper vitentur ea, quæ has manutenere, vel augere possunt; concoquentia sint ea, quæ materiam peccantem respiciant, ynde pro diversitate humoris peccantis diuersa assumenda erunt. In materia calida cõueniēs erit syrupus acetosus simplex, syrupus de succo acetosæ, syrupus de acetositate citri (huiuscemodi acida medicamenta in consimili casu semper alijs præferantur), syrupus rosatus recens, syrupus de sonco, & omnes cicoracei, syrupum de agrestæ, de succo granatorum, mirtium, & consimiles consulto prætermittito; quoniam exhibiti nimium obstructions ob eorum adstrictionem adaugent. diluantur hi syrapi cum decoctionibus earundem, vel similium herbarum, ut pote acetosæ, hepaticæ, sonci, reliquorumque cicoraceorum. In materia frigida sit in usu mel rosaceum, oximel simplex, syrupus de scordeo, syrupus de corticibus citri, syrupus de betonica, decoctiones sint ex iisdem, vel similibus, utpote agrimonio, myrrhide, seminibus citri, radicibus tormentillæ, pentaphilli, Gentianæ, dictami albi, & quæ huiusce sunt classis. Si autem materia fuerit melancholica, sit syrupus de pomis, syrupus de succo boraginis, syrupus sapor Regis, quod si materia adustionem acquisierit, omnibus præferatur syrupus de fumaria. pro dilutione parentur decoctiones ex iisdem, ex quibus syrapi formati sunt. Parentur ellectuaria ad alterationem, & propulsandam prauam, & venenatam qualitatem, exhibendum ante cibum, tum ante syrupum in materia calida ex conferva acetosæ, & conferva acetositatis citri, & Zucaro rosaceo, additis margaritis, fragmentis lapillorum.

*Concoquentia  
in feb. pestil.*

*Ellectuaria ex  
hibenda.*

preciosorum corallis, quæ pretiosa medicamenta, modò sint sincera, non adulterata, quantum possint cor roborare, experti, & prudentes Medici testari possunt. his addi potest semē acetosæ, cornū Vnicornis, cornu ceruinum, os de corde cerui, terra Melitenfis, terra Anatolia, bolus Armena, de qua licet sit inter medicos discrimen, tamen ea ad mentem Galeni accipiatur, quæ lutei est coloris, & plura alia similia, quorum in præseruationis capite meminimus. diuantur, & distemperentur hæc ellectuaria, si ingens sit calor ad intra, febrisq; sit valida, vel tempus æstiuum, & valde calidum existat, cum succo citri, vel succo limonum, vel aliquo consimili. si verò omnia hæc non ita instent, syrupi prædicti in materia calida ad hunc effectum assumantur. Si materia fuerit frigida, fiat ex conferua scordei, & ex conferua stēchados, ex conferua cardi benedicti, ex conferua scabiosæ, ex conferua Dianthos, ex conferua betonica; pulueres miscēdi sint ex scordeo, dictamo Cretico, scabiosa, ex radicibus tormentillæ, gentianæ, angelicæ, imperatoricæ, dictami albi, zedoariæ, myrrhæ, seminibus citri, seminibus cardi benedicti, corticibus citri, baccis iuniperi, incorporentur simul cum syrupis in materia frigida administrandis: quòd si his addatur portio humoris melancolici, admisceatur conferua boraginis, conferua melissæ, conferua fumariæ. Hæc autem, si cum ratione exhibita fuerint, poterunt & materiā peccantē alterare, & prauā, ac venenatā qualitātē refringere. Vitet autē Medicus semper in vtraq; materia excessum, ne videlicet aut in materia calida nimium refrigeret, vel in frigida nimium calefaciat; sed modò hæc, modò illa medicamenta cum his admisceat, vel cum illis, temperetq; eorum vsum, prout ratio, & medendi indicationes suadebunt. Quòd si ellectuaria hæc ita in forma solida parata vel egro renuente, vel medico nota parante, dimittantur, plurima in potu in vsum venire possunt: sicuti eadem pulueres cum aqua rosacea exhibitæ, vel si febris admittat, & virium debilitas

lin

vanina Dadi

*Pulueres exhibendi.*

600217

bilitas hoc indicet, addita portiuncula vini odorati, omni-  
 bus autem præferatur smaragdus in tenuissimum pollinē ar-  
 te redactus ad nouem, vel decem grana cum iisdem liquo-  
 ribus mixtus. secundum ab hoc locum habeant margaritæ,  
 cæteriꝫ lapilli pretiosi eodem modo parati. quibus si auri  
 folia admisceantur, non erit inutile, vt nonnulli falsò ima-  
 ginati sunt, experimenta, & antiquorum auctoritates abne-  
 gantes. bolus Armena succedit vnâ cum terra Melitensi, &  
 ea, quæ ex Anatolia defertur, quæ apud Turcas in maxima  
 habetur existimatione, coloris albi, sigillo imperatorio in-  
 sculpta, cuius in aliquibus ego maximū vidi experimētum.  
 succus rutæ capraræ, glaregæ dictæ, depuratus in hoc casu  
 etiā valde prodesse potest, & mirum prodit effectū, sed cū  
 valdè insuauis sit, iubeo ego per balneum Mariæ destillari,  
 sicuti & plurima alia consimilia ex prædictis medicamentis  
 pharmaca. præcipuè autē medicamentū hoc exhibendum  
 propono, quo meq̃ martē composito felicissimo cum suc-  
 cessu frequentissimè vtor. Sumatur succus glaregæ dictæ,  
 succus acetosæ, succus scordēi, succus citri ad pondus librę  
 vnus pro singulo quoque, quibus addatur Theriacę opti-  
 mæ, vncia vna, omnia misceantur simul, & macerentur in  
 aqua tepida, postea in duplici vase destillentur; hinc habe-  
 bitur aqua, cuius vsus est ab vncia semis vsque ad vnciam  
 vnam ante cibum tam mane, quàm vesp̃ri, cui (prout ratio  
 mihi, vel medendi methodus nonnunquam dicit) prædi-  
 ctorum medicamentorum nonnihil admisceo, habeoq; me-  
 dicamentum valdè potens in domanda, & euincenda febris  
 pestilentis praua qualitate, vt rei euentus mihi longa expe-  
 rientia, felicĩꝫ vsu comprobauit. Antidotus de sanguinibus  
 à Galeno in propriis libris descripta mirè proderit in pestu-  
 lētibz affectibus, Mithridatum etiā consimilem, sed maio-  
 rem habet efficaciam. Theriacam tamen omnibus antidotis  
 præpono, vt quæ in affectibus venenatis maiori vigeat, quā  
 cæteræ omnes, facultate, huiusq; in hisce febribz maximū  
 ego

*Succi exhibēdi*

*Aqua scordēi  
composita.*

*Antidoti ex-  
hibenda.*



ego habeo, & felicissimum vsum, cuius drachmiam summo mane singulis diebus exhibeo, cum video prauam qualitatē intendi, vires deijci, corpus refrigerari, simpliciāq; illa iam dicta, & facillē parabilia inefficacia, & inualida esse, iubeoq; vt superbibant, vel haustum vini generosi, seu puri, seu lymphali cum aliquo liquore ex prædictis, & hoc cum intensam caliditatem non timeam. quod si hæc mihi negotium facescat, vel ei admisceo conseruas refrigerantes: vel si hoc non sufficiat ad remittēdam caliditatem in minori quātitate ita mixtam exhibeo, ad semidrachmam, vel etiam ad scrupulum descendens, easque cōseruas ad sesquidrachmā, & vltra etiam commiscens. Plurimæ ad harum similitudinem cōfectæ circumferuntur antidoti, à recentioribus descriptæ, ab iisdemq; summè celebratæ, quibus tamen ego illas, in hoc magis antiquitati, quā nouissimis his hominibus tribuens, præfero. quorum descriptiones tum à proprijs authoribus, tum à nonnullis scriptoribus, qui has in vñū collegerunt, petantur. Medicamentum Ruffi ex aloë, ammoniaco, & myrrha (quod posteritas turbatis ponderibus, & mutato ammoniaco in crocum, deprauauit) in morbi progressu administratur, vel solum, vel temperatum, prout morbus indicabit. Lapis quidam Bezaar ad nos ex Indijs Orientalibus aduectus, cuius etiam antiqui meminere, à multis pro efficacissima huius febris antidoto celebratur: cui ego nihil attestari possum, quoniam nec hunc præ manibus vniquam habui, nec eius experimentum vidi, aut feci, quare hunc relinquo fidei eorum, qui hoc se expertos esse profitentur. Plura alia ad hanc eandem intentionem possem recensere, sed sufficiant ea, quæ enarrata sunt, cum ea tantum proponere decreuerim, quorum certus vsus, & certa experientia mihi innotuit. horum enim omnium vsum non tantum antiquitatis, & celeberrimorum virorum testimonio proficuum comprobare, sed etiam meo periculo, & longa experientia confirmare possum. Ad prædictorum

autem,

autem confirmationem prudens medicus vel simplicia, vel composita, accipiendo plurima sibi ad expugnandam, & domandam materiei peccantis prauam, & venenatam qualitatem, efficacia, & valida remedia parare poterit. Quibus cum prædictis concoquentibus in usum positis, & obstruções tollere, & materiam peccantem concoquere, & perniciosam qualitatem alterare, & superare procurabit. Quam prauam qualitatem non tantum per interius assumpta, sed etiam per exterius applicita medicamenta oppugnare debet; unde parentur epithemata, inunctiones, linimenta, emplastra, & sacculi, quæ omnia supra regionem cordis appositæ, cor ipsum roborando prauam qualitatem refringere, & remittere possint. Epithemata parentur ex stillatitijs aquis, sicuti ex aqua melissæ, boraginis, acetosæ, sonci, endiuig, rosarum, scordei, lauandulæ, spicæ, & similibus ad mixtis speciebus cordialibus, pulueribus odoratis, aromaticis, bezearticis, addito vino generoso, & aceto rosaceo; cõponantur autem modò magis refrigerantia, modò minus, prout occasio docebit, & peccantium humorum indicatio sua debet, semper cauendo ab his, quæ adstringere multum possint; quoniam talia potius constipando, & obstruendo nocere, quàm alterando, iuuare possunt. Hæc autem epithemata non tantum laudo, ut ex aquis enarratis, aut similibus parentur; sed etiam summopere commendo, ut ex succis prædictarum herbarum, cum recentes, & depurati haberi possunt, componantur: quorum succorum usum maxima urgente necessitate, & in calibus ferè desperatis summa cum ægrotantium utilitate nonnunquam expertus sum. ratio. n. mihi dictauit, ut efficacior esset succus, quàm aqua inde per sublimationem extracta: his tamen succis etiam admisceantur eadem, quæ superius addenda esse stillatitijs aquis, commemorauimus. administrentur hæc epithemata calida infusis panis cocco, vel purpura tinctis supra cordis regionem; quibus administratis iungatur locus inunctionibus, quæ

*Medicamenta  
exterius appli-  
canda in febre  
pestilenti.*

*Epithemata.*

*Inunctiones.*

N formen-

formentur ex vnguento rosaceo Mesue, ex vnguento sanda-  
 lino, ex vnguento citrino, additis speciebus cordialibus, vel  
 quibusdam aromatibus, seu seminibus, seu radicibus bezear-  
 ticis, vel etiam addita portiuncula vel Mithridati, vel The-  
 riaca: quod si hæc non satisfaciant, parentur linimenta ex  
*Linimenta.* Theriaca ipsa, succo citri, vel limonum diluta, cui etiam  
 possent addi pulveres prædicti generis, quæ Theriaca ratio-  
 ne caliditatis, & antipathiæ potest validissimè venenatam  
*Emplastr.* qualitatem ad extra euocare. Emplastra componi debent  
 ex iam enumeratis herbis contusis, additis aromatibus, ra-  
 dicibus, & seminibus, & reliquis rebus, quæ alexipharma-  
 ca vi donata sint; iam propositis, & succis prædictis imbu-  
 tur, impinguenturq; oleo rosaceo, theyrino, anethino, co-  
*Olea.* stino, ex iuniperi baccis facto, de gariohilis, vel aliquo alio  
 consimili; inter quæ primum habeat locum oleum de scor-  
 pionibus & simplex, & compositum. Ex quibus scorio-  
 nibus solet parari aliud oleum valde compositum, & apud omnes  
 Chymicus celeberrimum, vulgo oleum Clemētis appellatū;  
 quod & in veneno assumpto, & in pestilētibz affectibus ad  
 mirabiles edit effectus, semimortuos patientes reuiuiscere  
 faciens. quod oleum in casu isto summopere commendo, si  
*Sacculi.* eo solo loci arteriarum exteriores, & cordis regio inungā-  
 tur. Sacculi ad eandē intentionem possunt parari ex iisdem  
 rebus iam commemoratis; commiscendo flores, & folia  
 herbarum odorata, semina, radices, cortices, aromata,  
 gummata, succos concretos, & omnia ea, quæ sicca sub-  
 stantia contundi possunt: quæ omnia simul mixta in sacculo  
 sericco cotto, vel purpura infecto, & viignis odorati suntu  
 migato, & calefacto super regionem cordis applicentur.  
 consultò hic prætereo sacculum illum in præseruatione lau-  
 datum ex arsenico, auripigmento, & similibus confectum;  
 quoniam ratione febris præsentis, in qua illa adeò sicca, &  
 calida non conueniunt, importunum esset, & periculi ple-  
 num remedium. His autem prædictis, & cum ratione adhi-  
 bitis

bitis, poterimus qualitatem venenatam, & perniciosam cor ipsum roborando refrangere, & alterationem materiei peccantis procurare. Quibus, vel singulis eorum, vel pluribus pro ratione morbi, & occasionis tum interius, tum exterius peractis, si fieri poterit, morbusq; via naturali sit superandus, possumus sperare coctionem materiae peccantis, qua habita cogitandum erit de pharmaco pro euacuatione materiae iam euictae. Attamen ante pharmaci administrationem considerandum est, an natura aliquam moliatur excretionem, siue per euacuationem, siue per abscellum; si enim quid simile tentauerit natura, quiescendum est, quod ipsa natura à proprio opere cessauerit: quae si integrè iudicauerit, nihil medico agendum erit, sed totum id naturae est permittendum; quae enim iudicantur, & iudicata sunt integrè, neque mouere, neque nouare aliquid siue medicamentis, siue aliter irritando, sed sinere oportet. Vbi verò integrè iudicatum non fuerit, id, quod deficit, nos supplere debemus. qua de re in usum tantummodò veniat pharmacum, vel cum natura quieuerit, vel in proprio opere imperfectè iudicauerit: quo casu habeatur delectus pharmacorum, quae materiam peccantem educere quidem possint, sed non valde corpus exagitare, & debilitare; Vnde mihi nec scāmonium, nec turbiti, nec colochytis, nec elleborus, nec quae huiusce sunt classis, vllò pacto probantur; cum enim febris pestilens sit cum putredine, & corruptione valida, à quibus deducuntur humores ad naturam quandam venenatam, cuius ratione vires debilitantur, & languent, tutius est insistere in mitioribus medicamentis, quàm in illis vehementioribus. quapropter qui pillulas cochias, qui Euphorbiū, & similia proponunt medicamenta, à me damnantur: nec mihi persuadere possum, quemquam horum excellentissimorum Virorum, qui hæc proposuerūt, ausum fuisse illis uti, & maxime cum hæc contra rationem, & Galenum ipsum in usum venire debeant; si enim Galenus in ægritudinibus saluberrimis

*Pharmaci exhibitione quando tentanda, & quid in ea observandum.*

*Lib. p. Apho. 10.*

*Lib. 1. Apho. com. 19.*

mis abhorret pharmacum, consistentē morbo ob fatigatam eo tempore vim animalem, quid dicendum erit de pharmaco in morbo, in quo vix vires vitales validæ possunt esse? quare dimittantur ista vehementiora, & mitiora præferantur: vnde in bile educendā Rhabarbarum, in pituita Agarium, in melancholia sēna, & epithimum, cæteraq; quæ huius sunt ordinis, & quæ inter benedicta pharmaca à recentioribus enumerantur, in hunc usum veniant. Quòd si ob rebellem materiam cogamur aliquando ad ellectuaria, & composita pharmaca descendere, sumantur ea, quæ valdè correctæ sunt, sicuti Triphera persica, Diaphinicon, Ellectuarium rosatum Mesue, & in moderata quantitate prædictis addantur; præparentur autem cum decoctionibus florum cordialium, cum rebus odoratis, admixtis nonnullis, quæ vim bezearticam habeant, corq; ipsum à venenata tueri qualitate possint; vt sunt semina citri, scordeum, os de corde cerui, myrrhis, & similia, & sint, quantum fieri poterit, suauia; quod, additis quibusdam dulcioribus (sicuti syrupo acetoso, vel de succo acetosæ, vel violato, vel rosaceo recente; vel de acetositate citri, vel consimili) procurabitur. Huiusmodi medicamentis administratis, sperandum est, euacuationem humorum peccantium fieri maxima cum ægri & tolerantia, & vtilitate: quibus eductis alteri indicationi satisfactum erit, videlicet refrigerationi intentæ; nam vltra quòd concoquentia in parte hanc præstare debeant, hanc eandem corporis refrigerationem perfectè assequemur, dū putrescentes humores, à quibus corpus incalescebat, euacuabimus. Hanc autem refrigerationē aliquando non pharmaco, nec syrupis tantum opportunis procurabimus, sed potius aquæ frigide, quæ nonnunquam in febre pestilenti in usum venit: quod fit, cum febris est ex ardentibus, naturamq; causonidis retinet, magnum ad intra incendium habens: tunc enim coctionis signis apparentibus in vigore febris, sitiente ægro, copiosè ebibita aqua frigida summū affert adiumentum

*Refrigeratio  
quando habetur  
in feb. pestilenti,  
& qui  
bus tentanda.*

tum, tū totum corpus refrigerando, tū peccantes humores vel per vomitum, vel per secessum, vel per sudorem excludendo. Ita seu per pharmacū, seu per præparantia adhibita, seu per aquam frigidam, seu sponte quiescente febre, refrigerato corpore eiusdem humectatio subsequetur. quæ etiā plurimis medicamentis actu humidis, cibarijsq; consimilibus, licet eisdē admista sit & facultas exsiccatoria ratione corruptionis, & putredinis connexæ, tentabitur in morbo ipso, quo euicto, & materia superata, &educta, cuius ratione corpus exsiccabatur, saluberrimā habebimus corporis humectationem. quam victu opportuno, nulla re præter naturā reluctante, facilè conseruare poterimus, quibus in actu positis, & peractis, omnibus propositis indicationibus abundè satis factum erit.

*De curatione exanthematum, macularum, & aliarum excretionum, quæ in febre pestilenti contingunt.*

*Cap. XXXIII.*

**C**onsuevit multoties natura in hisce febribus tentans materiei peccantis excretionem, eiusdem portionem ad cutim propellere. hincq; superueniunt exanthemata, & papulæ illæ antiquorum, sed potissimum ætate nostra eæ maculæ, de quibus inter signa egimus. quæ maculæ, cū magnitudine inter se differant, rarò maiores, sepius autem minimæ, & quæ pulicum moribus similes existentes peticulæ, vel pestichiaæ vulgò appellantur, apparent. His apparentibus, quid medico agendum sit, diu dubitatum est. Varij varias obtinuerunt sententias. Alij sensere motum hunc, quocunq; tempore, & quocunq; modo eueniat, semper adiuvandum esse, freti ea Hippocratis autoritate dicentis. Eò ducere oportet, quò natura vergit, si per conuenientes regiones: at conuenientissima regio est cutis, ad quam transferatur materia perniciosa, internas occupans partes; & confirmatur eiusdem consimili sententia, quæ habet,

*Exanthematus, vel maculis apparentibus quid agendum.*

*Lib. p. Apbo. 21.*

N 3 Erysi



*Lib. 6. Apho.*  
25.

Erysipilas ab interioribus ad exteriora verti, bonum esse; & eò magis prædicant hoc faciendum esse in his febribus, quò materia maligna existens est deterior ea, quæ erysipilas causat; immo cum sit venenosa, hancq; conetur natura ab intimis visceribus ad cutaneas partes traducere, omninò huic expulsionì instantèr opitulandum esse concludunt. Alij melioribus rationibus ducti (cum duplici modo expulsionem hanc fieri nouerint .s. vel symptomaticè, vel criticè) sentiunt eam tantùm, quæ critica fuerit, adiuuandam esse: quæ verò symptomatica, cohibendam fore; illa enim cocta fit materia, quæ omni ingenio à locis patientibus educi, & reuelli debet, hæc fit cruda existènte, quæ nullo pacto irritari, sed sinere, & impediri oportet. Sed res ita explicanda est. Motus naturæ in excretionibus materierum peccantium sunt triplices; alij enim sunt purè critici, alij purè symptomatici, alij. medij. purè critici sunt illi, quos signa concoctionis præcedunt, fiuntq; in decretorijs diebus, subsequiturq; morbi leuamen, & egri tolerántia. Hi critici motus vel perfecti, vel imperfecti sunt. perfecti sunt illi, in quibus tota expellitur materia; imperfecti, quando non tota, sed pars expulsa est. quod duplici euenit de causa, scilicet, quoniam licèt materia sit concocta, tamen vel propter multitudinem eiusdem, vel propter naturæ imbecillitatem tota non eijcitur. Motus purè symptomatici sunt illi, qui fiunt, aut cum materia cruda est, aut ex toto praua, & in diebus non decretorijs, & cum magno ægrotantis labore, nulla, vel minima subsequente morbi alleviatione. Motus medij sunt illi, qui fiunt, cum materia aliquo modo est concocta, existenteq; imperfecta concoctione, natura aggreditur materiam illam, & eam integrè non expellit, vnde nec sequitur perfecta salus, licèt aliquod leuamen, aliquodq; bonæ valetudinis indicium nonnunquam subsequatur. His stantibus, dico, quòd apparentibus his maculis, vbi motus purè criticus perfectus, vel purè symptomaticus fuerit, ab arte nullo

*Motus materierum peccantium & excretionibus est triplex.*

*Motus purè critici.*

*Motus purè symptomatici.*

*Motus medij*

*Motus materierum in extratio*

nullo pacto adiuuandus est. Nam de critico perfecto primo sermonem habendo, quoties natura rectè, integreque iudicauerit, neque mouere, neque nouare aliquid medicus, sed sinere debet, totum id naturæ rectè operanti permittens, tantumque febris curationi vniuersali incumbens. Sicuti autem in hoc critico motu, ita & in purè symptomatiko pro euocatione materiæ ab intimis partibus ad exteriores nihil medico agendum erit; cum enim medicus sit artifex naturæ deseruiens, ei non malè, sed bene operanti inseruire debet: malè autem operatur, dum materia cruda existente, eiusdem expulsionem tentat, quo tempore si quid excernitur, nihil tunc excernitur naturæ rectè operantis ratione, sed omnia huiusmodi sunt casus præter naturam earum, quæ sunt in corpore, dispositionum: tuncque cum à causis morbum facientibus natura vel grauatur, vel irritatur, adest autem cruditas humorum, aliquid benè euacuari est impossibile. hinc morbus regius ante septimam malus, hinc atrabilis in principio morbi exiens lethalem indicat casum, hinc plura alia consimilia, quæ tamen nullo pacto contrariantur duobus prædictis locis Hippocratis ex aduerso deductis. quoniam dum dicebat: Eò ducere oportet, quò natura vergit, si per conuenientes regiones. loquebatur de materia cocta; quæ vel non iudicabitur, vel integrè non erat iudicata. dum autem dicebat, bonum esse verti Erysipilàs ab interioribus ad exteriora, loquebatur de totali morbi permutatione, quæ non tantum est signum bonum, sed etiam causa, & non de alicuius partis materiæ excretionem à natura tentata, dum vel copia grauatur, vel mala qualitate irritatur. quapropter tunc desistat medicus ab omni opere, quod talem motum adiuuare posset, circumspiciat tamen omnia diligentissimè, quæ in corpore præter naturam continentur, & consideret fomitem harum macularum, in quo statu se habeat. si enim adsit plenitudo, tollenda erit sanguinis missione eo modo facta, quo superius faciendam esse, declarauimus.

nibus q̄ sint iudicandi, & quæ non.

Lib. 4. Aphor. 62.

Lib. 4. Aphor. 22.

Macularum fontes consideramus.

uimus. nec periculum erit ex hoc retrocessiōis materiæ,  
*Maculis appa* quæ cuti inhæsit. quoniam ista per minutionem sanguinis  
*ventibus an sit* non potest è cuti ad internas partes remeare. Sed ex hoc  
*secunda vena.* exonerata natura forsan supra residuum fortior facta pote-  
 rit & coctiōi, & expulsioni tutiori via incumbere. Sunt  
 qui in tali casu superiores venas aperire, internasq; brachio-  
 rum tam dextras, quàm sinistras secare audeant, sed rem  
 discriminis, & periculi plenam aggrediuntur. febres enim,  
 in quibus hæ apparent maculæ, solent vires euertere. nec  
 tuta est (sicuti docuimus) in huiusce generis febribus superio-  
 rum, ac maiorū venarum sectio. hæc igitur omittatur, eaq;  
 sanguinis minutiones, quas probauimus, cū tutò, nulloq; di-  
 scrimine administrari queant, præferantur, ac seruentur. An  
*Maculis appa* autem hoc casu sit pharmacum exhibendum, vt ferè om-  
*ventibus an sit* nes medicinam facientes docent, ex superius declaratis  
*exhibendum* pateat, vbi docuimus, nunquam materiam crudam pharma-  
*pharmacum.* co non dixerim educendam, sed nec tentandam esse: vnum  
 tamen animaduerto, scilicet, quòd si in tali casu sit viscerū  
 impuritas, abundetq; in vis communibus humorum col-  
 luies, à quibus foueri internus morbus possit ob auctam  
 putredinem, & corruptionem, conuenienti pharmaco ea  
 depuranda, humoresq; illi exterminandi erunt; sit autem  
 pharmacum leniens, præpareturq; cum his, quæ veneno  
 aduersari, & prauam qualitatem oppugnare queant. Si au-  
 tem viæ communes satis purgatæ sint, nulliq; in eis abun-  
 dent, vel resideant prauī humores, omne medicamenti ge-  
 nus detestor; quoniam his turbari materia cruda ad intra  
*Macule repri* venas existens, non demulceri poterit. insistat autem Me-  
*mentibus nun* dicus in coctiōe, & alteratione, vnà cum antidotis, & ale-  
*quam sunt re-* xipharmacis, nec ratione periculi vnquam à recta medendi  
*pellenda.* methodo discedat. caueatq; tanquam à veneno, vt macu-  
*Lib. 4. Apdo.* las has reprimētibus repellere (vt nonnulli celebres viri iu-  
 2. dicarunt agendum esse, ducti sententia Hippocratis, dicētis  
 ea, quæ inutiliter prodeunt, cohibenda esse) tentet; cum quo-

quo-

quoniā reprimētia nūquā in materia venenosa admittuntur; tum quoniam symptomata, nisi vicem causę subeant, non curanda. Si autem motus fuerit purē criticus, at imperfectus, hic omni ingenio adiuuandus erit. quod enim natura præ imbecillitate propria, vel ob materię multitudinem integrē non potuit expellere, ars ipsa vniuersalibus præmissis euocare debet. quod duplici via perficere potest. primò materiam ad partes cutaneas ab intimis attrahendo, secundò cutim ipsam laxando, & aperiendo. primum cucurbitulis adhibitis, & scarificatis, & non scarificatis, procurabimus. scarificentur autem præcipuè, & plures, non pauciores apponantur, multa existente materia, potissimumq; vbi maculæ non sint ex illis minoribus, sed maiores fuerint; hæ enim à copiosiori materia, & viscidiori generantur, ideoq; maiori indigent euacuatione. secundum exequemur, tuentes ægrum ab ambiente frigido, timentes, ne materia retrocedat, quod pessimum esset indicium, eundemq; panis rubeis, vel similibus induentes, additis frictionibus asperis, vel cū linteaminibus, vel manu illinjit aliquo oleo relaxante, quale est oleum camemolinum, vel anethinum factis. Quòd si maior vrgeat necessitas, oleis addatur vini potens, nitrum, vel sal, & similia; quæ cutim exasperando & attrahant, & laxent, & aperiant. quòd si hæc non sufficiant, hic laudo vesicatoria, & exulcerantia, & attrahentia medicamenta apposita membris exterioribus, videlicet tum cruribus, tum brachijs, his enim prauos ichores ad extremas partes attrahere, per easque eisdem euacuare poterimus, sicque per partem post partem ab intimis locis eos abducere valebimus, motumq; naturæ ad exteriora adiuuabimus. Plurima ad hunc vsum apta sunt, sicuti cantarides, synapi, radix ranunculi, radix anemonis, cortex intus sambuci, iberidis folia, & radix, allium vocatum caninum, flammula Iouis, & similia. Omnibus tamen ego præfero citharides, quarum ego frequentissimum, & felicissimum vsum

*Macularū ex  
cretio quādo,  
& quibus in-  
uanda.*

*Exulcerantia,  
& attrahētia  
quādo, et quæ  
conueniant.*

usum habeo, tum quoniam bezearticam vim habent veneno aduersantem; tum quoniam cum minori dolore bullas excitant. quoniam tamen hæ vesicæ aduersantur, lotijq; ardorem sæpius etiam exterius appositæ excitare solêt, quod molestissimum symptoma, & pessimum esset in hisce febribus, in quibus omnia demulceri, non exasperari, debent; ideo ego admiscere his consueui semina ameos, quæ hac facultate donata sunt, vt prohibeant cantharides nocumentum vesicæ inferre. Dum autem hæc administrantur, semper recipiat Medicus causas, ob quas natura intègrè nō iudicauerit. Vnde si hoc sit ratione multitudinis materiæ, magis infestat in euacuationibus prædictis, vel eas iterâdo, vel easdem validius procurando, prout vires, & status morbi indicabunt. Si autem hoc eueniat ob naturæ imbecillitatē, viribus intentus de earū robore cogitet, per interiusq; administret ea, quæ naturam imbecillem ad motum hunc ad partes cutaneas proritare, & adiuuare possit. talia autem erunt decocta lentium, casticarum, radicum petroselini, radicum apij, seminum feniculi, & huiuscemodi; quibus admisceantur ea, quæ vim veneni propulsatricem habeant, addaturq; portio vel syrupi bysantini, vel de duabus radicibus. Dum etiam hæc à Medico summa cum diligentia circa ægotantem pertractantur, non dimittat usum eorum medicamentorū, quæ antidoti rationē habeant, nec abstineat ab epithematibus, ceterisq; similibus remedijs externis, regioni cordis applicandis, licet nonnulli oppositū sentiant, opinantes per epithemata, & reliqua exteriora medicamēta materiam peccantem, & venenosam ad intra retrudi. quod falsum est, cum potius oppositum contingat; quoniam per hæc roborata corde natura validior facta promptius residuum materiæ à corde excutiet, ad cutimq; ipsam, in qua prior inhæsit, propellet. Animaduertat tamen medicus, ne hoc tempore adstringentia, quæ semper suspecta habuimus, & refrigerantia admodum in epithematibus admisceat. Sed

*Maculis appa-  
rentibus an sit  
exhibendum  
pharmacum.*

*sint*

sint hæc tantum temperata in actiuis ; in reliquis autem qualitatibus sint, quæ moderatè exsiccare , & cor ipsum tueri, & roborare possint ; reliqua autem exteriora applicanda ad horum conformitatem præparentur , & summa cum ratione adhibeantur . Si autem nec purè criticè , nec purè symptomaticè appareant hæ maculæ , sed sit motus medius, quoniam in hoc diuersa , & contraria euenire possunt ; nam quandoq; simul aliqua apparent bona, & aliqua mala, ac nō nulla, quæ spem salutis afferant , nonnulla , quæ adimant ; ideo in hoc solers , & diligentissimus Medicus esse debet, circumspiciatq; omnia, quæ ad hunc motum consequuntur, antequam manum ægrotanti admoueat : si enim plura sint bona, quæ sequuntur, quàm mala, bonaq; , quàm mala sint maioris efficacis , coctionisq; signa cruditatis signis præuallere videat, speretq; maius fore iuuamentum , quàm nocuum , adiuuet motum hunc , naturæq; opituletur, quantum in eius erit facultate, cum propositis , & superius explicatis remedijs . secus autem , si oppositum contingat ; cum enim signa cruditatis superabundare , plura que mala ad expulsionem consequentia , sicuti virium languorem , ægri malam tolerantiam , & similia, hæcque maioris efficacis , & ponderis, quàm bona , nouerit , dubiusq; sit de iuuamento, quod laturus est, abstinere ab omni auxilio , quod hanc materiæ propulsionem adiuuare possit, in hocque casu similiter, ac si motus hic purè symptomaticus fuisset , se gerat. semper tamen cauendo ab his, per quæ ad intra repelli materia , & retrocedere posset . & hæc de maculis, ad quarum exemplum exanthematum , aliarumq; omnium cutanearum excretionum curatio dirigatur. Sicuti autem natura in huiusmodi febre sæpe materiam peccantem ad cutim per exanthemata, & maculas dictas detrudere conatur, ita & eandem nonnunquam per lotium, nonnunquā per sudorē, aliquando autē per aluum , & aliquando per abscessum excernere tentat . In quibus excretionibus omnia ea, quæ in

*Macularū motus  
in medio existēte  
quid agendum.*

macu-



*Lotiū quādo,  
& quibus pro  
uocandum.*

*Lib. 4. de fa-  
m. iuen.*

*Sudor quādo,  
& quibus iu-  
mandus sit.*

macularum consideratione adnotauimus, attendenda sunt, eodemq; modo procedendum, scilicet, vt nunquam purè symptomaticas excretiones, nec purè criticas perfectas, sed tantum imperfectas, & medias adiuuemus; Vnde lotium nunquam prouocabitur, nisi ex parte cocta materia, idemq; natura excernere conante; quod enim crudum est, & probe consequi debet, vt dicebat Galenus in cura lassitudinis vlcerosæ, huic tanta adhuc vexatio non conuenit: cum autem natura eò vergat, materiaq; aliquam acquisierit coctionem, tunc diu retica, & quæ materiam eò ducere possunt, exhibeantur, & sint ea precipuè, quæ prauam qualitatem remittere possint, sicuti spica Celtica, Valeriana, asarum, scordeum, & huiuscemodi, quibus admisceri possunt aliqua refrigerantia pro ratione febris, sicuti semina illa communia. Si autem materia in totum cocta fuerit, naturaq; per eam viam imperfectè iudicauerit, similibus, at vehementioribus, adiuuanda erit. Si autem perfectum fuerit iudiciū, nihil medico agendum erit; sicuti & nihil pro lotij prouocatione agere debet, quando natura colliquato vel corpore, vel humoribus illam ichorosam, & serosam materiā vniuersam ad renes detrudit; Vnde copiosissimum profluit lotium colore, & substantia aliquando naturali, aliquando non naturali existens, vt sæpe ego vidi, sed tantū tunc obstare debet colliquationi tentans eiusdem causas vel remittere, vel in totum adimere, tuendo tamen & urinæ vias, & meatus, tum per ea, quæ interius assumuntur, tū per ea, quæ exterius adhibentur. Huic similis est casus de sudore; quoniam & qui purè criticus, & qui purè symptomaticus est, nullo modo iuandus est. Vnde si cocta materia, & decreto rio die sudor eueniat, ac integrè sedet febrem, vel saltem faciat, vt æger facilius morbum ferat, calidusq; ex toto corpore procedat, cum hic verè criticus sit, nihil medicus agat, nisi ægrum à sudore illo extergendo, & recta ratione expurgando. Si verò nihil tale efficiat, sed potius oppositum

agar,

agat, frigidusq; sit, & circa caput tantummodò, vultum, & ceruicem, erit symptomaticus: hicq; non est adiuuandus. Immo hic cum malè prodeat, viresq; dissoluat, potius cohibendus est: quod fiet, si facies aqua rosacea, admixta portuicula aceti rosacei leniter, & sæpius madefiat: à quo tamen abstinendum est, dum summa est colliquatio, sudorq; sit diaphoreticus, & vires langueant; quoniam hæc mortem proximam, non curationem, indicant. Quòd si mors nō ita instet, maximum ad sistendum sudorem iuuamentum ex Theriaca habebimus, quæ sicuti diaphoreticos sudores in cardiacis firmare potest, pariter in pestilenti febre, si quid aliud, eisdem sistere valebit. Quo casu adhibeantur etiam ea remedium genera, quæ in cardiacis passionibus ministranda veniunt; quales sunt inunctiones ex oleo myrtino, rosaceo, melino, euanthino, & similibus, quibus circa partes exudantes superinspergatur pulvis ex myrti folijs, ex rosis, ex euantho, ex hordeo, ex sandalis, & similibus rebus cōfectis. Circa manum autem sinistram apponatur cataplasma, cum magnū erit incendiū, ex folijs rubi, ex myrti tum baccis, tum folijs, ex rosis, ex capreolis, & pampinis vitium, & ex plantagine vnā cum pane in oxicato macerato paratum: aut vbi tantum non adsit incendium, mala cotonea, vel palmæ immaturæ, quarum loco accipiantur thamarindi vino austero incoctæ, & contusæ, ceratoq; aliquo (quod rosas, myrtillos, hypochistidem, euantem, acaciam, & similia adiuncta habeat) exceptæ in modum cataplasmatidis apponantur: talia enim medicamentorum genera, vbi sudorū sit nimius excessus, mirum in modum prodesse solent. Si autem sudor non perfecta existente coctione eueniat, hinc tamen subsequatur morbi leuamen, faciliusq; æger toleret morbum, calidusq; sit, non tamen copiosus, adhibeat Medicus quæ sudorem prouocare possunt, sicuti aquam hordei copiosam, vel simplicem, vel cum radicibus petroselini, vel feniculi, vel aniso, vel artemisia, vel dictamo, vel caricis, vel re

*Lib. de Theriaca ad Pis.*

confi-

*Colliquefacto  
fluxu presente,  
quid agendum.*

consimili paratam. pannis æger tunc cooperiatur, & quiescat, sique sit procliuis in somnum, dormiat; ita enim facilius sudor prolicietur, hunc eundem facilitabunt frictiones opportuno tempore factæ, cibariaq, tunc temporis cum his, quæ sudores excludere valeant, alterentur. Fluente autem aluo circumspiciet. Medicus, an hoc sit colliquationis vice, an quia peccantem materiam natura excernere tentet. si fluxio fuerit ex colliquefacientibus, consideret, an febris sit ardens, vel non; si fuerit ex ardentium genere, frigida aquæ potus tempore conuenienti exhibitus, vt Ruffus Ephesius monebat, præcipuè prodesse poterit. in hac tamen pariter, ac in febre non ardenti administrentur ea, quæ colliquationis causam inhibere possint. talis autem causa cum sit vel putredo ingens, vel corruptio, & mala qualitas, ea, quæ putredini resistunt, quæq, corruptionem, & prauam qualitatem remittere valent, adhibeantur, qualia sunt prædicta omnia in curandi ratione iam explicata remedia, ex quibus ea seligantur, quæ præcipuè acida, & frigida sint, licet nouerim etiam scordeum, quamuis calidum, forsitan omnibus in tali casu præferendū, cuius vsum vnà cū saccharo rosacco, vel cōserua acetosæ in colliquatibus febribus felicissimū habeo. Ad idem maximè proficere possunt boli, & terræ numeratæ, cæteræq; omnes, quæ à natura validam coctionem consequuntur, prædictis similes fuerint. hæ enim, siccanti, & refrigeratoria qualitate, qua donatæ sunt, validè colliquationem sistere valent. In hunc eundem effectum proficius erit vsus alicuius aquæ naturalis, quæ, cum sit vel ferrea (vt quidam dicunt) vel mixturam alicuius terræ boliue, vt ego celsæ, per summam coctionem receperit, existat refrigerans, & exsiccans, qualis nunc Imeldulæ habetur opera Domini ci Rosurij (quoniam unicuiq; sua debetur laus) præstantis Medici inuenta. hæc autem non astringendo (minimæ enim adstrictionis est particeps) sed refrigerando, & exsiccando, addita partium tenuitate, qua penetrare, & non obstruere potest,

*Colliquatiuis  
fluxibus an cō  
ueniant medica  
menta purgan  
da.*

potest, in huiusmodi colliquefacientibus fluxionibus admodum pollet, tum putredinem inhibendo, tum caliditatem temperando, tum seminaria praua disperdendo, tum viscera omnia roborando, huius usus est pro potu, pro medicamento, & pro coctione alimētorum. bibitur enim summo mane vel sola, vel ei admixto aliquo prædictorum medicamentorum ad quātitatem quinq;, aut sex vnciarum, vel paulò plus. quæ quantitas, si sitiant ægrotantes, repetatur eadem die per tres horas ante cenam, in cena, & prandio, vel sola pro potu: vel ubi vinum sit exhibendum, ad eum lymphandū assumitur, in eademq; omnia cibaria coquuntur. eamq; hoc pacto administratam docuit experientia felicissimo euentu multum prodesse, nec in ea quid timendum esse, nisi ubi patientes sint frigidioris, & languidioris ventriculi. in his enim tum in potu, tum pro medicamento exhibita cautè administranda est, vel eam ad calidum alterando, vel eidem calida, & proportionata medicamenta commiscendo, simulq; ventriculum exterioribus tuendo. Huius tamen analogia non assumant in usum Medici aquas eas, quæ, ultra refrigeratoriam facultatem, sint etiam valdè, aut insigniter, & manifestè adstringentes; quoniā hæc constiparēt quidem, ac materiam intrò retinerent, non tamen, cum ratione adstrictionis obstructions fouere, & inde febrem augere possent, propriè ad colliquationem tollendam conuenirent. Symptomati enim, & non causæ aduersarentur. Si cuti autem talia interius maximè conueniunt, pariter exterius epithemata, inunctiones, & linimenta tum thoraci, tum ventri inferiori, quæ ipsæ donata sint facultatibus, administrentur; ita enim calorem præter naturam refringere, & colliquationis causas abolere poterimus. An autem in his fluxionibus conueniat (sicuti nonnulli celebres Viri arbitrati sunt) exhibere medicamenta, purgantia quidem, sed quæ viarum adstrictionem relinquere post euacuationem apta sint, id nos doceat medendi ratio, & recta methodus,

*Colliquefacien-  
tibus fluxibus  
an conferat ad-  
stringentia me-  
dicamenta.*

thodus; cum. n. educatæ per tales fluxiones nō sint superfluitates ab humoribus ipsis, vel à partibus solidis decissæ, sed sint vel humores ipsi, vel solidæ partes, quæ colliquantur, nemo ambigat villo pacto euacuandū esse, sed causis colliquationis tantū esse incumbendū, asserat. Evacuatio. n. per pharmacū tentata nec materiei colliquatæ, cum natura eā sponte educat, debetur, nec à colliquanda indicatur, cum vera in hoc affectu ea sumenda sit indicatio, quæ colliquationem inhibeat, quam tamen colliquationem non tantū non inhibere, sed eam augere medicamentum soluens poterit. Quod quā periculosū, ac discriminis plenum in talibus fluxibus existat, dicant illi, qui audacter hoc tentantes in præcipitem casum deduxere ægrotantes. Quemadmodum autem pharmaca soluentia à me in his colliquefacientibus fluxionibus damnantur, similiter nec adstringentium medicamentorum vsus probatur; quoniam si ea materia, quæ per colliquationem expressa ex toto prava existit, ad intra ægrō tantis corpus retineatur, retenta maiorem, quā excreta, lēSIONem inferre posset; hæc enim præterquā, quod continuè sui prauitate febrem ipsam foueret, etiam ex retentione ista deterrimam consequeretur qualitatem; vnde & morbum augeret, & ad cor, vel ad cetera principalia membra facilē motum caperet; quapropter materiei iam genitæ tota ipsi naturæ, vt eam sponte excludat, euacuatio dimittatur, causisq; colliquationis à medico, quantum pro viribus eius erit, incumbatur; Si autem fluxus non colliquefactionis fuerit, sed natura per aluum excretionem materiei peccantis tentauerit, attendat Medicus & naturæ motum, & materiæ qualitatem. Si motus fuerit symptomaticus, materiaq; sit cruda, & prava, dum non est superflua euacuatio, nil aliud consideret, quā munire intestina clysteribus opportunis, nè in transitu ab ea materia quid patiatur; quoniam symptomata nunquam curanda veniunt, nisi vel cum subeunt rationem causæ, vel cum vires debilitent. At si ni-

*Colliquefaciēti  
bus fluxib. an  
conferant ad-  
stringentia me-  
dicamenta.*

*Materia febris  
per aluum ex-  
creta, quid age-  
dum.*

*euacuatio*

*mium*

mlum hæc euacuatio excesserit, vnde virium languor timeatur, non tantum munire intestina debet, sed & adstringentia propinare, & fluxum cohibere conuenit cum his, quæ & materiam peccantem, & morbum præsentem respiciat. Cum autem euicta materia, eius excretionem natura per aluum molietur, dum natura sponte euacuat, consideret, & attendat euacuationis finem; si enim perfecte, & integrè iudicauerit, nihil intentandum erit: sin minus id, quod deficit, supplere debet, pharmacoq; opportuno materiei reliquum euacuabit; ita enim operi extremam manum imponet, cum ea, quæ post iudicium relinquuntur, recidivas facere consueuerint. Cum autem natura per abscessum materiam extramittere tentat, vnde in partibus glandosis sæpe tumores superueniunt, vel parotides, vel bubones dicti, non regula illa generalis superius declarata attendenda est, sed in casu isto hoc particulare seruetur, quod semper hi motus, quomodocunq; eueniant, sunt adiuuandi; cum enim ad partes ignobiles, & quæ excrementa facile viscerum suscipiunt, materiam hæc prauam, & qualitate venenata infectam à natura detrudantur, nunquam reprimendæ sunt. sed loca illa sunt laxanda, & medicamentis attrahentibus ille motus magis irritandus, & prouocandus est. pro laxatione faciet butirum, pinguedo pulli, axungia suilla recens, oleum amigdalarum dulcium, diachylon cum aliqua pinguedine dissolutum, & similia. Attractionem iuuabunt animalia viua dissecta, & statim apposita, sicuti & catuli, pulli, collumbini, gallinæ, & galli, & hoc præcipue cum summus est dolor. validius attrahent emplastra ex fermento, caricis, capis, columbinis stercore, & similibus attrahentibus, admixtis pinguedinibus supradictis. Validissime omnium attrahit cucurbitula, sed omnium est dolorosissima; quare nisi in urgentissimo casu admoveatur; dolores enim ingentes vires dissolunt, quarum conseruationi maxime in hisce febribus attendendum est. Euocata materia ad partes exteriores, tentetur suppuratio

*Abscessibus  
apparentibus  
quid agendum.*



cum opportunis medicamentis. quo peracto aperiatur tumor, reliquum materiei concoquatur, vlcus mundificetur, abstergatur, apertum diutius teneatur, & tandem consolidetur, & ad cicatricem ducatur, semper ea applicando remedia, quæ ea admixta habeant, quæ veneno aduersari, & prauam qualitatem remittere possint. Plurima alia hisce febribus mala superuenire possunt; quæ quoniam alijs morbis etiam cõmunia sunt, curatioq; consimilis, & eadem methodo indicata eis debetur, ideo ea consulo hic prætereo; quoniam illa, quæ propriè ad curationem febris pestilentis pertinent, tantum enarrare decreui, eiusq; solius tractationem portractare sponendi.

*De ratione victus seruanda in febre pestilenti.*

*Cap. XXV.*

**E**A medendi est ratio, vt non solum circa ægrotantes medicamentis agamus, sed etiã victu; cuius talis, ac tanta ratio haberi debet, vt cognoscat Medicus, ea neglecta, cætera omnia auxilia incassum administrari. quapropter cum ad propulsandam hanc febrem tradita iam sint, & explicata opportuna remedia, pro eiusdem perfectâ curatione ad rectam victus rationem descendamus, eamq; doceamus. Recta victus ratio in conuenienti consistit sex rerum non naturalium administratione. in quarum usu si & Medicus, & æger, ille imperando, hic exequendo, vt decet, se gesserint, maximo ad exterminandam febrem remedio operam dabunt, Incipientes autem à cibo, & potu in his animaduertimus plura esse adnotanda. considerandum enim est, quæ cibaria in hac febre conueniant, eorundemq; quantitas, qualitas, præparatio, & assumendi tempus. Quæ cibaria conueniant, habetur à morbo, & virtute. morbus hic semper est cum corruptione humorum; quare eorundem exigitur contemperamentum, virtusq; in hac febre, licet modò magis, modò minus, ferè semper languet, quare

*Cibaria conuenientia in feb. pest.*

quare pro eiusdem conseruatione, & etiam augmento, vbi expediet, indicabuntur cibaria, quæ nutrire multum possint, sed quæ leui admodum egeant coctione, & nequaquam excrementosa sint. hæc autem duo munia obire poterunt iura pullorum, præcipuè iuniorum, carnes eorundem, & caponum, & auicularum montanarum, perdicum, attagenarum, fercula in iuribus his parata, quæ erunt vel ptisana, vel panis tritus, carnes eadem, vel in elixatione in iure eliquatæ, vel contusæ, vel per Balneum Mariæ destillatæ, ouorum recentium lutea, vel sorbilia, vel in iure dissoluta. Quantitas similiter & à morbo, & à virtute indicatur. à morbo quidem, quoniâ cû Medicus æstimare debeat, an morbus futurus sit vel longus, vel brevis, & an ad statum properet, vel non; vbi censuerit morbum fore longum, & statum distare, copiosius alere debet, quàm vbi morbum fore breuem, & instare statum indicauerit. à morbo etiam alia ratione quantitas indicari potest; quoniam si morbus hic paucam, aut minimam corruptionem humorum admiserit, parciorem indicat cibum, quàm ille, qui est cum ingenti humorum corruptione. cum enim corruptio contemperamentû exigat, vbi corruptio maior, maior etiam alimenti contemperantis copia requiratur. A virtute autem indicatur quantitas; quoniam vbi ea valet (quod vix in morbo isto inuenire queas) parcius cibandus est æger, tum quoniam virtus valida diutius perdurare potest, tum nè à proprio opere coctionis humorum peccatum distrahatur natura, cuius proprium est & cibum, & humores peccantes concoquere. Si autem languet, vt in hisce morbis ferè perpetuum est, indicat de pauca quantitate cibi exhibenda; vbi enim virium est imbecillitas, multitudinem alimenti sustinere non possunt, & hoc valdè animaduertatur; quoniam ego in hoc vidi maxima errata sæpe in actu medendi à communiter medicinâ facientibus perpetrata. hi enim, dum vires languent, statim ad maiorem cibi quantitatem deueniunt, & quò magis de-

*Quantitas.*

bilitantur ægri, cò magis quantitatem alimenti adaugēt: ita  
 vt & lutea ouorum, & còtusa, & fercula simul miseris ægro  
 tantibus exhibeant, vnde eos in perniciem ducunt, cū hinc  
 non inualefcāt vires, immo magis opprimātur, & suffocen-  
 tur. vidiq; ego ex talibus plurimos (qui forsā vel non pe-  
 rijssent, vel saltē tardius) à sola cibi nimia, & superflua  
 quantitate, cum vltra vires cibum sumpsissent, necatos: qua  
 propter cum debili existente virtute parum cibi indicetur,  
 ad multam quantitatem non deueniamus. quē quantitas li-  
 cēt sit necessaria pro contemperandis humoribus, & pro re-  
 stauratiōe virium, ac corporis nutritione, nequaquam ta-  
 men eam, nō potentibus hanc viribus tolerare, admittamus,  
 sed parum cibi pro uice exhibentes eandem quantitatem sæ-  
 pius iterabimus, ita vt parum, & sæpe cibantes eam totam,  
 quæ requiritur ad virium restauratiōem, quantitatem asse-  
 quemur. Qualitas indicatur à morbo, moribus autē hic  
 est febris pestilens. quā febris, victum indicat humidum, &  
 refrigerantem; victus enim talis omnibus febricitantibus cō-  
 uenit, vnde actu humida, & sorbilia exhibebimus, quorū  
 ratione & humectatiōem, & faciliorem cibi cōctionem ha-  
 bebimus; cum solida, & dura difficiliter concoquantur, &  
 distribuuntur. qua pestilens autē, indicat, vt victus ea  
 donata sit facultate, qua venenatæ qualitati, & corru-  
 ptioni, & putredini aduersari queat; Vnde alterentur ciba-  
 ria sonco, acetosa, endiuia, scordeo, issopo, melissa, bora-  
 gine, seminibus citri, corticibus citri, semine acetosæ, & si-  
 milibus, ea in iuribus ebulliēdo. cibarijs pro hac intentiōe  
 admisceantur margaritæ, fragmenta lapillorum pretio-  
 sorum, coralli, cornu ceruinū, cornu vnicornis, os de cor-  
 de cerui; addantur pulueres cordiales pro cibo, quæ omnia  
 pro ratione materiei peccantis, vel calidæ, vel frigidæ admi-  
 nistrentur, & cōponantur. Qui consulunt, ferculis admiscē-  
 dum esse succum granatorum, citri, limonū, vuē immatu-  
 ræ, & reliqua huiusce qualitatis, à me non probantur, quia

non

non habent rationem obstructionum, quæ inter cætera sunt potissimæ huius febris causæ tum fouentes, tum efficientes: sicuti autem à me non probantur ista adstringentia; ita & damnantur dulcia, tum quoniam hæc ventriculum subuertunt, tum quoniam faciliè bilescunt, vnde incendium internum angeri potest. quare vsus eorum, quæ ex saccharo parantur, hic dimittatur, fugiaturq; ea sacchari tam ingens quæritas, & tam continuus vsus, quanta, & qualis imperatur, & ordinatur continuè à multis malè medicinam facientibus.

Præparatio habetur à qualitate morbi, & materiæ peccantis: quare cum hic habeamus corruptionem, putredinem, & malam qualitatem, indicatur ea ciborum præparatio, per quā his omnibus repugnare, & aduersari possimus. Vnde in præparatione ptisanæ, vbi præsentè ingenti interius caliditate sit exhibenda, torreatur hordeum, antequam coquantur. hinc enim maiore vi exsiccandi prædita erit. in multâ tamen humorum corruptione, tum quoniam faciliè diffluit, tum quia faciliè corrumpitur, ab hac abstinendum erit. in ferculo ex pane trito hoc fiat, vt medulla panis optimi in aqua sonci, seu endiuia, vel acetosæ, aut simili, infundatur, quæ exprimatur, & bis & ter commutetur, vt panis inde lotus nouam adipiscatur qualitatem, & vim. sicq; expressus in iure ad ferculum conficiendum præparato elixetur. fercula ista itidem ad remittendam caliditatem præparentur cum lacte seminum melonum, vel cucurbitæ, lutea ouorum forbilia exhibeantur, vel sola, vel in iure alterato dissoluta. oua ipsa, antequam coquantur, temporis æstiuus, & calidioribus teneantur in aqua frigida vel acetosæ, vel endiuia, nè ab aere facilius alterentur, & in hunc vsum recentia tantum assumentur. Carnes coquantur cum prædictis alterantibus, vt nouum inde consequantur temperamentum, & facultatem.

Vbi autem maior vigeat putredo, & corruptio, iubeo ego, vt præparentur carnes modo hoc nunc explicando. Accipiant pullum, quem impleant cerasis acidis, amarenis dictis,

*Præparatio.*

*Contusum exhibedū in febre pest.*

folijs acetosæ, folijs limonum, folijs citri, & similibus; postea bulliat pullus ynica ebullitione, ita vt ablata spuma, expurgetur ab illo excremento crassiori. deinde in veru torreatur ad ignem non fumosum, cui, dum torretur, superinfundatur ius pulli, addita tertia parte succi citri; fugiatur enim omnis pinguedo, quoniam ab hac humores facili acceduntur, & sæuiunt. hinc autem habebitur caro tosta satis mollis, & suavis, quæ in vsum, cum expediet ægrotanti, ad comedendum venire poterit, præcipuè autem pars interna, non illa externa tosta, & siccata: ego autem ex pulpa illa interiori iubeo, vt paretur contusum, admixto iure alterato, quod optimè contundatur, & per cribrum tenuè transcoletur, vt coctioni facilius cedat. hinc autem habebitur alimentum, quod multum nutriet, & venenatam qualitatem propulsare, corruptioniq; ac putredini resistere queat. si tamen vires non ita valeant, vt hoc contusum sustinere possint, iubeo, vt ex eodem pullo eliquato in bulliendo habeatur ius, quod eiusdem erit facultatis, & multum nutrire poterit. Quòd si vires magis adhuc labant, accipio pullum, impleo conseruis iam in curatione enarratis, admixtis herbis, feminibus, & pulueribus cordialibus, & speciebus eiusdem facultatis, semper habita ratione, & febris, & humorum peccantium; iubeoq; vt vel prius coquatur in aliqua aqua stillatitia, quæ, si haberi poterit, non per vasa plumbea, sed per vitrea sit sublimata, morboq; & causis morbi proportionata: vel etiam si non coquatur, per balneum, Mariæ dictum, in vase vitreo destilletur, quo aqua carnis habetur potens in propulsanda prava qualitate, & valida in nutriendo. cuius vltus erit per intervalla, & nō continuè, vt multi hanc partem malè intelligentes, & mulieribus consentientes nō nunquam exhibendam iubent. Ad præparationem etiam pertineat coctio ciborum in aqua minerali, seu naturali, de qua superius. quæ aqua quando sit adhibenda, iam declarauimus, Videlicet vbi simul cum pestilenti febre adsit colli-

quatio,

*Stillatitia exhibenda in feb. pest.*

quatio, vel consimilis alius affectus. Tempus exhibendi *Tempus.*  
 cibum à temporibus morbi desumitur; tempora autem mor-  
 borum alia sunt particularia, alia vniuersalia. in particula-  
 ribus hæc cibandi seruetur ratio, vt semper in declinationi-  
 bus particularium accessionum offeratur cibus, si virtus  
 eousq; perferre poterit. vbi enim interuenerit aliquis casus  
 virium robur dissoluens, quocunq; tempore nutrire cogi-  
 mur. Si autem accessiones parem habuerint æqualitatem,  
 eundem seruantes febris motum, cibus ea exhibeatur ho-  
 ra, qua ægrotans sanitatis tempore assumere consueuerat.  
 ita enim facilius cibum tolerabit, minusq; ab eo grauabitur.  
 Quò ad vniuersalia tēpora hoc obseruandum est, vt in pri-  
 mis diebus is tantum offeratur cibus, qui virtutem manute-  
 nere possit, vel parum augere, si opus fuerit. quare tunc  
 temporis exhibeantur tantum ouorum recentium lutea, fer-  
 cula in iure pulli alterata, vel iura ipsa modo superius de-  
 clarato præparata, non autem exhibeantur carnes; quoniā  
 tunc nimis graue onus naturæ essent, putredinem augerēt,  
 & potius opprimerent, quàm releuarent vires. quod tamen  
 in ægritudinis progressu, alteratis pro parte, & humoribus,  
 & praua qualitate, laudarem, si cum moderamine admini-  
 strantur, & instante necessitate ad virium resolutarum re-  
 stauracionem. ad quam intentionem commendo omnia  
 prædicta, quæ summa tamē cū ratione administrari debent.  
 tanta est enim huius morbi sæuities, vt sicuti in medicamen-  
 tis, ita in ratione victus nullum impunem ferè vnquam ad-  
 mittat errorem. Pro potu abstineant primis diebus ab om-  
 ni genere vini; dum enim materia cruda est, à vino maximè  
 exagitur, & facilius feruescit. aqua simplex etiam nō cō-  
 uenit, quia in hypochondrijs faciliè bilefcit; si bibant etiam  
 aquam cum saccharo coctam, & nullam dilutam, mihi hæc  
 non admodum probantur; quoniam similia dulcia faciliè vē-  
 triculum subuertunt, quod maximè vitare in hisce morbis  
 debemus. nonnulli succum granatorum, succum berberis,

*Potus admini-  
 strandus in feb.  
 pest.*



succum vuæ immaturæ aquæ pro potu admiscant. at ista ad modum adstringentia semper mihi valdè suspecta sunt. bibant potius aquam hordei, vel aquam, in qua decocta fuerint cerasa illa acida, amerena dicta, consueui ego ordinare, vt pro potu in aqua cocta tātum iuleb rosacci, & tantū vini granatorū medij saporis admisceatur, vt nec dulcedo, nec austeritas gustui pateat, ex quibus habet potio, quæ nec ratione dulcedinis infesta, nec ratione austeritatis nocua erit. Apparentibus autem coctionis signis, vel virium imbecillitate instante, exhibeatur vinum album, pauciferum, odoratum, nec dulce, nec adstringens, sed medij saporis, vel sub adstringentis, & optima aqua lymphatū: quòd si ratione affectionum cerebri, vel alicuius instantis symptomatis, vinum timeamus, panis medulla ad prunas calefiat, & leuiter torreatur, huicq; superinfundatur vinum, quod per notabile temporis spatium ita infusum maneat, postea panis extrahatur, qui iam vini subtiliores spiritus, & calidiores attraxerit. quo pane extracto, superaddatur aquæ ea quantitas, quæ ad vinum lymphandum satis esse poterit. hoc autem pacto paratū vinū non ita petet caput, nec incēdium faciliè augebit. Vini autem quantitas sit pro ratione ingesti cibi; vbi enim plurimum vini fuerit, difficilior concoctio alimenti subsequetur ob supernatantem ad os ventriculi assumptū cibum, faciliusq; indè cerebrum ob eorum plurimos vapores replebitur. & hæc de cibo, & potu. Quòd ad aerem, temperetur, & alteretur, pro ratione morbi, temporis anni, constitutionis aeris, eiusq; qualitatis; & in hunc vsum veniāt omnia ea, quæ superius descripta sunt pro aere alterando, & temperando, & expurgando. Excrementa, præsertim crassiora, si non spontè descendunt, arte procurentur, hicq; ea conueniunt clysteria mollia, de quorum præparatione superius iam abundè dictum est. acriora autem vitentur, & in hunc vsum non admittantur. Quies summa imperetur; ita enim facilius natura coctionem accelerabit, quā à proprio

coctio-

*Aer.**Excrementorum  
ratio.**Quies.*

coctionis opere motus distrahit. Somnus, & vigilia moderata sint; Vtraque enim si modum excefferint, malum. Somnus diurnus, ubi in nocte dormiat æger, est fugiendus, solumque, nocturnis instantibus vigiliis, concedendus. Quod si non dormiat, arte procuretur, adhibendo leuiora; quoniam grauiora, cum stupeficientia sint, stante virium imbecillitate, quæ ferè semper hanc concomitatur febrem, valdè suspecta sunt, cum vires extinguere nimia stupefactione possint. Quod si vigiliæ cum tali virium languore valde instent, abstineat medicus ab his, quæ interius exhibentur, & solum exterioribus agat, sicuti inunctionibus, linimentis, odoramentis, balneis ad extremas partes factis, & similibus, à quibus timenda non sit virium dissolutio. Si autem non vigilia, sed somnus superfluat (quod semper est malum, cum omnes febres somnulosæ timendæ sint) excitentur patientes odoramentis, & suffumigijs factis ex aceto, in quo herbarum attenuantes ebullierint, sicuti organum, pulegium, thymum, maiorana, salvia, stæchas, & huiusmodi. præterea frictionibus, ligaturis, cucurbitulis vel scarificatis, vel non scarificatis, reuellatur materia ad partes inferiores. quod si materia in cerebro proprium affectum inducat, cerebro per propria medicamenta, & morbo proportionata attendatur. Omnia animi molestia accidentia vitentur, sint hilares patientes, læti viuant, & benè sperent, Diuinū implorantes auxilium, cuius ope, & febris tolli, & vita diu conseruari poterit.

*somnus, &  
vigilia.*

*Animi accidentia.*

**FINIS.**

**PETRI**

PETRI SALII DIVERSI,  
 MEDICI, AC PHILOSOPHI  
 FAVENTINI.  
 DE AFFECTIBVS  
 PARTICVLARIBVS.



EDICI ea præstantia esse debet, vt non tantum circa illos morbos, qui frequentius accidunt, quorumq; exactissima ab authoribus habetur pertractatio, bene se gerat, sed etiam, vt in eis, qui raro eueniunt, quosq; praxim communiter docentes vel neglexerunt, vel ignorauerunt, ita se præbeat, vt recta cum ratione, opportuna in his administrando medicamentâ, miseros ægrotantes, artis nostræ implorantes auxiliû vel negligentia, vel ignorantia non eludat; ita enim agendo præstantem medicum se esse ostendet, & dignum, cui ægrotantium salus, & hominum vita fideliter, & merito committi possit. Qua de re cum tanti hoc referat, & cum inter morbos ego nonnullos, qui raro contingunt, & quorû tractatio à communiter medicinam facientibus non habetur, aliquando homines infestare adnotauerim, de his (cû præcipuè inter cæteros nonnulli periculosissimi existant, sæpissimeq; mortem ægrotantibus inferant) hic agere decreui, tum vt unicuiq; pateant, tum etiam vt eorum recta curandi ratio innotescat. Vnde monitus in his raris ægritudinibus hoc consequetur Medicus, vt si ægros hisce morbis laborantes sanitati restituere ob eorum sæuitiem quandoq;

non

non possit, saltem appositè ad sanandum curandò opportuna, conuenientiàq; adhibeat medicamenta, & innoxie, & cum ratione medendo discernat, rectèq; iudicet de futuro ægritudinis euentu. inter hos primum habeat locum cerebri inflammatio. qua declarata ad cæteros descendam, singulorum essentiam, causas, signa, & curationem proponens, & explicans.

*De Cerebri inflammatione. Cap. Primo.*

**A**pprehendit aliquando cerebrum inflammatio, cuius tanta est violentia, vt inde ægrotantes intra quartâ diem sæpius mortì succumbant, cum inuadit hic affectus; apprehendit patientem ingens capitis dolor, qui p occiput collo, & vniuersæ spinæ communicatur, à quo statim deperduntur sensus, tum externi, tum interni, solusq; remanet motus, qui adeò nonnunquam in his ægrotantibus validus est, vt vix quandoq; loco contineri queant. quamprimum enim correpti sunt hoc morbo deperdito, vnoquoq; sensu exiliunt ægri, quemcunque inordinatum motum tentantes, modò cruribus & pedibus, modò toto corpore se agitant, præcipuè autem manibus, partes superiores, licèt non semper, sæpius tamen, inuadunt, easq; toto conatu distrahère nituntur; vt interdum viderim ego mulieres hoc morbo detentas omnes crines dilaniasse, & totam faciem vnguibus proprijs dilacerasse, sicuti etiam & viros hæc eadem ægritudine deprehensos totam ferè barbam sibi euellentes idem fecisse conspexerim. procedente morbo languescit corpus, ad motumq; impotens redditur. hi semper sine voce manent, nec vllum vestigium sensus retinent; cum nec (si etiam fortiter pungantur) respondere, aut annuere posse videantur. accedente hoc morbo, vnà inuadit acutissima, & intensissima febris, quæ eundem semper concomitatur affectum, cum tanta tamen febre, nec, si potù offe-

*Causa quare  
non sentiant.*

quam

quam admittunt. Horum omnium causa est inflammatio; substantiâ, corpusq; ipsum cerebri occupâs. cuius ratione ita deperduntur virtutes rectrices, cû cerebrû per propriam, & innatam temperiem munia sua exequatur, vt nec dignoscere affectum ipsum, nec cetera queant: vnde licet in parte nervosa spiritus animales non sint intercepti, tamen, quia his mens egrotat, & deprehensa est, nec dolorem, nec quid molestum ad extra perferunt, interius tamen cum supra modum affligantur, adsitq; incendium maximum, irritata natura est in causâ illius motus voluntarij, qui non potest tolli, non obstructis, vel oclusis nervis ipsis. Febris autem huic morbo connectitur; quoniam cum inflammatio sit valida, & sit in membro principali, necessario ad hunc consequitur febris. Huius inflammationis causa est sanguis super calefactus, vel admodum biliosus, qui affatim irruens ad partes superiores, cerebri corpus, & partes eius internas, ipsiusq; substantiam occupans in eo figitur, firmaturq; ac inflammationem facit; per inflammationem nunc intelligamus omnem tumorem calidum, siue pura inflammatio, siue erysipelas, siue ex utrisq; mixtus affectus fuerit. Huius signa ex prædictis sumantur, quibus hoc addatur, quod facies in huius morbi principio satis rubet, & fere tumet; oculi autem præcipuè rubent, & in his venæ sanguine plenæ apparere solent, coactantesq; ac fixi prominent. Prædicta signa observantes habebimus ea, per quæ distinguitur hic affectus à cæteris, qui huic similes existentes cerebrum occupant. Ab Epilepsia differt, quoniam licet in vtrisque deperdantur sensus interiores, & exteriores, & in vtrisque adsit motus, tamen in Epilepsia est motus convulsivus, in hoc autem est voluntarius; præterea in Epilepsia spuma ex ore procedere consuevit, quæ nunquam in hoc affectu videtur; cui etiam necessario febris acuta connectitur, quod non est in epilepsia. Ab apoplexia distinguitur, quoniam in apoplexia tollitur & motus, & sensus, at in isto soli sensus desunt;

non

*Causa.*

*Cerebri inflam-  
matio quo mo-  
do differat à ce-  
teris morbis ce-  
rebri occupan-  
tibus.*

non motus. præterea apoplexiæ necessariò non adiungitur febris, immò rarò in ea, & salubriter aliquando apparere solet; at in hoc febris acuta admodum de necessitate connectitur. A phrenitide autem distat; quoniam in phrenitide est delirium, & non deperduntur sensus, quorum neutrum est in isto affectu. Videtur quidem consimilis phrenitidi hic morbus ratione affectionis, & ratione loci affecti; quoniam in vtrisque est inflammatio, & in vtrisque inflammatur cerebrum, tamen maxime differunt ratione partis, & loci affecti; quoniam in phrenitide potius est inflammatio in mèbranis, quàm in cerebro ipso, & præcipuè in tenui, à qua communicatur & ipsi cerebro inflammatio, potissimumq; parti eius exteriori, & contangenti membranam: at in ista internas cerebri partes, eiusque ventriculos, & propriam substantiam inflammatio occupat. qua de re casus hic grauior est, quàm ille, magisq; lethalis, & potissimum cū hæc inflammationes magnæ existentes partem frigidam, materiâq; peccati improporcionatam occupent: vnde sæpè euenire solet, vt partem ipsam patientem ferè corrumpant, & ad gangrænam deducant: quapropter dicebat Hippocrâtes casum hunc ab alijs non animaduersum, cõsiderans. Quibus cerebrum sphacelatum est, in tribus diebus pereunt, si verò hos euaserint, sani fiunt. per sphacelum autem hic, vt monet Galenus in commento, intelligit non factam, & completam partis corruptionem; quoniam hæc sanationem nō admittit, sed quæ est in fieri, imminetq; ob inflammationis magnitudinem. Qui autem hoc patiuntur, velociter pereunt, tum quoniam morbus est grauissimus, tum quoniam pars maximè principalis admodum læsa est. quòd si tamen contingat, ægrum tribus primis diebus superuiuere, & ad diem quartum peruenire, possumus sperare, & morbum declinaturum fore, & vires ita fortes esse, vt morbum superare possint. quod vbi contigerit, in ægro nulla erit memoria præteritorum. non recordatur enim nec morbi,

*Lib. 7. Aphor;  
51.*

*Sphacelus qd  
significet quan-  
doq; apud Hip-  
pocrate.*

nec



nec alterius rei ad morbum ipsum pertinentis, tantum hoc vidi in nonnullis, qui saluari fuere, quod confuse meminerunt se valde anxios, & angustiatos fuisse, magnumque incendium perferensse, non tamen quid distincte enarrare potuerunt. Huius morbi meminit etiam Hippocrates lib. tertio de morbis sub nomine sphaceli, seu syderationis ipsius cerebri. ubi habet, quod in his caput dolet, & ceruix, & spina. quod intelligas, dum hic morbus patientem aggreditur, hoc enim facto sensus omnes externos, & internos amittunt. quod docere voluit exemplo auditus, & loquutionis, dum inquit, quod illi non audiunt, & quod de repente obmutescunt. subdit, his sanguinem e naribus defluere, quod non est vniuersale signum, sed aliquibus tantum peculiare. quibus si copiosior fluat, indicium est ex morbo conualiturum agrum. si parce autem, & stillet tantum, contrarium enunciabit. quod autem, ut inquit, hi liuescant, est in casu, in quo iam natura succumbente verè cerebrum sphacelatur; dum enim est spes salutis, non liuent, sed potius rubent egrotantes. Huius morbi narrationem æmulatus est lib. secundo de morbis, sed paulò aliter: quæ omnia fere in idem coincidunt, exponenda tamen ea ratione, qua nos morbum hunc iam explicauimus. De cerebri inflammatione loquuti sunt etiam Paulus, Actius, & Oribasius ex Philumeno, quos æmulatus est etiam Auicēnas in huius morbi explicatione, sed eorum casus non est huic, quem nos explicamus, similis. quoniam isti asserunt in hac cerebrum inflammatum ita intumescere, ut suturæ capitis disparentur. quod dictum nedum verificatur in casu nostro, sed nec apud me est possibile, cum suturæ ex graui ictu non ita facile dissolui, & disparari possint, nedum quod imaginari queat, ex tumore interno hoc accidere posse, nisi forsitan hoc in puerulis admittatur, in quibus suturarum ligamenta mollissima existunt, cartilaginosaque corpora nondum ossæ sunt facta. præterea addunt subsequi nauseam multam in illis, bilisque vomitum super-

*De cerebri inflammatione antiqui sunt auctoritates.*

super-

superuenire, quorum neutrum in casu nostro reperitur, nisi forsan hoc ante factam inflammationem acciderit, vt semel in vno vidi, qui in primo morbi insultu copiosissime euomuit, statimq; facta inflammatione, & sensus exteriores, & interiores amittens ab omni euacuatione quieuit. De Erysipelate etiam cerebri loquuti sunt, sed signa nostra non ponunt, & addunt in hoc dolorem totius capitis adesse, & videri egrotantibus flammam in ipso cerebro habere, quæ duo iure consequuntur quidem ad erysipelas; sed cum postea omnem sensum, & cognitionem hic tollat, non possunt esse signa presentis morbi. quare pro habendis huius signis recurratur ad ea, quæ ego declarauit, & enarraui, constitutusq; morbum hunc, cum sit inflammatio vel simplex, vel erysipelatides, esse intemperiem calidam cerebri cum materia, & cum tumore. quapropter pro eius curatione indicabitur, vt materia in cerebri substantia contenta euacuetur, & ipsum cerebrum refrigeretur. euacuabitur ista materia, si retrocedet, vel è corpore educat: retrocedet, vel impulsæ, vel attracta à corpore: educet, vel sensibiliter, vel insensibiliter; materia tñ non pōt retrocedere, nisi prius corpus sit euacuatum. Et ideo primò totum euacuandum est. Secundò ita agendum est, vt materia retrocedat, retrocedet autem, vel si reprimatur, vel si retrahatur. Tertiò debemus materiam discutere, & resolvere, & suis loco, & tempore refrigerare. An possit Medicus his indicationibus satisfacere, vel non: dixerim vnum, scilicet, rarò hoc contingere, vt huiusmodi ægrotantes saluentur; quoniam tanta est huius morbi sequities, vt cerebrum ipsum ad gangrenam vtpurimum deducat, nisiq; ex arte statim opportuna adhibeantur medicamenta, citissime pereat, & maximè, vbi vires ægrotantis imbecilles erunt, potissimum cū has nullo modo restitui possimus; ad oblata enim nequaquam apti sunt, solisq; exterioribus auxilijs hic agere possimus. Vbi tamen vires fortes erunt, cum in omni interna inflammatione, & in acutis morbis vni-

*Signa.**Indicationes.**Prognostica.**Lib. 10. Met.  
cap. 5.*

ca fit

ca sit salutis spes ipsa virium fortitudo, si cetera citò, tutò,  
 & cum ratione administrentur, possimus quoquo pacto sa-  
 lutem, licet semper cū maximo ægrotantis descrimine, & pe-  
 riculo, sperare. Pro executione autem indicationum propo-  
 sitarum ita procedendum erit. pro totius corporis euacua-  
 tione statim secanda est vena interna brachij dextri, vbi sit  
 magna plenitudo: vel si nō adsit plenitudo, humeraria, præ-  
 missa alui lenitione per leniens, & refrigerans clystere, non  
 per acre; acria enim per partem post partem calefaciendo  
 magis inflammant, & affectum præter naturam adaugent,  
 febremq; intensissimam, & acutam, quæ huic affectui con-  
 necitur, magis accendunt. Venæ sectio sit copiosa, repe-  
 taturq; eadem die ex altera humeraria. interim reprimen-  
 tia, & actu frigida adhibeantur. opportuna ad hoc sunt oxir-  
 rhedina ex oleo rosaceo completo, nō omphacino, addita  
 quarta parte aceti ad penetrationem, quibus totum synci-  
 put optimè abrasum continuè madefiat. Sed quoniam hic  
 summum est incendium, magis laudo irrigationes, & Em-  
 brochas cōtinuè adhibitas, & factas ex decoctionibus her-  
 barum refrigerantium, sicuti ex endiuia, lactuca, solatro,  
 semperuiuo, violis, portulaca, acetosa, & similibus, quæ  
 actu frigida incontinuo sint vsu super sinciput admodum  
 Embrochæ stillantis; possunt etiam cessantibus Embrochis,  
 parari emplastra ex prædictis herbis contulis, admixtis ea-  
 rundem succis, oleisq; refrigerantibus, addita portiun-  
 cula aceti rosati. hæcq; frigida actu applicentur: quæ cum  
 incaluerint, remoueantur, & repetantur. hocque modo in  
 morbi principio, & præcipuè, si tempus æstiuum fuerit, aga-  
 tur. His refrigerare, & materiam repercutere poterimus:  
 quam eandem materiam à cerebro retrahemus reuulsioni-  
 bus, & deriuationibus. pro quibus satisfacient cucurbitu-  
 læ scarificatæ, quæ plurimæ sint, & profundè incidantur, quæ  
 postea etiam repetantur, sed vbi non sit magna vrgentia;  
 non scarificatæ. ad idem facient frictiones, & ligaturæ do-  
 lorosæ

lorosæ extremarum partium. quæ etiam balneari possunt decoctionibus herbarum refrigerantium, sed quæ sint actu calidæ. ita enim actuali caliditate possunt reuellere, potentiali autem frigidityte refrigerabunt, & vaporibus illis cerebrum demulcere poterunt. fiant autem hæc ex folijs rosarum, violarum, maluarum, lactucarum, salicis, & huiusmodi, quibus semper aliquid chamæmeli addatur ad aliquam discussionem, & faciliorem transmissionem. ad eandem intentionem exulcerantia humeris, & spatulis appolita facient, quibus ego aliquando usus sum cum optimo successu ea ex catharidibus formando. Pro derivatione convenient hirudines post aures applicatæ, sectioq; venarum sub lingua, si ægrotantes admitterent, satis commoda esset, Sed illis vniuersalioribus præmissis, factisq; predictis reuulsionibus hoc vnum maximè laudo, cui potissimum attribuo sanitatē in nonnullis ex tali morbo recuperatam. Vide licet missionem sanguinis ex naribus, quam hirudinibus ad narium penitiores partes applicitis habeo, nitorq; vt copiosè effluat sanguis, vel iisdem repetitis, vel ad nares appolita spongia aliquo liquore relaxante, non tamen calidiori imbuta, vel saltem in aqua dulci calida infusa. hinc maximè subleuatur cerebrum, alleuiatq; natura morbus, si fieri dabitur, vniquā aliqua via, superabitur. quo casu remittantur refrigerantia illa, & quo ad actuale, & quò ad potentialem frigiditytem, admisceanturq; prædictis tunc aliqua temperata, vel leuiter discutientia, sicuti exirrhodino oleum chamæmelinum, embrochis illis malua, flores chamæmeli, meliloti, semina fenugræci, lini, radices althææ, & consimilia, quæ aliquo modo discutere valeant, quorum usum postea declinate morbo solus erit vel nullis admistis, vel paucioribus refrigerantibus. sternutatoria etiam tunc temporis, iam euacuato cerebro, & inclinante morbo adhibeantur, & aliqua odoramenta, quæ non sint grauia, nec caput replere possint administrētur. Et dum hæc omnia fiunt, semper habeatur

alius lubrica, & si non sponte fluat, ex lenientibus clysteribus, vt supra dictum est venter leniatur: & quoniam in his aliquando non prodit lotium, non exurgente virtute ad munus suum, vbi hoc euenerit, ad imum ventrem apponatur vesica semiplena oleo calido, vel aliquo decocto relaxante. iungatur idem locus oleo amigdalorum amararum, oleo de scorpionibus, & foueatur cum his, quæ virtutem excitare, & relaxare possint. Hæc quò ad medicamenta, quò ad victum, raro est, quòd ante quartam veniat cibus offerendus, quoniam, vel primis tribus diebus pereunt, & sic cibandi occasio præterijt, vel his transactis ad quartam perueniant, quo tempore, si res ex voto successura sit, incipiunt ægrotantes releuari, & aliquo modo sensus recuperare, & tunc cibandi sunt. sed cū omnimoda inædia præcesserit, non statim pleno victu uti debent, sed tenuiter alantur, cōtentiq; sint ferculo in iurè pulli tenuioris, vel alterato cum seminibus communibus, abstineantq; a vino, quò ad præsens nō fuerit totius morbi vniuersalis, & manifesta declinatio, quo tempore vinum bibant, sed pauciferum, & lymphatum, largiori; cibo utantur, qui pro ratione virium, & morbi præcedentis expediat tuncq; poterunt ægrotantes pharmaco electiuo ab humoribus calidioribus expurgari, vt integrè omnis morbi causa amoveatur.

*De Apoplexia à sanguine. Cap. II.*

**A**poplexiam fieri ab humore frigido, viscido, & lento, sit vel pituita, vel humor melancholicus, replete, & obstruente cerebri ventriculos, cuius ratione vis animæ ad partes inferiores defluere non possit, vnde ægrotantes motu, & sensu vnà cū detentione principum facultatum priuentur, nemo non nouit, omnesq; scribentes de hac pertractant. At Hippocrates quarto regiminis acutorum docuit etiam hanc fieri à sanguine, vt ibidem declarauit Galenus in commento vigesimo tertio, & vigesimo septimo,

*Apoplexiam  
fieri à sanguine.*

primo, quod idem & affirmault libro curatiuo per sanguinis misionem cap. quinto hæc verba habens. Nam hoc pacto apoplexię proueniunt, multo nimirum sanguine in principium animantis confertim irruente. Quod præcipuè aliquando in his contingere docuit, qui plurimo abundantes sanguine ad validas exercitationes perducuntur. vt habet lib. 3. Aph. cōmen. 20. sanguinis hæc plenitudo cerebrum occupans non per obstructionem ventriculorū, sicuti pituita, & melancholicus humor, apoplexiam generat, sed propter eorundem constipationem, & constrictionem, cuius ratione vis animalis ad infernas partes defluere impeditur. Venæ enim omnes cerebi, & sinus illi ampli, & præcipuè retiformis plexus adeo sanguine hoc confertim irruente replentur, vt ventriculis, & vasis principalibus angustatis transitus virtuti animali prohibeatur. Hinc dicebat Galenus libro secundò aphorismorum cōmen. 42. duplici de causa fieri apoplexiā scilicet aut oppletis ventriculis cerebri humore frigido, qui est casus, de quo omnes scribentes agūt. aut propter aliquam dispositionem inflammationi similem, quæ in ipso cerebro constituta sit. & hic est casus præsens, de quo nos agimus, & cuius curationem neglexere, qui singulorum morborum medicationes docere profitentur. Nā verè in tali apoplexia explurimo sanguine, cum ex calidis humoribus vnus sit, cerebrum occupante sit affectus inflammationi similis. Aduertatur autem quod non dixit Galenus ab hac inflammationem fieri, sed affectum inflammationi similem: quoniam in hac apoplexia sanguis ad intra propria vasa continetur, nec substantię cerebri communicatur, at in vera inflammatione à venis magnis ad minores, à minoribus ad capillares, ab his autem in porositates, & substantiam cerebri transmittitur. vnde verè membrum inflammat. Quod membrum inflammatum cum sit ex principalibus, necessariò ad eius inflammationem cōsequitur febris. quæ febris cum ab apoplexia abnegetur, non enim Hippo-

*Causa.*

*In apoplexia à sanguine nō fit vera cerebri inflammatio.*



crates nec Galenus vnquam huic, aut alteri apoplexiæ febrem cõpulâri meminere, idco apoplexiam à vera cerebri inflammatione causari non tradunt, nec ab ea fiet, sed tantum ab affectu inflammationi simili, qui non erit, nisi maxima venarum, & vasorum à sanguine calidiori repletio, de qua vasorum repletione solum in casu isto Hippocrates, & Galenus, non autem de cerebri substantia male affecta meminere, cuius ratione dicebat Hippocrates. Quod autem quis repente obmutescat, id ventarum interceptiones, occlusionesq; faciunt. quem locum declarans Galenus librò de morborum causis, post alia subiungebat. Vbi verò intercipiuntur, quæ sunt in animali, arteriæ, hoc est ita oppletæ sanguine fuerint, vt nullus in ipsis relinquatur locus, in quẽ, dum attolluntur, aerem externum attrahere possint, tunc quodammodo strangulatur, atque extinguitur calor internus, ac qui ita affecti sunt, subito sensum, & motum totius corporis amittunt. Quare hæc apoplexia non ex substantia cerebri inflammata, sed ex eiusdem vasorum nimia oppletione causabitur. Et hinc pateat eorum error, qui locum illum Galeni secundi aphorismorum exponentes per dispositionem inflammationi similem intellexerunt, vel veram inflammationem, vel erysipilas, pateatq; nec eos mentem Galeni assequutos esse, nec veritatem attigisse. vbi enim cerebrum vel inflammationem, vel erysipilas patitur, si partes exteriores, & membranæ tantum hic patiuntur, fit phrenitis, si autem intimæ partes, & internæ, ipsiusq; cerebri substantia hoc idem passa sit, accidit affectus ille, de quo supra egimus, non autem apoplexia, in qua cum necessariò adesse debeat impedimentum, per quod statim prohibeatur descendere vis animalis ad inferiores partes, hoc nõ ex erysipilate nec ex pura inflammatione, quoniam hinc nec ventriculi, nec vasa omnino angustiantur, pendere potest: sed tantum hoc fiet, ex venarum, arteriarum, sinuumq; nimia sanguinis repletione, cuius ratione facta constipatioq;

*Lib. 4. reg.  
acus. 23.*

*Lib. de caus.  
morb. cap. 3.*

&

& constrictio, unde spirituum non tantum transitus prohibetur, sed etiam, & ipsi strangulentur, & suffocentur, sit in causa, ut subito motus, & sensus una cum detentione principum facultatum amittatur, sicque vera, & exacta succedit apoplexia. Hunc affectum olfecit quidem Avicenna non tamen perfecte metam ipsam attingit. nam apoplexiæ essentiam declarans docebat etiam eam à sanguine fieri. quâ duplici ratione accidere testabatur. scilicet vel eo statim effuso ad ventriculos cerebri, perinde, ac ob pituitæ, & humoris melancholici ad eisdem subito factam effusionem sit etiam apoplexia; quod non alia poterit contingere via, nisi cum ex vena, siue hoc ex causa procatarotica, siue ex interna euerniatur, cietus cerebri/cavitas multitudine replens eas obstruit casus mea sententia insanabilis, tum quia ea sanguinis copia ex ventriculis cerebri arte educi non potest, tum quia ibi permanens necessario in grumos conuertetur, à quibus in euitabiliter mors succedet. Vel eo oppilante non cerebrum, vel cerebri vasa, sed meatus ipsius spiritus ad cerebrum permeantes, qui meatus sunt arteriæ carotides, & venæ iugulares. his autem ex vehementia repletionis, & multitudine sanguinis oppilatis credit Avicenna hominem statim apoplexia deprehendi, perinde, ac contingere consuevit (inquit ipse) contractis venis apoplecticis; quibus ligatis deperditur statim motus, & sensus. At hic casus à nostro ratione loci affecti, cum nos cerebrum ipsum affectum, hic autem vasa ad cerebrum deuenientia affecta supponat, multum dissidet, nec veritati. aut Galeno conformari videtur. Nam falsum est his vasibus, siue per hæc vasa venas iugulares, siue arteriasque, intelligas. coarctatis, & contractis hominem sopiri sensumque, ac motum amittere, ut clarè docuit Galenus lib. 2. de plac. Hipp. & Plat. cap. 6. qui etiam lib. de pulsum usu cap. 2. ligatis venis iugularibus exiguum quid incommodi animal sentire, vincit autem arterijs carotidibus etiam idem currere posse experientia hoc approbante testatus est. Si autem his ligatis non sopi-

*Avicenna au-  
egerit de apo-  
plexia à san-  
guine.*

*An obstructis  
venis iugulan-  
tibus, & arte  
rijs carotidib.  
homo fiat apo-  
plecticus.*

tur animal, in eoq; seruat<sup>r</sup> motus, & sensus, depēditur autem tantū, v<sup>t</sup> loco prius citatō monet Gal. pulsatio in arterijs super partem ligatam existētib<sup>us</sup>, igitur nec his obstructis, aut oppilatis videtur posse hominem apoplexia deprehendi subsequitur quidem ex tali oppilatione lētio, in homine lethalis, vbi hāc perseverauerit, quoniam huius ratione non cōmunicata vitali virtute, ac spiritu ipsi cerebro omnes eius virtutes in posterum periclitabuntur, non tamē succedit apoplexia, quæ subito accedens attatim sensum, & motum auferre consuevit. in hac autem oppilatione cum subito non fiat casus, nec etiam apoplexiæ nomine vocari poterit. Forſan autem lapsus est in hac re Auicennā ex nomine venarum apoplecticarum quas Arabes ita appellarūt, quia opinati sunt his constrictis apoplecticum hominem fieri. Hi autem apopletica vocarunt, & libetica hāc vasa ad imitationem Græcorum, inter quos præcipuē Aristoteles hoc idem libro de somno, & yigilia, pro verō supponens recensetur, qui has carotides arterias, quasi his obstructis, & angustiatis stupidus, & soporosus homo reddatur, dixere. cū tñ & in hac re antiquiores Græci errarint, qui ligatis vñ cū his arterijs venis, & nervis, videntes animal mutū reddi, illud sopitum dixere, obmutescentiam ipsam soporem arbitantes, quod non ab arterijs tamen, sed à nervorum interceptione causatur, quemadmodum Galenus loco citato clarissimē expressit. Quare hinc censeo Auicennam lapsum fuisse. Ni forſam cum nos ab omni calumniā vindicare nitentes, dicamus ipsum per meatus ipsius spiritus ad cerebrum intellexisse plexum retiformem, ac choroidem cōtextum, quibus, aut obstructis, aut angustiatis, cum nō per ea subministratur amplius spiritus animalis ipsi cerebro necessario eo munere suo non fungente concidit animal, sensuq; ac motu vñ priuatur. Qui tamen casus, à nostro lōgē diuersus est, nec coincidit cum his quæ à nobis declarata sunt, licet in hoc etiam prædictorum vasorum obstructio

à san-

à sanguine ipso supponi queat. Huius autem cum nos essentiam causas differētiās signa, & curationem tradere debeamus procius declaranda, & essentia, & causis sufficiant ea, quę nunc dicta sunt: Differentias, & signa earundem habebimus ab eodem fonte, à quo & alterius apoplexię luberimus. nam hic, cuiuscemodī, & illā, vel est fortissima, vel fortis, vel minus fortis, vel debilis. harum differentiarum signa desumuntur ex anhelitu, qui si vel prohibeatur, vel magna cum vi inspiretur, vel si non erit violentus, sit tamen inæqualis, inordinatus, & intermittens, vel si aliquo modo sit ordinatus, & non ita intermittens, nec ita inæqualis, indicat, vel fortissimam, vel fortem, vel minus fortem, vel debilem apoplexiam. Hanc ultimam curare poterimus si omnia fiant, quę sunt ex arte necessaria, minus fortē non ita facilē, fortem cum difficultate maxima, & sæpē eius erit curatio impossibilis, sicut, & eius, quę est fortissima. Si gna autem, per quę hæc apoplexia à sanguine genita differat, & distinguatur ab ea, quę ab humore frigido ventriculos replente causatur, maximē consideranda sunt, quoniā utrarumque curationes nō coincidunt, maximaq; in ægrotantium detrimentum errata, si omnia indiscriminatim fiāt, committi possunt. illa enim calefacientibus, incidentibus, acrioribus, exurentibus, & quandoq; igne ipso curatur, quę si in hac adhiberentur, omnia pernitiōsa essent. Distinctionem hanc habebimus, si materiam peccantem, quę sit, conijcere poterimus, præsentemq; ægotantem exacte inspexerimus, considerauerimus. materiam peccantem expræcedenti victu, ex ratione vitę, ex ætate, ex sexu, ex tempe-  
ratura, ex anni tempore, ex aeris constitutione, ex passionum consuetudine, ex suppressa euacuatione, & similibus iudicare poterimus. Vnde si patiens vsus sit cibarijs ex farina subacta, lacticiinijs, leguminibus, oleribus frigidis, rapis, vinis nouis, & similibus, si circa aquas, vel in locis humidis degerit, si sit senex, si mulier, si frigidę, & humidę

*Differētię, & signa.*

*Prognosticon.*

*Apoplexia à sanguine quomodo differat ab ea, quę sit à pituita.*

complexionis, si sit in hyeme, si aeris constitutio his sit similis, si consueverit pati morbos à pituita, si eiusdem aliqua euacuatio sit cohibita, si sit solitus excrementis pituitosis abundare, poterimus indicare morbum hunc à pituita genitum fuisse. Si autem patiens vsus sit carbibus syluestriū animalium, vel domesticoꝝ, sed salinis lentibus, caulibus, cochilæis, vinis nigris, & crassioribus, & alijs similibus si sit in ætate declinanti, si habitus calidi, & sicci, vel saltem calidioris hepatis fuerit, si simus in autumno, si in constitutione simili, si in regione sicca degerit, si consuevit pati morbo, à melancholia. si eiusdem aliqua euacuatio suppressa sit, & præcipue si hæmorrhoidium consueta fluxio sit cohibita. si sit solitus abundare melancholicis excrementis, si plurima passus est animi molestia accideria, si curis sollicitudinibusq; implicatus fuit, si vigilas, vel saltem insomnia formidolosa, & mæsta passus est, iudicare poterimus hanc apoplexiā à melancholico humore genitam esse. Si verò patiens assumpserit cibaria bonichymi, & sanguinem generantia, si hilariter vixit, si moderatè se exercuit, si sit iuuenis, si sit habitus carnosus, si temperaturæ calidæ, & humidæ, si simus in vere, si simus in constitutione calida, & humida, in regione consimili, si consuetus sit pati morbos à sanguine si suppressa sit aliqua sanguinis solita euacuatio, si plurimo sanguine abundare sit solitus, & si alia consimilia adsint, poterimus conijcere morbum hunc à sanguine gentium fuisse. quod idem confirmabitur, si ægrotantem considerantes, in facie ruborem, in oculis venarum apparentiam, & in capite calorem insignem adesse inspexerimus. quod si pallor in facie, & frigiditas eiusdem, & totius capitis oculiq; caui adsint, pituitam, vel melancholiam esse in causa morbi poterimus suspicari. Cum autem habita hac causarum consideratione proposita, & cognita fuerit apoplexia à sanguine, quid pro eius curatione indicabitur? Quicumque morbi ex repletionne fiunt, curat euacuatio. quare cum hic morbus fiat ex so-

*Indicationes.*

*Curatio.*  
*Tex. 24.*

la sanguinis repletionem, eiusdem sanguinis euacuatio indica-  
tur. quapropter statim mittatur sanguis, vt docet Hippo-  
crates in casu isto, ex interna brachij dextri vena, sanguisq;  
copiosè educat; repetaturq; eadem die ex alterius brachij  
humeraria, & quoniam materia est firmata in cerebro, &  
loco principali, hic vltra vniuersalem totius sanguinis mis-  
sione euacuationem factam conueniunt omnia reuulsioni,  
& deriuationum genera, quę proposita sunt inflammatio-  
ne cerebri. Vnde cucurbitulę scarificatę, & non scarifica-  
tę, frictions, ligaturę, compressiones, balnea ad extremas  
partes, hirudines, & post aures, & ad intra nares applicitę, ac  
etiam vltra hęc clysteria acriā cum hic nulla sit inflamma-  
tio conueniunt methodo conuenienti, & recta ratione  
administrata. An autem hic conueniant repercutientia,  
& cętera localia superius explicata, dico, quod licet quę-  
cunq; materia in principio sit reprimenda cum tamen apo-  
plexię principium vno oculi ictu pertranseat, cum fiat subi-  
tò, non ratione principij repercutientia conueniunt, quę nec  
etiam ratione materię peccantis conuenire possunt. cū enim  
sanguis nimia quantitate super abundans adeò repleat vasa,  
vt spiritui animali transitus per ea permeare, & ad inferas  
partes descendere prohibeatur, hincq; crāssescat, & quasi  
coalescat, difficulterq; effluat; ideo reprimētia, adstrin-  
gentia, refrigerantia, repercutientia non conueniunt; quo-  
niam magis constipabunt, & constringent materiā, & eā  
impingent in vasibus ipsis, quam quod eam possint à pro-  
prio conceptaculo excludere, & repellere. quare hic mo-  
neo abstinendum esse à repercutientibus, & refrigeranti-  
bus, quoniam hæc potius sanguinem sisterent, sed vtendū  
esse his, quę laxare possunt. quibus median:ibus sanguis, qui  
in loco affecto firmatus est, possit euacuationibus, reuulsio-  
nibus, & deriuationibus cedere. Ista autem laxantia sint mo-  
deratè calida, tum quò ad caliditatem actualem, tum quò  
ad potentialem; præ omnibus autem commendo balneum  
aquę

*Repercutientia  
an conueniant.*



Lib. 3. reg  
acut. 59.  
Lib. p. Epid.  
sect. 3. 23.

*Apoplexiā nō  
semper fieri ob  
structo, vel ad  
stricto plexu  
retiformi.*

aquæ dulcis, eiusque embrocham, per hæc enim laxatur facile vasa, sanguisq; magis fluidus redditur. Vnde in his, in quibus minusquam deceat sanguis à naribus fluxerit, laudat Hippocrates lauare caput aqua dulci calida quod remedium particulariter ipse in Mitone administravit, unde sanguinem prouocando ægrotantem subleuauit, quoniā vasa laxare potest, & sanguinem fluere facit. Quod idem cum tentandum sit in apoplexia à sanguine videlicet, vt vasa laxentur, & sanguis fluidus reddatur, vt reuulsionibus arte faciendis, & etiam his, quæ à natura tentari possunt, cuiuscemodi vidi nonnullos ex sanguinis profluuiō hoc morbo sanatos, facilius cedat remedium maximè conueniens, ac opportunum existet, & multum proficere poterit, cui in morbi progressus nonnullos etiam laxantia addere poterimus ea in aqua decoquendo, sicuti folia maluarum, violarum, radices altheæ, radices maluæ, semina lini, maluæ, fenugræci, altheæ, & similia, quorum decoctiones ad hanc eandem intentionem procedente morbo in usum venire possunt, modò quibusdam refrigerantibus temperatæ, modò solæ. Excrementorum hic eadem habeatur ratio, quam in superioribus habendam esse declarauimus. cibi, dum morbo detinentur, nullus est vsus, in eius autem declinatione ad sorbitiones deueniendum est cum omnimoda vini abstinentia. Qui docuit apoplexiam fieri obstructis, vel constrictis arterijs, quæ plexum retiformem conficiunt, si pro casu speciali, & possibili hunc proposuit, admittatur, & iure, cum ijs vasibus impeditis vitales spiritus ad cerebrum promeare nequeant. quibus ipsum destitutum necessariò motum, & sensum influere amplius non potest. At si hunc casum, tanquam exemplar, quo semper ita apoplexia fiat, in medium protulit, non admittendus est: cum enim solutæ apoplexiæ creberrimò alterius partis corporis paralyfis succedere consueuerit, & hoc ex permutatione materiæ à cerebro ad neruos transmis-

sa; & transpositæ; clarè liquet non semper fieri apoplexiam prædicto modo, quoniam ad hunc casum specialem propositum paralyfis nunquam succedere potest. collecta enim materia ad basim cerebri, ubi est plexus ille retiformis, nullam habet cum nervis communionem, quibus illa laxis nunquam paralyfis succedere potest. cum igitur sæpissimè ad apoplexiam solutâ Paralyfis succedat, & in hoc speciali casu nunquam succedere possit concludatur apoplexiam non semper modo nunc proposito generari, & eò magis, quò apoplexia hæc ex materia angustiante retiformem plexum videatur insanabilis: cum tamen solutio apoplexiæ sæpius videatur, sæpeq; ab apoplexiâ soluta pristina sanitas recuperetur.

*De Epilepsia à sanguine. Cap. III.*

**E**pilepsiam fieri, quem admodum, & apoplexiam, ex venarum interceptione, & occlusionè à nimia sanguinis copia causata, nemo præter Hippocratem, & Galenum (à quibus transcripsit Avicenna) citatis locis quarto de ratione victus in morbis acutis, tradidit, nisiq; hanc ego aliquando in actu medendi vidissem, cum omnibus signis ab Hippocrate prænaratis, forsân nec huius verbum facerem: cum hic sit rarissimus casus, nec ita facilè sit explicare, quomodo ex venarum interceptione, & occlusionè fieri possit epilepsia, cum tamen hunc videam, & ab Hippocrate, & à Galeno positû ab Avicennâq; receptum, mihiq; hic casus in praxi se obtulerit curandus, propono Epilepsiâ aliquando à sola sanguinis copia venas intercipientè, & occludente generari. Sanguis hic cum copiosus est, ab aliqua causa extrinseca, sicuti vel ex potu vini vinosi, vel ex valida exercitatione, ut innuere videtur Galenus tertio Aphorismorum commen. 20. concitatus, & quemadmodum in his, qui mihi se curandi obtulerunt, semper animaduerti, irruës ad partes superiores, cerebriq; vasa affatim replens, cum

*Epilepsia à sanguine.*

*Epilepsia à sanguine quomodo causetur.*

naturæ

naturæ grauis , & qualitate forſem etiam moleſtus fit , epilepſiam cauſat inſurgēte natura ad eiſdem propulſionem , & diſcuſſionem , ſicuti in ſingultu à repletionē euenit , & eò magis natura ad hoc inſurgit , quò magis ex repletionē vaſorum ſentit ſe grauari , & præmi . Vnde in extinſionis periculum eat natiaua caliditas quæ ob multitudinem , & copiã ſuffocationi quippiam ſimilè patitur . hacq; ratione in caſu iſto accidunt conuulſiones , ſcilicet conculſio , & concitato primo principio ad noxiij humoris expulſionem . quod non fit in apoplexia , licèt ab eadem cauſa generetur , quoniam in apoplexia eſt ferè omnimoda venarũ interceptio , cuius ratione ſpiritus nullo pacto permeare poſſunt , vnde ſtationis motus , & ſenſus deperditur , at in hac epilepſia , licèt ſiciliqua interceptio , & occluſio , non tamen eſt tanta , & talis , quanta , & qualis eſt in apoplexia . nec eſt adeò vehemens , vt ſpiritus omninò permeare prohibeat , vnde natura poteſt validè inſurgere , quod non poteſt in apoplexia , cum in apoplexia etiam ſpiritus ferè extinſi ſint , & ſuffocati . at in epilepſia ſit tantum ob materiam copioſam grauantem , & occludentem periculum eiſ extinſionis , & ſuffocationis cuius ratione etiam facilius admodum hæc epilepſia , quàm apoplexia curetur . quæ niſi importuna adhibeantur caleſcientia remedia ab his , qui epilepſiam ab humore frigido cauſari ſemper exiſtimant , ſola copioſa ſanguinis miſſione tollitur . Huius ea ſunt ſigna quæ ab Hippocrate poſita ſunt , videlicet faciei rubor , oculorum conſtantia , manuum porrectio , dentium ſtridores maxillarum contractio , & ceteri ſimiles conuulſiui motus . quòd ſi his addatur ſanguine patientē abundare , vt ex proprijs ſuperius poſitis ſignis conijcere poſſumus , cauſamq; præcedentē cū cōcitaffe , certò poterimus indicare Epilepſiam hanc à plurimo ſanguine , eundemque venas intercipientē , & occludēte genitā eſſe . cuius curatio cum coincidat cum ea , quæ apoplexiæ à ſanguine debetur , à ſuperioribus adminiſtranda remedia aſſumantur .

*De Syncope Cardiaca. Cap. II II I.*

**A**B hoc eodem fonte, videlicet, à venarum interceptio-  
ne, & occlusiõe altera affectiõ omnibus prædictis de-  
terior, vt quæ subitam mortem sæpè inferre solita sit, ema-  
nat, euenit enim, vt sanguinis copia non ad partes superio-  
res, nec ad cerebrum, sed ad vasa interna, scilicet, ad ve-  
nam cauam, & arteriam magnam aliquando affatim irruat;  
easque opplendo ibi sistatur, firmatusq; exeuntibus, & ferè  
extinctis spiritibus coalescat, cuius ratione natiua caliditas,  
quæ suffocationis vim, nequeuntibus spiritibus per vasa per-  
meare, patitur. ferè extinguatur. hincq; syncope cardiaca  
ex ea accedente, nisi præsto remedia administrentur, sub-  
ita mors subsequatur. De hac syncope cardiaca genita ob  
extinctam ferè natiuam caliditatem ratione sanguinis venas  
opplentis, & ibidè coalescentis meminit Galenus locis cita-  
tis quarto de ratione victus in acutis, quam tamen Viri ij,  
qui singulorum morborum curationes tradere profitentur,  
adeò neglexerunt, vt de ea ne verbum quidem fecerint, cum  
tamen, & ratione periculi, & ratione affectionis hoc facere  
debuissent. ratione periculi quidem, quoniam hinc imminē-  
te subita morte, eā ante significare, & ante vertere docere  
debebant, ratione autem affectionis, quoniam tenebantur  
animaduerrere insolitum hunc casum, & à nemine confide-  
ratum, scilicet in venis viuētis hominis coalescere sangui-  
nem, qui in mortuis solet fluidus conseruari. Ego autem de  
hac syncope pertractans, & hæc duo considerans, scilicet,  
& periculum, & affectionem, quò ad periculum dico Medi-  
cum futuram hanc syncopem, & imminentem subitam mor-  
tē ex duobus præcipue cognoscere posse, quorū primū est,  
quòd isti patientes ante casum syncopes persentiunt non  
nunquam præfocationem quandam, non ad fauces, nec ad  
partes spirituales superiores, sed in partibus internis, ac si  
manu cor ipsis subito constingatur, deficiuntq; , ac muta-

*Syncope car-  
diaca à sangui-  
ne.*

*Periculum.  
Signa.*

*Sanguinem in  
arterijs, & ve  
nis aliquando  
coalescere.*

to colore vivido in pallidum sudant. citò autem reuocantur ab hoc defectu, sed subsequitur lassitudo magna. alterū est, quòd in his pulsus quandoq; accedit intermittens, qui si supra vnicam intermittat pulsationem, magnum periculum minatur, significatq; syncopem hanc instare; quæ intermissio, sicuti, & illa præfocatio non aliunde generatur, quàm ex illa sanguinis coalescentis copia, obstruentisq; , ac grauantis vasa illa, & partes internas, hæc duo signa vidi ego in non nullis, quibus cum prædixerim periculum impendens, sectione venæ, alijsq; remedijs opportunis ab imminenti discrimine præseruati sunt. nonnulli autem alii, qui cum iisdem hoc significauerim, remedia renuerunt, subito de medio sublati sunt. Quò ad affectionem attestor, & ego vltra Hippocratis, & Galeni testimonium me obseruasse in nonnullis ita sanguinem in venis, & arterijs coaluisse, vt inde, & syncope, & mors subsequuta fuerit, præcipue autem hoc in puella quartum decimum annum agente perspexi, quæ cum per diem capitis grauitatem, vertigines, & anxietatem passa esset, die sequenti subito extincta est. Cum dubitaretur, quo morbo perierit, & an vitio cerebri, an huius syncopes meritò hoc factum fuerit, secta fuit post mortem, in qua immune cerebrum ab omni affectione præter naturam inuenimus, sed in arteria magna, & in vena cava ita totum sanguinem coalescere vidimus, vt apprehenso illius sanguinis concreti altero principio, totus sanguis coalescens ita integer ex vena, & arteria educebatur, perinde, ac gladius ex vagina extrahi solet. quare iudicatum fuit subitam hanc mortē à sola interceptione, & occlusionē venarū à sanguine coalescente facta causatam fuisse. Alteram vidi iuenculam, cum per menstruam fluxionem expurgaretur, mediaq; die æstiuo tempore in balneum, aquæ frigidae ingressa, & ibi morata fuisset, eadem die post cænam hilariter sumptam subitam opetijsse mortem. hanc iudicauì ob repressam menstruam purgationem sanguinem, cuius maxi-  
me

mè abundabat, ad vasa interna recurisse, ibique coalescentem, ac venas, & arterias vnà intercipientem, subitam etiā hanc mortem intulisse. in hac dubitatum fuit de veneno, tamen mea sententia causa illa procatactica fuit sufficiens ad inferendam mortem, cum nouerim sanguinem in venis coalescere posse, ad mortemq; causandam hoc solum aliquando sufficere. Noui quidem à venenato pharmaco aliquando coalescere sanguinē in venis, indeq; mortem subsequi, sed ab hac syncope differt veneni casus. quoniam si tale venenum celeriter hominē de medio rapere debet, ante mortem, qui venenum assumpsit, in profundissimum incidit somnum. quo ingrauescente nec excitatur patiens, nec releuatur, sed ad mortem non tamen subitam properat. si autē ad tempus hoc venenum suam promere debet violentiam, coalescet quidem sanguis, sed non affatim, nec tantum, vt omnia vasa intercipiat, immo potius ea, quadam acrimonia acquisita, aperit, & hinc è naribus hi emungunt sæpe sanguinem adco concretum, vt digitis solis eum apprehendāt, & ad notabilem quantitatem simul vnitam extrahunt. talē etiam sepe ab inferioribus partibus excernunt. hi tamen tandem liquato hoc sanguine, à proprioq; calore destituto vitam cum morte commutuant, exanimanturq; à solo sanguinis profluuiio, quod vt plurimū è naribus prodere cōsuevit. Vnde pateat veneni casum non esse huic syncope cōsimilē, licet ab vtraq; mors immineat, impendatq; pateatq; in venis coalescere sanguinem posse. quod qua ratione fieri possit, cum venæ sanguinis proprium sint conceptaculum, propriumq; eis sit ipsum fluidum conseruare, non ita facillē est explicare. Qui tamen nouerit, qua ratione sanguis ad extra venas concreseat, poterit easdem causas ad sanguinem intra venas existentem adaptando rem ipsam declarare. Sanguis è vena eiectus hac ratione concrescit, quoniam quamprimum ex proprio conceptaculo eductus est, statim euanescent, & exhalant eius spiritus, moxque, & simul pars icho-

*Sanguinem aliquando in venis, & arterijs coalescere à veneno.*

*Sanguis quare in venis, et arterijs coalescat.*

*Sanguis extra venas quare statim concreseat.*

rola



rosa separatur, quo facto reliquum refrigeratum concre-  
 scit, & ita concrefcit, vt non tantum pura, & sincera san-  
 guinis pars, sed etiam ceteri ei admisti humores, qui ex sui  
 natura non possunt concrefcere (hoc enim solius sanguinis  
 est proprium) vnà cum sanguine ipso coalescant. hinc vide-  
 mus non solum vtramq; bilem cum sanguine è vena eiectā  
 concrefcere, sed etiam pituitam ipsam, quæ adeò in sangui-  
 nis superficie nonnunquam concrefcit, vt vix gladio incidi  
 queat. nisiq; hæc & limosa pars sanguinis ei admisceatur,  
 licet concrefcatur sanguis, quomocunq; è vena eiectus, nō  
 tamen ita citò concrefcit, nec ita durè coalescit, sicuti ei cō-  
 tingit, quando copiosè ei admisti sunt, & humores melan-  
 cholici, & pituitosi. Sanguis igitur extra venas eductus, spi-  
 ritibus exinanitis, & iisdē euaporantibus, ac parte ichorosa  
 separata ob refrigerationē coalescit. coalescunt si quidē, &  
 quæ siccantur, & quæ refrigerantur. hic autem nō propter sic-  
 cationem, vt patet causas consideranti, sed propter refrige-  
 rationem concrefcit, & eo velocius, & intensius concrefcit,  
 quo ei magis admisti sunt humores frigidiores, crassiores,  
 & viscidiores, sicuti pituita, & melancholicus humor, quo-  
 rum ratione intemperiem consequutus frigidiorē ad cō-  
 crefcendum faciliorem habilitatem, & promptitudinem re-  
 cipit. Hæ autem eadem causæ cum non tantum in sangui-  
 ne extra venas, sed etiam in venis existente contingere pos-  
 sint, clarum erit, quare sanguis aliquando in venis coalesce-  
 re queat. Euenit enim quandoq; vt in sanguine vel nō ge-  
 nita, vel excreta ichorosa parte, vitiosi defluant, & abun-  
 dent succi, qui substantia crassiores, & temperie frigidi, san-  
 guinem crassiorem, & frigidiorē reddant. qui sanguis ve-  
 nas internas, & maiores non nunquam occupans, adeò re-  
 plet, vt spiritus intercipient, & penetrare non permittens  
 eos in extinctionem ducat. quibus spiritibus extinctis san-  
 guis refrigeratur, ac concrefcit, & vna cum ipso vitiosi, qui  
 in ipso defluunt, & qui eum ad concrefcendum habilitant,  
 &

& disponunt, succi, nempè si hi non præstò essent, incorruptus, & naturaliter fusus, liquidusq; redderetur sanguis; quoniam nec extinctionis spirituum causa potens adesset, nec tantæ refrigerationis occasio, vt sanguis possit coalescere. at vbi hi maneant, sistanturq; cum nativam caliditatem respuant, extinguantq; , faciliter, ac expeditò sanguis ob introductam refrigerationem concrelescere potest.

Vndè in affectis hoc pacto corporibus, vt notabat Galenus, si sanguis detrahatur, is frigidus (quod vix vllus credere queat) crassusq; , & vix effluens conspicitur, idq; propter huiusmodi refrigerationem. Pateat igitur, quæ ratione sanguis in venis coalescere possit, cuius ratione synopæ cardiacæ nonnunquam generantur, quæ tanti discriminis plenæ sunt, vt nisi opportuna statim adhibeantur remedia, subita mors sæpius succedere consueverit. quæ cum Medicus omni ingenio, & conatu, quantum arte fieri possit, inhibere debeat, maximè has synopes, & earum causas animaduertat. Præsente synopa, reuocationi caloris, regenerationiq; spirituum attendens, & excitationem patientis his remedijs, quæ in communi sunt vsu, & ab omnibus scribentibus proponuntur, tentet. Sed præ omnibus causæ incumbere debet. quæ quomodo remouenda sit, affectio ipsa indicat, & expressè docent Hippocrates, & Galenus. sanguis hic copia superfluit, succisq; frigidis, & crassioribus abundat: quorum ratione si coalescat sanguis, mors subsequitur. Idcò, antequam (vt ait Hippocrates) fixa sint omnia, quæ contristant (scilicet tum spiritus, tum fluxiones) sanguis minuendus, & expurgandus est. Minuatur autem per sectionem venæ internæ brachij dextri, qui si effluat, copiosè educatur. si autem non ita facillè effluat, incipitq; coalescere, in talibus, prius adhibitis fomentis ex laxantibus, fricari oportet cunctas corporis partes eodem tempore à multis hominibus, postea venam secare, & si sanguis mediocriter fluxerit, rursus fricare, & denuò san-

*Sanguis aliquando secta vena frigidus exie.*

*Curatio.*

guinē auferre, & ita repetere, quoad debita sanguinis quantitas extracta fuerit. hoc facto refici hominem, & restaurari conuenit, simulque de purgatione cogitandum est. ad quam intentionem assumantur ea, quæ peccantes, & superabundantes humores prius concoquere, postea expurgare possint, semper admiscendo nonnulla, quæ facultatem vitalem respiciant, & roborare queant. Qualia autem debeant esse ista, non referam; quoniam peccans humor hæc indicare potest, plurimaq; horum est sylua ab authoribus conscripta. Hoc vnum animaduertam, videlicet, quod, cum in casu isto periculum sit, ne concreascit sanguis, coalescatq; in venis, veniant in usum ea medicamenta, quæ grumos dissoluere possunt. quare secta vena, statim exhibeatur aliquod coaguli genus, inter quæ præferatur leporinum. ad idem faciet amaranti coma in mulso epota, oximel etiã ipsum proderit, & cetera attenuantia, & incidentia medicamenta, & quæ valde lotium prouocare possunt. Vitæ sit attentantia. Vinum interdicatur, ceteraq; omnia, quæ sanguinem augere possunt; nisiq; vires intercidant; parcus sit cibus. quod si hæc labant, alimentum sit copiosius, vinumq; pauciferum, & lymphatum exhibeatur.

*De Hydero pulmonis. Cap. V.*

**P**lurima morborum genera pulmonem pati, nemo non asseuerat, de quibus praxim cõmuniter docentes pertractant. vnus tamen superest, de quo solus author in libro de Morbis Hippocrati ascripto (à quo Auicenna, qui nihilominus postea huius affectus prætermisit curationem, transcripsit) egit. qui licet rarissimè accedat, vt mihi, qui per plures annos artem hanc exercens tot agrotantes curauerim, bis tantum se obtulerit; à me tamen de eo etiã hic agendum est, cum & hic peritiã Medici subterfugere non debeat. Morbus hic ab authore citati libri pulmonis hyderos, seu hydrops appellatur; quoniam sicut in hydrope in imâ

*Pulmonis hyderos, seu hydrops.*

ventre

ventre, ita in hoc affectu intra cavitates thoracis, & pulmonis colligitur materia aquosa, & ichorosa, quæ materia quantitate abundans; & gravitatem copia, & difficultatem anhelitus obstruendo, & tussim ad excretionem proritando excitat. nihil tamen expuitur, quoniam materia adeo est tenuis, ut à spiritu facile disrupta ad partes superiores nequaquam attolli possit. Materia hæc quoniam aquosa est, & ichorosa, nullam admittit coctionem; quare nec fomentis, nec vntionibus, nec perfusionibus, nec alterius generis medicamento cedit, nec etiam diuturnitate temporis, cum moram longiorem traxerit in thorace, vel incrassatur, vel in pus cōvertitur, sicuti in destillationibus contingit ad ipsum thoracem decumbentibus, quæ, ut docebat Hippocrates libro septimo Aphorismorum Apho. 38. viginti diebus suppurare consuevere. non descendit materia hæc à cerebro, nec per destillationem ab eo fluētem in thorace colligitur: sed ubi congesti fuerint serosi, & ichorosi humores in corpore, in eoq; abundauerint, si pulmo imbecillitatem vel ab ortu conceperit, vel noua occasione contraxerit, pronusq; ad fluxiones recipiendas ob intemperie propriam, & præcipuè frigidam, fuerit, ad cum superabundantes aquosi humores transmittuntur, qui replentes thoracis, & pulmonis cavitates postea morbum hunc generant. Humores hi tenues, & ichorosi aggregantur in his, quibus partes naturales frigida intemperie laborant, visceraq; vel obstructa, vel scyrrosa sint, & præcipuè si hi otiosè, & in locis humidis, vel frigidis, & sub cœlo consimili viuentes potui indulgeant, cibarijsq; humidioribus largius vtantur. his oculi palpebra inferior, pedumq; extremitates solent subtumescere, calorq; faciei non viuudus, sed ad pallorem tendens cōspicitur. in his autem cum congesti fuerint hi aquosi humores, transmittuntur aliquando ad cavitatem thoracis, & ad pulmonem ipsum, indeq; morbum, de quo nunc agimus, introducunt: qui morbus aliquando sponte solui videtur;

*Humores tenues, & serosi in quibus aggregantur.*

*Signa.*

*Febres an sit in  
hydropolmo-  
nis.*

erumpente ad aluum hac materia, recludente sibi natura ca-  
ca, & delitescencia spiracula, & absconditas vias ad hanc  
excretionem, tamen postea iterum noua regenerata, & ag-  
gregata materia, ad ipsumq; thoracem, & pulmonem de-  
nuo transmissa, cum iisdem symptomatibus, & deterioribus  
redit, vt potè qui magis succumbente, & debilitata natura,  
cuius ratione copiosiores regnuntur hi aquosi succi, regre-  
diatur. vnde in his postea manifestè & facies, & scrotum, &  
venter intumescit, non tantum in thoracem, sed etià in om-  
nes has partes, effuso, qui regeneratus superabundat, aquo-  
so humore. Hæc de essentia, & causis præsentis morbi suf-  
ficient. signa hæc erunt, grauitas thoracis ob materiæ copiã,  
tussis sicca, non potente natura nec materiam concoquere,  
nec eam ob ipsius tenuitatem extra ducere, difficultas anhe-  
litus, qui frequens admodum, & paruus erit ob vias spiri-  
tus à plurima materia detentas, & propter deaphragma ad  
eandem compressum, & grauatum, ita vt hinc ægri suffocari  
continuè ferè videantur, & quietem rarò inueniant, sonitus  
in thorace obstrepens ebullienti materiæ similis ab eadem  
causa deueniens. tumor pedum, & palpebrarum huic con-  
nectitur, non tanquam proprium huius morbi signum, sed  
tanquam indicium abundantie humoris aquosi. febris addi-  
tur ab auctore libri de morbis. attamen in his, quos ego  
curaui, nec fuit febris, nec ratione materiæ, quæ frigida est,  
& non putrescit, adesse debet. Porro verum est, quod ali-  
quando ob diuturnam moram in thorace tractam hæc ma-  
teria, sicuti quæ in abdomine ex hydropse collecta diu ibi  
retenta salsa, & acris euadit, nonnullã acquirit acrimoniã, vt  
optimè hic author adnotauit, extrinsecus latus acetũ olet,  
cuiusque rarione credo eam sibi viam recludere, & parare  
ad aluumq; erumpere, credoq; eandem tunc aliquam pos-  
se ex quadam leui accessione causare febriculam, tamen  
nunquam potest ratione materiæ dari, vt necessariò fe-  
brem introducat, vtque febris sit huius morbi proprium  
signum

signum. Cuius morbi curationem author hic per sectionē: *Curatio secundum Hippo.* thoracis tentandam esse docet. quam tamen ego nec in his, quos curandos suscepi, facere ausus sum, nec etiam in alijs faciendam esse laudo, cum enī huius morbi sanatio non tantum materiæ præsentis, pulmonemq; obstructis, & repletis remotionem, sed etiam eiusdem regenerationis prohibitionem indicet, cumq; sectio primæ tantum indicationi, non secundæ satisfacere possit, sufficiens huius morbi remedium esse non poterit. quam eo magis excludendam esse assero, quò idem, quod sectione tentandum esset, possumus tutiori via efficere, exhibendo ea medicamenta, quæ hanc materiam educere possint. Exclusa autem sectione, ista, hanc ego curandi methodum, & rationem propono. Materia aquosa pulmonem replens, & obstruens, indicat suæ *Curatio propria.* evacuationem, & quoniam in ipso thorace non gignitur, sed aliunde transmittitur, indicatur, ut eiusdem generatio, prohibeatur, si quid verò huius genitum fuerit, educatur, & aliò diuertatur. An his indicationibus possit Medicus satisfacere, vel non, dixerim ego difficillimum esse; quoniam *Prognosticum.* corpora hæc, in quibus tales gignuntur morbi, huiusmodiq; aquosi aggregantur humores, inbecillum calorem naturæ habent, virtutesq; naturales satis languidas, & viscera admodum læsa possident. quæ omniū causarum ratione vix præservari possunt, quin non tantum in præsentem, sed etiam in deteriorem incidant morbum. nam omnes hi in hydropem proclives sunt, in quam tādē illos delapsuros esse credo, sicuti eos vidi, quos curandos suscepi. quos licet ab hoc thoracis affectu per quædam interval- laeducta materia peccante liberauerim, & per menses; & annos eos, maximo tamen cum labore, præservauerim, tamen tandem in hydropem lapsi sunt, ex eaq; extinctos fuisse animadverti. Ut autem patientes à præsentī morbo vindicemus pro prima intentione veniant nobis in usum ea medicamenta, quæ aquosos humores evacuare possint. qui



aquosi humores, cum tenues sint, euacuationiq; satis habi-  
 les, nullam requirunt coctionem, sola autem viarum præ-  
 paratione, nè molesta fiat euacuatio, indigent. quare viæ  
 communes primò expurgandæ erunt, fluidumq; corpus red-  
 di debet. postea medicamentum aquosum materiam edu-  
 cens exhibeatur. plura hæc sunt, tamen duo tantum propo-  
 nam, quæ mihi in felicissimo vfu sunt, alterum est elateriū,  
 alterum est succus radicum sambuci. hic ad vnciam vnam,  
 & semis vel circa; ille ad quatuor grana ad summum; si re-  
 ctè paratum fuerit exhibitum, potest hæc materiam serosam  
 educere, quæ tamen repetenda erunt, quoniam vnica eua-  
 cuatione vniuersam materiam educere non poterunt. Edu-  
 ctâ materia peccante, attendendum est causâ generationis  
 materiæ: quæ causa quoniam est viscerum vel intemperies,  
 vel obstructio, vel scyrrus, per propria medicamenta vni-  
 cuiq; incumbatur. quòd si hæc omninò tolli non possint, in-  
 deq; necessariò semper aliqua serosi humoris quantitas re-  
 generatur, vltra euacuationē faciendâ per medicamēta pro-  
 pria, fiant cauteria in brachijs, vel cruribus, quibus cōtinuò  
 regenita materia educatur, simulq; à thorace reuellatur.  
 Summa interim habeatur victus ratio, cuius meritò cū op-  
 portuna non seruetur, sæpe maxima adaugetur hæc humo-  
 rum serosa aquositas. Vnde hi parcè viuant, cibarijs vtan-  
 tur exsiccantibus, merum, & in minima quantitate bibant.  
 quantum possint, non tamen vltra vires, exercentur, loca  
 ab omni humiditate immunia habitent, in aëreque ficiiori  
 omnia his opposita vitantes degant.

*De inflammatione membranarum intersipientium, &  
 pericardij. Cap. VI.*

**I**N cauitate thoracis continetur pleura, arteria aspera,  
 arteriæ leues, pulmo, membranæ intersipientes, pericar-  
 dium, & cor. de affectibus pleuræ, arteriarum, pulmonis, &  
 cordis omnes scribes pertractarunt, at de affectibus mē-  
 branarū

brantarum intersepiētium, & pericardij nemo nec morbum, nec curationem exposuit, quas tamen partes cum nihil prohibeat, sicuti & ceteras, diuersis apprehendi morbis, mirandum est, qua ratione praxim docentes eas ita neglexerint, vt ne harum quidem minimum fecerint verbum. hanc rem diu ego animaduertens, cum censerem fieri non posse, quin hæ partes vel inflammatione, vel alio affectu aliquando laborarent, tandem experientia, & ratione ductus cognoui has partes nonnunquā inflammari, aliosq; similes morbos pati, quorum sæuitia ob cordis viciniam sæpe ægrotantes in extremum vitæ discrimen incurrunt. Quam rem cum hic explicare decreuerim, primò ante alia exponam methodum, qua in nonnullis ægrotantibus hæce partes inflammatorias pati affectus indagauerim, deinde qua ratione ipsi curandi sint, & quomodo in illis me in administrandis remedijs gesserim, declarabo. Ad ægrotantes accedens vidi nō nullos febre acuta detineri, ad quam inquietudo magna, ingensq; sitis consequebatur, & cetera, quæ febres ardentes concomitari solēt. in his spiratio frequens admodum, & celeris erat, in thorace maximū aderat incēdium, vnde & frigidum aerem inspirare desiderarent, & calidum spiritum reflarent. nullus in thorace affligebat dolor insignis, præterquam ad sternō, vbi angustiam, & offendiculum quoddam in inspirando potius, quàm dolorem, persentiebant. tussis in omnibus fuit, at in aliquibus sicca in principio, quæ postea subsequebatur humida. quæ per tussim excernebantur, erant colorata, vel rubra, vel flaua; plurima tamen flauicoloris, paucissima rubei vidi. pulsus in cunctis erat, qualis pleuriticorum esse solet, vt si dolorem lateris habuissent; certò pleuritide laborare iudicari potuissent. Hæc omnia considerans, videlicet, febrem acutam, incendium in thorace; spirationem frequentem, offendiculum illud ad sternō, tussim cum sputis coloratis, pulsus duritiem, non potui non induci, quin crederem hosce ægrotantes inflamma-

*Signa.*

tionem in partibus spiritalibus pati, quæ cum non esset peripneumonia, quoniam nec aderat illa difficultas, angustiaue anhelitus, quam in peripneumonia adesse noueram, nec illa pulsus durities hoc confirmare poterat, & cum pleuritis similiter esse non potuisset, cum huic non aliteret dolor lateris pungitius, nec etiam cor hoc pati iudicarem, ut potè quod ferè incipientes vix tolerare possit inflammatio nes, reliquum erat, ut censerem membranas intersepien- tes, pericardiumuè hanc pati quibus inflammatis nec flario omnia superius dicta consequantur. febris quidem acuta, & vehemens accedit tum ratione affectus, tum quia sedes affecta parum distat à corde; quod cum supercalefiat admodum à proxima flamma, non mirum est, si etiam in thorace incendium persentiant, inquietudoq; succedat maxima, & sitis aliquando in exhausta sequatur, hocq; multò magis inflammati pericardio, quàm membranis illis, quorum membrorum inflammatio altera sæpius ob viciniam alteri communicatur. Cæterum an magis afficiatur vel pericardium, vel membrana, hoc ex subsequentiis habeatur; si fecto enim magis pericardio virgine morbo syncopæ ali- que nonnunquam contingunt, & æstuationes ingentes accedunt, quoniam inflammatio cor ipsum ferè contangit, omniaq; symptomata in hac sunt sæuiora, quàm affectis membranis. Iisdem inflammatis, quoniam connectuntur, & membrana succigenti, & thoraci, sequitur anhelitus difficultas, spiratioq; inde frequens est, celer autem ratione necessitatis adauctæ. dolor verò, licet inflammatio sit in parte membranosa, non adest ita pungitius, sicut in pleuritide; quoniam hæ membranæ, sicut illa, non firmanur ad costam, vel ad os alterum, cuius meritò compressa maiorem persentiat ab eo punctiorem, sed est in parte laxa thoracis; nec hæ, sicut illa, ad eò sensatione vigent, sed offendiculum illud ad sternò tantum in his succedit, quoniam hæ partes ibi colligantur, quare, & ibi inflammatio tanquam parti magis sensitiuæ

*Lib. 13. Meth.  
cap. 18.*

niur quoquo pacto communicatur. tussis autem cum spu-  
tis coloratis adiungitur, quoniam cum in omni inflamma-  
tione, quæ operculo duriori non regatur, semper aliquid  
refudet, idcirco his partibus affectis materia peccans refudâdo  
tussim excitare cogitur, pro ratione q; materiæ diuersi appa-  
rēt colores, & inde sputū coloratū. quod profectō fuit prin-  
cipale signum, quod me ad hoc iudicandum manuduxerit,  
cum viderim Galeum sputa colorata in acutis passionibus  
adscribere inflammationibus partium spiritalium, scilicet,  
vel pleuræ, vel pulmonis; quorū neutrum cum in prædicto ca-  
su clara luce deprehenderem inflammatione affectum esse,  
consecrant in membranis illis adesse, comunicata aliquā  
do ipsi pericardio etiam hac affectione. pulsus omnino du-  
rus in hoc eodem casu accedit; quoniam genita inflamma-  
tione in corpore membranoso, cuiusmodi hæc duo sunt, ne-  
cessariō in arterijs talis durities imprimitur, qualis in pleuritici  
videri solet. Cum autem omnia hæc, vt ex dictis clarè  
liquet, ad inflammationem dictarum partium necessariō cō-  
sequantur, non sit mirum, si per hæc eadem, tanquam per  
propria huius affectionis signa in cognitionem inflammatio-  
nis harum partium deuenierim, quod eō mihi fortassè faci-  
lius, quàm alijs contigit, quoniam ductus exemplo, & ana-  
logia semper hunc affectum omni diligentia in ægrotantibus  
inuestigauerim; nam cū iunior essem, sub præceptoribusq;  
celeberrimis huic studio operam darē, vidi nobilem Ianuē-  
sem ab iisdē curatum, qui cum fere omnibus prædictis sym-  
ptomatibus teneretur, & ad oblata, ceteraq; omnia tamen  
bellè se haberet, lotiaq; admodum laudabilia essent, coctio-  
nemq; indicarent, quorum meritō ab eis indicabatur hunc  
ex morbo conualiturum fore, ex insperato, præcedentibus  
nonnullis syncopis, nona die defunctus est. Cum dubitare-  
tur inter Medicos de morbo, & eius amici suspicarentur de  
veneno ob syncopes illas, sectus est, in quo nulla alia re  
præter naturam præsentē, inuentus est in membranis inter-  
sepientibus

ſepientibus tumor inflammatorius ſatis notabilis magnitudinis, qui etiam in parte communicabatur pericardio. Hoc cum memoria ſemper conſeruaffem: data occasione coniecturam de eodem morbo, analogia ab enarrato deſumpta; feci, credoq; me in pluribus verum huius morbi indicium conſequutum fuiſſe. qui morbus cum ſub nomine inflammationis exponatur, per inflammationem omne tumoris calidi genus, à quacunq; gignatur materia, ſicuti in pleuritide declaratum eſt ab omnibus, intelligatur. attamen, vt antea adnotaui, ego vidi hanc à duplici tantum materia cauſari, ſcilicet à ſanguine, & bile, raro à ſanguine, à bile autem frequentius, hancq; ſæuiorem eſſe, quàm illam, animaduerti. Auicennas quidē de pleuritide agens viſus eſt de inflammatione membranarum interſepientium meminiffe, dum inter varias pleuritidis ſpecies velaminis diſtinguentis inflammationem recenſeret. Verum an nomine velaminis diſtinguentis intellexerit potius mediaſtinum, quàm ſeptum tranſuerſum; plurimum difficultatis habet. Noui ſanè quosdam clariffimos authores explicaffe per hoc velamen mediaſtinum ipſum, quoniā ex ſuccingenti membrana, in qua verā fit pleuritis, hoc formatur. nihilominus Auicennas ipſe, dum huius inflammationis ſigna exponit, potius diaphragma, quàm mediaſtinum hoc eſſe demonſtrat, dum inquit rationis permiſſionem, ac delirium conſequi hanc affectionem. quod eſt proprium ſignum ſepti tranſuerſi, non mediaſtini inflammationi. ad hoc enim neceſſariò mens læditur, quod in illius inflammatione contingere nō cōſuevit. præterea addit, quòd omnia accidētia in inflammatione velaminis diſtinguentis ſunt vehemētiora, & dolor, & difficultas anhelitus. At in inflammatione membranarum interſepientium potius offendiculum quoddam ad ſternō, quàm dolor adeſt, & vbi adeſt dolor, non eſt vehemens, ac difficultas anhelitus in eodem non eſt admodum ingens, licet enim ſit frequens, & celer ob neceſſitatem adauctā, & aliquomodo diſciliſ ob inſtrum-  
 mentorum

mentorum inobedientiam, attamen cum ei non sit dolor ingēs connexus, nec multum difficilis esse potest anhelitus. At in inflammatione diaphragmatis, & dolor est vehemens ratione partis affectæ, & ratione continui motus partem affectam lacerātis; & spiratio est admodum difficilis, scū sit affectum instrumentum primò respirationi inseruiens. Quapropter ex his censeo ego Auicennam non mediastinū per velamen distinguens, sed septum transuersum potius intellexisse, & eò magis, cum testetur in tali affectu eam vehemētiā, & velocitatem febris, quæ in pleuritide pura, & vera ex membranę succingentis inflammatione causatur, non adesse. cum & ratio ob viciniam cordis dicet, & experientia ipsa testata sit, mediastino affecto statim hominem corripi acuta, & ingenti febre, quæ in inflāmatione diaphragmatis rarò est, quòd à principio sit ita acuta, cū in hoc ab initio omnia accidētia, quā in mediastini affectione, sint leuiora. His addo supposito etiam, quòd potuisset Auicennas hoc loco intelligere membranas intersepientes, curationem huius affectus ab eo postea neglectam fuisse, qui solum diuersarum pleuritidis specierum in sequentibus, non particularis huius casus curandi rationem complexus est. Hanc autem ego explicaturus, cum de essentia, causis, & signis præsentis morbi, quæ dicta sunt, sufficere debeāt, ad curationem ipsam descēdo. morbus hic est inflāmatio, in qua ē materia, ergo eius dē indicabitur euacuatio, euacuabit autē, si vel retrocedat, vel si insensibiliter, insensibiliteruē educatur: retrocēdet, si vel reuellatur, vel repercutiatur. educetur autē insensibiliter per discutientia, sensibiliter autem per sputum prouocantia. at hæc postrema non sunt admittenda pleno existente corpore; igitur primò corpus est euacuandum. Quare quatuor erunt intentiones, totius euacuatio, reuulsio, percussio, & materiei in loco affecto contentæ insensibiliter, vel per sputum euacuatio. Quibus indicationibus an Medicus sperare debeat plenè satis facere posse, dico hoc non ita facile esse, quoniam

*Indicationes.*

*Prognostica.*



*Lib. 5. de loc.  
affect. cap. 2.*

*Curatio.*

quoniam hic habemus morbum validissimum, & pleuritide vehementiorem, quam si Galenus asseuerat ingentem causam febrem, quia paruum distat à corde, & quia cum pericardio succigens membrana cognationem habet, quid dicendum est fore eo inflammato, & membranis intersepientibus, quæ cordi proximiores sunt, quam pleurae profecto in hoc morbo omnia validiora sunt, præter dolorem, quam sint in pleuritide. unde & in hac, sicuti & in cæteris inflammationibus internis vnica erit salutis spes ipsa virium fortitudo, quam cum præsentem habuerimus, omne remedij genus opportunum audacter tentabimus. Itaque à prima indicatione incipientes pro totius euacuatione, lenita aluo clystere leni, & refrigeranti secetur interna vena brachij dextri; viribus enim constantibus in morbo magno statim ad sectionem venæ propterandum est. copiosè autem emittatur sanguis, & præcipuè ubi summum sit incendium in thorace: nam venæ sectio copiosè facta non tantum euacuat, & reuellit à loco affecto, sed etiam sanguinem valde refrigerare potest, à venæ sectione laudo; ut statim exhibeatur, ubi plurimum fuerit intendij, & morbus à bile pendeat, aqua endiuia, vel acetosæ, vel hordei actu frigida ad libram, vel circa. repetatur venæ sectio vel eodem die, vel potius sequenti, si vires non admodum constarent, nec sit habitus, qui facile omnem ferat euacuationem, rari autem sunt casus: consimiles, in quibus ego ad secundam, & aliquando ad tertiam sectionem non deueniam. testorq; me semper per posteriores venæ sectiones deteriorem sanguinem, quam per primam, eduxisse, & inde semper magis saluti aegrotantis consultum fuisse. qui si ex repetita sanguinis missione non releuetur, pauca de eo spes habenda erit. Euacuato toto corpore, reuulsaq; per venæ sectionem à loco affecto materia, thoraci applicentur ea, quæ inflammationem lenire, temperare, & aliquo modo reprimere possint. ad hanc intentionem fumantur ea, quæ frigida quidem potentia sint, sed omni careant adstrictione

ctione, cum medicamenta altius penetrare debeant; adstringentia enim sibi viam præcluderent, & materiam magis in loco affecto constiparent. cuius ratione oleum violaceum omnibus præfero, quo tepido inungatur sæpe totus thorax, in quo si luminum sit incendium, inflammatioq; erysipelatis naturam sapiat, tempusq; æstiuū fuerit, eo vtor actu frigido; & nō tantum eo ad inungendum vtor, sed etiā ad epithemandum, infusus in eo pannis lineis, & postea eo madidis applicitis, & subindè mutatis. cui aliquando admiscui lac recens non coagulatum, & parum aquæ endiuivæ, quibus eodem modo epithemaretur pectus. ad idem pareretur emplastrum ex farina hordei cum succo endiuivæ, vel lactucæ ex eodem oleo impinguatum. An autē ista vel actu, vel potentia tantum frigida conveniant in hoc casu, cum frigidum thoraci ex Hippocrate inimicum sit, & talia etiam in pleuritide sint nocua, quæ affectio huic similis videtur, dico, cum inflammatio hæc sit in penitioribus thoracis partibus, qua ratione non occurrunt statim medicamenta parti læsæ; & sit in loco, vbi plurimum calor viget, & abundat, quod ista convenient; quoniam hic in tanto incendio inflammatio hæc tolerat medicamenta frigida, quæ ex indicatione ei debentur, cum flamma sit propè cor, & materia existat admodum calida, nec affectus in exteriori thoracis parte positus sit, quæ nervosa existens aeri frigidiori, & medicamentis exposita ab eis lædi potest. Hæ sunt rationes, quibus ductus urgente inflammatione, aut erysipelate in tempore æstivo ad frigida deveni medicamenta: quod si hæ non probantur, dicam id, quod dixit Galenus, quando loquebatur de causis pulsuum intermittentium, hæc habens. hæ si tibi rationes probantur, vtaris licet; sin secus, at vt docet experientia, rem scito, vt diximus. Si tamen non ita vrgeat inflammatio, nec incendium summum sit, nec sub cælo calidiori nō decumbat æger, frigida actu prætermittens ad tepida medicamenta descendo; & si aeris constitutio, vel hyemalis sit,

vel

*Lib. 2. de ag.  
ex pul.*

vel ad eius temperiē vergat, eadem actu calida administrare iubeo. Dum autem hæc frigida ex indicationibus narratis administro, cum ex prædictis medicamentis remittatur incendium, iisdem postea tepidis vtor, & admisceo oleo violaceo parum olei camomelini. dimitto vsum aquæ endiuivæ, & lactis. quod si magis leniendum sit, addo prædictis oleis mucilagines seminū maluarum, altheæ, fenugraci, & similium, hæcque similiter in his infusis pannis, & subinde mutatis administrare iubeo: vel aliquando prædictis oleis, & mucilagines, cum maiorem disculsionem, & coctionem tento, addendo pinguedinem pulli recentem, & paucam quantitatem croci cum cera in modica portione linimenta paro. Dum hæc fiunt, prouocetur sputum, educaturque materia per lambitiua, & præcipuè sint ea, quæ non calefaciunt, sicuti syrupus violatus, addita portiuncula syrupi de iuiubis, vel de farsara, vel de liquiritia. Elæctuaria, cum plurimū recipiant saccari, non laudo, quoniam ista facile bilescunt, ubi sit incendium internum, bilisque abundet. qua ratione duæus, & etiam Hippocratis præcepto, qui in biliosis, & calidioribus morbis mulsam dilutam, meram, & non dilutam damnando, præferebat; consueui ego vti decoctionibus peroralibus summa cum ratione factis, semper à calidioribus abstinendo, quibus admisceo portiunculam prædictorum syruporum, & ita mulsam dilutam non spernendam in tali casu habeo, qua faciliè sputum prouocatur, & ex ea corpus non accenditur. Ad cuius rei similitudinem, dum materiæ præparationem, quæ interim portionibus conuenientibus est concoquenda, & coctionem tento, iubeo, vt portiones concoquentes plurimum habeant decoctionis, parum autè ex illis syrupis, vt meracitas mulsæ fugiatur, eademque diluta habeatur, decoctiones parentur ex hordeo, violis, endiuia, cap. Veneris, seminibus cidoniorum, passulis, & similibus. syrupi sint, violatus præcipuè, & de endiuia, addita portiuncula vel de iuiubis, vel de farsara, vel de liquiritia. hæc dum

viget

Lib. 3. reg.  
acut. 13.

viget incendium internum, exhibeantur actu non calida, nec frigida etiam, sed ad teporem aquæ fontium consimiliter temperata, quibus cū procurata fuerit coctio, materia peccans conuenienti educatur pharmaco, quod opportunum erit, si nec validum sit, nec malam qualitatem habuerit, thori facemq; respexerit. quare non transcendantur pharmaca ex benedictis vocata, assumaturq; Manna, Rhabarbarum, syrupus violatus solutiuis, & similia cum decoctionibus pectoralibus dissoluta. Quod si in loco affecto remissa inflammatio, & ea cedente, quid remanserit discutiendū, quod per superius dicta non potuerit resolui, formetur emplastrum ex radicibus althææ, maluæ, folijs maluæ, & violarum, ex daçtilis, caricis, sebecken, & passulis, quæ omnia coquantur, contundantur, & cribellentur, postea iisdem commisceatur farina seminum lini, seminum tenuigræci, puluis florum camomeli, quibus oleum camomelinum, & amigdalorum dulcium ad impinguandam addatur, & ita emplastrum formetur, quod residuum inflammationis facile discutere poterit, quo tempore etiam concoquentia ad aliam quam caliditatem accedant, vt maturius rem perficere possint. Dum hæc omnia administrantur, optima habeatur victus ratio, qui, cum sumus in morbo acuto, & grauissimo, valde tenuis esse debet, vnde egrotantes contenti sint sola pitana, quæ non calida, sed tepida actu exhibeatur, potus sit multa dilutissimus potius ex saccharo, quam ex melle confectus. in processu autem pro ratione coctionis morbi poterit eadem pitana parari cum iure pulli, quod poterit esse post septimam, quibus & addi poterit succus seminum communium, seu amigdalorum dulcium, & bui luteum, & etiam in totum declinante morbo vinum ipsum, quod sit dulce, tenue, oligosorum, & optimè lympharū. Hora cibandi observetur ex accessionum temporibus, & ægri tolerantia. In qua re hoc vnum animaduerto, quod diuersis alui excrementis nunquam exhibeatur cibus, nam, vt docebat

ad hoc  
q. 7. 1. 2.

ad hoc  
q. 7. 1. 2.

Lib. p. reg.  
act. 32.

Hippocrates in libro victus acutorum, si his non eductis  
 sorbitionem quis dederit, dolorem, si adest, adaugebit;  
 si non adest, protinus inducet, frequentiorq; spiritus redde-  
 tur, quod malum est; secum enim retentio mala est in omni-  
 bus thoracis affectibus, quoniam harum vapores, & exha-  
 lationes dolores vel augent, vel inducunt, & spirationē  
 frequentiore reddunt, & maximè, si his superingeratur  
 nouus cibus. quapropter ante cibum alui excrementa, vbi  
 abundauerint, excludantur, sēpiusq; ad euitanda prædicta  
 mala clesmate refrigerante, & molli alui lenitio procuretur.

*De Tabæ ex affectu Pericardij. Cap. VII.*

**A**dmonitus à Galeno analogia ab animalibus desum-  
 pta posse emaciari, & tabescere corpus ex solo pe-  
 ricardio affecto, cum ipse hoc in sumia animaduernerit, in  
 qua, cum eam secuerit, ceteris omnibus corporis partibus  
 illæsis, inuenit in ambiente cor tunica tumorem præter na-  
 turam, qui humorem aquosum in se continebat, qualē pu-  
 stulæ, quas hydatidas vocant, emittere solent, diu hanc rē  
 obseruauit, considerauiq; ac dubitauit, an hoc fieri possit;  
 cum enim panniculus iste inter partes ignobiles reputetur,  
 vt idem Galenus testatur, ipsoq; solo affecto, exemplo reli-  
 quarum omnium partium, quæ ad custodiam, & tegumen-  
 tum cæterarum nobiliorum factæ sunt, nullum insequatur  
 periculum. Quod historia pueri Marylli Mimographi ab  
 eo in libris Anatomicarum administrationum narrata maxi-  
 mè confirmare potest, cum in eo ob sphacelatum os pecto-  
 ris exciso osse in loco, in quo pericardij vertex adnascitur,  
 huius panniculi apex sectus ita fuërit, vt cor nudum appa-  
 reret, & tamen superuixërit, hinc conijciebam difficile esse  
 iudicare, quòd eo affecto tabes vniuersi corporis subsequi  
 possit. Attamen cum nonnullos emaciari viderim, nulla  
 præsentē destillatione, nec sputo, vel cruento, vel purulen-  
 to, nullaq; naturalium partium ita læsa videretur, vt huius  
 macies

*Lib. p. de loc.  
 affect. cap. p.*

*Lib. 7. Anat.  
 admi. cap. 13.*

males, & atropbia subsequi possit, in eam deueni suspicio-  
 ne, posse hoc aliquando contingere ex pericardio quoinodo  
 libet affecto, quod licet inter partes ignobiles adnumeran-  
 dum censeatur, ideoq; si solum afficiatur, nullum posse pe-  
 riculum afferre: attamen cum aliquando ita affici possit, si-  
 cuti apparet eo inflammato fieri posse, ideo poterit plura  
 mala prodele lethalia, quæ hominem vel breuiori, vel lon-  
 giori tempore pro diuersitate affectus rapiant, & ita non erit  
 impossibile; quod aliquando tabem inducat, cum ea ratione  
 vel consimili, quæ à Galeno enarrata fuit, erit affectum. Si  
 autem vulneratum, sectum, & excisum in puero Marylli mor-  
 tem non tantum non induxit, sed citò sanatum fuit, hoc con-  
 tingit, quia eo solo affecto, illa affectio cordi non communi-  
 cata fuit: quæ si perseverasset, potuisset diuturnitate tempo-  
 ris cor in consensum trahere, & inde mortem cauare. Affec-  
 tus autem hic pericardij, ex quo aliqui emaciantur, & fa-  
 bescunt, qualem ego in nonnullis factum fuisse, coniecturam  
 feci, quo pacto curandus sit, videant alij, & doceant. Ego  
 enim, licet omni ingenio hos præseruare tentauerim, nihil  
 tamen profeci, omnesq; hos vidi tandem tabe consumptos,  
 & emaciatos, vltimo loco quadam accedente leui febricu-  
 la, cui syncopes sæpius connectebantur, periisse: b A. 300. 10

*De tumoribus Diaphragmatis. Cap. VIII.*

**D**iaphragma membrum maximè respirationi deservies  
 duplices patitur tumores, & ab utrisq; agrotantes in  
 extremum vitæ periculum deducuntur, quidam sunt breues,  
 quidam longi, hi à materia sæpius frigida, illi à calida gene-  
 rantur: de utrisque egit sapis abundè Galenus, pluribus in  
 locis, quæ loca cum ad cognitionem essentia horum tumo-  
 rum, & eorumdem causarum, & differentiarum, & signorum;  
 plurimum faciant, rem ita ex Galeni locis declarando expo-  
 nam, in mediumq; adducam. Diaphragma, cum tumore af-  
 ficitur, dupliciter hoc pati solet. nam irruentibus excremen-

*Diaphragma-  
 tis tumores si  
 ne febre.*



ris ad ipsum, potest tumorē, & sine febre; & cū febre pati. si sine febre afficiatur, à principio dolor, & respirandi difficultas cōtinget. præterea pulsus parvus accedit, & durus. quod autē ad crebritatē, quoniā in his necessitas non est adaucta, vel parū quid, vel nullo modo mutatur, vt docet Galenus lib. 4. de præfagatione ex pulsibus cap. de septo transuerso, & hæc excrementa debemus iudicare esse cruda, & tenuia; quoniam crassa non possunt infigi in substantiam nervosam diaphragmatis. quoniam autem hæc excrementa carent extrema caliditate, hi tumores possunt esse non tantum longi, sed etiam diuturni, sicuti experientia vidi in nobili egrotante, cui ex crudiore, & subtiliore sanguine factus est tumor in septo transuerso diuturnus. in quo cum dolor, & spirandi difficultas, pulsusq; durities, & paruitas adessent, ad eum tamen non subsequutū est delirium, cum hoc videretur rationabile ex eo, quod hæc pars ad mentem, vnde phrenes appellata est, plurimum faciat, quasi quod ad sapientiam conferat; quoniam materia, & tumor erat frigidus, & crudus. ex quo tandem mortuus est, cum prius ferē ad tabem deuonisset, & in ultimo disrupto abscessu expuisset cruenta, & cruda aliquo modo tenuia, & quæ nullam coctionem indicarent. Ad hunc eundem tumorem sequitur necessario tensio præcordiorum subuacua; quoniam tenduntur muscoli ad diaphragma, nulla existente in hypochondrijs inflammatione, vel alio simili tumore. & vt paucis hanc partem concludam, tumores hi longi, & diuturni generantur à materia tenui, & frigida, quæ tamen temporis diuturnitate in loco affecto crassescit, & ad hos sequitur dolor, difficultas respirandi, pulsus durus, & paruus, qui ad crebritatem vel parū, vel nihil mutatur, & tensio hypochondriorum nullo apparēte in his tumore ad tactum. & si his tumoribus aliquando adiungatur febris, vt experientia pluries adnotauimus, non est acuta, nec delirium necessario subsequitur, quod tamē aliquandō in appropinquāte morti vidī accessisse. & hi tumores,

res, cum perseuerant, & non soluuntur, patientes ad tabem deducunt. quod licet non fuerit a Galeno notatum, tamen testor ego verum esse hoc accidere. & hæc de tumoribus lōgis sine febre causatis à materia frigida. Si autem tumor diaphragmatis cum febre accesserit, hoc inde euenit, quod putrescentibus excrementis influxis, quæ necessariò vel biliosus humor, vel calidus, & tenuis sanguis sunt; quoniam crassa materia, ut sanguis crassior, & pituita lenta, propter densitatem diaphragmatis in ipsum non possunt recipi, inflammatur septum ipsum. Incipiente autem septi transuersi inflammatione, necessariò sequitur febris, tum ratione affectionis, tum ratione loci affecti. ratione affectionis quidem, quoniā hic tumor est ex calidis: ratione autem loci affecti; quoniā, propter viciniam, quam habet cum corde, & propter colligantiam cum eodem ob arteriam magnam, & cum cerebro per neruos, & cum iecore per venam cauam, trahit in consensum omnes partes principales, & præcipuè cor ipsum, cuius ratione etiam hæc febris ut plurimum est acuta. hac eadem incipiente inflammatione, à principio statim, quemadmodum in altero iam declarato tumore, sequitur dolor, & difficultas respirandi; & ideo in his, antequam delirent, spiratio est parua, & frequens, ut docet Galenus libro quinto de loc. affect. cap. 3. & similiter præcordia intenduntur absque nullo tumore in hypochondrijs existente, ut ibidem habet, & lib. primo Epid. commen. 3. tex. comm. 18. Hi autem, in crescente inflammatione, necessariò delirabunt, ut habetur lib. 4. de præfag. ex puls. cap. de septo transuerso. & loco citato lib. 5. de loc. affect. tuncque spiratio erit inæqualis modò parua, modò magna, & modò frequens, modò rara. Circa hypochondria etiā, vel ut magis propriè loquamur, ad sitū diaphragmatis nonnunquā apparet palpitatio, vel saltus, seu pulsus, ut docet Hippocrates lib. primo Prognost. tex. 31. & Galenus ibidem, & loco citato primo Epid. lect. 3. cōm. 18. Et sicuti sensus huius motus indicat inflammatum esse dia-

*Diaphragmatis tumores cum febre.*

phragma, ita etiam est indicium delirij superuenturi. Inflammationibus etiā istis solent superuenire aliquando conuulsiones nonnullæ. nam vt docet Galenus lib. 4. de pul. caus. capite de pulsu inflammationis. quibus inflammatum est septū transuersum, hi conuulsionibus sunt opportuni. In quo casu semper pulsus est durus ob communicatam arterijs affectionem: paruus, quoniam propter duritiem non potest attolli, & extendi; creber etiam ob necessitatem adauctam, pro cuius ratione semper frequentia adaugebitur. Quapropter ad hunc tumorē hæc cōsequentur, febris acuta, dolor, spirandi difficultas, hypochondriorū tensio, pullatio in præcordijs, spiratio praua, & frequēs: in crescēte autē inflammatione deliriū cōtinuū, spiratio inæqualis modò parua, & frequens, modò rara, & magna; pulsus paruus, durus, & pro ratione necessitatis creber, & hi cōuulsionibus sunt opportuni. & hæc omnia enarrata, & à Galeno tradita sufficiāt pro cognitione horum tumorum, cum hinc eorundem causæ differentię, & signa pateant. pro quorum curatione, quam proximè communiter docentes (cum ab ijs ægri in perniciem, & mortem sæpe deducantur, cumq; potissimum inflammatorii hi tumores, pleuritide ab ijs ita exquisitè pertractata, sint deteriores) immeritò neglexerunt, ad singulorum indicationes desumendas; vt recta horum curatio haberi possit, descendamus. Incipiendo à primis, cum curandus proponitur diaphragmatis tumor, genitus à materia frigida, quid indicabitur? indicatur, vt materia in loco affecto contenta euacuetur; euacuabitur, si sensibilibiter, vel insensibilibiter educatur: quoniam autem hic morbus ex fluxione factus est, fluxio materiæ fluentis prohibenda est. hoc autem fiet, si genita materia, & quæ fluere potest, euacuetur, simulq; prohibeatur, ne noua generetur. Quæ omnia an possit Medicus egrotantibus polliceri, animaduertant, qui horum tumorū curationem suscipiunt: quod si tumores hi sint incipientes, & non diutius progressi, poterunt egrotantium salutem, &

tumoris

*Diaphragmatis  
tumorū à ma-  
teria frigida  
indicationes.*

*Prognosticū.*

tumoris resolutionem sperare; quoniam hi possunt, licet cum discrimine, saluari, cum adhuc omnes vires consent. & remedia opportuna ferre possint. Quod si contigerit, ut hi tumores fuerint diuturniores, & confirmati, sciant, quod curationem non admittunt tum ratione affectionis, cum quasi iam occoluerint, tum quia temporis diuturnitate patientes ad tabem deducunt, cuius merito labefactaris omnibus viribus languent, generosaq; remedia non possunt tolerare. Quare in principijs horum, & quam primum occasio dabitur, curationem aggrediantur, rectaq; ratione agentes ita prædictis indicationibus satisfaciant. Proposito tumore diaphragmatis à materia frigida debet Medicus ad euacuationem materiæ in loco affecto contentæ accedere, ut eam vel sensibiliter educat, vel insensibiliter discutiat. Sed quoniam semper particularibus vniuersalia præmittenda sunt, aliàs ad locum affectum maior materiæ copia attraheretur, ideo in primis corpus expurgandum erit. Vnde ante alia aluo pharmaco leniente, & opportuno lenita, materia in corpore superabundans, & qualitate peccans parando vias, & fluidum corpus reddendo propriis portionibus concoquatur, demumq; medicamento conuenienti euacuetur: quoniam autem cogitandum est talem materiã in corpore superabundare, qualis ad locum affectum fluxit, cū hæc sit tenuis, & cruda, cuius ratione sanguis subtilior, & tenuior redditur, hæc vel erit pituita aquosa, vel serosa materia, quæ sicuti adinuicem distincta sunt, ita etiam diuersa requiruntur medicamēta. hæc enim elaterio, succo radicum sambuci, & similibus faciliè educetur, illa autem turbit, & huiuscemodi, quæ pituitam subtiliorem, & aquosam educere possunt, euacuabitur; quare has optimè discernat Medicus, ut rectè iudicare possit, quibus medicamentis agere debeat: quoniam autem talis materia nō tantum, cum est præsens, est euacuanda, sed etiam ad tollendã fluxionem prohibendum est, nè noua generetur, huius cau-

*Curatio.*

ſæ attendendum eſt: quæ quoniam vel ratione imbecillita-  
 tis viſcerum, vel quia eadem ſunt obſtructa, generatur, ideò  
 viſceribus attendendo per propria medicamenta, de qui-  
 bus omnes ſcribentes diſſuſe pertractant, eorum imbecillita-  
 tas, vel obſtructiones tollantur, eadeinq; roborentur. An  
 autem, dum hæc purgatio adminiſtratur, ſit cogitandum de  
 ſectiōe venæ, dico, cum hic habeamus morbum longum,  
 in quo vires ſunt manutenendæ, cū materia peccans ſit frigi-  
 da, & cum tales patientes vtplurimum ſint habitus frigidio-  
 ris, nequaquam venæ ſectiōnem conuenire, vt quæ magis  
 corpus refrigerare, & vires labefactare poſſit, parumq; à  
 loco patiente, cum iam materia ibi fixa ſit, educere, & re-  
 uellere queat. Purgatione inita, ad localia deueniendum eſt,  
 quæ materiā diſcutere poſſint. An his medicamenta reper-  
 cutientia præmittenda ſint, dicam hoc, cum patientes me-  
 dicum ad hos tumores curandos aduocabunt, non erunt in  
 illo primo morbi principio, in quo forſan quoquo pacto  
 reprimentia conuenirent. vnde tum ratione primi principij  
 tranſacti, tum ratione materiæ peccantis, quæ eſt frigida,  
 tum ratione ſubſtantiæ membri, quæ eſt neruoſa, & dura,  
 non credo poſſe repercutientia in vſum opportunum veni-  
 re. quare his prætermiſſis ad diſcutientia deueniendum eſt.  
 Diſcutientia ſunt duorum generum, alia enim interius ſu-  
 muntur, alia exterius applicantur. Quæ exterius in hoc caſu  
 applicanda ſunt, ſint ea, quæ diſcutiēdo ſimul laxare, & emol-  
 lire etiā poſſint, vnde butirum, pinguedines animalium, adi-  
 pes, & medullæ, in hunc vſum venire poſſunt; in principio  
 autem imbecilliora aſſumantur, in proceſſu autem ſint vali-  
 diora. quare in primis diebus aſſumatur butirū recēs, pingue-  
 do ſuiſſa, pinguedo pullorū, pinguedo anſerina, medulla vi-  
 tulina, & medulla ceruina, quæ omnia ſint recētia. in progres-  
 ſu autem morbi hæc eadem antiquata ſumantur, & vbi vali-  
 diori diſcuſſione egerimus, aſcendemus ad pinguedinem  
 taurorum, vrforum, leonum, quæ omnes prædictis ſunt ma-  
 gis

gis discutientes. Quoniam autem pars affecta non ita facile exposita est medicamentis, sed intimas corporis partes permeat, ideo, ut profundius hæc medicamenta penetrare possint, iubeo nonnunquam, ut lixiuio, & aceto simul lauentur. hinc enim maiorem partium subtilitatem adepta altius penetrare valent. cum his possunt commisceri olea discutientia, sicuti camomelinum, anethinum; possunt ex iisdem formari emplastra additis radicibus a ltheæ, maluæ, liliorū alborū, seminibus lini, foenugræci, & similibus; commiscendo aliquando styracem, therebentinam, ammoniacum, & cetera gummata, quæ emollire possunt. Nonnunquam usus sum cum felici successu emplastro de meliloto, quod valde profuit. perfusiones etiam ex oleis prædictis, & decoctionibus rerum enarratarum, quoniam altius penetrare possunt, maximè in hoc casu conuenirent. quæ modò validiora, modò imbecilliora parentur, prout occasio, & status morbi indicabit. & hæc de discutientibus exterius applicandis. Interius autem sumenda sunt ea, quæ simul partes naturales roborando possint discutere, in cuius usum præcipuè veniunt confectiones magnæ, sicuti theriaca, & Mithridatum, sed ego aliquando ad aliud remedium nobile deueni, coniecturam faciens me ex hoc posse hosce tumores discutere, analogia desumpta à cæteris tumoribus etiam præduris, quos aliquando experientia ab eo solutos vidi. Hoc fuit decoctum salsæ periliæ, quo nonnullos ab hoc morbo liberaui, prius tamen præmissis vniuersalibus purgationibus exquisitissimè factis, nec dimissis etiam loca libus, & particularibus iam enarratis remedijs. In aliquibus tamè hoc idem decoctum exhibui, qui nullo pacto releuari potuerunt, vel quia in his iam tumor occalluisset, vel quia nimis tardè administratum fuisset, hiq; tabe consumpti, angustiatiq; tum à dolore illo continuo partem anteriorem thoracis affligente, tum à spiratione admodum parua, & densa continuè tandem cum maxima calamitate pe-



rierunt. De altera intentione, videlicet de euacuatione materiei in loco affecto contentæ sensibilibiter facta, hoc dicā, quòd nullo modo expectanda est, cum diaphragma à parte superiori membrana costas succingente, à parte autem inferiori peritonio vestiatur, vnde ad extra nihil eius materiei refudare potest, nisi forsan disrupto abscessu, materia in cavitare thoracis deducta per tussim educatur, quem casum aliquando vidi cum maximo laborantium discrimine accessisse; quo tempore medicus excretionem materiæ facili-  
 ter abstergendo, & leniendo, sique dabitur occasio (hinc enim ego vidi mortem subsequi) discusso tumore ad consolidantia deueniat. Victus in talibus tumoribus non requis, cum morbus futurus sit longus, attenuans tamen, impere-  
 tur. cibariaq; præter cætera non sint excrementosa, nec difficilis coctionis, abstineatq; ab omnibus, quæ aquosos tenues, & serosos humores abundare faciunt. Vnde multa etiam iura fugiantur, & potus sit, quàm maximè fieri poterit, parcus; omnis enim potus modicus sit, dicebat Gal dū de orthopnæa ageret, in ijs, qui alicubi abscessum habēt, & maximè in his, qui in profundo corporis existūt. Abstineāt ante purgationē factam à vino; quoniam vinum omnes fluxiones proritat, adauget, & accelerat, tuncq; vtantur aliquo decocto parato cum saccharo, vel melle admixtis aliquibus attenuantibus, sicuti vel seminibus odoratis, vel Iffopo, vel origano, vel similibus. celebrata autem purgatione bibant vinum tenue, album, oligotoro, & ad dulcedinē decliue. Excrementorum alui maxima habeatur ratio; quoniam in omni difficultate spirandi fecum retentio molesta est, hisq; conueniunt clysteria, mollia quidem pro maiori parte, tamen per interualla possunt etiam venire in vsum acria, quæ & reuellere, & calefacere, & euacuare pro parte materias illas crudiores possunt, quæ eadem materiæ diureticis ad expulsionem proritentur. quod fieri facilè pro earum tenuitate poterit. diuretica autem in hoc casu non sint illa  
 aquosa,

*Lib. 7. de med.  
 secundū loca.*

aquosa, & frigida, sicuti semina illa communia, sed sint vere diuretica, quæ caliditate, & facultate propria lotium prouocare possunt. & hæc de tumoribus à frigida materia genitis dicta sint.

\* Cum diaphragma tumorem à materia patitur calida, *Diaphragma-  
tis tumorum à  
materia calida  
curatio.*  
ager acuto derinetur morbo. hic enim est inflammatio, quæ posita communes omnium inflammationum indicationes desumendæ sunt; materia enim inflammationem faciens euacuanda est. euacuabitur si retrocedet, vel discutietur retrocedet autem, si repellatur, vel reuellatur, & euacuetur. quoniam autem nec repelli, nec discuti potest pleno existente corpore, ideo totius euacuatio præmittenda erit; postea repellendum, & discutiendum est. Has indicationes cum maxima difficultate Medicus exequi potest; quoniam, & ratione membri affecti, & ratione colligantiæ, quam cum omnibus principalibus visceribus habet, cuius merito hæc acutissima est affectio, cito deducitur ager in extremum vitæ periculum. quod eo promptius euenit; quoniam huiusmodi ægrotantes adeo desipiunt, & delirant, ut nec ad oblata, nec ad cætera, quæ opportuna fierent, remedia bene se habeant. hincq; cum facili exoluantur vires, in vitium vitæ discrimen incidunt. Quapropter proposito tali ægrotante, pro prima intentione, dum adhuc vires constant, nec admodum delirant, statim in primo huius morbi principio, lenitæ aluo clysteri molli, & refrigerante (quoniam hic æria ratione affectionis, & febris acutæ non conueniunt) secetur vena interna brachij dextri. quantitas sanguinis ea sit, quæ pro ratione habitus, temperaturæ, aeris, & virium potius copiosa, quam mediocris iudicari debeat. repetaturq; si vires tollerabunt, morbusq; non cedat. loco affecto applicentur, quæ partim potentialiter refrigerare, partim reprimere possint: sint tamen actu subcalida, non autem frigida, ratione partis, quæ & duræ est substantiæ, & in continuo persistit motu. à frigidis enim actu potius rigeret, indeq; ad motum

*Prognosticum.*

proprium difficilius se haberet. unde à principio inungatur locus patiens oleo rosaceo completo, vt minus adstringat, subcalido. cui postea in processu morbi addatur parum camomelini. ad quam eandem intentionem possunt parari perfusiones ex decoctionibus herbarum frigidarum, sicuti ex endiuia, violis, lactuca, semperuuo, & similibus, quibus epithimetur etiam locus affectus. his autem, cum discutendum erit, addatur malua, althea, flores camomeli, meliloti, semina lini, fenugræci ex ijsdeni herbis contusis, & carūdem succis, addita farina hordei, & oleis prædictis possunt parari emplastra, quæ in principio sint potius refrigerantia, in augmento autem admisceantur refrigerantibus aliqua discutientia, quorum maior copia in statu esse debet. in declinatione autem sint fere simpliciter discutientia. ad quem vsum pinguedines, & cætera, quæ proposita sunt in antecedenti calu ad discussionem, accedere, & administrari possunt. Cum autem morbus est in augmento. si symptomata validiora molestant, morbumq; non remitti, sed grauiorem fore timeamus, laudo præcedente iam, & facta ex interna vena sanguinis missione, vt sedi admoveantur hircines, à quibus maximam ab illis internis partibus reuulsionem sperare possumus. Interim, dum hæc sunt, commendo, vt extremis partibus balnea, & lotiones adhibeantur, quæ sint paratæ ex herbis refrigerantibus, admixtis nonnullis discutientibus; ita enim actuali caliditate poterimus reuellerè à loco affecto, & potenciali frigiditate demulcebimus affectum ipsum. Siq; instet delirium, cuius ratione subsequatur vigiliæ immoderatæ, syncipiti oxirrhodinum ad refrigerandum, temporibus, & naribus ad somnum prouocandū nonnulla leuia stupefacientia applicarem, eiusq; ordinis nonnulla lotionibus prædictis adderem; & ne exacerbetur in his delirium, multitudinem hominum, luminum, imaginum, sermonum, & huiuscemodi interdicerem. Quò ad vñctum sola puſana exhibeatur. potius sit aqua, alui excrementa

ta quotidie excludantur, si non sponte, arte. Declinante autem morbo victus sit plenior, augeaturq; pro ratione vi-  
rium, & declinationis morbi, tuncq; vinum exhiberi potest  
debile, album, & tenue, & dilutum.

*De hydropē ex colliuatione. Cap. IX.*

**H**Ydropem refrigerato iecore, ab eiusq; intemperie fri-  
gida generari omnes scribentes docuerunt, eiusque  
curationem hoc supposito fundamento tradiderunt. solus  
Alexāder Trallianus locū Galeni positum lib. 3. de sympt.  
caus. cap. 2. considerans censet hydropem aliquando gene-  
rari ab intemperie calida. dicebat enim Galenus colliqua-  
ri quandoq; succos in venis existentes, qui, si non per renes  
ad vesicam transferantur, sed ad ventrē, vel ad totum cor-  
pus transmittuntur, subitaneos hydropum status inducunt.  
Si autem vi colliuationis tales hydropum status introdu-  
cuntur, ergo aliquando ab intemperie calida, cum ab hac  
sola colliuatio fiat, generabitur hydrops. quare hinc duo  
habebimus, primò quòd aliqua species hydropis cōtra Ga-  
leni principia ab intemperie calida causabitur, secūdò quòd  
aliquandò hydrops, quoniam omnis intemperies per con-  
traria tollenda est, per refrigerantia curari debeat. Hāc dif-  
ficultatem nonnulli tetigerunt, sed rem ipsam non expli-  
carūt, nec huius affectionis curationem tradere conati sunt.  
Ego autem rem istam aggrediēs primò hanc veritatem sup-  
pono, quòd aliquando colliquato sanguine, & succis, qui  
in venis sunt, non attrahentibus renibus, sed à venis ad ven-  
trem vel ad ambitum vniuersi corporis hac colliuatione  
transmissa, serum hoc subitaneos hydropum status inducit,  
tumente statim ex hoc vel ventre inferiori solo, vel etiā re-  
liquo totius corporis. hoc suppono pro vero, quoniam hoc  
vidi aliquandò factum in febribus, quæ naturā ardentium  
seruabant, in quibus vnica, vel altera die factos ex colli-  
uatione vidi hos subitaneos hydropum status, hincq; intu-

*Hydrops ex  
colliuatione.*

*Hydrops ab  
intemperie ca-  
lida an detur,*

muissē

muille adeo ventrem, ac si ascite per menses plures a gro-  
 tes laborassent. His addo hydropistres species esse, quæ  
 ratione materiæ principaliter distinguuntur, nam vel mate-  
 ria pituitosa, & cruda, vel flatu, vel aqua, quæ omnia frigi-  
 da sunt, unde vel anascha, vel tympanites, vel ascites fit, ge-  
 neratur: hæcque species & materiæ peccates genitæ semper vi-  
 tio hepatis immediatè ex intemperie frigida male affecti,  
 unde amplius perfectum sanguinem gignere non possit, si-  
 uè hoc fit per propriam passionem, & primariam, siue per  
 consensum, & secundariò, generantur, hæcque non subito, sed  
 sensim, & sensim fiunt. His suppositis dico casum illu Ale-  
 xandri ex Galeno desumptum non esse veram hydropis spe-  
 ciem, primò quia non magis generatur vitio hepatis, quam  
 ex mala totius corporis intemperie; febris enim, in qua cõ-  
 rigisse vidi casum hunc, totius corporis est passio, illaq; in  
 temperies calida, cuius violentia succi, qui continentur in ve-  
 nis, colliquantur, non tantum est hepatis, sed etiam omniũ  
 aliarum corporis partium. Secundò quia in casu isto mate-  
 ria aquosa, quæ vi colliquationis gignitur, potius est calida,  
 quam frigida: at in hydrope omnis materia, quæ huius vi-  
 tio gignitur, est frigida. Tertiò quia vera hydrops sensim ge-  
 neratur, tumorque in hac vel ventris inferioris, vel totius cor-  
 poris sensim adaugetur: at hic casus generatur subito, ita ut  
 intra terminu morbi acuti patientes admodum intumescant.  
 Cui consimilis est casus Hippocratis positus lib. 7. Aph. 56.  
 ubi habetur. Quibus hepar aqua plenum in pmentum erupe-  
 rit, ijs venter aqua repletur, & moriuntur. Què affectum, li-  
 cèt in eo sit tumor ventris à materia aquosa, sicuti est in hy-  
 drope, tamen cum subito fiat, nec vitio intemperiei hepa-  
 tis gignatur, Hippocrates tamen hydropem non appella-  
 uit. & Galenus in commento cum à vera hydrope per ea  
 verba. Si quando igitur contingat eas vesicas rumpi, effun-  
 ditur aqua ad locum membranæ abdominis interioris par-  
 ti supra ventrem positæ respondentem, in quo etiam aqua  
 hydro-

*Tumor ex colli-  
 quatione non  
 est vera species  
 hydropis.*

hydropicorū congregatur, clarè distinguit, qui nō à tumore vētris & à materia cōtēta, sed à modo generationis, & à causa, quia fiat vitio refrigerati iecoris, & sensim generetur, semper appellauit. Quare sicuti in casu isto Hippocratis, ita & in eo Galeni nō erit vera hydrops, ad quod alludens Galenus in explicanda ea sententia vsus est his verbis. Subitaneos hydropū status inducunt. quasi dicere voluisset, inducūt tumores vel vētris inferioris, vel totius corporis eo modo, quo in hydrope fiunt. additq; subitaneos, vt clarè ab hydrope eos distingueret. Si. n. verā hydropem intellexisset, non vsus fuisset hoc verbo, status hydropum, sed subitaneas hydropes absolutè dixisset. Quod non cōsiderans Alexander credidit Galenum admisisse veram hydropem ex colliquatione fieri, hincq; contra propria principia censuit fieri aliquam hydropis speciem ab intemperie calida, quæ postea per refrigerantia curari debeat. Quod nullatenus admittendum est, cum ex colliquatione vera hydropis species non generetur, nec vi calidioris hepatis, cuius merito, cum refrigeratū fuerit, vera hydrops tantū generatur, gigni possit aqua. Vbi enim iccur supercalefactum est, bilis, non aqua, & si adhuc magis incalescat, retorridi, & adusti, non aquosi generantur humores. Quapropter concludo casum hunc Galeni non esse casum hydropis, licet eius verba hoc innuere videantur, nec ex hoc loco haberi posse, cum hic vi caloris colliquefacientis fiat, aliquam speciem hydropis per refrigerantia curari posse, quem Galeni locum sicuti Alexander per seclē non intellexit; ita nec Arabes, qui hunc locum malè interpretantes, alteram hydropis speciem vitio renum non attrahentium genitam introducere conati sunt, intellexerunt; cum loquatur Galenus in casu colliquationis succorū tantū, quam renes, vbi validi sunt, attrahūt, & ad vesicam transmittunt; vbi autem non ita valeant, vt hanc colliquationem trahere possint, transmissa hæc materia ad abdomen, vel ad cæteras corporis partes, ibi tumorem generat, qualem

*Hydrops vitio  
renum non as  
trahentium an  
detur.*



qualem in hydropē fieri videmus. Excepto hoc colliquatōnis casu, nunquam admittit Galenus vitio renum fieri talem tumorem, nec fieri potest, ut eorundem renum vitio nunquā generetur hydrops, nisi cum iecori consenserint, cuius ratio ne virtus sanguificandi labefactata humores crudi, & aquo si generentur. Qua de re concludatur, cum vi colliquatōnis genita aquosa materia ad ventrem inferiorem transmittitur, in eoq; tumore parit, non ab hoc fieri hydropem; sicuti nec fit hydrops, cū similiter intumescit abdomen, erūpente in idem materia aquosa ex vesicis genitis in ea, quæ iecur ambit exterius, membrana. Cum igitur hic tumor nō sit hydrops, non erit contra principia Galeni, qui in omni hydropē caletaciendum esse docebat, si in hac dabitur indicatio refrigerandi. In hoc enim casu indicantur duo agenda esse; alterum, ut ratione causæ colliquefacientis, quæ est calor immodicus, & prauus, refrigeremus; alterum, ut ratione materiei iam genitæ, iam euacuemus. quibus indicationibus difficillimum erit satisfacere; quoniam cum vehemens est colliquatō, cuiuscemodi est in casu isto, languescit corpus, viresq; omnes exoluuntur. quibus labantibus, quā sit difficile ægrotantes morbis magnis laborare, omnibus est notum. Cum tamen dabitur occasio, statim medicus causæ omni conatu incumbat, ut, si fieri possit, eam inhibeat. hoc pluribus ingenijs exequi potest, scilicet victu refrigerante, cataplasmatibus, epithematibus, inunctionibus refrigerantibus, & consimilibus rebus applicitis thoraci, & præcordijs, sed præ ceteris maximè prodesse poterit potus aquæ frigidæ, quorum omnium in sequentibus ex mente Galeni verba faciemus. Quò autem ad euacuationem materiæ, duplici via hanc tentabimus, scilicet vel eam insensibiliter discutiendo, vel sensibiliter, & hoc per aluum eam excludendo, vel per viam lotij deriuādo, quod est id, quod dicebat Galenus lib. 7. Aph. comm. 56. cum hæc habebat. Sicuti in illis per medicamenta aquositates purgantia, & im-

positio-

*Colliquatōnis  
indicationes.*

*Prognosticum*

*Curatio.*

positiones eorum, quæ vim habent ciendi vrinam, & in vapores soluendi humorem talem, sic & in his fieri curationē. Quæ autem hæc debeant esse, ad propria capita recuratur, illincq; omnia, quæ opportuna in hoc casu erūt, desumantur. In quo hoc vnum animaduertatur, quod ista ante causæ abscessionem non administrentur, ne vires in totum resoluantur, febrisq; ex prædictis generis remedijs augeatur, causa autem remota, vbi febris in totum quieuerit, tunc in usum venire possunt. Si autem aliqua perseueret febris, cessante tamen colliuatione, & febris simul cum his, quæ materiam peccantem respiciant, attendendum erit. Quoniam autem præsentis casus occasione loquuti sumus de febribus, quæ corpus colliquefaciunt; ideo quid de his Galenus senserit, & scripserit, breuibus hic ad claram iuniorum intelligentiam subscribam.

*De febribus colliquefacientibus ex Galeno. Cap. X.*

**F**ebres colliquefactiue duplices sunt, nā quod colliquatur, in quibusdā sensibilibus, in quibusdā insensibilibus colliquatur. Quæ habent colliuationē sensibilem, in duplici sunt discrimine; Alię. n. sunt ex genere febriu ardentium, & de his meminit Gal. lib. 10. Meth. in fine, lib. 3. regiminis acutorum commen. 12. & 13. lib. 3. Epid. sect. 3. commen. 34. & lib. primo de differ. feb. cap. 8. Alię autem sunt ex genere febrium pestilentium, & de his meminit Hippocrates lib. 3. Epid. sect. 3. tex. 55. 61. & 70. & eodem libro commen. 57. Galenus ponit colliuationem esse ferè perpetuam in febre pestilenti, quod idem affirmat exemplo eadem sect. comm. 74. Quæ autem habent colliuationem insensibilem, vel sunt febres hæcticæ marasmodes, vel sunt putridæ, vel pestilentes. Febres colliquefacientes hæcticæ sunt illæ marasmodes, quæ populantur, & consumunt partes carnosas, & solidiores corporis humani, & de his meminit Galenus lib. 10. Metho. cap. ultimo. Putridæ autem colliquefacientes cor-

*Febrium colliquefacientium quot sint genera.*

pus

pus insensibiliter sunt eæ, in quibus extenuatur, & contabescit præter rationē patientis corpus, unde in huiusmodi agrotantibus in primis diebus solent nulla præexistente, vel externa causa, vel sensibili euacuatione apparere facies illæ Hippocraticæ, habentes oculos cauos, adstricta tempora, aures frigidas, contractas, & fibras earum inuersas, cutem frontis duram, intentam, & aridam, coloremq; vel viridem, vel nigrum, & de his febribus meminit Galenus libro primo Prognost. commen. 10. & 11. & lib. 2. Aph. commen. 28. Tales esse possunt etiam nonnullæ pestilentes febres, in quibus ratione pestilentis affectus, primis diebus apparere solent ob insensibilem colliquationem prædicti generis facies; de quibus verbū fecit Gal. lib. 6. Epid. sect. 3. cōmen. 29. quod eodem loco monuit etiam de dictis putridis corpus ipsum impossibiliter colliquefacientibus, totque sunt febrium colliquefacientium genera. Causæ autem colliquationis in his febribus variæ, & diuersæ sunt secundum varietatem, & diuersitatem febrium; nam in febribus ardentibus causa colliquationis est ingens caliditas, quæ ita potens est, ut sicut carbonēs igniti colliquefaciunt carnem pinguedinem, & partes carnosas; cui nisi opportunis resistatur remedijs, hominem vel necat, vel marasmatum reddit, ut habet Galenus lib. 10. Meth. in fine. & lib. primo de differ. feb. cap. 8. In febribus autem pestilentibus causa sensibilis colliquationis est mala, & ingens putredo, quæ partes propinquas contabescit, & colliquat, causa autem colliquationis insensibilis est praua, & venenosa qualitas, ac eiusdem febris prauitas, & acuties. In febribus verò marasmodibus huius colliquationis causa est caliditas quidem, ut in ardentibus; sed non propter eius magnitudinem, quoniam febres marasmodes ingentem non habent caliditatem, sed quoniam ea caliditas fundatur in partibus solidis, in quibus residens tanquam in proprio pabulo, ut flammā in ligno, eas depulatur,

*Causa.*

*W. 10. 11. 12.*

*W. 10. 11. 12.*

*W. 10. 11. 12.*

Pulatur, & contumit, & inde colliquat illas partes solidas, ut docet Galenus loco citato 10. Metho. in fine. At in illis putridis, in quibus insensibiliter vniuersum corpus colliquatur, & inde supra modum quam citissimè extenuatur, causa est humorum tenuitas, & habitus ob corporis raritatem facile resoluibilis, ac qui facile dissilietur. cui si cōnectatur oris ventriculi debilitas, ægerq; laboret sub cælo æstiuo in regione calida, & constitutione simili, facillima, & promptissima erit huiusce corporis colliquatio, ut ab eodem Galeno libris Prognost. & Apho. citatis habetur. hæ autem febres aliquando validiores sunt, & periculum manifestum, quia imbecillitatem patietis indicant, minantur. aliquando autem sunt parue, & hæ magis periculose existunt; maiorem enim agrotationis maleficientiam, ut verbo Galeni utar, ostendunt, ut quæ cum debiliore causa symptoma verèdum inducant. hinc sæpè apparent febres, quæ aspectu quidem ob earum paruitatem mites, sed tamen valde perniciosæ existētes agrotantes ipsos ad omnimodam virium prostrationem, nulla sensibili existente euacuatione, ob eorum malignitatem corpus insensibiliter, acervatimq; colliquātes deducunt. & hæc de causis. signa autem, & indicia colliquationis in his febribus non sunt eadem. nam quod colliquatur in febre marasmode, animo tantum deprehendi potest, & non cadit sub sensu: cuius ratio est, quoniam quod colliquatur in febre marasmode, sensim colliquatur, & semper vaporis vice digeritur, ut docet Galenus loco citato. At in putridis febribus, in quibus colliquatio insensibilis fit, quod colliquatur, non sensim, sed acervatim resoluitur, & hinc velociter, non autem longo tempore, apparent in agrotantibus corporis illæ extenuationes, quæ quomodo, & qua ratione à medio sint cognoscendæ, docet Galenus lib. 1. Prognost. in medio comm. 31. ubi hæc habet. Cæterum conuenit iumorari diutius atrectando omnem manum non solum corpus egri, sed etiam superiores partes diligenter animad-

Signa.

uertentes, si non solum acriorem, sed etiam si substantiæ copiam vnâ secum, & quidem corpulentam reportet, veluti flammulâ quandam peruadentem cutem tuæ manus, quæ cutim ægri contingis, seque insinuâtem perspicuè in profundû. & reliqua quæ sequuntur. Per quæ clarè animaduertas differentiâ eius extenuationis, quæ ex colliquatione insensibili causatur, ab eis extenuationibus, quæ sunt vel ob viriû imbecillitatē, vel ob causâ externâ, & præcedentē, vel ob debilitatē natiui caloris, qui non insuper extendi, vt inquit Galenus in côm. 10. primi libri Prognosticorû in extremas corporis queat partes, sed in visceribus sôlis exiguus obseruetur, cuius meritò nō præterea affluat ad extremas corporis partes tâtum sanguinis, aut spiritus, quantû antea affluebat habentibus per naturam; & ob eam rem in facie maxima extenuatio, ac mutatio naturalis habitus liquidò apparet, quod idem à graui interna inflammatione, vel à nimia humorum copia calorem inhatum ad intra reuocantem, ac retrudentem, fereq; suffocantem quandoq; causari solet. hæ autem extenuationes sicuti ab ea, quæ per insensibilem colliquationem gignitur, valdè differunt, ita etiam à diuersis prodeunt causis, nec per eadem signa deprehendi possunt. Quod autem colliquatur in cæteris febribus, sensu deprehenditur; nam vel transmittitur per lotium; vel defluit in ventrem, & inde per secessum extramittitur; ex quo duplex est colliquationis principale signum in his febribus; scilicet, lotium, & deiectiones alui: lotium quidem hoc indicat, quando habet aliquid pingue desuper natans araneorum specie, vt habet Hippocrates lib. 2. Prognost. text. 35. & Galenus ibidē, & lib. 7. Aphor. côm. 37. & lib. 3. Epid. sect. 3. côm. 74. & hoc potest esse indicium commune & febribus ardētibus, & pestilentibus, at non omnis colliquationis, sed tantû pinguedinis: lotium etiam, si sit spumosum, potest esse colliquationis indicium, vt habet Galenus lib. 3. Porroher. côm. 10. Si etiam cû lotio aliqua partes erui, vel hordei speciem referētes

referentes vnà exeant, colliquatorum membrorum aut carnis pro colorum, & substantiæ differentia possunt esse colliquationis indicium, vt docet Galenus lib. 6. Epid. sect. 5. comm. 15. à iecore enim corpuscula veniunt, à renibus carnosiora, à vesica autem foliorum similia, hordeacea autem magnitudine quidem, & duritia, at non albida, colliquatæ carnis notæ sunt, sicuti & nigrae lienis magis. Deiectiones autē indicantes consumptionem, & colliquationē possunt esse diuersæ, nā aliquādo sunt pingues, & hæ indicāt colliquationē pinguedinis, vt habet Gal. lib. 3. Epid. sect. 3. cōm. 74. & 70. in fine, & 55. & lib. 3. Prognost. comm. 22. & lib. primo de Crisibus cap. 11. Aliæ autem sunt biliosæ, vt habet Galenus lib. 3. Epid. sect. 3. comm. 34. & hæ deiectiones biliosæ solent esse spumosa propter ingentem caliditatem, vt habet Galenus lib. 3. regiminis acutorum. comm. 12. & lib. primo de Crisibus cap. 11. præterea sunt hæ sincere biliosæ, & non mixtæ. & hæ solent esse præcipuè signum febrium ardentium colliquantium, vt habet Galenus lib. 3. regiminis acutorum comm. 13. & hæc sunt indicia maioris colliquationis factæ propter intensiorem calorem, ex quo vel colliquefit caro mollis, vel pinguedo ipsa quidem, sed intensius; & ab intensiori causa. solent etiam esse hæ deiectiones aliquandò sub croceæ, aliquandò albæ. albæ apparent, quandò colliquefit pinguedo, & non à maligno, nec intenso calore: subcroceæ autē, quādo colliquatio fit ob vehementiorem calorem, vnde & colliquatur caro mollis: vel quādo materia colliquefacienda habet aliquam malam qualitatem, qualis est pinguedo vetusta, ac semipuris, vnde colliquata acquirit illum colorem, sicuti docet Galenus lib. 3. Prognost. cōm. 21. Hæ etiam deiectiones solent esse leues, non autem asperæ, nec inæquales, quod fit propter vehementem colliquationem, ex qua tota materia æqualem passa est alterationem, vt habet Galenus lib. 3. Prognost. loco citato. Solent etiam hæ deiectiones esse glutinosæ, & hoc propter caliditatem præ-

*Lotiū colliquationē indicās.*

*Deiectiones colliquationē attestantes.*

*Non rubet*



dominantem materię, unde fit lenta, vt habetur à Galeno eodem loco citato, & primo de Crisibus cap. 11. Verum in his deiectionibus hoc est notandum, quod omnes tales deiectiones sunt corpulentę, & non aquosę, nec tenues, vt habetur à Galeno lib. 3. Epid. sect. 3. comm. 34. vbi loquens de febribus ardentibus, ponit colliquationem non esse signum pathognominum earum, & hoc probat ex processu Hippocratis, qui ait in illis febribus ardentibus eos excreuisse tenuia, & aquosa, quę (inquit ipse) non sunt colliquationes, vt confirmat etiam eodem loco comm. 40. & ita omnes deiectiones indicantes colliquationem sunt corpulentę, & glutinosę, vt apparet ex iam dictis à Galeno, & hę deiectiones tam sunt, & contingunt in febribus ardentibus, quàm in pestilentibus, verumtamen non eodem modo, nam in febribus pestilentibus, in quibus valida sit putredo, istę deiectiones solent esse graueolentes, & puridę, vt habet Galenus lib. 3. Epid. sect. 3. comm. 74. at in febribus ardentibus, & morbis acutis non semper sunt tales, sed tantum, quando adest ingens putredo, vt habet Galenus lib. 3. Prognost. comm. 12. & hæc de signis colliquationis in febribus colliquescientibus sumptis ex lotio, & ex deiectionibus. sed & his additur tertium, quod aliquando contingit colliquato carnoso genere, & sunt sudores multi; nā carne colliquata, excretio colliquationis, vel fit per ventrem, & hoc contingit, quando illa fluxio est crassior, vel fit per lotium, vbi minus crassa est, & ad renes transmittitur, vel per cutim: quod contingit, vbi in halitus resoluitur, & tunc contingunt multi sudores, vt docet Galenus lib. 3. de Sympt. caus. cap. 2. His addo, quod aliquando euenit fieri colliquationem non pinguedinis, nec carnis, nec partium solidarum, sed tantum sanguinis, & humorum, qui sunt in venis, & talis colliquationis signum est multitudo lotij. nam cum resoluantur humores in ichorosam sanie, si renes valida pollent vi attractrice, attrahunt ipsam, & inde multitudo lotij emergit. Si au-

*Sudores colliquationes attestantes.*

tem renes non sint sani, nec valeant trahere hunc ichorem, vel si venæ ipsum ad ventrē transmittant, seu ad totius corporis ambitum, subitanei hydropum, quemadmodum superius explicauimus, status inducuntur, & ita vel hydropis status subito factus, vel lotij multitudo, & exuberantia erunt signa colliquationis succorum, qui sunt in venis, & ipsius sanguinis, quod docet Galenus loco superius declarato in lib. 3. de sympt. caus. cap. 2. & hæc quò ad causas, & signa sufficiant. Quò autem ad curationem varia, & diuersa harum colliquationum secundum febrium diuersitatem esse debet curatio. nã in febre ardenti pluribus rebus curatur, scilicet, victu refrigerante, epithematibus eiusdē rationis, cataplasmatibus, & similibus rebus thoraci applicitis, vt docet Gal. lib. primo de differ. feb. cap. 9. Quare deueniendum est in hoc casu pro victu ad ptisanę cremorem, vt habet Gal. lib. 3. de ratione victus in acutis comm. 13. vel ad consimilem cibum refrigerantem, & humectantem, vt docet lib. 10. Metho. in fine, sed præ cæteris præcipuum est in hoc casu remediũ, & omnibus præferendum, & maximè iuuantissimum, & sine quo egri vel ad mortem, vel ad tabem deueniunt, aquæ frigidæ potus, vt monet Gal. primo de differ. feb. cap. 9. & lib. 11. Metho. in fine, & lib. 3. de ratione victus in acutis comm. 12. & 13. Quo autem tempore exhibenda sit hæc aqua, notandum est, quòd est exhibenda, quando aliquod apparuerit signum concoctionis, vt declarat Gal. citato lib. reg. acut. comm. 13. vbi habet, quòd obseruandum est quodcunq; signum coctionis, quantumvis momentaneum: quo apparente, inquit, exhibendam esse frigidam, & sic exhibenda est aqua eo tempore, quo aliqua concoctio apparuerit, nec requiritur perfecta, & exquisita materiæ concoctio, sed sufficit, quòd humores sint mediocriter concocti, vt etiam clarius habet Gal. lib. 9. Meth. cap. 16. in fine. ex quibus liquet hunc potum exhibendum esse in statu; nam in statu humores sunt aliquantulum, & mediocriter, non autem perfecte

*Hydropum subitanei status colliquationē attendantēs.*

*Curatio colliquationis febrium ardentium.*

*Curatio colli-  
quationis fe-  
brium pestilen-  
tium.*

*Curatio colli-  
quationis fe-  
bris marasmo-  
dis.*

concocti; in statu enim materia, vt habet Gal. lib. 3. de crisi-  
bus cap. 5. perfectè cōcoquitur, & ideò non est perfectè cō-  
cocta, quod postea habet in fine status: vnde possumus de-  
prehendere hanc frigidæ aquæ potionē esse exhibendā in pri-  
mis partibus status. & hæc de colliquatione febrium arden-  
tium, quæ curatur tantum per refrigerantia, quia per solam  
caliditatem causatur. Quò autem ad eam, quæ sit in febre  
pestilenti, notandum, quò duplex potest esse febris, scili-  
cet vel ardens, vel non ardens. si sit primi generis, in hac  
etiam conuenit potus aquæ frigidæ ad extinguendam flam-  
mam illam, vt docet Oribasius, & alij ex intentione Ruffi. si  
autem sit secundi generis, cum in hoc casu colliquatio pro-  
ueniat ex putredine, & pura qualitate, ac venenosa, curatur  
cum his, quæ resistunt putredini, ac prauam, & venenosam  
qualitatem propulsare possunt, siue sit cibus, & potus, siue  
medicamenta, & antidoti, de quibus in tractatu de febre pe-  
stilenti egimus. Colliquatio autem insensibilis, quæ contin-  
git in febre marasmode, curatur per refrigerantia, scilicet,  
per victum, aerem, medicamenta, & balneum, quæ refrige-  
rantia sunt remedia adhibenda in curatione huius febris: quæ  
licet non propriè curetur, cum siccitas sit insanabilis, cura-  
tur tamen aliquo modo, scilicet transferendo hominem ad  
melius, videlicet ad marasum ex senio; nam cum febres  
marasmodi consistant in duobus, quorum alterum est cali-  
ditas, alterum siccitas, potest quidem remoueri caliditas,  
at non siccitas. Quomodo autem remoueatur ista caliditas,  
quæ, cum fundetur in partibus solidis, est causa colliqua-  
tionis, docet Gal. lib. 10. Metho. cap. 10. & 11. dum mo-  
net ipsam remoueri ex quibuscunq; refrigerantibus, sed  
præcipuè ex folio aquæ frigide, ex quo remota caliditate, re-  
mouetur colliquatio. & licet tunc temporis homo non pos-  
sit dici sanus, diutius tamen potest viuere, ita constitutus in  
habitu senili, vt etiam docet Galenus loco citato 10. Meth.  
in fine. Si autem ista colliquatio insensibilis contingat in fe-  
bre

bre putrida, intentionem habebit Medicus, vt monet Galenus comm. 11. lib. primo Prognost. firmare vires ventriculo idoneis alimentis administratis. præcipuè autem eam curandi rationem aggrediatur, quam idem lib. 12. Meth. cap. 6. docet. quo loco, & tenuitati humorum, & corporis raritati, & eiusdem superflue distillationi quibus, & quomodo resistendum sit, explicat. Si autem ultra causas enarratas adfit etiam prauitas humorum, malignitasq; in febre appareat, ea, qualia in febre pestilenti agenda esse explicauimus, administraret, quibus prauam qualitatem, & inde colliquationem inhibere poterit, & hæc de febribus colliquescentibus ex Galeno.

*Curatio colli-  
quationis fe-  
bris putridæ.*

*De Ileo. Cap. XI.*

**I**leos est affectio, quæ sepius vnâ cum ægrotantis vita terminari solet; de qua licet omnes scribes traderint curationem, tamen quia indistinctè, & confusè, quæ ad eius cognitionem pertinent, tractant, in hacq; nonnulla sunt discriminis plena, ideò prædictis addam etiâ caput hoc de Ileo. quod eò libentius agam, cum videam plures ægrotantes ex inflammationibus, & cæteris membrorum principalium morbis, quàm ex Ileo, saluari: quod profectò non ex partis affectæ præstantia, nec etiam sæpè ex magnitudine affectus contingere potuit, sed tantum, quia debito tempore opportuna in hoc non administrantur remedia. hocq; quia eius essentia, & causæ, quibus obuiandum est, non ita medicis pateant. quas ego explicaturus ita exordiar.

Ileos est superfluitatum cibi, quæ per inferiorem aluum excernuntur, retentio, vt clarè habet Galenus lib. 3. Aphor. comm. 22. Cum retinentur istæ superfluitates in intestinis, vel vt si quid in eis boni chyni remanserit, ad iecur per mesarçi venas attrahatur, vel vt ob maiorem hominis commoditatem ad debitum tempus excerni possint, ista retentio non dicitur Ileos, sed tantum cum præter naturam, nec ad di-

*Ileos quid sit.*

*Causa.*

tributionem, nec ad commodiorem excretionem retinentur. Retentio autem hæc præter naturam à laxa virtute ex pultrice generatur, quæ dupliciter lædi solet, scilicet, vel aboletæ, vel impedita. aboletur ab excessu intemperiei frigidioris, sicuti & cæteræ omnes facultates ab excessu simili abolentur, & tunc nihil ad infernas partes transmittit, ut habetur lib. 3. de sympt. caus. cap. 2. quod idem Galenus lib. 1. de locis aff. in fine. asserere, & confirmare videtur. impeditur, cum intercluduntur intestina; intercluduntur autem duplici ratione, scilicet, vel ratione tumorum præter naturam, vel ratione excrementorum obstruentium. tumores hi possunt esse inflammatio, de qua Gal. lib. 3. Epid. sect. 2. cōm. 7. & lib. 6. de loc. affect. cap. 2. & lib. 3. Aph. comm. 22. & lib. 6. Aph. comm. 44. vel abscessus in substantia intestinorum collecta materia, vel duri tumores, ut scyrus, de quibus. Galenus hoc ultimo citato loco meminit. Cancer etiā hoc idem causare potest, cuiuscemodi vidi ego in Fabro ferrario, qui cum in colo per plures menses cancrum passus fuisset, ex quo in transitu fæcum quotidie vehementi cruciatur dolore, maximas perferens punctiones, perinde, ac si acubus perforaretur, tandem acuto cancro, ab eodemq; obstructis intestinis factus Iliacus, præcedentibus stercoreis vomitibus miserè vita functus est. Excrementa autem obstruentia sunt, vel fæces induratae; ut habet Galenus lib. 6. de loc. aff. cap. 2. & lib. 3. de sympt. caus. cap. primo, & lib. 6. Aph. comm. 44. vel pituitæ copia; quam licet videatur ponere Galenus hoc ultimo citato loco sub dubio, tamen eam in fine, si vnà cum ingente frigidityte iuncta fuerit, admittit, hancq; causam veram esse testantur historiae à Viris celeberrimis enarratae. hæc de essentia, & causis, quibus signa subscribo. Signa alia sunt præsentis morbi, alia moris morbi, alia differentiarū morbi. Signa præsentis de se patent, quoniam cum à prædictis causis alui excrementa, quæ per ventrem inferiorem excerni deberent, retinentur, clarè

*Ileos an possit  
causari à pi-  
nita sola.*

*Signa.*

appa-

apparet factum esse Ileon. addebat Galenus lib. 7. Aphor. comm. 10. huic proprium, & inseparabile esse, nihil inferius descendere, & lib. 6. Apho. comm. 44. subdebat, etiā si acerrimo vtaris clisteri. Hoc Galeni dictum omnes scribentes acceptauerunt, tamen Hippocrates contrarium testatur lib. 3. Epid. sect. 2. tex. 7. in historia mulieris uolulo fæ, quæ apud Tisamenum decumbebat, dicens. Deiectiones tenues, crudæ, pauçæ. quæ uerba sicuti Galenus in commento neglexit, ita posteritas conuiuentibus oculis pertransiuit, & tamen hæc in Iliaca passione aliquid descendere affirmant. Ego diu locum hunc considerauit, remq; ipsam obseruauit, tandem experientia, & ratio me docuit in Ileo aliquid descendere posse. Vidi enim plures Ilicos, in quibus nonnulla, licet pauca, excernebantur. hocq; tantum, dum generaretur morbus, animaduerti fieri; factò autem, & completo morbo, nihil postea descendisse vidi. hoc autem non sine ratione factum iudicauit; quoniam, dum fieret Ileos infra locum affectum, descenderant excrementa, quæ vel à natura, vel ab arte excludi poterant, antequam omnia intestina in consensum affecti ducta essent, propriamq; naturam, & facultatem omnem amisissent. hinc Hippocrates in lib. de morbis tertio, in Ileo ex inflammatione genito, ad extrudendas fæces infra locum affectum contentas suppositoriū ex mele taurino fele oblinitum, decem digitorum longitudine imperabat, quæ non post morbum factum, sed antea in inferioribus intestinis congestæ erant. Cum autem oppositum Galenus scripserit, intelligatur de morbo completo loquutum esse, & in eo casu, in quo omnia intestina in consensum loci affecti deducta, adeò aliquando angusta redduntur, ut nec amplius flatum, nec stercus, nec podex etiam specilli acumen admittant. hæc de signis præsentis morbi. Signa moris hæc erunt. Omnis Ileos licet periculosus sit, at tamen non æquè, cum hic non ita exitialis sit, ut ille: nec ille, perindè ut hic, sit mali moris; quare hi per hæc signa di-

*In Ileo an sit  
inseparabile, ni-  
hil inferius de-  
scendere.*

*Signa moris  
Ilei.*

stinguantur.



stinguantur, Ilei exitiales, & mali moris erunt omnes hi, quibus vomitus superueniunt à principio quidem materie-  
rum biliosarum, & pituitosarum, sed postmodum, cum ma-  
gis distorquentur ægri, stercoris succedunt, vt habet Ga-  
lenus lib. 7. Aphor. comm. 10. & ab his vix vllus saluatur,  
vt docet lib. 6. de loc. affect. cap. 2. aliqui enim interdum  
huic vomitui superuiuant, sicuti nos in aliquibus Iliacis ex  
fæcum retentione, & scroti delapsu contigisse vidimus, in  
quibus Ileis solent etiam adesse dolores vehementissimi, vt  
ibidem habetur. Quòd si etiam in Ileo non sit stercoris vo-  
mitus, sed vel respiratio, vel ructus, vel flatus, vel totum  
corpus graue oleat, hi etiam (vt docet tertio commentario  
Prorret. comm. 63.) erunt mali moris, & perniciosi, licet  
non æquè, vt superiores. In quibus autem non erit vomitus,  
nec respiratio, vel ructus, vel flatus, vel corpus malè oleat,  
nec vehementes erunt dolores, hi ilei ex se nec mali moris,  
nec exitiales erunt. dixi, ex se, quoniam si cum tales sunt, ci-  
tò, & rectè non curentur, postea & in his omnia symptoma-  
ta mala occlusis intestinis, & nihil recipiètibz superueniunt.  
Signa autem differentiarum, quæ maximè aduertenda sunt,  
(quoniam hinc omnis recta curandi ratio auspicari debet)  
hæc erunt. Cum fuerit Ileos ratione abolitæ virtutis expul-  
tricis, aderit retentio excrementorum alui, nullo præsentè  
dolore, nec ad tactum tumor molæstus persentietur: nulli  
aderunt discurrentes per superiora intestina flatus; quoniã  
hi à diminuto calore, non ab insigni frigiditate generantur,  
his nec vomitus superueniunt stercoris; quoniã virtus abo-  
lita nullum intentat motum, nec deprauatè operari potest,  
ad superiora id, quod infernè descendere deberet, detru-  
dens, superueniunt tamen, cum perseverant hi Ilei, malæ  
ventriculi affectiones à prauis vaporibus materierum reten-  
tarum, & quia non fit distributio, causatq. Vnde subsequen-  
tur inappetentiæ, subuersiones, nausæ, vomitus tum cibi,  
tum aliquarum serositatum, & si diutius perduret morbus,  
respira-

*Ilei ratiõe vir-  
tutis expultri-  
cis abolitæ si-  
gna.*

respiratio, & ructus malè olent. quo ingrauescente, totum etiam graue olet corpus. quod indicium est proximi exitij. In his præcessere causę refrigerantes, sicuti victus, & potus refrigerans, & præcipuè aquę frigidę potio, medicamēta, vel venena eiusdem ordinis, crudirates multę, & diurnę, exercitium in aquis frigidis, deambulationes per niues, sub dio, sub cęlo hyberno, & gelido, pedum vehemens frigus, quod facillimè intestinis communicatur, corporis hyemali tempore nuditas, seu indumentorum leuitas, vel quid simile, à quibus omnibus causis vidi tales Ileos generari. Cū autem causabitur Ileos ratione interclusionis intestinorum, si hoc erit ratione tumoris scyrrosi, præcessit diuturna intestini durities; quoniam à puro scyrro nō potest citò hoc fieri, quæ ad tactum, & maximè si sit in his, quæ exterius locata sunt, facillè persentiri potuit. Si autem in his, quæ interiorius distribuuntur, factus fuerit, maiori compressione ad eā sentiendam indiguit in his, licet non extiterit dolor, tamen semper adesse solet grauitas consideratione digna, quæ continuè intestina, & abdomen ipsis inferius, potissimum cum stant, detrahi videtur, ad excernenda quę, & detrudenda inferius excrementa non ita faciles sunt, cum ab hoc semper in transitu angustientur. Si erit in causa cancer (quemadmodum ego dixi aliàs factum fuisse) præcessere signa canceri, Videlicet, punctiones ad compressionem, durities, & inæqualitas ad tactum, dolor ferè continuus, qui in trāsitu facum valdè exacerbat, & diuturna fuit hæc affectio, quę tandem intestinum intercludens Ileum causat. Si sit abscessus, dolor in parte læsa aderit, & febris quandoq; huic, cum ad suppurationem declinauerit, connectitur, tumor ad tactum præsentietur, non ita citò ab hoc intercluduntur intestina, & præcessere ea, ex quibus abscessus generari potuit. Si autem ab inflammatione (quod vt plurimum contingere consuevit) generetur Ileos, acutissimus fit morbus, & qui velociter ad statum properet. huic addi-

*Ilei ex scyrro  
so tumore signa.*

*Ilei ex cancro  
signa.*

*Ilei ex abscessu  
signa.*

*Ilei ex inflammatione  
signa.*

tur febris, & vnà cum ea dolores, qui in hoc sunt vehementes, & qui multum ægros distorqueant. hinc faciliè ventriculus in consensum trahitur, vndè vomitus biliosi, & pituito si citissimè succedunt, siq; non cedat morbus, & augeatur, cum id, quod phlegmone laborabat, intestinum, nec pōdus, nec acrimoniam, vt habet Galenus lib. 3. de natural. facultatibus cap. 13. toleret excrementorum, eò excernere, expellereq; ea quàm longissimè à se nititur. cumq; hoc prohibitum sit inferius ob phlegmonem occludentem persequi, ad supraposita intestina, & ad ventriculum extrudit, hincq; vomitus stercoris, signum admodū exitiale succedit. tunc quia nec cibum, nec potum continere possunt; singultiant, sudant, aliquando conuelluntur, extremaq; cum in deterius labuntur, refrigerantur, & omnes vires languent, in locoq; dolente nonnunquam apparet tumor eminens, cuius ratione, vt docebat Galenus lib. 6. de loc. affect. cap. 2. nonnulli hunc morbum Chordapsum vocauere, quoniam in eo tumore apparet intestinum ad similitudinem chordæ conuolutum. Præcessere hunc morbum causæ calefacientes, sicuti vsus aromatum, eduliorum acriorum, vini generosi ingurgitatio, cruditates nidorosæ, ciborum corruptiones, & similia, quæ etiam occasione sumpta à causa extrinseca, & potissimum à frigiditate externa, & vehementi, potuere hanc inflammationem causare: quod idem, non præexistentibus his causis, plaga, medicamentum, venenum, & prolapsio intestini in scrotum, indeq; violenter retrusum causare potuit. At si fiat Ileos à stercore indurato obstruente intestina, cuius ratione materierū ad infra descensus prohibeatur, & per plures dies in his aluus nihil egeffit, à principio non est dolor, qui postea accedit, cum diuturnitate temporis fæces retentæ mordacitatem insignem acquisierint. nam per plures dies hic pertrahitur morbus, nec adeo est acutus, vt qui ex inflammatione, nec dolor erit ita vehemens, & cruciās, vt in priori. aderit grauitas vētris à copiosa materiæ, & sæpius

*Ileos quare dicitur  
Etus Chorda  
psus.*

*Ilei ex indurato  
stercore signa.*

prius ipsis videtur distendi abdomen, ac si vi detrahatur, ad tactum persentiantur intestina, si corpus non fuerit ad modum carnosum, & obesum, stercore duro turgida, his cum pertrahitur morbus, intestinaq; sunt plena durioribus fecibus, succedunt vomitus bilis, & pituitæ. & si magis distorqueantur, stercoris etiam. nam ab intestinis, in quibus talis passio existit, hic vomitus causatur, à se expellere stercus appetentibus, cum longitudine temporis molestare inciperit, & non potentibus se exonerare propter eam, quæ facta est in partibus inferioribus, obstructionem, sed coactis contra naturam violentè moueri, & ad loca superiora materiam noxiam extrudere, ut habet Gal. lib. 7. Aphor. commen. 10. hiq; similiter, cum malè habent, singultunt, & aliquando conuelluntur, rarò febricitant, & tandem refrigeratis partibus extremis vita decedunt. hic morbus gigni consuevit in his, qui à natura adstrictiores sunt alui, quiq; intestina parum sensitiua habeant, & præcipuè si vsi fuerint cibarijs crassis, excrementosis, adstringentibus, austèris, si vixerint otiosè, cum gulæ indulerint, si vel negotijs, vel curis impediti, & maxime cum equitauerint, faccum excretionem vel neglexerint, vel necessitate coacti retinere voluerint, & in his fecibus gignitur morbus, cum intestina ab intemperie frigida, quæ eis communicata fuerit, vel ratione frigoris externi, vel ratione interius sumptorū labefactata fuerint. Si autem à pituitæ copia vnà cum ingenti frigiditate (quod fieri posse experientia ipsa testata est) gignatur illos, nulla morbi ratione in hoc erit febris, hic erunt vehementissimi dolores ratione intemperiei, cum ratione materiæ geniti, qui cum ad modum vigeant, ægrotantesq; valde crucient, citò deducunt partes superiores in cōsensum, hincq; citò superueniunt vomitus biliosi, & pituitosi: quod si non cedat morbus, etiam his stercoris vomitus succedunt, tentantibus intestinis hoc à se expellere, nec potèntibus ad inferiores partes ob oclusam viam

*Illi à pituita  
signa.*

viam detrudere, vnde tandem, motu contra naturam concitato, ad superiora stercus ipsum violenter transmittitur, in his semper corpus friget, nec admotis calefacientibus facile incalescit, & à dolore vexati loco stare nequeunt. murrant partes superiores, adsunt rugitus, & flatus ascendentes, qui tamen dolorem leuiorem non faciunt. In his præcessere, quæ pituitam aggregare, & crudeos humores cumulare potuerunt, sed præcipue ab externo frigore palsi sunt. Hæcque solet esse potentissima occasio, qua & pituita in vno, & eodem loco aggregatur, & qua intestina adstringuntur, & magis conuiuent; frigidi enim est constipare, hæc de signis differentiarum Ileii. Qui sicut à diuersis prædictis causis generatur, ita an in diuersis fieri possit intestinis, considerandum est. Omnes scribes ex Galeno lib. 6. de loc. affect. & lib. 6. Aphor. & alijs locis habent hanc affectionem intestinis tenuibus, ex quibus præcipue in hoc morbo intestinū Ileon patitur, propriam esse: cuius ratione hic morbus à læsa parte nomen desumens, vt habetur lib. 2. Metho. cap. primo, dictus est Ileos. Huic sententiæ non acquiesco, quoniā video omnes prædictas causas, quæ in intestinis tenuibus Ileum, & superfluitatum cibi retentionem facere possunt, eandem in crasis etiam producere posse. nam in his, & virtus ex intemperie aboleri potest, & tanta gigni inflammatio, seu aliud tumoris genus, quod totum eius spatium intercludat. potest etiam in his tantum stercoris, quod propriè in crasis aggregatur, vel pituitæ cumulari, vt ex toto obstruantur. immo vomitus fecum in omni Ileo exitiali superueniens potius attestatur crassa intestina in eo affici, quàm tenuia; in tenuibus enim materia succosa, & coctioni, & distributioni, & alimoniæ apta, in cuius gratiam hæc condita sunt, continetur: at in crasis materia verè stercorosa coadunatur, in hisque alui feces speciem primū, & nomē habet; si quidem ab alimentis, dum per tenuia intestina ferebātur, sueta puriori, & vtiliori substantia, horum residuum sunt feces.

*Ileos an sicuti  
fit in tenuiori-  
bus intestinis,  
ita etiam fieri  
possit in cras-  
sis.*

fæces, quæ hoc nomen assumunt, cum ad crassum intestinū  
 peruenerint. huic sententiæ adstipulatur Gal. lib. 3. de facul.  
 natur. Cap. 13. vbi docebat in Ileo stercus à loco infra Ileon  
 intestinum existente, quod erit crassum, ascendere ad par-  
 tes superiores, & hinc vomitum causare, per hæc verba. Quā-  
 quam nisi pertransito tum tenui intestino toto, tum ieiuno,  
 tum pyloro, ventriculoq; ac gula omninò nequeat per il-  
 lius os eijci tale vllum excrementum. crassa etiam intestina  
 pati in Ileo, locus dolens significare potest, in his autem vt  
 plurimum dolor est ad præcordia, vt plures testantur, &  
 præcipuè Hippocrates lib. de Morb. 3. quod idem asserit  
 in historia mulieris Iliacæ lib. 3. Epid. dum dicebat, præcor-  
 dia dolebant. circa præcordia autem est colon intestinum.  
 quod per caua iecoris permeat. folliculum bilis attingēs, fun-  
 dūq; ventriculi adhærens lieni in sinistro hypochondrio ac-  
 cūbit, hincq; ad renes deurgēs eos cōtangit. quapropter ad  
 omnia præcordia insternitur. quod intestinis tenuioribus nō  
 ē datū, vnde sumi potest, intestina crassa affecta fuisse. Quod  
 idē mihi persuadent verba illa Hippocratis, & infra secundū  
 ventriculū tormina perpetua; per secundū. n. ventriculū intel-  
 ligo intestina tenuia, cū crassa nōnulli, vt habet Gal. lib. 4. de  
 vsu partiū ca. 18. & Oribasius in collect. Med. ca. 19. lib. 24.  
 inferiorem ventrem nuncupent; quare primus ventriculus  
 erit ille, in quo deuoratum alimentum statim ingeritur, in  
 chylumque mutatur. Secundus tenuia erunt intestina ad  
 distributionem, & cōctionem eiusdem parata. Tertius  
 & inferior, erunt crassa ad excipiendas fæces formata. Qua-  
 re per ea verba, infra secundum ventrem, innuit Hippocra-  
 tes tormina, & dolorum exacerbationes fuisse in intestinis  
 crassis. Hanc sententiam acceptauit Alexander Trallianus  
 lib. 19. vbi agens de dolore colico ab inflammatione geni-  
 to, & reprehendens eos, qui à principio pharmacum exhi-  
 bent, dicebat in his exacerbari, adeo ex pharmaco inflam-  
 mationem, vt a gri in Ileum morbum incidant; nō enim (su-  
 biunge-



*Ileos in crassis intestinis factus an sit deterior eo, qui in tenuibus est.*

biungebat) aliud est Ileos, quàm colici affectus intensio, ac incrementum; cum autem in colico dolore crassa intestina afficiantur; etiàm in Ileo eadem affecta erunt. Galenus etiàm in commento historiæ mulieris voluolosæ non negat fieri Ileum ex affectione intestinorum crassiorum. immo supponens fieri & in tenuibus, & in crassis intestinis, adinuicè eà comparans, censet eum, qui in crassis sit intestinis, illo, qui in tenuibus generatur, hac ratione dereriores esse, quia hic contagio afficit & iecur, & lienem. hocq; facile facere potest; quoniam, vt dixi, utrunq; hoc mēbrum contangit colon intestinum crassum, quod tenuibus nō est datum, indeq; nō ità facile membra hæc in consensum trahere possunt, & hic locus Galeni animaduertatur, quoniam à multis perperam, & in contrario sensu intelligitur. Cum autem subiungit Galenus. Qui stercus si vomat (aduertitur etiàm hoc fieri) clarissimum sit signum tibi esse subtilia intestina affecta: si intelligit semper hoc euenire ipsis intestinis tenuioribus primariò affectis, ex prædictis indicetur, an sibi cōstet, & rectè senserit. si autem intelligat in vomitu stercoris semper affecta esse tenuiora intestina vel primariò, vel secundariò tracta in cōsensum ab inferioribus intestinis, experientiæ, & veritati, & sibi ipsi cōsonus erit. Vidimus enim nos Iliacos, qui laborantes hoc morbo propter facces obstruentes ultra vigesimam secundam diem tantum enomuerunt facces. quod fieri nō potuisset, si hæc affectio fuisset in tenuibus, quoniam tenuia non possunt tantam stercoris copiam continere per tot dies, & citius trahunt ventriculum in cōsensum, vnde fiunt postea vomitus cibi, potus, & aliarum rerum assumptarum. verum cum talis affectio fuerit ob retentionem faccum in crassis, potuit tardari vomitus per tantum temporis, cum crassa intestina magnam habeant capacitatem, & multam possint continere materiam, quibus etiàm ad maiorem capacitatem coniunguntur tenuia, quæ simul per aliquod temporis spatium aliqualem materiæ copiam cōtinere possunt.

cuius

cuius ratione potest his vomitus per tantum temporis pro-  
trahi, quod fieri non potuisset, si in tenuioribus fuisset affe-  
ctio. Quare si aliquando in Ileo, vt communis omnium est  
sententia, intestina tenuia sunt affecta, non est, quod crassa  
etiam aliquando non afficiantur. Et si Galenus hoc in 6.  
Aphor. & 6. de loc. affect. semper tribuit intestinis tenui-  
bus, hoc non ex propria, sed antiquorum medicorum sen-  
tentia, & opinione, vt optimè consideranti patere potest,  
affirmauit, quam postea lib. 3. Epid. sect. 2. comm. 7. non  
acceptauit, clarè asserens, Ileum etiam in crassis fieri intesti-  
nis: cui etiam opinioni vltra ea, quæ nos vidimus, & notau-  
imus, ad stipulatur historia à Ioanne Fernelio, quem ætas no-  
stra, & venerari, & admirari debet, enarrata de eo, cui inte-  
stina ex copia pituitæ obstrueta Ileon, & omnimodam fecu  
retentionem induxerunt: hoc enim secto, inuentum est co-  
lon ipsum, non intestina tenuia, hac materia oppletum, &  
obstructum. Quapropter concludo in Ileo posse & tenuia,  
& crassa intestina affici, præcipueq; ex tenuioribus intesti-  
num Ileum, ex crassis colon voluulum causare assero. Qui-  
bus autem signis adinuicem hi duo affectus distinguantur, do-  
cet Galenus loco citato, dicens, hoc ex vomitionum affi-  
duitate, & vehementia, & quod potum continere non po-  
sunt, sed reddant, discerni. nam vbi intestina tenuia affi-  
ciuntur, vomitus crebriores, & vehementiores sunt, & po-  
tum continere non possunt. quoniam ab his facillimè ven-  
triculus in consensum traducitur, citoq; materia ad locum  
affectum permeat. quem pertingens, & molestantis violento  
motu præter naturam concitato à virtute expultrice sta-  
tim ad partes superiores retruditur. cum autem crassa inte-  
stina magis à ventriculo distent, longiori q; ductu assumpta  
ad locum affectum permeare, & ab eo remeare debeant,  
hinc vomitus in his nec sunt ita assidui, & frequētes, nec ita  
vehementes sunt, & potum aliquo modo cōtinere possunt.  
Cum autem addit Galenus adhuc magis ex eo, quod nihil

*Signa distin-  
guentia illū in  
crassis intestinis  
ab eo, qui est  
in tenuibus.*

*Ilei ratioe abo-  
lita virtutis  
curatio.*

per aluum deijcitur, animaduertatur, quod affectis intesti-  
nis superioribus infra locum affectum solent subsidere fa-  
eces, quæ in principio morbi spontè educi possunt, & si non  
spontè, arte saltem. at affectis crassioribus, parum quid su-  
best, & interiora magis cum loco affecto consentiunt. vnde  
quò ad excretionem alui consequitur hoc; quod affectis  
crassioribus intestinis, omnibus excrementis citius, & vali-  
dius, quàm affectis tenuibus, via præcluditur, in hisq; Ileis  
minus aluus, quàm in cæteris, deijcit. his habitis curatione  
aggredior. Si curandus proponatur. Ileos ratione virtutis  
expultricis abolitæ ex intemperie frigida genitus, hic indi-  
catur, ut omni ingenio calefaciamus, excretionemq; excre-  
mentorū retentorum prouocemus. quod licet difficile sit,  
cum hæc affectio sit tanquam intestinorum paralytis, tamè  
si citò, & rectè pertractetur, poterit Medicus sanationem  
sperare. Calefacimus dupliciter vel per interius assumpta,  
vel per exterius applicata. per exterius hoc tentabimus  
cum inunctionibus ex oleo anethino, camomelino, rutaceo,  
laurino, costino, de piperibus, de castoreo, & similibus, cum  
fomentis factis in vino ex floribus camomeli, anethi, ex her-  
bis, & seminibus odoratis, ex baccis lauri addita galanga,  
zedoaria, aristolochia, pyrethro, & huiusmodi, cum bal-  
neis ex prædictis, & similibus decoctionibus paratis, vel ex  
oleo calido, in quibus patiens infundatur, cum emplastris  
ex herbis, radicibus, seminibus, oleis, & pinguedinibus ca-  
lidioribus confectis, additis aromatibus: & si hæc non suffi-  
ciant, cum sinapi puatibus, & dropacibus, quos maximè  
in tali casu commendo. & præcipuè, ubi his admixta fuerint  
piper, sulfur, pyrethrum, & similia, in ea tamen modera-  
tione, qua cutis non exuratur; & tale medicamenti genus  
tolerare possit. Interius exhibeantur ea, quæ vel per os  
assumuntur, vel per inferius infunduntur, & imponuntur; per  
os exhibeantur vina generosa, aromata, species ex his para-  
te, confectiones magnæ, aqua ardēs vitæ dicta, vel simplex,  
vel

vel in aqua aliqua admixta, seu infusa fuerint, castoreū, olea calidiora, & præcipuè aromatica, si ea ventriculus ferre possit. his omnibus addo, vt præcipuum remedium, vel decoctionem, vel infusionem in vino potenti factam, vel aquam in duplici vase paratam ex radicibus Rafani, quæ optimè potest calefacere, & penetrare. per inferius imponantur suppositoria notabilis longitudinis ex melle, addita galanga, castoreo, nigella, & similibus parata. Infundantur etiam clisteria, quæ componantur ex decoctionibus herbarum, florum, seminum calidiorum vnà cum oleis calefacientibus, quæ sola aliquando infundi possunt, admixto vel diaphinicone, vel Benedicta, vel aliquo eiusdem ordinis medicamento, quod simul possit educere, & calefacere, & hæc sæpius iterentur: quibus peractis, & pro maiori parte administratis, poterit medicus aliquod medicamentum soluens exhibere ad tentandam excrémentorum alui euacuationem; quod, antequam calefaciat, non ita tutum est propinare. Ad quam eandem intentionem exhibeat etiā Medicus aquas thermales calidas, quæ sulfureæ, & salis sunt. his enim non tantum intestina calefacere, sed & expurgare potest, & non tantum in potu conueniunt, sed etiam infusa maximè prodesse valent. quod cum ratio me docuerit, dum plurima antea incassum administrata forent, in nonnullis vsus sum Iliacis felici cum successu aqua nostri Balnei diui Christophori, ex qua pristinam sanitatem recuperarunt, dum eisdem per potum exhibita, & per sedem infusa fuisset. Vbi autem fuerit Ileos ex interclutione intestinorum, si ex scyrro, cancro, vel consimili tumore euenerit, non recipit curationem; quoniā res eò ducta est ex his, vt ars medica nihil polleat. hi enim affectus, dum ad omnimodam occlusionem intestinorum deueniunt, vel ex se curationem non admittunt, vel si admitterent, hoc diuturno tempore esset peragendū. at morbus hic celeri indiget medicatione. Si verò ex inflammatione intestinorum fuerit Ileos, hic habemus morbum magnū,

*Ilei ex scyrro, cancro, & simili tumore curatio.*

*dei ex Infla-  
matione cu-  
ratio.*

& acutissimum, quare stantibus viribus statim secunda est interna brachij dextri vena, sanguisq; copiosè pro ratione habitus, temperaturæ, & cæli status educatur; repetaturq; venæ sectio, si morbus vrgeat. hoc facto statim ad remittendam inflammationem deueniendum est. quare adhibeatur repellentia, refrigerantia, & quæ mitigare possunt. vnde inunctiones ex oleo rosato completo fiât continuè in eo infusus pannis, & adhibitis: vel applicetur lana succida vîno adstringenti, & debiliori, præcipuè autem nigro, ac oleo rosaceo imbuta, quibus etiam parum quid aceti addi potest. formentur etiam emplastra ex plantagine, solatrio, endiua, portulaca, & similibus costis, quibus comustis, earundem succi, & oleum rosaceum, & ouorum recentium lutea cruda admisceantur: aut mala cidonia in posca dilutione cocta, oleoq; mellino, vel rosaceo cômixta applicentur. his tepidioribus vtimur, quoniam inflammatio calidiora nô tolerat, frigida autem actu intestina lædunt, nisi fuerit inflatio erysipelatis particeps. quo casu omnia subfrigida apponantur in principio morbi. In augmento autè addantur nonnulla, quæ aliquâ vim discussoriâ, & lenientem habent. vnde inunctionibus addatur oleû camomelinû, emplastris, semina lini, fenugræci, & camomelû ipsum, & farina fabarû, Vnde remedium Alexandri maximè prodesse potest, quod recipit cera vncias quinq;, olei camomelini vncias duas, & semis farine fabaceæ, olei rosacci singulorum vncias duas, & semis, lutea ouorum quinq;, aut sex mucilaginis semini lini, quod satis est ad formandum emplastrum; hoc ita paratur. Oua, & farina lenigantur, atq; tunc ceratum refrigeratum iniicitur, & omnia adinuicem subiguntur, quousque mixta omnia adinuicem fuerint, & in vnam formam coissè videantur. hoc potuit inflammationem remittere, aliquantisper discutere, & simul lenire. Interim per sedem in morbi principio infundantur clysmata ex cremore ptisanæ, oleo rosaceo, succo plantaginis, luteis ouorum recentium, & si milibus

milibus admixtis . quibus in progressu addatur oleum camomelinum, succus seminum lini, camomelæ decoctum, fenugraci, & huiusmodi, hæc q; sæpius reperiuntur tum ad remittendam inflammationem in intestinis existentem, tum ad tentandam excrementorum euacuationem, & hoc præcipue, ubi inflammata erant intestina inferiora. quo casu clisteria, & suppositoria acria damnanda sunt, quoniam augere inflammationē possunt. Quod si non admodum acria fuerint, inflammationis intestinis superioribus, & maximè in progressu morbi ad excludenda excremēta in inferioribus intestinis cōtenta, cōuenire possunt. Victus in his sit tenuis, & refrigerans, quare sola ptisana contenti sint, tum vt victu refrigeranti agamus, tum etiam ne copia alimenti, & excrementorum inde gignendorum grauetur, & exasperetur inflammatio, cui admisceri nōnunquam poterit pauca quantitas vini granatorum. abstineant à vino, & ab omnibus calefacientibus, præcipue autem pharmaca soluentia, quorum vsum nō nulli in tali casu admittunt, omnia vitanda sunt, dum inflammatio viget. Ultra enim, quod locum exasperare possunt pharmaca, & per eundemmet materias peccantes educant (quæ duo mala in omni inflammatione vitanda sunt) hoc admonet Alexander in cura doloris colici ex inflammatione non esse agendum, quod idem præmonuerat Hippocrates lib. 4. reg. acut. tex. 22. in quacunq; inflammatione cauendum esse: & licet sint yrgētia ratione retentionis excrementorum pondere, & acrimonia partem læsam irritantium, tamen maius nocūmentum ex violenta inflammatione à pharmaco illata succedet, quàm iuuamentum ex irritatione eiusdem pharmaci, quod incassum renitente inflammatione tentabitur. quod tamen eadem declinante commendo; cum eo tempore & excrementa excludere, & inflammationem aliquo modo soluere possit, tuncq; omnia exteriora discutientia, lenientia tamen sint, & clisteria acriuscula imponantur; persusionesq; , & infusiones, & infusus in decoctis, quæ



eiusdem inflammationis resolutionem præstare possint, ad-  
ministrantur; victusq; tunc augeatur, & vinum debile, & re-  
quæ exhibeatur. Fiant, dum viget morbus, omnia reuulsio-  
num genera ad reuocandam materiam ab internis partibus,  
sicuti frictions, ligaturæ dolorosæ, cucurbitulæ scarifica-  
tæ, & non scarificatæ artubus, non autem abdomini (vt nō-  
nulli malè sensere, quoniam hinc artrahitur materia ad læ-  
sum membrum) applicatæ. balnea ex rebus potentialiter re-  
frigerantibus, admixtis nonnullis discutientibus, actualiter  
autem calidis, ad partes extremas fiant, & huiusmodi om-  
nia, quæ à membro læso materiam traducere, & remoue-  
re queant. Quoniam autem hiæ dolores aliquando sunt ve-  
hementissimi, si eā, quæ exterius applicantur, non prode-  
runt, aliqua dolorem lenientia conuenient, sicuti nonnulla  
leuiter stupefacientia, quale erit lac seminum papaueris al-  
bi, diacodion; & ad summum philonium, quod, vbi vires  
languidæ forent, non admittatur; quoniam in periculum ex-  
tinctionis caloris innati deducens egrotantem mortem ac-  
celeraret. Hæc autem curandi ratio integrè in omni intesti-  
norum inflammatione seruetur, præterquā vbi venenū hu-  
ius causa extiterit, quo casu venæ sectio omittatur, medica-  
mentisq; exterius applicandis nonnulla, quæ vim veneno  
aduersantem habeant, adimisceantur. interius autem alexi-  
pharmaca, & ea, quæ venenosam qualitatem propulsare, ac  
superare valeant, exhibeantur. Vbi verò contusio (sicuti ex  
prolapsione intestini in scrotum succedere consuevit) fue-  
rit inflammationis causa, ceteris integrè seruatis, hoc adda-  
tur, quod in remedijs localibus semper nonnulla lenientia,  
& aliquantulum concoquentia commisceantur. Si autem Ileos  
ex duro stercore intestina obstruente genitus sit, in hoc ster-  
cus emollire, & humectare debemus, vt postea medicamē-  
tis excrementa excludentibus cedere possit; vnde exterius  
perfusiones, irrigationes, fomenta, cataplasmata, infusus,  
balnea ex rebus emollientibus parabimus, inter quæ præ-  
cipuum

*Ilei ex duro  
stercore cura-  
tio.*

cipuum habeat locum olei balneū, ita ab omnibus antiquis celebratum. Interius conueniunt iura pingua, oleum dulce, oleum amigdarum dulcium, butirum, mucilagines altheę, maluarum, feminum lini, fenugraeci; ex quibus istudē clisteria primò ad emolliendum parentur, quibus adhibitis postea succedant acia, & fēces dissoluentia, & euacuantia, in quorū cathalogo iterum numerabo ea, quæ ex aquis naturalibus parantur; quoniam ex his ego præcipuum vidi semper iuuamentum, impositisq; clisteribus, sicuti & non impositis, semper foueatur sedes per spōgias calidas aliquo ex prædictis liquore prius imbutas, postea quoquo pacto expressas. Quod si his non cedat morbus, propono remedium Hippocratis ab eo enarratum, & lib. 3. de Morbis, & lib. de passionibus, seu affectionibus inscripto. hoc sit foliis, per quem ad intra sedem immissum adeò insistentur intestina, vt a stercore ea disparentur. quo facto, statim iubet imponēdū esse clistere ad dissoluendas, & excludendas fēces, si mulq; spongia sedem obturandam, & ægrum in balneo locandū esse. hanc eandem curandi rationem admittit Alexander in cura doloris colici ex stercoreis duri obstructione, vbi non adsit inflammatio, quam tamen ego nec expertus sum, nec alios expertos fuisse audiui, præter Amatū Lusitanum, qui, si ei credendum est, semel hanc curandi rationem, felici cum successu vsus est. hoc autem ego proposuisse volui, vt remedia antiqua considerentur, siq; placeant, in vsum reuocentur. Cum verò Ileos a pituita crassa, & viscida, obstruente intestina, curandus erit, in hoc calefacere, attenuare, incidere, abstergere, & ad excretionem materiam proritare debemus. quapropter veniant in hunc vsum, quæ iam dicta sunt in Ileo ab intemperie frigida. Sed præcipue hic laudo Rasani decoctum, vel infusionem, vel aquam. laudo vinum potens, in quo aromata, & herbe incidentes, & attenuantes vel ebullierint, vel infusæ steterint. præcipue autem commendō vsum vini potentis, admixta aqua ardenti,

*Folis per sedē immisissus ad inflanda intestina in ileo à duro stercore.*

*Ilei à pituita curatio.*

& melle rosaceo, quod si hæc non sufficiant, exhibeantur medicamenta magna, quæ pituitam dissiccare, & attenuare possint, sicuti oleum vitrioli Romani optime parati ad drachmam semis cum vino generoso, quale est Cretense, exhibitum, vel ex eis compositionibus (quæ Elyxir vitæ ab his modernis nuncupantur) drachma una cum eodem vini genere imperetur. Clisteria sint calefacientia, & eiusdem ordinis, qualia subscripta pharmaca, quibus admisceatur in decoctionibus faciedis pulpa colochytidis, agaricus, centaureum minus, & cætera omnia, quæ pituitam calefacere, & trahere possunt, sicuti Benedicta, & Diaphanicon. laudo autem præcipue in hoc casu elysma ex vino poteri, cui prædicta pharmaca incotta, vel admixta fuerint, addita aqua ardenti ad uncias duas, vel parum plus. Et in hoc contineantur etiam irrigationes, iniectiones, & balnea ex rebus calefacientibus, & discutientibus, & emollientibus, inter quæ se per summopere extollendum venit balneum olei. Quibus factis, ex iisdemq; tentata materię præparatione, si natura sponte obstructionem euacuando non tollat, deueniendum est ad pharmacum soluens, materiam peccantem respiciens, hocq; sit validum; quoniam leuia à propria operatione vi obstructionis frustrarentur. Quod idem animaduerto agendum esse in Ilco ex duro stercore intestina ocludente genito; ubi enim emollita fuerint feces, parataq; ad excretionem, si clisteria non sufficiant, medicamentum validum exhibeatur, quod simul feces excludere, & obstructionem intestina liberare poterit. In hoc ultimo Ilco victus sit attenuans, & parvus, & bibant & grotantes vinum potens; clarum, & subfilium partium.

*De Adstrictione Ventriculi. Cap. XII.*

*Adstrictio ventriculi.*

*Lib. 9. cap. 13.*

**A**ffectus ventriculi plures sunt, a quibus diuersimode affliguntur egrotantes, de quibus omnibus scribentes satis cumulatè agunt, vno excepto, cuius solus meminit

Actius

**Aetius**, qui est ventriculi adstrictio: quæ adstrictio licet non sit perinde exitialis, ac ij affectus, de quibus iam egimus: tamē quia molesta est hæc affectio, sæpè solet accidere, & inducere Medicos in maximas hæsitaciones; ideo quid sit hæc ventriculi adstrictio, & quæ ei debeat curatio, exponam.

Cum ventriculus laborat in coctione, necessariò plurimæ fiunt euaporationes. quòd si contingat ventriculum tū quò ad meatum superiorem, tum quò ad inferiorem ita adstrictum esse, vt nec flatus, nec vapores ad extra possint erumpere, nihilq; extra corpus ob cutis adstrictionem, vel exsiccationem euaporare queat, tunc fit accessio horum vaporum, incalescuntq; hi adeò, vt vniuersum corpus aestuet, præcipuè autem pedù, & manuum extremitates, vnde frigiditatem quaerunt, & facies rubescit, pulsus mutatur in densitates; & vt, vniò verbo rem expediam, præbent sensum febris, multiq; , qui hæc affectionem vel non animaduerunt, vel ignorant, patientes febricitate suspicantur. hæc affectio vt plurimum gignitur in aridis naturis, & condensatam carnē habentibus, soletq; sæpè conualescentibus accidere; quia in his solet esse exsiccatio cutis, vnde nihil potest euaporare: hoc Medici sæpè affirmant ratione iccoris fieri: quod tamen non semper est asserendum, cum, vt iam dictū est, hoc etiam fiat ratione ventriculi superius enarrato modo affecti, quæ affectio, celebrata coctione, & descendēte cibo per semultories solet quiescere, causa huius affectionis primò est imbecillitas ventriculi, secundo est adstrictio cutis: ventriculus debilis facit plurimas euaporationes, cutis autem nihil admittit exhalare; vnde detinentur spiritus, qui deinde accenduntur, & prædicta symptomata inducunt.

His positis clare patet, quid à medico agendum sit pro curatione huius affectus: nam cum huius duæ sint causæ, scilicet ventriculi imbecillitas, & cutis adstrictio, non existente in hoc morbo vrgentia, causis attendendum est. qua de re debemus remouere ventriculi imbecillitatem, quæ vt plurimum

*Causa.**Indicationes.**Curatio.*

mum fit ratione intemperiei frigidaë . præterea est laxanda,  
 & humectanda cutis: roborato ventriculo paucissimæ fient  
 vaporations, laxata autem, & humectata cutis genitas va-  
 porationes admittere, easq; facile discutere poterit. Pro  
 tollenda intemperie ventriculi frigida agenda esse, omnes  
 scribentes docent: pro laxanda autem, & humectanda cuti  
 præstantissimum erit balneum aquæ dulcis . ad idem faciēt  
 frictions mediocres, inunctiones ex oleo camomelino, vel  
 ex oleo amigdalorum dulcium. victus non sit excremento-  
 sus, nec ex edulijis difficilis coctionis, nec plurimus vnica vi-  
 ce exhibeatur, nè ab eo vlla ex occasione grauetur, & inde  
 laboret ventriculus. potus sit mediocris tum quò ad quanti-  
 tatem, tum quò ad vini generositatem . hæc est vera huius  
 affectus curatio, quæ satis distat à cura Aetij. Aetius enim,  
 quasi in hoc affectu sit magna vrgentia, attendit symptoma-  
 ti, non causæ: vndè in principio affectionis & constrictioni-  
 bus, & ligaturis, & frictionibus, & compressionibus par-  
 tium extremarum tentat retractionem, caloris ad exte-  
 riora, vt calor naturalis non agens in nutrimentum nō faciat  
 tantas euaporationes. ante augmentum autem, habita to-  
 tius corporis cura, tentat carnem mollem, & humectā red-  
 dere, ad hocq; vtitur frictione olei cum vitro: quod reme-  
 dium apud me suspectum est, cum nitrum oleo mixtum ex  
 siccationem, non humectationem inducat. Vigore autem  
 præterito, & inclinante morbo, iubet infundi manus, & pe-  
 des in aqua, ad hoc, vt vaporations ad cutim discutiantur.  
 quo tempore laudat etiam balneum ante cibum, pluribusq;  
 iuuamentum hoc præstitisse testatur. quæ tota curatio, licet  
 conferre possit, tamen cum in hoc morbo non tanta sit vr-  
 gentia, vt medicum à recta curandi ratione distrahere de-  
 beat, dimittatur, causisq; incumbendo vera methodo affe-  
 ctus hic tollatur.

Curatio Aetij.

## De Cholera sicca. Cap. XIII.

**C**holera est duplex, altera humida, cuius curationem satis diffusè omnes scribes docent, altera sicca, de qua tantum Hippocrates lib. 4. reg. acut. à 104. tex. vsque ad 109. In vtrisque est expulsio materierum per superiora, & per inferiora. sed in humida educuntur humores, & liquidi succi: at in sicca nihil humidi expellitur, sed tantum spiritus flatuosus acris tum per ventriculum, tum per intestina excernitur. illa est acuta, & periculosissima affectio; hæc autem, licet non ita discriminis sit plena, ramen molestissima est, & valdè ægrotantes angit. vndè, sicuti illa nequaquam est ignoranda à medico, similiter & hæc non est negligenda. quæ de re proposita essentia, causis, & signis, huius curationem etiam explicabo. Arida cholera est affectio genita à spiritu flatuoso acri, qui & per superiora, & per inferiora excernitur, quiq; cum sit acris, & partes internas, in quibus genitus est, mordet, & eas, per quas in educatione pertranlit, exasperat, & affligit. Vndè sequitur, quòd in hoc affectu vèter propter spiritum inflatur, & quòd partes propè ventrem nervosæ, sicuti latera, & lumbi, ob acrimoniam mordeantur, à flatuq; illo contento, ex quo aliquando discurrente fit strepitus, intendantur, hincq; dolorem patiantur. quòd idem in excretionem huius spiritus flatuosi, & acris euenit. nam extramissus & partes inferiores mordet, ac exasperat, & superiores, cū præcipuè os ventriculi sit valde sensitiuū, admodū ob eius acrimoniam affligit. quæ de re & si retinetur, siue educatur hic spiritus, valdè molestus est, in hacq; affectione alius nihil liquidi deijcit, cū retineatur materia, à qua illi spiritus acres eleuantur, sed adstringitur. quapropter concludens dico, Aridā, seu siccam choleram esse effectum, in quo inflato ventre, & obstrepente cum dolore laterum, & lumborum, nihilq; aluo deijciente, excernitur per superiora, & per inferiora spiritus acris admodum molestus.

*Cholera duplex, & earū differentia.*

*Cholera sicca quid sit, & eius causa.*

Huius



*Acris spiritus  
genesi in  
cholera causa*

Huius spiritus acris causa, quærenda est, quoniam hoc habito, causas siccæ cholore habebimus. Acres vapores, & spiritus in corpore humano duplici de causa generantur. scilicet vel ratione ventriculi, vel ratione assumptorū. ratione ventriculi fuit, cum ventriculus cibaria, licet in his non sit peccatū, corrumpit, & ita corrumpit, ut ea conuertat in acerrimos vapores, quod non alia sit ex causa, quam propter eiusdem igneum calorem. quare igneus calor ventriculi erit altera causa cholerae siccæ. ratione autem assumptorum sunt hi acres spiritus, cum in alimentū sumuntur cibaria acris, & flatuosa, seu quæ nidorulentam, & fumosam habent qualitatem, qui nidor in materia semiusta, & acris fundatur, sicuti sunt cæpe, raphanus comestilis, & cæteræ radices acriores, crucea, caro nimium tosta, & assata, oua, & cætera in sartagine nimium frixa, & cætera, quæ consimilis sunt qualitatis. hæc autem ingesta, ubi corrumpuntur, acerrimos procreant vapores, & sunt in causa cholerae siccæ. causis habitis, ad signa deueniendum. Signa præsentis cholerae de se patent, consideratis his, quæ pro eius essentia explicanda superius declarata sunt. signa autem differentiarum à causis (quoniam considerandum est, an sit vitio vel ventriculi, vel assumptorum) habebimus, si percunctabimur, quali victus genere usus sit egrotas. si enim optimo usus est, iudicabimus hoc factum esse ratione ventriculi, in quo igneus vigeat calor. si autem cibaria praua assumpserit, ratione assumptorum coniectare poterimus factam esse choleram: quod si ambæ concurrent causæ, utrarumque etiam indicia aderunt. his præmissis curatione aggredior. In hac cholera, quæ contristat, sunt flatus, & vapores acres; ergo his incumbere debemus, ut affectionem hanc remoueamus: quæ remouebitur, si hi flatus vel educantur, vel temperentur, quod præcipue fiet educa, vel temperata materia, à qua hi vapores eleuantur. temperabimus autem, si vel contemperantia adhibeamus, vel materiam, unde generantur hi vapores, concoquamus, vel si eandem temperare, & concoque

re non possumus,educamus: quare primò debemus tentare, an hi status, & hæc materia possit retundi, & temperari: quod si non detur, ipsam debemus euacuare. Hoc non erit difficile Medico perficere, cum in hac cholera non sit nec *Prognosticū.* acuteis, nec discriminē illud, quod est in humida, & cum facile sit hos status, & has materias vel contemperare, vel à corpore educere, vbi recta methodo agatur, & non ea communi ratione, qua vtuntur vulgares Medici, qui in omni genere status semper eadem remedia calidiora administrare consueverunt. recta autē agat ratione Medicus, si ea, quæ docet Hippocrates pro curatione huius affectus, attendat. hic autē & pro disculsione, & retusione, & educatione tū statū, tū materierū acrium ita plura præcipiēdo procedit. Primò, *Curatio secū-* quoniā supponit materiam in intestinis contineri, parumq; *dū Hipp.* eius existere in ventriculo, prohibet vomitum, & præcipuè cum materia peccans sit materia arida, & quæ faciliè nō educitur per vomitum, & quæ, si educeretur, in transitu maximè mordere os ventriculi posset. Secundò iubet subduci ventrem oleo plurimò calido, & pingui. hinc duorum aliorum habebimus; nam vel retundetur, & lenietur morsus, & acrimonia, vel subducetur materia, & status peccans. Tertiò ordinat Hippocrates balneum, & perfusionem olei, & aquę dulcis: quod facit ad concoctionem, & contemperantiam, & disculsionem vaporum acrium. Quartò imperat somnum, & dormiendum esse: quod maximè conferre poterit ad coctionem concentrato calore, & præcipuè cum somnus omnibus cruditatibus maximo esse remedio consueuerit. Quintò vinum tunc antiquum, & meracius exhibendum esse, proponit. quod vinum, & ad disculsionem statuum, & ad materiæ coctionem facere poterit. Sextò præcipit perseuerante affectione, propinandum esse oleum per os: quod cum supponat dulce esse, & pingue, facit ad siccitatem emendandam, ad acrium retusionē, & ad alui subductionem. Septimò, vt coctio facilius procuretur, iubet abstinere

abstinendum esse à cibo, & ab omni motu, nam cum coctio nem desideramus, cruda non sunt superingerenda. quiescereq; debemus, cum quies, si quid aliud, ad coctionem faciat. Vltimò alijs non conferentibus euacuandam esse materiam peccantem docet, & ad hoc exhibet lac asinæ, quod omnibus cæteris medicamentis in casu isto præfert; quoniam ex lacte maiorem, quàm ex prædictis, acrium temperantiam sperat, cum hoc, quod simul & euacuet, & refrigeret, hacq; via, & propolis auxilijs credit Hippocrates choleram siccam curari, & tolli posse. In qua arida cholera nonnunquam corruptio materierum acrium talis est, ut febrem accendat; & tunc fit febris diaria ex cruditate nido rosa. quam febrem curare docet Galenus lib. 8. Methodi cap. 5. in quo loco ponit curationem febris ex ea cruditate, in qua cibi in nidorulentam qualitatem conuertuntur. Vbi distinguit, quòd fit hæc febris ex tali cruditate, vel fluente aluo, vel non. posita primò cura quando fluit, secundò declarat; quomodo sit curanda ea, in qua non fluit aluus. qui est casus præsentis cholere sicca. Vnde ait primò considerandum esse, an cibus in gracile intestinum, vel in colon descenderit. quòd habebitur ex pertractatis præcordijs, & ventre, & interrogato ægro, in qua parte morsum, vel gravitatem sentiat, & quos habeat ructus. Si in intestina tenuia tantum descendisse deprehendatur alimentum, iubet diatrion piperion exhibendum esse, & præcordia, ventremq; perfundendum esse, quæ perfusio, & tempore diuturnior, & quantitate copiosior semper esse debet in his, in quibus alimentum corruptum est in superioribus, quàm in his, in quibus est in inferioribus intestinis. Ad quæ inferiora intestina si descendisse deprehendatur hæc materia corrupta, educenda erit vel glande supposita, vel clistere levi injecto, hac habita distinctione; quòd ratione morsus, mirigantia, ratione flatuum discrucientia infundantur; si neutrum adsit, simplici & molli clysmate agatur. Vacuata aluo, monet statim nutriendum

*Febris diaria  
ex cruditate ni  
dorosa, qui est  
casus cholera  
sicca, curatio  
secundum Ga  
lenum.*

trahendum ægrum cibo contemperanti, & leui, sicuti pisana; alica; testiculis pullorum gallinaceorum, piscibus saxatilibus albo iure paratis, & similibus. quibus peraëctis, si planè desijt febris, balneum concedit: quòd si ea in totum non quiescat, sed quid febrile remanserit, etiam vsque ad secundam, & tertiam diem eodè genere victus vti præcipit. post quas similiter, cessante omninò febre, balneum admittit, & hæc est curandi ratio à Galeno tradita, quæ non multum distat ab ea, quam proposuerat Hippocrates. Verùm quoniam ex vtriusq; credo ego perfectam aridæ cholæræ curatio nem haberi posse, vt res integra habeatur, nonnullaq; discrimina tollantur, rem ad actum practicum deducens, ita ego curationem explicabo. In casu isto intentio est contristantium euacuatio. quæ contristant, sunt flatus, & vapores acres, qui eleuantur à materia consimili corrupta, & genita vel ratione assumptorum, vel ratione ventriculi; quorū euacuatio si haberi non possit, saltem per contemperantia eorum morsus, & acrimonia retundatur; quare pro his intentionibus imponatur primò (supposito quòd materia ad inferiora extra ventriculum descenderit) clystere ex puro oleo admodum dulci, vel ex oleo seminum lini, vel ex camomelino, in quibus pro retundenda acrimonia aliquid pinguedinis anserinæ, vel pullinæ liquare possumus. quòd si magis flatus extensione, & multitudine, quàm acrimonia, infestent, in his oleis concoquantur semina odorata, & alia, quæ possunt flatus discutere, vel ex eisdem decoctiones parentur, quibus pro clysmate addantur olea, & pinguedines prædictæ. Inungatur etiam, & profundatur ventriculus, ac præcordia, & maximè vbi hæc affectio ratione assumptorum contigerit, oleo nardino, spicato, de absinthio, mastichino, & similibus. quòd si non ratione assumptorum, sed ventriculi vitio hoc factum sit, inungatis ventriculum, & prædictas partes oleo mellino, vel rosaceo completo. quòd si adsit incendium, in ventriculoq; plurimum abundet

*Cholera sicca  
curatio absoluta.*

abundet ignei caloris, possumus eum perfundere ômphacio, quod à Galeno lib. 4. de simpl. med. fac. cap. 3. & cap. 12. ad æstuantia hypochondria celebratur. possumus etiam ad idem parare emplastra ex pulpa thamarindorum, velle carne citoniorum, additis rosis rubeis, sandasis, hypochistide, ænanthe, balauistijs, farinaq; hordei, quæ omnia misceantur, & impinguentur oleo mellino, & rosaceo: quod si his actis, dolor, & morsus perscueret, cogitandû est de remedio, quod simul possit euacuare, & temperare; tale poterit esse oleum dulcissimum eorum ab Hippocrate lib. 4. reg. acut. propositum, & à Galeno lib. 2. de simpl. med. fac. cap. 13. celebratum, ad cuius conformitatem oleum amigdalarum dulcium maximè probatur, & consimiliter oleum seminum lini recens, quod valentius omnibus potest & euacuare, & discutere flatus. Quo oleo exhibitò, si non cedat affectio, flatusq; abundant, ex Hippocrate ad discussionem, & coctionem vinum tenue, antiquum, & merum; ex Galeno autem diatrion piperion exhibebimus, hocque intelligatur, nisi summum adsit incendium; & hæc est mens Galeni, qui semper æstuantem ventriculo, & præcordijs, ut docet in curatione cruditatis nidorosa, in qua fluit alius, calida abhorrens ad refrigerantia recurrit. quare non est, quod in hoc reprehendatur ab Alexandro, sicuti & in perfusione ventriculi; quoniam vbi sit ventriculi intemperies calida, in eoq; igneus abundet calor, refrigerantia administranda esse iubet: at vbi hoc non adsit, sed facta fuerit corruptio ista ratione assumptorû, calida exterius, & interius, tum ad discursionem, tum ad coctionem procurandam conueniunt. cuius ratione etiam Hippocrates merum imperat, quod, vbi adesset incendium, omnino cauendum esset. His non conferentibus, pharmaco hæc materia educenda erit. ad quam intentionem exhibet Hippocrates lac asininû, quod simul potest temperare & euacuare. sed cum nos non habeamus in vû tale medicamenti genus, si in vsum idem reuocare

*Diatrion piperion an conueniat in febre diaria ex cruditate nidorosa.*

Care non volumus, aliquid simile exhibeamus, quod vnâ euacuet, & acrimoniam vaporum retundere possit; cuiusce modi erit Calsia, quæ in simili casu mihi maximè probatur: verùm ne ex hac lædatur ventriculus, flatu suè exacerben- tur, admiscerem parum hyeræ, & ad leniendas simul vias adderem nonnihil succi liquiritiæ. Vacuato autem corpore, nullaq; præsentè febrili accessione, si non quiesceret in totum affectio hæc, balneum valde probarem, & inunctio- nem totius corporis, per quæ contemperantiam acrium va- porum, & vnâ digestionem sperarem. Interim victu con- temperante vtantur, sicuti ptisana, lacte, chondro, ouis sor- bilibus, testiculis pullorum, piscibus saxatilibus, & quæ hu- iusce sunt ordinis. Vinum à principio vitent, quod postea conuenit in declinatione, & virgentibus flatibus, vbi non sit incendium. quiescant ab omni motu. somnum quærant, & omnia acria, frixa, assata, & nidorosa fugiant.

*De ea lotij suppressione, in qua non descendit vrina  
in vesica. Cap. XI III.*

**S**Upprimitur duplici ratione lotium, aliàs plena, aliàs va-  
cua existente vesica. cum plena est, appellatur hic affe-  
ctus à Græcis proprio nomine Ischuria. cuius causas, & cu-  
rationes diffusissimè omnes scribentes explicarunt. cum au-  
tem est vacua, suppressio quidem est dicenda, non tamen  
Ischuria, cum in hac vesica non sit affecta. cuius suppressio-  
nis tractationem omnes ferè authores intactam relique-  
runt, paucissimi autem vix attigerunt, quæ tamen affectio  
à medico nequaquã negligenda, nec ignoranda est, cū hinc  
plurima mala symptomata, & sæpenuerò mors ineluti-  
biliter succedere consueuerit. Hanc ego explicaturus, &  
eius causas primò exponam, deinceps harum causarum si-  
gnis enarratis, ad curationē descendam. Suppressio hæc vel  
vicio pororum vriturum, vel renum, vel venarum emulgen-  
tium causari potest. Ratione pororum vriturum hoc contin-

*Suppressionis  
lotij causa.*

*Suppressionis  
lotij rōe poro-  
rum cause.*

V git



git ipsis vel conuiuentibus, vel obstructis. conuiuent propter aliquam collectionem in ipsis factam, sicuti vel propter inflammationem, vel scyrrum, vel quempiam similem tumorem. obstruuntur autem vel à calculo, vel à sanguinis grumo, vel à crassiori pure, vel à viscida, & crassa pituita.

*Suppressionis  
lotij ratione re  
num causa.*

Ratione renum hoc euenit, vel deperdita renum actione cuius meritò à venis emulgentibus attrahere non possunt. quod erit ratione intemperiei ipsorum renum validæ, quæ intemperies solet esse frigida. ab hac præcipuè enim oēs virtutes labefactantur, & deperduntur vel ipsis obstructis. obstruuntur autem potissimum à calculo in ventriculis earum existente, vel à copia arenularum mixtarum cum mucosa, & viscida pituita. Ratione venarum emulgentium hoc contin-

*Suppressiones  
lotij rõe vena  
rum emulgentiū  
causa.*

gere ut plurimum consuevit, cum obstruuntur; obstruuntur autem præcipuè à pituita crassiori, & viscida, ac tenaci. credo etiam posse obstrui à pure crasso, quemadmodum & ab eodem sepe obstruitur vesicæ collum, hoc tamen ita frequenter apparet. possumus etiam imaginari ipsis conuiuentibus ob aliquam collectionem hunc eundem affectum gigni posse: tamen cum non ita experimento hoc compertum sit, non ita hoc pro confesso assero. cuiuscemodi certè affirmo hoc sepe contingere obstructionis eorum merito.

*Signa rõe po  
rorum vritiæ.*

Hæc de causis, signa hæc erunt. Si suppressio fiat conuiuentibus meatibus vrinarijs ob inflammationem, vel aliquam aliam similem phlegmonosam dispositionem, aderit dolor in partibus illis. qui dolor causatur quidem principaliter ab affectu ipso, sed exacerbatur etiam ab acrimonia vrinæ eò permeantibus. & si patiens lotium habuerit calidius, & acrius, dolores erunt ex eiusdem locij acrimonia, locos inflammatos mordicante sauiore. aderit & febris simul, & cum his erit grauitas circa lumborum, & renum regionem, his lotio, quod permeare ad partes non potest interiores, repletis existentibus. hicq; affectus solet ut plurimum habere causas præcedentes, & citò generatur. si autem hoc fuerit ratione scyrris

præcessit

præcessit alter affectus in partibus illis, à quo potuit succedere scyrus ille: vel si ex materia eò collabente, & collecta factus est, paulatim generatus erit; nec dolor, aut febris eum concomitabitur; superueniet tamen & grauitas in renum regione, & circa lumbos ob retentum, & grauans in illis locis lotium. Si autem hi meatus obstructi fuerint, si à calculo, calculi aderunt propria signa, & dolor aderit sæuis firmus, & hoc maximè, vbi calculi non leuès, sed asperi existant vnà cum grauitate prædictarum partium: nec in hoc ratione affectus vlla aderit febris, quæ tamen ratione exacerbationis dolorum, alteratis spiritibus, ac humoribus ipsis, sæpe in his casibus succedere solet. Si à sanguinis grumo, lotium omnino præcessit sanguinolentum, hocque factum erit vel ratione casus, vel longè, seu valide equitationis, ac agitationis, vel percussione, vel vulneris: aut his non præexistētibus, ratione vel plenitudinis, vel acrimoniæ, vel tenuitatis, & superflue caliditatis sanguinis aperientis superiora vasa. Si à pure, præcessit abscessus vel in renibus, vel in hepate, vel in alijs partibus superioribus, quo disrupto, lotiū purulentum apparuit, fluente autem crassiori, facta est obstructio. Si à pituita crassa, & viscida, non est dolor in parte læsa, non adest febris, apparent inditia abundantis pituitæ, & cōfēstīm facta est ista suppressio, quam semper concomitatur grauitas in renibus, & lumbis. Si verò fuerit hæc suppressio vitio renum, vbi earum actio fuerit deperdita, apparebunt signa intemperie frigidæ ipsorum renum, quæ per plures dies (nam intemperies subito introduci non potest) præcessit, cuius signa erunt, vrinæ albedo præcedens, paucitas desiderij Veneris, languiditas earum partium, læsio à refrigerantibus; & infrigidantium forsan præcessit occasio, sicuti aquæ frigidæ potus, eiusdem balneum, infrigidantia his partibus intempestiue, & sine ratione adhibita, & quæ huius sunt qualitatē, & similia, & ab hac causa non affatim, nec subito supprimitur lotium; quoniam intemperies subi-

*Signa ratione  
renum.*

to introduci non potest, sed paulatim aucta. est in causa, vt paulatim etiam earum actio deperdatur, cuius merito fit, vt lotium continuè in quantitate imminuatur, non validè attrahentibus à venis, & vasibus lotium deferentibus renibus ipsis. cum autem ad summum peruenierit, tunc omninò deperdità actione, nihil attrahitur, & inde serosa sanguinis pars supra renes ipsos retinetur. Vbi autem fuerint obstru-  
 ti renes. si à calculo, signa calculi præcessere, & in his est sensus gravitatis, nullus tamen est dolor. dum enim lapides in uentriculis renum continentur, nec indè exturbantur, nullum inferunt, vt experientia compertum est, dolorè. Si autè ab arenosa, & mucosa materia simul mixta fiat hic affectus, earumdem præcessere inditia, & aderit gravitas notabilis, & aliqui succedent dolores, conuersa aliquàdo in flatu portione materie viscida, & mucosè, sed dolores hi non erunt nec graues, nec sæui, nec continui. Si fiat autè suppressio ratione venarum emulgentium, vbi fuerit ab ob-  
 struptione. Si à pituita, obstructio hæc confestim est facta. ad sunt signa abundantis pituitæ, nullus est dolor, nec vlla adest gravitas in renibus. & hæc est signum peculiare, & certissimum, quòd retineatur sanguinis serositas supra renes. Vbi enim vel ratione renum, vel pororum vriturum fiat confestim hæc suppressio, semper circa renes, & lumbos est gravitas; cum autem vitio venarum emulgentium hoc contigerit, nullus gravitatis sensus, nec minimus quidè apparet. Quod idem verificatur, si a pure obstruantur. cuius eadem aderunt signa, quæ in signis obstructionis pororum vriturum à pure factæ relata sunt. si autem conniueant propter aliquem tumorem, quòd experimento non ita liquet, aderunt, excepta gravitate renum, eadem signa, quæ dicta sunt in suppressione ex conniuentia pororum vriturum causata. His omnibus autem commune est, vt utraque vasa, scilicet & dextera, & sinistra pariter afficiantur. Vbi enim altera pars illæsa esset, nunquam lotium in totum retineretur,

*Signa ratione  
venarum emul-  
gentium.*

tur, altera fungente munere suo, per quod ad vesicam descendere urina posset. Vbi autem urina ad vesicam non descendat, rationeque prædictarum causarum retineatur, Medicus omni utatur diligentia, sollicitusque admodum sit in remouenda causa. hinc enim celeri indigent ægrotantes auxilio; quoniam si per plures dies retineatur lotium, inuitabiliter pereunt. & hoc quoniam retenta illa serositate ad intra venas, & commixta sanguini, totalis humorum moles putrescit, & febres continuas, & prauas generat. hunc autem terminum ego obseruavi, ut, si ante septimam mingant, saluentur. si ultra, licet deinceps remoueatur causa, & lotium prouocetur, tamen accensa febre. vtpotimum postea eos perijisse, animaduerti: quare non negligat hoc symptoma Medicus, licet nec vlllo dolore, nec vlla molestia hinc aliquando affligantur patientes, sed sit sollicitus, & sagax, omniq; industria vtēs, citò, & quamprimum vocatus fuerit, causis intendens, urinae retentionem hac describenda methodo inhibeat. Si fuerit suppressio ratione conuenientia pororum vriturum ob aliquam phlegmonosam dispositionem, lenitè a luo per cassiam, quæ præcipuè in vsum veniat in affectibus membrorum urinae deferuentium, statim secetur vena. sanguinis quantitas sit pro ratione habitus, & plenitudinis, postea loci patientes inungantur oleis refrigerantibus, & laxantibus, quale præcipuè est violaceum, & iisdem sæpius perfundantur. epithimentur etiam ex aquis refrigerantibus, addita portiuncula aceti ad penetrationem, & quibusdam speciebus eadem facultate donatis, quales sunt illæ, quæ parantur pro vnguento sandalino. possunt formari emplastra ex herbis eiusdem facultatis, sicuti endiuiæ, sonco, plantagine, solatro, lactuca, semperuiuo, & huiuscemodi, additis earundem succis, & farinis cõsimilibus, quæ impinguentur oleis prædictis. & nisi ex his cedat inflammatio, laudo, ut etiam secentur, his præmissis, venæ inferiores. vitetur interim omnia diuretica, & præcipuè in morbi principio: quorum ta-

*Prognostica*

*Curatio ratio  
ne pororū vriturum.*

men postea erit vsus, lenita inflammatione, & ex diureticis  
 assumantur ea, quæ humiditate addita, & frigida existentia  
 possunt & demulcere, & prouocare lotium, qualia erunt  
 semina communia, sæpiusq; infundantur clysmata refrigerā  
 tia, & lenientia vel ex prāsana, vel ex lacte, vel ex decocto  
 herbarum refrigerantium, quibus earundē succi, olea refri  
 gerantia, & quæ huiusce sunt facultatis, commisceantur; mi  
 tescente autem inflammatione, admisceantur refrigeranti  
 bus aliqua leniter discutientia, & laxantia, sicuti inunctioni  
 oleum camomelinū, & oleum de scorpionibus. epithema  
 tri aquæ aliqua leniter calefacientes; additis speciebus diar  
 rhodon, quæ minus, quā prædictæ, refrigerare possunt, & spi  
 ca, & squinato, & similibus: emplastro autem flores camo  
 meli, farina seminum lini, & quæ huiusce sunt classis; in de  
 clinatione autem sint purè discutientia. Reuulsiones conti  
 nuæ interim fiant ad corporis extremas partes cum frictio  
 nibus, ligaturis, cucurbitulis scarificatis, & non scarificatis:  
 quæ nunq; circa patientes locos applicentur, nisi in manife  
 sta inflammationis declinatione, quo tempore supra locum  
 affectum appositæ affectum ipsum discutiendo multum pro  
 desse poterunt. Victus sit eius qualitatis, qua in internis in  
 flāmationibus indigemus. Si autē conuiueant ratione scyrrī,  
 purgādo corpus, emollientibus agendum erit, & curatione  
 scyrrī tractādi sunt, cuius tamen, si vnquam fiat, sanatio erit  
 impossibilis, cum vrgentia excernendi lotij valdè instet, in  
 duriasq; non sit datura, scyrrī autem curatio sit admodum  
 longa. in qua tamen ad laxandum non prætermittatur bal  
 neum olei dulcis. Si autem hi meatus à calculo fuerint ob  
 structi, hic veniant in vsu omnia, quæ ad curationem calculi  
 à scriptoribus referuntur, præcipuè autem laxantia admi  
 nistrentur, quale est olei dulcis balneum, vel ex decoctioni  
 bus herbarum idem præstantium præparatum. Si autē hoc  
 sit vitio grumorum, firmetur sanguis, & ea, quæ grumos  
 dissoluere apta sunt, administrentur. Si verò hoc sit factū à  
 pure

pure crassiori, abstergentia exhibeantur vnà cum incidenti-  
 bus, exterius autem laxantia administrentur. Si hoc fuerit  
 factum à pituita viscida, & crassa, hic assumantur ea, quæ di-  
 cam agenda esse in obstructione venarum emulgentium ab  
 eadem materia genita. At cum causabitur hæc suppressio  
 ex deperdita renum actione, hic earum frigida intemperies  
 tollenda erit, quam difficillimum erit remouere; quoniam ad  
 hunc gradum producta est tanquam intemperies in habitu  
 redacta. Hæc autem præcipuè clysteribus ex calefacienti-  
 bus medicamentis paratis erit remouenda, ad quam eandem  
 intentionem exhiberi possunt aromata, pulueres ex his pa-  
 ratæ, species compositæ, confectiones aromaticæ, & etiam  
 aliquando confectiones magnæ. quibus semper admiscean-  
 tur nonnulla, quæ hæc medicamenta ad vias lotij deducere  
 queant. exterius autem administrentur epithemata, inunctio-  
 nes, linimenta, & emplastra calefacientia; & vbi res vrgeat,  
 etiam ad sinapismata, & dropaces ascenderem. in his enim  
 omnia tentanda sunt, quoniam hic est casus paralyti consi-  
 milis. Vbi autem vel à calculo, vel ab arenis sint obstructi  
 renes, in hunc casum, & curatio calculi, & hærenularum tra-  
 ducatur, querendo simul harum partium laxationem, & ex-  
 hibendo ea, quæ renes mundificare, abstergere, & exob-  
 struere, & ad expulsionem proritare possunt. inter quæ pro  
 tollenda horum renum obstructione non dimittantur planta-  
 ginis radices, nec eius semina, quæ ad hoc efficaciora sunt;  
 sicuti & asparagus, & præonia, & alia huiusce qualitatis.  
 Cum verò ratione venarum emulgentium non descenderit  
 lotium ad partes inferiores, nec serosa sanguinis pars ad re-  
 nes attrahatur ex earum impedimento, & lésione; si fuerit  
 ratione coniuentia harum venarum, fiant ea, quæ dicta  
 sunt in coniuentia pororū vriturū. Si verò fuerit ratio-  
 ne obstructionis, vbi hoc contigerit à materia frigida, & cras-  
 sa obstruere, statim, nihil contra indicante, exhibeatur medi-  
 camentum, quod pituitam purgare queat; quo exhibito,

*Curatio ratio-  
 ne renum.*

*Curatio ratio-  
 ne venarum  
 emulgentium.*



& minorata materia, statim accedat Medicus ad ea, quae valide incidere possunt. quorum licet plurima sit sylva, tamen non omnia haec, cum quibuscumque ex antiquorum monumentis patere possint, recensere, sed tantum ea, quae mihi, & usu, & experientia comprobata sunt. Haec autem erunt ista, iubeo ego aquas stillaticias, ut subtiliorum partium sit medicamentum, per Balneum Mariae factas parari, quae quinquies, & sexcies super easdem feces distillentur, & ultima vice adeo violenter educantur, ut feces, quantum fieri poterit, siccatae remaneant. fecum habeo usum aliquando in pulvere, sed aquam in potu exhibeo cum felicissimo successu. in hunc usum assumo. parietariam, oronide, asparagum, solatrum, alchencheri, adiantum, celenium, pulgium, rutam, & alia similia; & si timeam haec debilia esse, ascendo ad aquam Rafani eodem modo paratam, a qua nonquam frustratus sum, spe concepta, si cito, & continue administraretur. In huius defectu, necessitate urgente, veniant in usum cantharides integrae ad granum vnum, vel ad summum duo, exhibita una cum scrupulo vno seminum dauci Eretrici, & scrupulo dimidio seminis ameos, quod solet esse antidotus propria, & remedium potens ad defendendam vesicam a laesione cantharidum. Et quamvis ex hoc medicamento periclitemur de laedenda vesica, non tamen ab hoc remedio abstinendum erit; cum in casu desperato omnia temere sint agenda, & ea maxime, quae cum ratione administranda veniunt, quales sunt cantharides in casu isto: quae, ut docebat Galenus lib. 4. de simpl. med. facul. cap. 19. commixtae medicamentis urinae cientibus ex veneno transcurrunt in antidoti naturam, ubi parce, & in minima quantitate exhibeantur. Ad idem facere posset ius galli antiqui cum diureticis, & calidioribus, valde tamen incidentibus medicamentis, praeparatum, sed praestantiora sunt praedicta. quae si etiam non proficiant, exhibeatur scrupulus olei ex Calchanto per sublimationem parati, summaque cum ratione confecti: seu aliquo

aliquod generis Elyxir cum vino, vel iure ad eandem quantitatem propinetur. Dum hæc fiunt, optima habeatur victus ratio, quæ sit attenuans, & incidens, abstinendo à potu, quantum fieri poterit, ne ex multo potu plures aggregentur leuositates. interim clysteria ex calefacientibus medicamentis infundantur, & exterius, qualia in deperdita reumactione agenda enumeravi, administrentur. si fiat autem obstructio hic à pure, conuenire poterunt ea, quæ superius inter leuiora exhibenda per os enumeravi. quæ si non conferant, ad vehementiora ascendat Medicus, laxando simul vias, tum per interius infundenda, tum per exterius applicanda, cauendo in hoc semper ab omnibus calidioribus, & acrioribus medicamentis, quoniam hæc potius incrassarēt, quàm attenuarent, & summam habendo loci affecti rationem. Victus autem pro vnaquaq; causarum differentia conueniens, & opportunus imperetur; quoniam absque recta victus ratione medicamenta parum proficere possunt.

*De nigris deiectionibus. Cap. XV.*

**Q**uemadmodum ea, quæ leuiora apparent, discriminis autem plena sunt, Medicus negligere non debet, similiter nec debet ea, quæ aspectu, & fama grauiora videntur, cum tamen periculo vacent, formidare; cuiuscemodi creberrimè euenit ex deiectionibus nigris, quibus apparentibus, ægri, astantesq; pariter à colore illo terrentur, & cōmagis, cum communi omnium sententia ab Hippocrate lib. 4. Aphor. 21. desumpta, Deiectiones nigræ, siue febre præsentite, siue eadem absente eueniant, semper pessimæ sint. Cuius oppositum cum ratio, & experientia me docuerit, in hac re Medicos commonefieri velim, nè semper nigras deiectiones, cum sæpissimè omni periculo vacent, timeant. Vbi enim excretiones istæ in morbis acutis non contingant, materiaq; edueta non sit bilis atra, sed verè melancholicus humor, qui cæ sanguinis sex, quandocunq; eueniunt, omni

*Deiectiones nigre an semper male, et an se per timenda.*

carent

*Delectionū ni  
grarum causa*

catent discrimine, ad bonumq, terminantur, exonerata demum per has à graui materia natura ipsa. Cum enim splen ex propria naturali facultate humorem istum, qui est sanguinis limosa, & fœcalis pars, ad se attrahat, eumq; pro sui nutrimento conficiat, vtaturq; , si contingat vel ex intemperie imbecillum, vel à materia obstructum ipsum lien esse, plurimūq; huius limosæ superfluitatis in sanguine abundet, tunc materia hæc accumulatur circa viscera, in venisq; illis communibus & si abundantior colligitur, etiam in mesenterio, & circa pancreas, quæ totius corporis, veluti altera sentina, sunt, copiosè aggregatur: qui tandem cum grauis admodum naturæ fuerit, vel in ea copia, vt illis vasibus ampliùs contineri nequeat, insurgente virtute expultrice, natura eius excretionem tentat, hincq; deiectiones nigerrimæ, quibus aliquando & simul (sicuti creberrimè fieri animaduerti) connectuntur eiusdem superfluitatis vomitus, ita vt species cholæræ videatur; supra enim, & infra eandem nigram materiam & per vomitum, & per sedem excernunt patientes: quos aliquando vidi ex solo aspectu huius limosæ, & nigræ superfluitatis in maximum incurrisse timorem, indeq; in syncopem incidisse, fereq; exanimatos fuisse, qui tamen in meliorem spem, me commonefaciente, & certè affirmante nihil indè periculi imminere, ducti, non tantum laxatum à timore animum habuere, sed etiam pristinam salutem citò recuperauere. Vbi enim natura totam materiam eiecerit, licet corpus ex euacuatione quoquo pacto languidum reddatur, tamen patientes in meliorem statum, quam fuerint, redacti sunt. Quo tempore nihil aliud Medico agendum erit, quam considerare, vt causis huius affectionis incumbat: nam terminata iam euacuatione animaduertat Medicus, an vitio hepatis, vel alimentorum, huius limosæ, & nigræ superfluitatis copia in sanguine cumuletur; & tunc si vitio hepatis hoc factum fuerit, huic succurrat. si autem alimentorum causa, rectam, & probam im-

*Curatio.*

peret

peret victus rationem, circumspiciatq; cum hæc materia non attrahatur à splene, cuius merito impurus remanet sanguis, an hoc factum sit ex splenis vel imbecillitate, vel obstructione imbecillitatem tollat, intemperiem, quæ imbecillitatis est causa, remouendo: obstructionem autem, vias aperiendo, & materiam præsentem excludendo, consumabitur. Quibus remedijs hæc sint peragenda, non referam, cum à proprijs fontibus hæc desumenda sint. hoc vnum tantum dico, quod, si causæ huius affectus, iam terminata, & perfecta euacuatione, non remoueantur, eiusdè fiet recidiva, per intervallaq; reperet, tandèq; egrotantes vel ad hydropem (ut in nonnullis contigisse vidi). deducet: vel aliquando ita sæuiet hæc materia acredinem ascita, ad naturamq; atræ bilis conuersa, ut vnica euacuatione demum egrotantes de medio tollat, sicuti vidi factum in his, quibus me aduersante vina generosa, aromata, radices, & olera acriora erant in continuo usu. quod si hæc materia acredinem non acquisierit, nec ad naturam atræ bilis vergat, in suoq; naturali statu permansens ad ventericulum repat, per eumq; educi solita sit, deducet pat. etes ad malas ventriculi affectiones, sicuti precipue ad famem caninam, in quam ex tali materia per ventericulum sæpius euacuata, eoq; decumbere solita. nobilem Medicum deductum, & ex ea consumptum fuisse, noui. Hæc dicta sint, ut Medici huius affectus præseruationem nõ negligant, circa cuius curationem non ita laborabunt; quoniã tunc sat erit munire intestina clysteribus lenientibus, ne in transitu ab illa materia offendantur, & vomitum, si aderit, facilitare cum leuioribus, abstinendo ab oximellite, & cæteris omnibus, quæ acetum recipiunt; cauentes, ne ea, quæ ventericulũ roborant, præterquam in casu vrgenti, administrantur, omniũq; adstringentiũ rerũ usum tam exterius, quàm interius vitent. optimam, opportunaq; pro ratione morbi, victus rationem interim ægrotantibus præscribant; certamq; salutem, si errata nulla admiserint, polliceantur.

*Deiectionũ nĩ  
grauĩ nisi tollatur  
causa, fit  
recidiva, &  
morbi graues  
succedunt.*

*De Ischiade à matière biliosa. Cap. XVI.*

*Arthritis quo  
modo fiat.*

*De arthritide  
modernorum  
opinie.*

**A**rthritim fieri à quacunq; materia, quæ transmissa vel ab vniuerso corpore, vel à determinato mēbro per proprias vias in cavitatibus articulorum, & in circumstantibus partibus recipiatur, dogma est Galeni antiquū, ab omnibusq; acceptatum. Contra hanc sententiam insurrexerunt Moderni, discrepantes de materia, de membro mittēte, de vijs, & de loco, in quo hæc materia recipiatur. Materiam vnicam esse, hancq; pituitosam, subtilem, & serosam affirmant: quod si in arthritide quandoq; sit rubor & calor, dicunt hoc fieri ratione doloris attrahentis, sicuti & afferunt febrem huic aliquādo connecti, non ex se, sed quia hæc affectio contingat in temperatura impensè calida, & in corpore pletorico, quod uè ex leui occasione in febrē incidat. Membrum mittens dicunt esse solū caput, in quo extra calnam sub cutē talis aggregatur materia, quæ sensim transmissa ad partes inferiores modò ad hos, modò ad illos dilabatur articulos, negantq; à visceribus, & internis partibus hæc transmitti; quoniam syncerus humor per venas non potest ferri, nec sanguini permixtus potest syncerus in articulos excidere, ad quos si etiam cū sanguine emanaret, phlegmonem, non arthritidem excitaret. Quapropter viam, per quam hæc materia in articulos descendit, dicunt esse sub cutē tantum, vbi laxæ, & amplæ sunt viæ, non autem per venas permeare. in medijsq; earum viarum regionibus dicunt eam non subsistere, quoniam cum sit subtilis, penetrat vsque ad loca densa, & compacta, quibus hæreat, & ided in articulos tantum firmatur. loca autē, in quibus hæc materia retinetur, dicunt non cavitates articulorum esse, sed in ligamenta, in periostea, & in tendones recipi, hoc argumento, quod in tophacea podagra, aperta, rupta uè cū plerunq; è digitorum articulis eruitur humor in tophum conuersus vinculo integro, & illæso, addito hoc, quod si

in Ifchiade, cū ligamenta vel nullius, vel obtusi sint sensus, si in coxendicis pixide, in eiusq; cavitare materia reciperetur, nec tā vehementē, nec tam latē vagantē dolorē inuheret. sententia hæc sicuti Galeno, ita & veritati cōtradicit, nec digna est, vt à Medicis recipiatur. quòd non vnica sit materia, quæ arthritidē generat, apparet clarē ex diuersitate coloris, tumoris, doloris, symptomatum, & modi curandi. color. n. aliàs est rubicundus, aliàs flauus, aliàs albus. tumor aliquando ē notabilis magnitudinis, quādoq; n. vix apparet dolor, quandoq; est molæstus quidem, sed non multum, quandoq; autem est acerrimus. hicq; nonnunquam citò soluitur, ille longius protrahitur. symptomata autem multoties sequuntur mala, vt caliditas ingens, & feruor in loco affecto; aliquādo autem eorundē vel nulla est caliditas, vel frigiditas inest molæsta, illiq; ab aere calidiori, hi à frigidiori læduntur, modus curandi nonnunquam admodum variat, quoniam in his calida iuuant, in illis frigida, illiq; à frigidis, isti à calidis exacerbantur: præterea quidam ex sanguinis, quidam ex pituitæ; alij ex bilis, nonnulli ex atræ bilis euacuatione sedantur, quæ omnia indicāt arthritidis causam modò calidam, modò frigidam, ac diuersam esse materiam. Nec responsum eorum ad hoc facit, cum dicunt hanc diuersitatem causari tum ratione doloris attrahentis, tum ratione subiecti recipientis; quoniam si ex colore, tumore, dolore, symptomatibus, & modo curandi diuerso diuersam materiam peccare non deberemus conijcere, ac iudicare, tota destrueretur medicina, omnesq; tumores pariter à pituita cōstituere possemus; quoniam ruborem, colorem, symptomataq; cætera ratione doloris attrahentis fieri, non autem ratione materiæ peccantis, esset affirmandum. Quòd membrum mittens aliquando sit cerebrum, non negatur: quòd autem semper ab eo in quacunq; arthritide materia defluat, falsum est; aliquando enim à toto, aliquando à determinato membro hæc transmittetur. nec semper præcedunt hunc morbum

*Arthritidis  
an sit vnica  
materia.*

*An in arthritide membrum mittēs sit semper cerebrum.*

capitis



*An in arthriti  
de materia pos  
sit ad articulos  
per uenas trā  
smitti.*

capitis affectiones, hec semper in omnibus materiae sensibi  
lis descensus à partibus superioribus ad inferiora per senti  
tur. immo sēpissimē nullo præexistente capitis, alteriusuē  
superioris partis, affectu subita fit arthritis, quod sēpissimē  
animaduertent, qui hanc artem consumabunt, videbuntq;  
modò hepar, modò lien, modò ventriculum, modo uterū,  
modò aliam internam partem, modò totum corpus; non  
autem semper caput, esse in causa huius affectionis. Nec est,  
quòd mirentur isti, quando per venas à partibus intimis, à  
visceribusq; ipsis in articulos humor aliquando feratur. quo  
niam virtus expultrix, ubi vigeat, à partibus interioribus ad  
exteriores materiam naturæ grauē detrudere solet, ac pō  
tēst. & hæc per propria vasa, per quæ vniuerso corpori ma  
teriæ ingestæ communicantur, quæ sunt venæ, & arteriæ, à  
quibus quomodo possint sanguini cōmixta per eorum ora  
in articulos pura excidere, non aliam querant viam, quā  
eam, quā ipsi proponunt in suo casu, dicentes, venas ab ex  
ternis iugularibus deductas extra caluam sub cute sua ex  
crementa tenuia, & serosa deponere. quod idem cum cæte  
ræ venæ terminantes ad articulos possint vi facultatis ex  
pultricis agere, non erit dubitandum, quo modo extra ve  
nas traduci possit syncerus humor. qui cum eis affirmanti  
bus, possit esse frigidus, nihil refragatur, quòd etiam possit  
esse calidus, qui rarioris suæ tenuitatis facilius frigido in arti  
culos deponi poterit. Nec est, quòd si vnus humor extra ve  
nas transmittatur cum eo, sanguis ei commixtus transmitti  
etiam necessariò debeat, quoniam hoc fit vi facultatis na  
turalis, quæ noxium, & superuacaneū tantum excludit  
humorem. aliàs in quacunque expulsionē omne humoris ge  
nus promiscuē, & vnā commixtum educeretur, nunquamq;  
daretur tumor purus vel à sanguine; vel à bile, vel ab alio  
humore. animaduertatur tamen, quòd cum concedimus syn  
cerū humorē extrā venas in articulos decidere; nō creda  
tur ita syncerū semper esse, vt nullius mixtionē vnquā admit  
tat.

tat. sed dicitur syncerus à prædominio; quoniam vel nihil,  
 vel parum quid ei commixtum est. yndè bili aliquando san-  
 guis commisceri potest, & hinc causare arthritidem. Nec ta-  
 men tunc veram potest causare inflammationem; quoniam  
 intra cavitates, non in substantia membrorum materia reci-  
 pitur. Cuius oppositum cum contingat in cachexia, decum-  
 bentibus per venas in pedes humoribus crudis, est in causa,  
 quòd tumeant quidem pedes, sed non hinc arthritim pati-  
 tur, & præcipuè cum in his non sit articulorum imbecilli-  
 tas, quæ necessariò ad arthritidem procreandam requi-  
 ritur, quare certò assermetur humores à visceribus, inrimisq;  
 partibus ad articulos per venas transmissos, aliquando ar-  
 thritim procreare: quam tamen quandoq; etiam à capite  
 delabi, & per exteriora transmitti asserimus, & attestamur.  
 Cum autem materiam recipi in ligamenta, in periostia, & in  
 tendones docere nituntur, quid ad Galeni rationem; quam  
 consultò tacuerunt; respondere possunt, cum inquit; argu-  
 mentò esse, materià in substantia membrorù non recipi, nec  
 hinc veram inflàmationem causari; quoniam visus est nun-  
 quam podagricus pati convulsionem, quæ frequenter solet  
 in nervorum, ac tendonum inflammationibus advenire hæc  
 Galeni ratio est demonstrativa, nec eam impugnare possunt,  
 quæ in contrarium adducuntur, Videlicet, quòd si in Ischia  
 de materia esset in pixide, & cavitate articuli coxendicis  
 contenta, cum ligamènta obtusi sint sensus, non posset do-  
 lorem nec vehemètem, nec latè diffusum causare; quoniam  
 hæc sententia Galeno non aduersatur, qui docuit materià  
 non tantum in cavitatibus articulorum, sed etiam in cavitati-  
 bus circumstantiù membrorù vsque ad cutim recipi. quia  
 verò articulationes hac materia implentur, ideò circumstan-  
 tia ligamenta, idest, nervi, & tendones extenduntur. cuius  
 extènsionis meritò necessariò dolent. quare docet fieri dolo-  
 rem, nò ratione materiæ intra cavitatē articuli existētis, sed  
 meritò extensionis nervorum, & tendonum circumstantium.

In qua parte  
 articulorù ma-  
 teria recipia-  
 tur in arthriti-  
 de.

In qua parte  
 articulorù ma-  
 teria recipia-  
 tur in arthriti-  
 de.

In ischiade  
 in qua parte  
 articuli recipia-  
 tur materia.

*Lib. 6. Apho.  
59. & 60.*

Vnde in Ischiade verè quidem dolor non causabitur à materia contenta in pixide; quoniam in ea nulla pars sensitiva locata est, sed ab ea materia, quæ circumstantia loca occupans, nervos, & tendones offendit. Quòd autem intra cavitatem articuli coxendicis in Ischiade recipiatur materia (quod negare hi audet) sola Hippocratis autoritas eos monere debebat, dicentis. Quibuscunq; à coxendicium dolore molestatis excidit coxa, & rursus incidit, ijs mucres superueniunt. Qui mucres cum laxiora reddant articulationis ligamenta, facillè articulus ex cavitare excidit: quod fieri non posset, nisi in cavitare illa mucres cōtinerentur, quod idem ex sequenti aphorismo dicente. Quibuscunque à coxiciū dolore molestatis diuturno excidit coxa, ijs crusta scit, & claudicant, si non vrantur, elici potest; quoniam excidere non potest ex coxendico dolore coxa, nisi ratione materia intra cavitatem articuli existētis, eundemq; ultra, quā deceat, madefacientis, cuius meritò adustionem administrandam esse docet. Pro confesso igitur habeatur in Ischiade contineri ad intra pixidem coxendicis materiam, sed nō ab ea causari dolorem, qui solum ab illa, quæ circumstātes partes occupat, nervosq; ac tendones extendit, generatur. hincq; fieri, quòd dolor sit vehemens, & cum ad inferiores partes hi nervi descendant, quòd dolor hic latè, & longè diffundatur. qua de re dolor Ischiadicus nullo modo argumento erit, quòd materia in arthritide non recipiatur in cavitates articulorum, & circumstantium membrorum vsque ad cutim, cuius ratione apparere in tophacea podagra statim aperta cute potest humor in tophum conuersus, & cuelli vinculo integro, & illæso. quoniam non tantum in cavitare interna articuli, sed etiam in circumstantium partium cavitatibus vsque ad cutim recepta materia, & in tophum conuersa potest immediatè sub cute cōtineri, & apparere: quod non excludit materiam in cavitatibus articulorum recipi, nec demonstrat eandem in substantiam penetrare.

trare. Hęc adnotasse volui de arthritide, ne sententia hæc, quam in perniciem laborantium, si admitteretur, inuectam esse dubito, indiscriminatim, & sine examine recipiatur: quare arthritim à quocunque humore in cavitatibus articularum, & in circumstantibus partibus vsque ad cutim recepto verè generari ad mentem Galeni constituo.

Ab hac vniuersali positione analogia sumpta, in eam deueni sententiam, quam etiam in libro de internis affectionibus, in quo habetur coxendicum dolorem quandoq; à bile generari, recipit Hippocrates, vt Ischiadicū affectum non solum ab humore frigido, & à sanguine, quemadmodum in proprijs libris declarat Galenus, eius curationem ex professo tradens, ceteriq; omnes scribentes simul, sed etiam quandoq; à bile fieri censeam, quòd cum me non tantum ratio, & Hippocratis authoritas, sed etiam experientia docuerit (vidi enim aliquando Ischiadas factas à bile acerrima) arbitratus sum huius curationem ab authoribus neglectam fuisse, non quin ab hac fieri possit, sed tanquam eius affectus, qui rarissimè eueniat, cum vt plurimum à pituoso, & crudo humore procreari consueuerit. licèt autem rarò hic eueniat affectus, non debet tamen Medicus eius curationem negligere; quoniam, vt dixi, quæ rarò eueniunt, si rectè pertractentur, præstantem Medicum ostendere possunt. Qua de re Medicus Ischiadicum curaturus dolorè, optimè animaduertat hæc, quæ possunt eum manuducere in cognitionem peccantis materiei, sicuti qualitatem doloris, tempus exacerbationum, prægressam dietam, exercitia, habitum corporis, temperamentum, ætatè, regionem, anni tempus, applicationem remediorum, excrementorum vel abundantiam, vel retentionem, morbos patièti assuetos, & omnia alia, quæ huiusce sunt ordinis; quæ omnia possunt speciem materiæ peccantis attestari: verum quoniam nos tantum loquuturi sumus de Ischiade à materia calidiori, & biliosa; idè huius tantum signa ponemus, quibus positis, ad curationem descē-

*Ischiadicus af-  
fectus à bile  
genitus.*

*Ischiadis à bi-  
le signa.*

demus. In tali Ischiade dolor erit acerrimus, & similis punitiuo, exacerbationes erunt sæuiores alternis diebus, victus ad calidum, & siccum vrgens præcessit, exercitia fuere valida, habitus ut plurimum erit gracilis, temperaturæ erit biliosæ, ætas iuuenilis ad hoc plurimum faciet, sicuti & regio calida, tempus anni æstiuum, dolor à calefacientibus exacerbatur, quod maximè me manuduxit in cognitionem huius affectus, in tali patiente solèt abundare biliosi humores, vel iidem, qui excerni consueuerant, retenti sunt, solitusq; est pati morbos à bile, quæ in hoc morbo magis qualitate, quam quantitate lædit, facilè irascitur, excandescentiæq; animi facilè incurrit. His ductus Medicus in cognitionem materiæ biliosæ audacter curam aggrediatur; quoniam morbus hic non ità difficulter, si rectè curetur, soluitur, ut ille, à pituita. Quare statim dimissis purè repellentibus, quæ in coxendicum dolore non conueniunt; quoniam, cum pars affecta in profundo sita sit, sanguis, & humores ex vicinis & ambientibus vasis, ac musculis ad illam à repellentibus medicamentis compellerentur, debet tentare, ut materiam à loco affecto educat, causamq; fluxionis inhibeat, & si dolores exacerbentur, lenientibus agat. Vndè primò ad totius corporis euacuationem descendat. Quare lenita aluo Cassia, vel Thamarindis, vel alio simili pharmaco, ubi contra indicantia non æquipolleant, stante totius & hepatis, cuius ratione generetur bilis, intemperie calida, secetur vena. Vena autem sit interna, seruata rectitudine loci patientis, ubi sit plenitudo, quod si hæc non adsit, secetur vel poplitis, vel tali vena postea materia his, quæ bilem respiciant, & temperare possunt, concoquatur. hæc concocta euacuanda erit pharmaco, quod bilem ducat, in quem usum plurima venire possunt, tamè cum materia è longinquis partibus euocanda sit, ea assumatur, quæ in substantia solida formantur; cuiuscemodi sunt pillulæ aureæ: quæ, quoniam plurimum recipiunt scammonii, in hoc casu prodesse valent. repetaturq; hæc euacuatio,

quoniam

*Curatio.*

quoniam vnica vice affectus tolli non poterit, qui tamen ex repetita euacuatione maximè sedabitur; mirum enim est, quoniam in talibus affectibus conferant bilis euacuationes, ex quibus maximè leniri solet dolor, qui si aliquando exacerbetur, inungatur locus affectus, perfundaturq; oleo rosaceo, cui admixtum sit dimidium olei camomelini. possunt etiam formari emplastra ex lactuca, solatro, endiuia, farina ordei cocta in posca, quibus olea prædicta ad impingundum admisceantur. Infundantur etiam clisteria, quæ simul lenire, & refrigerare possunt, cuiuscumodi sunt formata ex decoctione radicum althææ, scirpini lini, foliorum maluarum, violarum, hordei, quibus addatur oleum violatum, saccarum rubeum, lutea ouorum, & cassia pro clysteribus parata, aliquando loco prædictæ decoctionis assumatur lae recens. & si indicium sit, bilem acrioriem esse, possunt etiam admisceri succi endiuia, lactucæ, portulacæ. & similiū herbarum, in quo casu etiam maximè probarem balneum, & aerem balnei tum ad temperamentum, tum ad discussionem: quod si dolor vehemens admodum esset, hincq; valde angerentur, & cruciarentur patientes, si prædictis non leniatur, applicentur tum exterius tum interius aliqua leuiter stupefacientia, quæ in hoc casu, stante & materia, & intemperie calidiori, poterūt maximè, nullam inferendo noxam, conferre. His peractis, & ijs administratis, quibus superetur morbus, si quid residui remanserit, vel inunctionibus, vel fomentis, vel emplastris leniter discutientibus agatur, semper in hoc casu cauendo ab omnibus acrioribus, & calidioribus medicamentis, à quibus aliquando vidi adeò exacerbatos hos agrotantes, vt miseri hinc claudicantes, & ad motum impotentes redacti maximè cruciarentur doloribus, quæ omnia deinceps lenientibus, contemperantibus, & refrigerantibus administratis remedijs lenita fuere. ad quæ intentionem faciunt etiam plurimum frictiones in parte opposita adhibita, sicuti & cætera deriuationum, & reuulsio-



num genera, Interim patientes victu utantur refrigerantijs, & contemperante. Vnde pitisana maximè probanda est, lactuca similiter, & omnia cicoracea, ceteraq; olera refrigerantia, quæ non tantùm veniant in vſu pro cibo, ſed etiam ut cum his alterentur iura, & carnes aſſumentes, quæ ſint elixatæ, non toſtæ, ſintq; ex pullis domeſticis, ex hædis, ex vitulis, & ſimilibus aniinantibus, non autem ex ſylueſtribus, & quæ durioris ſunt ſubſtantia; caueant omnia aromata, radiccs, herbas acriores, fugiant mel, & omnia, quæ ex eo parantur. Vinum in totum interdicitur uſque ad perfectam morbi declinationem. Motus ſit lenis, ſomni ſint longi, & degant in locis temperatis, omnem acris exceſſum vitantes, iramq; & omnem animi excaſcentiam fugiant, aluum lubricam, ſi non ſponte, arte ſaltem habeant. ſique hi præſeruari ab hoc eodem morbo deſiderant, inhibeatur bilis generatio, quæ refrigerato iecore tollitur. Vnde ad hoc balnea naturalia refrigerantia, cuiuſcemodi ſunt. S. Marini, Lucenſes, & ſimilia, imperanda ſunt; quòd ſi hæc non admittant, ſerum caprinum, vel lac, præcipuè aſininum, in emaciatis, & gracilibus corporibus optimè conferre poterit, multaq; alia cõſimilia tentanda erunt, quorum plurima eſt ſylua in locis illis, in quibus de intemperie calidiori hepatis tractatur.

*De Iſchiade, & Arthritide à ſiccitate. Cap. XVII.*

**Q**uemadmodum in libro de paſſionibus, ſeu de affectionibus internis Hippocrates coxendicum dolorem generari à bile aſſirmauit, ibidem pariter eundem dolorem à ſiccitate articuli procreari teſtatur eſt. cuius cauſa nec Galenus, nec alius poſt eum author uſquam meninit, dum Iſchiadis vel cognitionem, vel curationem tractarent. per ſiccitatem autem non intelligas intemperiem ſiccã partium ſolidarum articulum ipſum conſtituentium, videlicet, oſſium, ligamentorum, & tendinum, ſed conſumptionem

*Iſchias, & arthritidis à ſiccitate.*

eius glutinosæ humiditatis, qua naturaliter nutritur, & ad faciliorem motum subungitur articulus ipse. talem humorem continuè natura articulis subministrat, nè exsiccati ad motum inepti reddantur. Cum autem contigerit humiditatem hanc aliqua ex causa, quæcunq; ea extiterit, exsiccari, tunc articuli motus impeditur, difficultasq; in motu, ac dolor vnà succedit. huiuscemodi affectum, si in coxæ articulo fiat, vocat libro citato Hippocrates Ischiadem, coxendicumue dolorē, perinde ac vocet eos, qui à fluente generantur materia. quem eundem affectum ego non in solo coxæ, sed in quocunq; alio articulo gigni posse animaduerti, hincq; fieri alteram arthritidis differentiam notaui, si per arthritidem omnem articulorum dolorem, ac impeditum motum intellexerimus: consumpta enim ea humiditate, quæ ex naturæ præscripto articulos subungit, & humectat, coguntur, ac in vnum compinguntur articuli: vnde ad motum inepti, ac impotentes redacti dolore ex quocunque leuissimo motu cruciantur. Tales articulorum dolores in constitutionibus ficcioribus Hippocrates lib. 3. Apho. 16. fieri monebat: quoniam, vt docebat Galenus in eiusdem aphorismi commentatione, immodicæ aeris siccitates articulorum humiditatē consumentes, eos ad motum difficiles, ac impotentes reddunt, doloremq; hinc nonnunquam inuehunt. An autem tales affectus verè sub nomine arthritidis comprehendantur, visus est negasse ibidem Galenus, cum tamen rem indeterminatam reliquerit: qui cum de nominibus parum sollicitus fuerit, ideò hanc partem, quæ circa nomen arthritidis, & nõ circa eius essentiam versatur, neglexit. Si autem nos per arthritidem morbum in articulis à materia fluente factum intellexerimus, tales dolores, ac articulorum impedimenta sub nomine arthritidis non erunt recensendi. Si verò omnem articulorum impeditum motum, ac dolorem per arthritidem audiamus, hi proculdubio arthritidis nomine vocandi erunt. Quam sententiam Hippocratis libro citato

*Arthritis à  
siccitate an de  
bit.*

de affectionibus internis clarè admisit ; pariter coxendiciū  
dolorem hunc, ac eum, qui à materia articulos occupante  
causatur, appellans . Qui dolor à sola humiditatis natura-  
lis articulorum consumptione, non à sicca partium solidarum,  
ut iam dictum est, ipsum articulum constituentium in-  
temperie pendet; quoniam quodcumq; illa naturalis hu-  
miditas abundauerit, præstetq; sit, non adeò insigniter ex-  
siccari poterunt partes articuli solidiores, ut hinc impedi-  
tus motus, aut dolor succedere queat: deficiente tamē hac  
humiditate, ac supra modum exsiccata, nonnunquam etiam  
communicatur hæc exsiccatio partibus ipsis solidis; & hoc  
potissimum cum à causa externa, & valida ortum ea habue-  
rit. hincq; supramodum exsiccatis circa articulum tendoni-  
bus, & partibus nervosis, in hac affectione consueverunt ali-  
quando, ut notauit Hippocrates, succedere conuulsiones;  
quas aliquando sequuntur & febres, quæ ratione doloris,  
& cruciatus accenduntur. Hæc de nomine, & essentia hu-  
ius affectus, nunc causas recenseo. Quæcumq; humiditatē  
articulorum naturalem resiccare, & consumere apta sunt,  
ea omnia talem coxendicum dolorem, talem uē arthritidē  
causare poterunt. Vnde & diuturnum, ac vehemens exerci-  
tium sub sole factum, ut habet Hippocrates libro de affectio-  
nibus internis, & siccitates aeris immodicæ, ut habetur lib.  
3. Aphor. 16. possunt esse eorundem causæ. pariter. & vi-  
ctus exsiccans hoc idem causare poterit, quoniam hinc con-  
sumptis humiditatibus internis, etiam illæ, quæ ad articulos  
naturaliter desluere solent, multoties consumuntur. cu-  
ius ratione, ut recitat Hippocrates, qui in Aeno legumi-  
nibus (quoniā talis victus est exsiccās) vescebantur, infirma  
habebant crura. & qui orobos (quoniam hi leguminibus sic-  
ciores sunt) comedebant, genuū dolores patiebantur. Quod  
idem & longæ, ac diuturnæ egritudines, quæ corpus exsic-  
care aptæ sint, agere poterunt: unde videmus aliquando con-  
ualescenres, qui ex huiusmodi morbis liberati fuere, malè  
ince-

*Causa.*

*Lib. 6. Epid.  
sect. 4. tex. 13  
Lib. 2. Epid.  
sect. 4. de ve-  
nis.*

incedere, ad omnemq; motum ineptos esse: qui, si etiam cō-  
guntur deambulare, non leuem articulorum persentiunt  
dolorem, qui, deficiente ipsorum articulorum naturali hu-  
more, succedere consuevit. Harum omnium causarum si-  
gna de se patent; nam omnes hæ causæ sunt præcedentes,  
quæ vel ex ægrotantis relatione, vel ex sola Medici inspe-  
ctione nullo negotio comprehendi possunt. An autem, sicu-  
ti ab externis, ita ab internis causis possit talis affectio pro-  
creari, si quis quæreretur, dixerim hoc pro possibili admit-  
tendum esse, cum huius humiditatis, pariter ac cuiuscunque  
alterius partis nihil sit, quod exsiccationem impossibilem  
reddat. hoc tamen non ita experimento comprobatum est;  
quare pro huius affectionis cognitione sufficiant ea, quæ de  
exterioribus causis exposuimus. de quibus hoc aduertatur,  
quod ex omnibus molæstior. ea est affectio, quæ à vehemen-  
ti, & diuturna exercitatione sub sole facta, occasionem ha-  
buit. in hac enim dolores sunt multò, quàm in cæteris, sæui-  
ores, ac æstusosi vñ cum caloris sensu existunt, sæpiusq; his  
superueniunt febres, aliquando & conuulsiones. Quare  
quò ad prognosticum hæc erit cæteris difficilior, & periculo-  
sior: reliquæ autem non ita se uæ sunt, & minori cum discri-  
mine affligunt ægrotantes, ac minori cum labore ab his ijdē  
liberantur. Quæ omnes affectiones quomodo præsentēs  
cognoscendæ sunt, superfluum esset enarrare, cū ex sola articulo-  
rū resiccatione, & cōpactione, omni tumore absente, ac ex sola  
inspectione prudenti Medico patere possint. Qui Medicus  
has curaturus affectiones, istas indicationes habebit, scili-  
cet, vt amota omni causa externa, & præcedente, tentet na-  
turalis articulorum humiditatis regenerationem, eorundeq;  
humectationem quærat. Hæc consequetur, si eam viuendi  
rationem ægrotantibus præscribat, quæ & actu, & potentia  
corpus humectare queat, cuius merito regeneratis humidi-  
tatibus naturalibus adsit earum copia, apta ad subungēdos  
articulos ipsos. Talis victus ratio perficitur tum per ea, quæ

*Signa.*

*Arthritis, &  
Ischias à siccita-  
te an possit  
fieri à causa  
interna.*

*Indicationes.*

*Curatio.*

interius sumuntur, tum per ea, quæ exterius administrantur. Interius convenient cibaria humectantia, quæ sint boni clymi, quæq; nec difficulter conficiantur, nec superfluitatibus admodum scateant; talia erunt ova recentia, æs forbilia, iura ex carnibus laudabilibus parata, qualis est pullorum domesticorum, hædorum, vitulorum lactentium, fercula in his parata, carnes eorundem animalium elixatæ, pitisana sola ex frumentaceis, lactis potus, caseus recens, & quæ huiusce sunt classis. & ubi patientem ventriculi robustioris curâ dū habuerimus, extremitates animalium optimè elixatas, vel potius eliquatas nonnunquam exhibere poterimus. Potus sit vinum tenue, album, aquosum, & ad dulcedinem decliue, vel saltem admodum maturitate saturatum. Exterius maximè proficit balneum aquæ dulcis: in quo si coquantur radices althææ, & maluarum, earundemq; semina, capita castratorum, extremitates animalium, & quæ huius sunt ordinis, & facultatis, mirum in modum prædesse poterit. post quod administratum balneum, quamvis æger impotens ad motum existat, tamen modicè deambulet; hocq; singulis agat diebus; ita enim motus facilitabitur, & materia ad propria articulorum loca promptius attrahetur. Dum hæc peraguntur, caueant ægrotantes, ne frigus aliquod patientur. hoc enim articulos valdè lædere poterit, & materiam interceptiendo, & eosdem in vnum cogendo, & rigidos. eos reddendo: quare omnibus exterioribus vel calidis, vel saltem tepidis utantur. Vbiq; à balneo abstinerint, fomenta ex iisdem rebus parata in usum habeant: in quorum administratione hoc animaduertant astantes, ut antequam caro detumescat, vel hominem è balneo educant, vel fomenta removeant, aliàs in his administrandis ex succedente humoris attritione resolutione restauratio deperditæ humiditatis non esset speranda. Possunt ad idem parari emplastra, quæ articulis apposita eos humectare possint, quæ formentur ex axungia suilla recenti, butiro recenti, oleo amigdalæ dulcium, medulla

medulla vitulina, & ceruina; mucilagibus lini; altheę, fę-  
 -dugraci, addita cęta noua (hęc enim antiqua est humidior)  
 -ad pondus omnium prædictorum plusquam dimidium. Si  
 -autem in præfenti affectu sit periculum conuulsionis, ob in-  
 -troducendam ingentem articulorum exsiccationem, vltra bal-  
 -neum, & fomenta, inungantur loca patientia, & eis com-  
 -municantia aliquo oleo actu quidem calido, sed quod nullo  
 -pacto resolutionem notabilę causare valeat, tale erit olei  
 -dulcissimum, narcissinum, mastichinum, camomelinum, lu-  
 -bricatum, amigdalinum, & similia: hęc enim olea poterunt  
 -magis tueri articulos a frigore externo, & tendines, ac cir-  
 -cumsistentes articulorum partes laxando poterunt patientes  
 -a dolore, & inde a conuulsionibus præseruare: quę si instet,  
 -abstineant ægrotantes ab omni genere vini, & bibant mul-  
 -sam dilutam, caueantq; ab omni euacuatione, quoniā hęc  
 -omnes possunt corpus ipsum magis exsiccare. An autem, dū  
 -hęc peraguntur, vel purgandi sint medicamento electiuo  
 -patientes, vt docet Hippocrates, vel si hoc non conferat, cli-  
 -steria acria, qualia ipse imperat, imponenda veniant, propter  
 -senis auctoritatem quis ambigere posset. Attamę ego eius  
 -sum sententię, vt in tanta articulorum exsiccatione omne  
 -euacuationis genus noxium, ac suspectum sit, dictante hoc  
 -ratione; Videlicet, euacuationes omnes, & præcipuę vali-  
 -das non tantum prauas, & non naturales, sed etiam natura-  
 -les humiditates disperdere: quapropter caueant in huiusce-  
 -modi affectionibus Medici ab omni valido medicamento  
 -soluente, nę humiditates ad articulos attrahendas dissipet:  
 -nisi forsan ratione exsiccantis cibi, quali habitantes in Ae-  
 -no ysi erant, hęc affectio inducta fuerit, in his enim potuit  
 -aggregari ex malo victu copia prauorum, & terrestrium hu-  
 -morum, qui exturbadi, & ante articulorum laxationem ex-  
 -cludendi erunt. hoc tamę cautę agatur, semper hac habita ra-  
 -tione, nę in horū humorum deturbatione articuli vterius ex-  
 -siccentur. ad quam intencionem poterunt satis, præter phar-  
 -macū,

*An sint pur-  
 -gandi, & eua-  
 -cuandi arthri-  
 -ci astrictio.*

*in com-  
 -muni  
 -in  
 -in  
 -in*



macum, facere clysteria acria, eos ad vias communes deriuando, ac eisdem ab articulis reuellendo. quo peracto facile erit homines renutrire, & humiditates naturales regenerare, ac articulos ipsos prædictis medicamentis, ac præ narrata victus ratione laxare. Quæ omnia dum fiunt, omnes causæ, quæ talem articulorum siccitatem introducere, vel eandem conseruare possunt, amoueantur. Vnde fugiāt hi omnem vehementem motum, æstium cœlum, aeris siccitatem, Veneris vsus, animi accidentia molesta, exsiccantem victum, externum frigus, & cætera omnia, quæ harum partium humiditates dissipare, ac resiccare queant; & quantum fieri poterit, causas prædictas per opportuna præsidia rescindant, eisdemq; per conuenientia auxilia resistent.

*De dormientibus, qui vigilantium munia obeunt.*

*Cap. XVIII.*

*Somni causa.*

**D**VM homines vigilando munia animalia exercent, spirituum opulentia in eis imminuitur, ac disperditur: hinc labor in obeundis his functionibus succedit, indeq; nō possunt mortales perpetua sensuum agitatione frui. Huius merito ex naturæ præscripto animantibus irrepit somnus, vt per eum quiescente omni animalis motu, ac sensatione desperditi spiritus regenerentur: at vires, quæ non tantum per motum, sensationemq; , verum etiam per animales functiones obitas languent, restaurentur. In somno quiescit cerebrum, primum omnium sensationum instrumentum, & eo quiescente, cessat homo ab omni motu, & ab omni sensuum functione, dumq; hoc pacto se habet, in eo non tantum nervi, muscoli, membraq; omnia, & præcipue cerebrum, verum etiam omnes sensus consopiri videntur: quare tunc nec mouetur homo, nec sentit. Attamen hic in somno nō ita motu, ac sensu priuatur, vt nusquam moueatur, aut sentiat. Seruantur enim in dormientibus plurium musculorum motus, vt clarè apparet in his, qui excretionibus superfluitatum retinendis,

*In somno re-  
seruari ali-  
quos motus,  
& sensus.*

tinendis, & qui mandibulæ inferioris retractioni; & qui respirationi, & qui alijs huiusmodi functionibus destinati sunt, sed clarius in his, à quibus purè, & simpliciter voluntarij motus dependent, quorum ratione dormientes sæpe brachia, & crura agitantes de loco ad locum mouentur. seruantur etiam in multis sensus exteriores, hinc aliqui vocē cantantis galli, vel latrantis canis dormientes audiunt, & dignoscunt, & lumen præsentis lucernæ verè agnoscunt, saporesq; rei gustum afficientis diiudicant, foetentiaq; , ac malè olentia discernunt; aliqui autem clarè loquuntur, & alta voce quandoq; clamant, quidam etiam ad interrogata respondent, cuius merito nonnulli propria secreta in somnis cæteris aperuerunt. In nonnullis tamen adeò exteriores sensus consopiantur, vt nihil ad extra percipiant, sed tantum interius, phantasia rerum idola repræsentante, apparēt dormientibus insomnia, in quibus sibiipsis videtur audire, videre, loqui, discurrere, comedere, currere, pugnare, & cætera omnia patrare, quæ vigilando operari consueuere. Hæc insomnia aliquando clara, & certa, aliquando incerta, & confusa videntur, prout rerum spectra, vel clarè, vel confusè imaginationi repræsentantur. Nonnunquam tamen in quibusdam hæc ita euidentia apparent, vt dormientes ipsi tanquam ex proposito, ac ex industria aliquid agentes è lecto surgant, & modò superiores domus partes, modò inferiores adeant, modò domo exeant ad exequenda ea, quæ verè imaginantur se facturos esse, hincq; in maximum discrimen alicuius præcipitij deducuntur. Hoc quamuis difficile sit imaginari, rarissimeq; contingant tales casus, cum in somno, quiescente primo sensiterio (idest cerebro ipso) debeat dormiens ab omni functione tam motiua, quam sensitiua destitui, & ideò videantur dormientes nec posse moueri, aut sentire. tamen testimonia habemus celeberrimorum virorum, affirmantium in somno aliquando seruari motum, aliquando cum motu sensus ipsos, quod idem experientia ipsa

*Insomniorum  
causa.*

*Dormientes  
quare longum  
iter facere nō  
possint.  
Historia.*

ipsa in pluribus hoc euenire testata est. Galenus enim librō 2. de musculorum motu cap. 4. narrat quosdam dormiendo deambulasse, & testatur se ipsum dormientem, & somniantem integrum fermè stadium peregisse, nec à somno, priusquam in lapidem imegisset, excitatum fuisse. quā causam affirmat eam esse, propter quam non queant dormientes, quia leuē viam exactè nancisci non possunt, iter lōgū facere, innuens ex hoc multos, si per planam viam procederentur, longè proficisci posse. Aristoteles autem lib. 5. de Generatione animalium cap. primo affirmat in somno non tantum motum, verum etiam sensus seruari posse, hæc verba habens. Accidit enim dormientibus etiam animalibus sensus non modò, quæ somnia vocantur, sed etiam præter somnia, vt ijs, qui dormientes resurgunt, & quidem pleraq; agunt sine somnio. sunt enim, qui dormientes resurgunt, & ambulent, videntes eo modo, quo qui vigilant. ijs enim, qui sensus accidentium contingit, quamquā non vigilantibus, tamen non vt somnium. Ex quibus verbis claram eius habemus sententiam, quòd in dormientibus quandoq; seruētur motus, & sensus, & hoc non per somnium, quasi dicat, quòd per somnium hoc eis non contingat, sed quòd dormientes, & non somniantes moucantur, & videant, tanquam sint vigilantes. Quod affirmarunt hi duo inter Philosophos, & Medicos celeberrimi Viri, idem mihi experientia comprobauit. Iuuenem noui, qui somnians se propter negotia sua equitaturum esse, è lecto surgens indutus vestimentis proprijs, cothurnisq; ac calcaribus apposis, super fenestram (nam in tabulato degebat) conscendit, & hinc, indeq; diuaticatis cruribus parietem, perindè ac si equus esset, & voce, & calcaribus ad cursum incitabat, hic ex somno expergefactus tanto horrore correptus est, cogitans se per somnium mortem fere sibi ex præcipitiō consciuisse, vt me die sequēti consuluerit ad prohibenda hæc insomnia, quæ ipsum ad obeunda vigilantium munia deducebant. Alterum curauit, qui

qui cū natura iurgiosus, & contentiosus cum alijs fōret, vt plurimū somniabat se. cū aliquo manū conferre, indeq; surgēs ē lecto arma capiebat, gladiūq; euaginatū furiosē vibra-  
bat; perindeq; ac cum inimicō pugnans vndiq; parietes, & circumstantia loca percutiebat. hunc solum, in thalamo dormientem claudere, armaq; omnia indē auferre, nē vel se ipsum, vel alterum gladio confoderet, in posterum necessarium fuit. tandiūq; solus permanfit dormiens, quamdiu se cognouit à talibus insomnijs deprehendi. Præter hos artificē cognoui, qui dormiens ē lecto surgebat, ē thalamoq; exiens domum terē totam peragrabat, scalasq; nullo discrimine ascendebat, & descendebat. hic semel nullis indumentis amictus domo exiens apothecam propriam adiit, eaq; clauibus aperuit. à qua demū expergefactus ab amicis, qui ei sorte obuiam facti fuerunt, maxima cum verecundia, & timore, dubitans, ne indē stultus existimaretur, non amplius dormiens, sed vigilans rediuit. Dum hæc scriberem accessit sum ad inuiscendam adolescentulam, annum decimum nonum agentem, quæ decima die à puerperio media nocte somnians se quædam domestica negotia acturam, esse, ē lecto hyeme sæuiente nullis indumentis amicta surrexit, & cū ē thalamo hac imaginatione ducta in partes domus inferiores descendere vellet, strepitu facto, dum ostium aperiret, matrem, quæ vnā cum filia in eodem lecto decumbebat, expergefecit. quæ mater nouitatem rei admirans filiam alta voce clamans eam increpando vocauit, ex qua voce expergefata ipsa filia ad lectū redijt, affirmās se, nisi à somno excitata fuisset, ē thalamo exituram esse. Hinc ad viginti quatuor dies cum marito dormiens similiter circa nonā noctis horam subito ē lecto exiliens, & ad ostium properans expergefata à viro eam alta voce vocante, flens, & tremens ad lectum regressa est, narrans se somniasse fugere ex lecto tunc temporis voluisse ad euitandam vim sibi illatam ab homine, Venerem ab ea expetente. hæc eadē cum si-

milia insomnia sæpius passa sit, & hinc timeat, ne quid id mali ei ex hoc contingat, me ad eam curandam accersuit. Alias his confimiles historias referre possem; tamen hæc sufficiant ultra testimonia Galeni, & Aristotelis ad confirmandam hanc sententiam, quòd aliquando in dormientibus vel motus tantum, vel simul cum motu etiam ipsi sensus referuntur. Qui dormientes quomodo contra formalem rationem somni (qui est ligamentum primi sensiterij, per quod animal ab omni sensu, & functione animali ad regenerationem spirituum, & ad restaurationem virium ex vigilia dissipatarum quiescit) vigilantium munia, quæ sunt sentire, & moveri, obire possint, non ita facillè est explicare, ac certam ratione reddere. Si tamen ad hoc ego probabilia (alij hanc rem demonstratiuis explicabunt rationibus) adducam, satis mihi fecisse videbor, ita horum affectuum causas. expositurus. Anima corpori annexa, ut docet Hippocrates in libello de insomnia, eidem, dum vigilat homo, ita inferuit, ut in multas partes distributa singulis corporis partibus, siue sensibus aliquam sui partem distribuatur, videlicet, auditui, visui, tactui, gustui, gressui, actioni, ac omni corporis facultati. In hacq; distributione non sui iuris est anima, sicuti nec in cogitatione. non enim non potest corpori suas facultates impartiri, & non potest continuè aliquid non cogitare. Cum autem corpus quiescit, anima adhuc in motu est, & corporis partes omnes perreptans easdem gubernat, & omnes corporis actiones perficit. Nam corpus dormiens non sentit, ipsa vero vigilans cognoscit, ac visibilia videt, & audibilia audit, vadit, tangit, tristatur, gaudet, considerat. & in summa quæcunq; corporis, aut animæ munia sunt, ea omnia anima ipsa in somno obit. Dum anima siue vigilando, siue dormiendo hæc agit, semper omnia, quæcunq; agat, mediantibus spiritibus, qui sunt propria, & immediata ipsius animæ instrumenta, exequitur. Vnde in his, in quibus spiritus sunt perfectiores, semper anima proprias functiones, ubi orga-

na naturaliter disposita fuerint, excellentius operatur in quibus autē hi sunt imperfecti, diminutē, & imperfectē suas producit operationes. Spiritus perfecti, & imperfecti redduntur ex puritate, & impuritate sanguinis, & humorum. quales n. sunt corporis nostri humores, tales sunt & spiritus. Qui spiritus in aliquibus sunt puri, subtiles, ætherei, & clari, in aliquibus sunt impuri, crassi, turbidi, & nebulosi; Qui hos habent, sicuti nec vigilando perfectē vel sensus, vel mentis munia obeunt; ita nec dormiendo somniantes clarē rerum imagines sensibus, & menti iam oblatas, & in phantasia reseruatas circumspiciunt. in hisq; præ nimia spirituū, ac humorum impuritate, ac humiditate vel nulla, vel pauca, & confusa videntur somnia; præ nimia enim turbatione, ac crassitie tum spirituum, tum humorum rerum idola clara, & euidētia representari nequeunt. Qui autem spiritus claros, subtiles, ac æthereos habuerit, sicuti in vigilia perspicax, ad actionesq; promptus, & ad motum facilis existit; ita in somno rerum imagines clarē discernit, easque adeo euidētes, ac euidēter conspiciunt, vt perindē ac in vigilia, ea omnia, quæ cogitationi offeruntur, tamquā vera imaginetur, eaq; sedulitate, qua vigilans in eisdem actionibus vteretur, hæc omnia mente exequatur eo ordine, quo imaginationi representantur. Quod si vltra spirituum tenuitatem, ac subtilitatem dormiens sit fortis imaginatiuæ, quales solēt esse, qui melancholici sunt habitus, in quorum nonnullis rerum imaginationes ita fortiter, ac vehementer imprimuntur, & adhærent, vt nullis argumentis dissuaderi, aut ab his amoueri queant. in his hoc causatur, quod eis dormientibus somnia ita euidētia, ac fortiter imaginata representantur, vt vera magis hæc credant, quā ea, quæ ipsis vigilantibus offeruntur. hincq; in his somnijs tota mente, ac totis viribus agentes eas functiones, dominante anima præ spirituum tenuitate, ac forti imaginatione ipsi corpori, perindē ac si vigilarent, operantur, & indē surgunt o lecto, ambulant, pugnant,



quant, iisdemq; propriis operationibus, quæ somniantes imaginantur, se addicunt, ac operam navant. Quod si in his dormientibus, etiam somnia non represententur, ubi tanta fuerit cum forti rerum imaginatione spirituum tenuitas, & subtilitas, possunt in his ab anima ita sensibus ipsis propriæ facultates impartiri, ut dormientes quidem, non tamē somniantes videant, & audiant, cæterasq; sensuum functiones evidentes habeant. indeq; nonnulli dormientes iter inceptum prosequuti sunt; alij domus partes ipsis notas circumierunt, superioraq; & inferiora adire potuerunt, alij ad loca familiaria, quæ ipsi videntes ab alijs discernere potuerunt, progressi sunt. quod est id, quod Philosophus per ea verba testabatur, dicens. Sunt enim qui dormientes resurgant, & ambulant, videntes eo modo, quo qui vigilant. ijs. n. qui sensus accidentium contingit, quamquam non vigilantibus, non tamen ut somnium. Causa igitur, quod in dormientibus vel morus tantum, vel vnà cum motu etiam sensus ipsi referuentur, erit fortis imaginatiua vnà cum spirituum tenuitate, & subtilitate. Quoniam autem fortis hæc imaginatiua in melancholicis ut plurimum adesse solet, ideo animaduerto talia accidentia ut plurimum causari in his, qui melancholici sunt habitus, testorq; me tales affectus in consimilibus hominibus curasse, in quibus etiam spirituum tenuitatem, & subtilitatem inesse conieci. hos enim loquaces, promptos, impigros, facile irascibiles, & versatilis ingenij esse, obseruavi. Quos cognoui facilius in hæc incidere insomnia, & dormitiones, ubi quibusdā passionibus irretiti essent, in his enim omnis imaginatio repræsentat id, à quo ijdem faciliè patiuntur, & afficiuntur. & hi ab omni leui imaginatione, & similitudine faciliè in proprio affectu decipiuntur, ac circa eandem supramodum solliciti sunt; circa enim sensus, ut dicebat Aristoteles in libro de somno, & vigilia, facile decipimur, cum in passionibus existimus, Vnde à modica similitudine trepidus imaginatur, & putat se hostem videre,

aman

amans autem dilectum inspicere, iracundus stimulantem  
 perferre, & hic quanto magis passibilior fuerit, tanto ma-  
 gis, à minori similitudine decipitur; Vnde huius ratione,  
 qui fortem rerum imaginatiuam vnà cum spirituum tenui-  
 tate habuerint, si passionibus afficiatur, in hæc insomnia  
 procliuus erit: ac etiam, vbi non somniauerit, dormiens po-  
 terit ductus à leui similitudine, & imaginatione vigilantium  
 munia obire. Hæc penes me sunt, & causæ, ex quibus conij-  
 cio dormientes, non præter rationem posse moueri, & sen-  
 tire. Quas qui animaduertent, faciliè nouerint, quibus præ-  
 fidijs succurrendum sit ijs, qui talibus affectionibus detinen-  
 tur, cum enim, vt ex prædictis liquet, tenuitate spirituum,  
 ac forti imaginatione hi dotati sint, quibus etiam addun-  
 tur sæpè passiones, quibus irretiti sunt: quæ omnia in me-  
 lancholicis habitibus præoptius, quàm in ceteris quibuscumque,  
 reperiuntur, ac firmantur; ideo ad talia insomnia, ac dor-  
 mitiones prohibendas & spiritus crassiores reddere, &  
 imaginationem minus tenacem efficere, melancholicum ha-  
 bitum temperare, & affectus ipsos in talibus patientibus co-  
 rigere debemus. Quos curabimus, non quia hæc affectiones  
 sint morbi, vel quia ab his malum aliquid simpliciter immi-  
 neat, sed quia hi dormiendo possent ex insomnijs ad præ-  
 cipitia deduci, vel ad aliqua peragenda concitari, ex qui-  
 bus vel mortem incautè, ac inconsideratè sibi consciscerēt,  
 vel alijs inferrent: cuius ratione, non autem quia ex in-  
 somnijs, aut ex somno lædantur, huiusmodi patientes cō-  
 sulere medicos ad tales somnos prohibendos, & ad talia  
 insomnia profliganda consueuere. Quod vbi contigerit.  
 Medicus hac via quatuor indicationibus propo-  
 sitis obuiabit. Primò nimiam spirituum subtilitatem corrigit, eos cras-  
 siores reddens: hoc autem faciet, humores, ex quorum pu-  
 riori, ac subtiliori parte hi regenerantur, incrassando, hos  
 verò incrassabit, si alimenta crassi succi patientibus exhibē-  
 da præscribat; talia erunt carnes bubulæ, leporinæ, suillæ,  
 Y cochleæ

Prognosticū.

Cratio.

cochlear, casei omnes, ova ad perfectam concretionem cocta, fercula ex farina subacta, pisces molles, sicuti loligines, sepia, polipodes, anguilla, legumina, castaneæ, rapæ, nuces pineæ, vina dulcia, & crassa, & quæ huiusce sunt ordinis. secundò imaginationis tenacitati, ac fortitudini prospiciet, cerebrum, ex cuius sicca intemperie hæc dependet, humectando: in quo casu præter victus rationem humectantem præscribendam, maximè prodesse poterunt embrochæ, & lotiones capitis, vel simpliciter ex aqua dulci paratæ, vel ex decoctionibus rerum, quæ eiusdem sint facultatis, compositæ. Secundum locum ab his habebunt inunctiones ex oleis humectantibus, quale est oleum amigdalorum dulcium, & violaceum, & præter hæc odoraenta ex aquis odoratis, quæ similiter humectare queant. Tertio loco habitum melancholicum temperabit præscripta ea victus ratione, quæ nec retorridos, nec adustos, sed benignos humores generare possit. quare humectantia alimenta, quæ tamen boni succi existant, administrentur, & corpus ipsum ad humidum alteretur, quod potissimum aquæ dulcis balnea, quæ in simili casu cæteris omnibus medicamentis præferantur, præstare poterunt; sique in his generati sint, abundantq; nigri, & melancholici humores, lenibus medicamentis prius expurgentur. Ultimò vehementes, intensosq; animi affectus corrigit, si patientes à proprijs, & molestis negotijs abducatur, si hilarem vitam præscribat, si iucundas, & gratas societates adhibeat, si grauib; persuasionibus eos increpet, si solitudines, & omnes laboriosas curas interdicat, in summaq; si hos in contrarium habitum traducat. His omnibus peractis, sperandum est, hosce patientes a talibus insomnijs, & dormitionibus liberatos esse, vnde verè iucundissimum somnũ, qui omnium laborum, & solitudinum eis certum existat perfugium, capere possint. si tamen ex prædictis non omnino, nec integrè res absoluta sit (in nonnullis enim vidi admodum difficile esse tales affectiones soluere) deueniat Me  
dicus

dicus ad aliqua leniter somnum prouocantia: in quo casu feliciter quandoq; expertus sum post canam ante somnum exhibere lac amico. d. ad quantitatem quinque, aut sex vnciarum; hinc enim leniter humectatur cerebrum, & leniter consopitur, spiritusq; illi tenues quodammodo incrassantur. Quod si nec hoc sufficiat, ad lenia stupefacientia decuenio, sicuti ad fercula ex seminibus papaueris albi parata, ex quibus prouocato profundiori somno, ac obtusis spiritibus ipsis, adeo consopiantur homines, vt facultates sensitiuæ, ac motiuæ propriis organis ea viuacitate amplius communicari non possint, vt ex his dormientes vel deambulare, vel sentire queant. Validiora autem stupefacientia vitanda esse duco, non q̃ hæc nequaquã sint apta talia insomnia stupefaciendo inhibere, sed quoniã in tali casu, cum patientes nō sint insomnes, nec vigilijs cruciuntur, in somnosq; procliuēs sint, stupefacientia talia nocuentũ, quàm iuuamentũ, facilius inferre possent; vltra enim intentum, ac propositum terminum agerent, cerebrumq; ac omnes sensus nimis consopirent, vnde insomnia quidem prohiberent, sed vel in carum, vel in coma patientes deducerent: cuius ratione etiã exteriora stupefacientia, & cætera omnia somnum prouocantia omittenda censeo, solisq; prædictis, vel similibus præsidij agendum esse iudico.

*De Rabie. Cap. XIX.*

**R**Abie hominem affici, indeq; periclitantem miserabiliter vita orbari, satis apertum est. quorum autem ratione hoc fiat, & quid sit rabies, & an curationem admittat, non ita in confesso est. Scio multa de hac materia ab antiquis monumentis literarum prodita esse: tamen cum ratio, & experientia, quam plurimam huiusce rei habeo, multa longè aliter, quàm ipsi docuerint, mihi persuadeant, hic de creui quæ in hac materia animaduertenda sint, explicare, vt cognoscant Medici, quanta cū diligentia antiquorū scri-

*Rabies.*

*An tractatus  
de rabie debeat  
inscribi de mor-  
su canis rabidi*

*Quæ animalia  
rabiem incur-  
rant.*

*Rabies vera an  
sit solus canis,  
& non cætero  
rū animalium.*

*Lib. 6. de loc.  
affect. cap. 5.*

ptā in materijs abstrusis, & nō frequentibus sint perpenden-  
da, & ad lydiū, vt dicunt, lapidē examinanda. Quicumque  
aūthores de hac egerē materia, omnes sub titulo de com-  
morsis à cane rabido hanc rem perstringentes, eius ordiun-  
tur tractationem, primò declarantes, quæ de causa canes  
rabidi fiant, secundò quibus hi deprehendantur notis. Hāc  
docendi formam ego diū considerans, cum ultra canes ex  
Aristotele camelum, & equum; ex Auicenna Vulpes, mu-  
stillas; & mullos; ex Cælio Aureliano Vrsos, Leopardos,  
& Asinos; ex Alberto Magno Lupos tentari rabie sit cer-  
tum, non potui non admirari, cur de rabie acturi, quæ ho-  
mini per tot animalia communicari potest, solum de morsu  
canis rabidi agentes tractent, & inscribant de commorsis à  
cane rabido, cū de cōmorsis ab animali rabido inscriptionē  
ponere debuissent. Nec est, quòd dicas, iure ab antiquis  
hoc factum fuisse, cum vera rabies solum à cane communi-  
cari possit, cæteras autem non veras esse, sed per similitudi-  
nem ad hanc rabies dictas esse; quoniam quæ maior simili-  
tudo poni debet lupinæ rabiei ad caninam, quàm quæ ip-  
sius canis ad lupi? cum à lupo, sicuti & à cane, vera, & ex-  
acta inducatur in hominem rabies. immo noui ego à lupo se-  
uiores, & magis horrenda consequi symptomata, quàm à  
cane rabido, magisq; hi & violentius cruciantur, qui à lupo  
rabido cōmorsi sunt, quàm qui à cane. Quod de lupo at-  
testor, idem de cæteris animalibus prædictis asseratur, affir-  
meturq; veram rabiem ab omnibus his generari. Quæ tamē  
vera rabies à solis canibus primam fortasse apud antiquos  
sumpsit denominationem; quoniam hi magis, quàm cæte-  
ra animalia, consuetudinem manifestam habent cum homi-  
ne, clariusq; nobis eorum patefunt accidētia, frequētiusq;  
cæteris rabie corripuntur: quod tamen non tollit cætera  
prædicta etiā rabie vera deprehendi. Quam veritatem cū  
Galenus negauerit, credatur hoc ab eo factum fuisse ob non  
habitam ab eo huius rei experientiam, quam si vidisset, vel  
si

si eius testimonium fidum audiisset, eam profectò sententiam ablegasset, nec dixisset, solum canem ex omnibus animalibus rabie corripì: quod cum falsum sit, pluraq; sint animalia, quæ rabie tentantur, de hac materia scribentes titulum non de cômorsis à cane rabido, sed de cômorsis ab animali rabido ponere debebant. hæc de inscriptione.

His addo, quòd nonnulli tentantes reddere rationem, cur potissimum ex omnibus animalibus canes rabie corripiantur, dixere hoc fieri; quoniam cum praua huius virus seminaria analogiam, & proportionem habeant ad humores prauos, & melancholicos, canis autem præcipuè sit animal cacochymum, & melancholicum, hinc fieri, vt hi potissimum in rabiem incurrant. quæ sententia ex toto falsa est; nam ante canis rabiem nulla sunt seminaria, per quæ hæc rabies cani communicetur, nec ipso rabiente potest referri causa ad canis habitum, seu ad prauitatem humorum eius naturalem, nec etiam ad id, quòd melancholicum sit animal; quoniã canis habitus, nulla extrinseca causa accedente, non est sufficiens rabiei causa: aliàs omnes canes rabiem incurrerent. cum autem dicunt canem esse animal cacochymum: si de propria specie sit sermo, absurda est dictio; quoniam nec serpentes in propria specie debent dici cacochymi. Si autem dicatur relatiuè ad hominem, non solus canis, sed lupi, & vulpes, & asini, & similia animalia dici debent cacochyma, & ita hoc proprietatè canis non consequetur. Quòd autem canis sit animal melancholicum, experientia oppositū dictat, cum inter bruta ita gestire, colludere, dominis applaudere, blandiri, & in omnibus actibus lætitiæ præferre nullum animal, sicuti canis, videatur. quare nec ratione analogiæ, nec ratione cacochymix, nec quia sit animal melancholicum, asseratur canem ex animalibus præcipuè rabie corripì. Quærentes autem causas, propter quas canis rabidus fiat, docent hoc fieri ex immoderata eorum intemperie calida, & sicca, quæ præcipuè in eis introducit ex inclemen-

*Canis cur potissimum ex omnibus animalibus rabie tentur.*

*Canis an sit animal cacochymum.*

*Canis an sit animal melancholicum.*

*Canis quæ de causa rabidus fiat.*



tia calidioris celi, cuius vi cum adurantur humores in canibus, hinc insaniunt, & insaniam hanc rabiem vocari dicunt: hanc sententiam viri celeberrimi admiserunt: sed cum causæ suis effectibus adacquari debeant, notumq; sit experientia, & testimonio, grauissimorum virorum etiam extremam hyemem, vehementiaq; frigora rabiem inducere canibus, si cuti & cadauera corrupta, ac putrida, potiusq; consimiles, & nonnulla alia abominabilia degustata, & in usum alimentii ab eis desumpta, nullo pacto asserendum est ex intemperie calida, & sicca, tamquam ex causa propria rabiem canes incurere. At dices, quæ igitur erit causa, propter quam canes rabie corripuntur? Declarauimus in tractatu febris pestilentis, in homine aliquando humores corporis nostri, siue hoc fiat ratione alimenti externi, siue ratione causarum internarum, ita corrumpi, vt hinc naturam nobis contrariam adepti deleteriorum venenorum vim, & facultatem consequantur, hoc idem censeo in canibus, cæterisq; animalibus, quæ à rabie tentari possunt, contingere, videlicet, quod cum in eis nonnunquam eorum humores corruptionem, ingentemq; prauitatem patiantur, hinc euenire, vt in iisdem, cum ex corruptione venenatam naturam, & facultatem eorum humores acquisierint, excietur, & formetur virus istud, quod petens eorum membra principalia eos in rabiem, tandemq; in mortem præcipitat. Cur autem ex corruptione hoc virus tantum in canibus, & in alijs, quæ huiusce sunt classis, animalibus potissimum generetur, hoc ex proprietate naturæ eorum contingere assero. Quæ proprietas naturæ non in temperamento consistit; quoniam si hoc esset, omnia animalia, quæ rabiem incurrunt, eiusdem essent temperamentiq; quod non tantum est falsum, sed etiam absurdum; cum enim sicut in homine mores temperaturam sequantur, ita in omnibus his animalibus animi eorum affectiones eiusdem ordinis, cuius oppositum sensus dicitur, sed consistit in abstrusa, & occulta eorum proprietate,

ne natura, quæ nobis ineffabilis, & imperceptibilis est, sicuti & cætera omnia, quæ à proprietate aliquid vel patiuntur, vel agunt. Sicuti autem ex corruptione humorû in canibus, cæterisq; animalibus ex propria eorum natura, & occulta proprietate hoc virus rabidum gignitur, similiter & virus istud non consequitur ullam temperamenti conditionem, sed simpliciter est venenum à proprietate, ac à tota substantia. hincque fit, ut & à calida, & à frigida causa possit excitari; quoniam omnia ea, quæ humores horû animalium in corruptionem deducere possunt, facultatem habent procreandi rabiem. Vnde cû & cælum calidissimum, frigidissimumq; pariter (quoniã utraq; extrema violentiã naturæ inferunt) possit vel in corruptionem humores deducere, vel corruptos excitare, facillè canes, & æstate feruentissima, & hyeme prægelida rabiẽ patiuntur. quod nõ ex aeris temperamento alterate solû humores procedit; quoniã si hoc esset, ubi æstas rabiẽ posset introducere, hanc eandẽ hyems nequaquã procreare valeret: nec aeris validæ in contrarium permutationes hoc idem agerent, quæ tamen ad inducendam rabiem experientia testante validissimæ sunt; & hoc quoniam tales aeris permutationes facillè eorum humores corruptionem, prauamq; naturam traducunt. hanc humorum corruptionem, violentiusq; quàm prædictæ causæ, & cum maiori efficacia in canes inferunt alimenta corrupta, & putrida ab eis desumpta, potusq; similes hausti, & nonnulla alia abominabilia, quæ in salutem hominum sub silentio continenda sunt, degustata. Hanc ego præcipuam causam rabiẽ canû censeo esse, hancq; validissimam omnium adnotavi; cum enim omnia, quæ ad hanc materiam faciunt, diligentissimè inuestigauerim, inueni ferè omnes canes rabidos, vel cadauera hominum corrupta, & putrida, vel carnes animalium putrescentes comedisse, vel potum consimilem hausisse, vel alia abominabilia degustasse. quæ omnia ab eis in alimenti vsum assumpta corruptionem humorum ingentem;

*Corruptio humorum in canibus unde canis fitur.*

& prauissimam in iisdem concitare possunt: cuius violentia naturam, & facultatem venenatam humores adepti non ratione alicuius intemperiei valide, quæ ab assumptis introduci non potuit, sed ratione prauæ eorum qualitatis, & merito proprietatis eiusdem canis abstrusæ, sensibusq; nostris reconditæ, virus hoc rabidum in eis excitant, quod factum venenum à proprietate eos in rabiem, & mortem deducit. Hinc non videbitur mirum, si lupus à venatoribus captus, in diuersaq; obsoniorum genera apparatus, & coctus fuerit in causa, ut qui cum gularint, esitarintq; rabie non multò post correpti fuerint; quoniam cum virus hoc sit venenum à tota substantia, vi ignis in totum deuii ci non potuit, qui tamen omne temperamenti genus nulla cum difficultate domare potest, quiq; omnium rerum, quæ coctionem vi eius recipiunt, qualitates manifestas superare valet. Quare constituo, canes, ceteraq; animalia, quæ rabie tentari solent, non ex temperamenti alteratione, quæ nusquam est sufficiens causa (cum hinc æqualiter ferè omnia hæc animalia deberent morbo corripì) sed ex praua, & ingenti humorum corruptione, quæ ex violentia excessus aeris, & ex eiusdem validis in contrariū permutationibus, sed potissimū alimentis putridis, & abominabilibus ab eis desumptis generari potest, rabie pati: quæ rabies idè in his gignitur, quoniam cum humores ex corruptione deleteriam, & venenatam facultatem acquisierint; ex his ob proprietatē naturæ, & habitudinis horum animalium occulte generatur venenum, quod à tota substantia rabiem inducens ea tandem vita excludit. Quibus signis rabidus canis deprehendatur, non exponam; quoniam in claris non est immorandum, & præcipuè cum hoc exquisitissimè ab omnibus scribentibus declaratū sit. cuius habitus signis, desumpta ab ijs analogia, facile erit dignoscere, quando cætera animalia, quæ rabie incurrere solent, eadem correpta sint. hæc de canina rabie sufficiant, nunc de humana agamus.

*Lupi rabidi a  
ro rosta quare  
potuit rabiem  
communicari  
comedentibus*

*Rabien'is ani  
malium signa.*

Animalia-

Animalia rabida, quæcunq; eis obuiam fiunt, violenti perunt morfu, tamq; animata, quam inanimata mordent, canesq; dominum pariter, ac alienos, nulla habita distinctio ne, terociter dentibus inuadunt. Ex hoc morfu, qui à morfu nō rabidi animantis nulla sensibili differētia distingui potest, homini per contactum seu dentis, seu saliuæ, & spumæ rabidi animalis eiusdem virus communicatur. qui contactus ad hoc efficax non est, nisi aperta, ruptaue cuti; quoniam hoc virus integra ea existente, altius penetrare non potest. Ulceri communicatum virus per mortem nullum prodit signum perniciē, quam postea illaturum est. sed intro latenter subiecti spiritus, sanguinem, humores, ipsasq; solidas corporis humani partes tabefaciens sensim modò paucioribus, modò pluribus diebus, modò per menses, modò per annos serpit ad principalia membra. quæ ubi attingerit, ad rabiem hominem deducere incipit. nitiq; statim morbo vix apparente, generosa ab arte administrētur remedia, patientes per rabiem in miserabilem mortem præcipitat.

*Homini quomodo rabies à rabido animali communicetur.*

Dum rabiunt homines, cor & præcordia eis villicātur, mentis confusio accedit, labare res circumstantes ipsi videntur, loco stare nequeunt, inordinate se iactant, oculis toruē aspi ciunt, aspectu horrendi sunt, ipsi distenduntur membra, in inspiratione plurimum offenduntur, sitiunt admodum, ac continua querimonia lamentantur. Cum deterius habet, in furorem aguntur, spuma ad os eis apparet, dentibus alios petunt, vt canes latrant, vel vt lupi ululant, dentibus strident, sudant, & conuelluntur. Sed his omnibus vnum maximum accedit incommodum, huic affectioni peculiarē, & propriū, quod aquam, & omnia liquida, & potulentia ita auersantur, & perhorrescunt, vt mortem sæpè facilius, quam ista, admittant. mirumq; est, quārum ex sola istorum oblatione agitentur, contremiscant, confundantur, concutiantur, angustientur, seque huc, atque illuc iactent, vt vix ab astantibus loco contineri queant. Huius ratione vobis

*Rabientis hominis signa.*

catus

*Rabies quare  
dicta ὡς φοβία  
ab anti-  
quis.*

*Rabies quid  
sit.*

catus est affectus iste à Græcis ὡς φοβία, quasi quòd Rabies nihil aliud præcipuè sit, quàm aquæ timor. diffinitusq; ab antiquis dictus est appetentia vehemens, atque timor aquæ si ne vlla ratione. Author diffinitionum medicarum dicebat esse affectum ex morfu canis rabie furentis, addebatq; fieri cum potus auersione, conuulsione, & singultu, & cum superueniente delirio, cuius delirij meminit etiam author libri de Theriaca ad Pisonem. Alij autem rem hanc breuius perstringentes diffinierunt, hunc morbum esse affectum præternaturalem cum delirio, & aquæ timore irrationali, & vehementi. Horum authorum dicta, si experimento corresponderent, simpliciter admittenda essent, at longè aliter experientia dicat. Quòd homines, ubi rabie correpti fuerint, auersentur, perhorrescant, fugiãtq; omnia liquida, & potissimum aquam, clarum est: sed an ipsam verè timeant, & antimentes timeant sine ratione, & an cum hoc affectu sit semper delirium, conuulsio, & singultus, non ita constat. Pro huius rei euidentia præmittenda est causa, propter quam homines rabidi potum, & omnia liquida auersantur; quo habito, prædicta satis facillè innotescunt, ac dilucidabuntur. Huius rei causas diuersas prodiderunt antiqui. Alij dixerunt hos aquam auersari, vel quia propriam speciem in ea, tamquam in speculo, rubicundam, toruè tuentem, & ira plenè conspiciunt: vel quia in eadem canis, à quo còmorsus fuerint, imago appareat, cuius violentiæ, & ferociæ recordati contestim immodico corripuntur timore, causa hæc est fabulosa, nec villo experimento comprobari potest, cum rabientes nec in aqua quid videant, vt pluries ego interrogans: ab eis audiui, nec aquam solùm, sed omnia liquida, in quibus etiã nulla species representari potest; cuiuscemodi sunt iusa, & fercula, & alij turbidi potus, pariter fugiant. Quidã dixere, homines rabientes liquida, & humida formidare; quoniam, mutata eorum substantia, ad summam siccitatem, hincq; arefacta timent omnia humida, tanquam eis aduersantia

*Rabidi quare  
aquã, & liqui-  
da auersantur.*

fantia, aptaq; ad eorundem destructionem, & dissolutionem. At sententia hæc sensui contradicit; nam rabientes, dum liquida auersantur; non propriam temperaturam, an vel humida, vel sicca sit, perpendunt, & dignoscunt, nec ratione, sed sensu ad fugiendos liquores ducuntur. Eam autē insignem siccitatem, quam hi in rabidis hominibus supponunt, nec ex pulsu, nec ex habitu, nec ex facie, nec ex alio sensibili signo (quod ad sensum enim in his immutari nō sunt) ego vnquam deprehendere potui. Quæ tamen, vbi summa est (vt in hæcticis, & marasmatibus) facillè cognosci potest. Nonnulli ab eadem siccitate auspicati dixerunt hos formidare non solida, sed liquida; quoniam hæc sua subtilitate ingredientia meatus ventriculi exsiccatos, valde eos lædūt. ad cuius læsionem consentientibus cerebri membranis, læditur imaginatio, quæ postea est in causa huius formidinis. Opinio hæc supponit marasmatum ventriculum, eiusq; penetrationem, cuius ratione lædatur, à liquidis, quæ à veritate longè distant, cum tantæ siccitatis ventriculi nulla sint signa: nec ea penetratio, si detur, possit tantam afferre læsionem, vt humida inde auersentur, aliàs in marasmatibus, & in his, in quibus hæctica est ventriculi, similis fieret penetratio, similisq; læsio, cuius oppositum experientia docet. Alij probabilem adducentes causam dixerunt; quod cum in rabie correptis spuma circa os obuersetur, & corde liqueſcant, si his liquida offeruntur, phantasia in eis excitat imaginationem liquidi ipsos extinguentis, cum ex paruis occasionibus in ægris horribilium imaginatio excitetur, vt in febricitantibus apparet, qui ex paruis lineamentis parietum imaginantur animalia sæua, vnde timent, & clamant: ad cuius conformitatem ex imaginatione huius liquidi extinguentis dicunt excitari in rabidis formidinem humidorum. Porro pulcherrima est hæc ratio, & satis probabilis, non tamen admittenda; quia spumam circa os non omnes rabientes habent. & qui habent, tantum in vltimis horis habent. attamē

*In rabidis an sit summa siccitas.*

*Rabidi nō semper habent spumam circa os.*

antequam



antequam spuma ad os eorum obuerfetur, liquida abominantur, qua de re hoc non poterit esse ob imaginationem excitatam à phantasia, mota à causa externa. Hi rem istam altius perscrutantes aliam assignant rationem, dicētes, quòd corpora exsiccata, dum naturam propriam adhuc retinent, humidum quidem appetunt: sed si eò res deducta sit, ut propter nimiam siccitatem formam connatam, & naturalē amplius non conseruent, ac ab ea ceciderint, non tantum non appetunt humida, sed ea, uti cōtraria, abhorrent, & respuūt, sicuti in morituris apparet, in quibus cū extincta sit viscerū natura, cibum, & potū renuunt, nihilq; quod eos alere possit, admittunt, omnia similia, tamquam molesta, & horribilia à se abdicantes. quod idem cum sit in rabie correptis, videlicet, quòd cum his viscera, & cætera principalia membra adeò exsiccata sint, ut amplius naturā propriam non conseruent, sed ferè extincta sint, hinc sequitur, quòd omnia humida, & liquida abhorreant, & abominentur. Ratio hæc nihil dicit in casu nostro; cū enim vniuersalis sit, vniuersaliter etiā concludere debet; quoniam ubi natura viscerum extincta sit, non modò liquida, sed etiam solida ab horrere debent. sicuti in his, qui propè mortem sunt, in quibus non potus tantum, sed & cibus, & omnia oblata, cuiuscunq; sint generis, reijciuntur: at in casu nostro solum liquida, & potulenta auersantur ægri, cum solida accipiant, & aliquando auidè petant, & assumant; cuiuscemodi in nonnullis vidi rabientibus, qui panem, & carnes, præcipuè autem saccarum in maxima quantitate, dum rabie cruciarentur, assument: quod tamen saccarum, si in vino, vel in iure, vel in aqua dissolutum offerebatur, pariter & aquam simplicem auersabantur. Quare cum hi solida cibaria promptè assumant, hisque interdum delectentur, indicium sit in his viscerum propriam naturā non extinctam esse, sed conseruari adhuc. cuius ratione cibaria solida appetunt, & assumunt. qua de re nec hæc erit assignanda causa, cur aquam, & omnes

*Rabidi aliquādo solida alimenta libèter sumunt, et petunt,*

nes liquorēs rabie detenti abominentur. Exclusis tot grauissimorum virorum sententijs, quid in hac re sit sentiendū, difficile est affirmare. si tamen ego ad hoc probabilia, & quæ vel nullam, vel minimam patiantur contradictionē adduxero, satis mihi fecisse videbor, alijs rem istam demonstratiuis rationibus discutiedam relinquēs. Declaratum est, virus animantium rabidorum nullum consequi peculiare temperamentum, sed esse venenum à tota substantia. hoc vbi homini fuerit communicatum, latenter absq; noxa sensu la befactans humores, pedetentimq; per partem post partē per means, quàm primū membra principalia attigerit, ea velli- cat, maximòq; cruciatu affligit, sitim inducens. quo tempo- re si patientes quid liquidi hauserint, ultraquàm credi po- test, maximam persentiunt læsionem, admodumq; ex eo po- tu internè cruciantur. Hoc non alicuius temperamenti ratio- ne fieri potest (quoniam siue calida, siue frigida assumant, omnia pariter, cuiuscunq; sint facultatis, & temperamen- ti, æqualem proferūt molæstiam) sed ratione propriæ natu- ræ veneni. quod sicuti est venenum à tota substantia homi- nem lædens, ita antipathiam quandam ad omnia liquida habet, per quam ita à liquidis exasperatur, efferaturq; vt in dē maiori ferocia exultans sæuius petat, & cruciet internas partes. hanc noui ego causam, propter quam à principio abhorreant liquida; quoniam omnes vnanimiter assense- runt se à liquidis admodum lēsos prius fuisse. post quam læsionem adeò omnes liquores deinde abominati sunt, vt etiam ex eorum oblatione, & solo visu eundem, & aliquan- do sæuiorem passi sint cruciatum. Quod non sit mirū. cum enim re vera hi lædantur à liquidis epotis, facile erit, quòd ad eorundem oblationem, & visum idem sequatur incom- modum, cum percepta iam læsione ex vero potu, ad obla- tionem tantum, & ad eius solam imaginationem hoc subse- qui possit propter maximum consensum, quem habet ven- triculus cum rebus vel visis, vel imaginatis. Cuius consen-

*Rabidi quare  
aquam, & li-  
quida auersan-  
tur.*

*Rabidi quare  
ad oblationē,  
& visum re-  
rum liquida-  
rum lædantur.*

sus merito videmus sæpe ob visas res abominabiles, & facti-  
das multos vomitum incurrere, in quem pariter aliqui inter-  
dum ex sola imaginatione incidunt, in alijsq; subvertitur vē-  
triculo ex solo audito sermone de ijsdem rebus. cuiusce-  
modi etiam nouimus multos, qui vel videntes, vel audien-  
tes alios comedere, seu sermonem habere de comestione  
fructuum acidorum, & austerorum, persentiunt sibi ventri-  
culum commoueri, indeq; eis, resudante humore ex ventri-  
culo ad gulam, os humida saliuā repletur, & inde plura spu-  
tamina fiunt. Quapropter cum tantus sit consensus inter vē-  
triculum, & res visas, seu imaginatas, non sit mirum, si præ-  
uia existente læsione, nō tantum liquida abominantur, sed  
etiam eorundem visionem tolerare non audeant, cum ex so-  
lo aspectu eandem ferè calamitatem in ventriculo, & parti-  
bus internis persentiant, quam ex vero potu perciperent.

*Rabidorum vi-  
rus non solum  
à liquidis assu-  
ptis, sed etiam  
oblatis, & ui-  
sis exacerbatur.*

His addo, virus istud venenatum tantum habere antipa-  
thiam ad liquida, vt non modò ab assumptis, sed etiam ab  
oblatis, & visis liquoribus exacerbetur. cuius merito vide-  
mus patientes in tali statu constitutos, si sæpius cogantur,  
tententurq; liquida assumere, & eisdem eadem sæpius offe-  
rantur, citius perire, quàm illos, quibus ista non offeruntur:  
cuius rei ratio est; quoniam in eis ex liquidorum assumptio-  
ne, vel oblatione semper magis effertur venenum. qua-  
de re hoc sæpius agitaturn, & stimulaturn, ferocius agen-  
do mortem accelerat. Nec mirum sit alicui, per solam  
oblationem liquidorum posse venenum internum exacer-  
bari; cum inanimata quædam coram his, quibus cum anti-  
pathiam naturalem habent, ex sola præsentia à propria for-  
ma immutentur. hinc cornu Vnicornis, & cornu, vel linguā  
serpentis oblato veneno sudare, lapidem prassinum, Plasma  
dictum, eodem præsentē, splendore proprio priuari vide-  
mus. quod si in corpore inanimato hæc sunt possibilia, cur  
venenum in corpore animato, in quo propriam exercet fa-  
cultatem, non potest oblati his, ad quæ antipathiā à sub-  
stantia

stantia habet vim suam acere, magisq; patientes cruciari? sed quid magis? Apud nos per longa tempora observatum est, quod qui comorsus à rabido animali ante exactum annum tetigerit vel plantam cornus, vel sanguinaria, inevitabiliter incidet in rabiem. proditum etiam est eisdem, si sub forbo dormiant, rabie corripi. ex quibus duo clarè habemus, alterum, quod hoc virus à tota substantia, non ratione temperamenti agit; quoniam nec à tactu, nec ab umbræ intemperies introduci potest. alterum, quod hoc venenum, si dum sopitum est, excitari potest ab his, cum quibus antipathiam habent, tantò magis ab his exacerbari poterit, quibus, dum viget, actusq; lædit, eandem habet. Cuius antipathia nulla alia potest manifesta causa explicari, quam ea, quæ omnibus his, quæ à propria substantia aliquam peculiarem facultatem habent, est communis; videlicet quod à proprietate hoc agant. Vnde quemadmodum, quare cantharides vesicam, lepus marinum pulmonem, solatrum inaniacum cerebrum lædant, nulla potest assignari alia ratio, quam quod à propria, & innata, & occulta facultate, non à manifesta, hoc habeant; ita cum hæc in rabidis læsio interna à liquidis rebus, eorundemq; auersio, & abominatio consequatur hoc venenū à proprietate, nulla potest certa reddi, & manifesta ratio. Quemadmodum etiam, quare qui lepus marinum hauserunt, omne genus piscis auersantur, abhorrentq; cum hoc ex proprietate veneni fiat, nulla potest naturalis causa adduci. Tantaq; huius proprietatis, & antipathia efficacia est, ut viderim cantharides non tantum assumptas, & appositas, sed etiam exterius delatas vesicæ læsionem intulisse, sicuti & aquam exterius oblatam hoc virus rabidum exacerbare videmus, quarum rerum ratione quis naturalium manifestam reddere posset? At videmus etiam in naturalibus rebus nulla præsentente venenosa, nec virulenta materia, ad solam oblationem alimentorum, quæ auersentur patientes, interius homines valde affligi. hoc patet

*Morsus à rabido animali si tetigerit cornū, vel sanguinariam, incidet in rabiem.*

*Morsus à rabido animali si dormiat sub forbo, rabie corrumpitur.*

*Ad oblationem eorum, quæ auersentur homines eosdē interius affligi.*

teat exemplo mulierum vtero gerentium; & virorum abstemiorum; nonnullas enim ego vidi mulieres grauidas, quæ cum ex mala ventriculi affectione odissent carnes, ex sola earum oblatione in lypothymiam incidebant. quod non ex alia factum est causa, quam ex antipathia, quam habet humor prauus in ore ventriculi in eis collectus ad carnes ipsas, sicuti & ex eiusdem sympathia ad alias res abominabiles, & alere ineptas vidi alias appetere, & comedere gypsum, alias calcem, alias carbones, alias vidi appetiisse, & comediisse carnem crudam. harum rerum causa est ex materia. In abstemijs autem, quorū vidi nonnullos ex solo vini odore in syncopem incidisse, hoc factum est non ratione materiæ, sed ratione propriæ naturæ ab intimis substantiæ suæ facultatibus vino aduersantis. similiter ad horum conformitatem rabidi homines liquida auersantur, non ratione vanæ imaginationis, sed quia valde ex his læduntur ob antipathiam, quam habet hoc virus cum illis. Sed quid magis? Rabidi cum deterius habent; non modò ex assumpta, & oblata aqua, verum etiam ubi sonitum eius audierint, vel aliquis de ea coram ipsis sermonem habuerit, cruciantur, & lationem sentiunt: quod non tantum ex antipathia, sed etiā ex forti patientium imaginatione, per quam venenum internum excitatur, fieri potest, quæ fortis imaginatio quantum à rebus venenatis causata possit, ex hac pateat historia. Exhibitus fuit in ferculo pulvis cuidā adolescēti, qui ex eo in maximam incidit corporis iactationem, & in pruritus adeò molestus, ut ungibus se laceraret, superuenitq; totius corporis tremor, & videbatur animo linqui. dubitarūt parentes de veneno, ego ad hunc accedens vidi eum maxime vociferari, altāq; voce inclamare, conquerentem se à patre tunc præsentē fuisse percuti, in locoq; dolente statim apparebant pustulæ rubicundæ, ac si quis verè eum flagello caderet, fugamq; inde quærebat, ac si è patris manibus fugere voluisset; nilq; ab astantibus vi detētus fuisset, ex præcipiti

*Rabidi cū deterius habent, sonitum aquæ, vel sermonem de eā audientes cruciantur.*

*Historia pulvis mentem ledens exhibitus.*

cipiti loco se dedisset, vt indè exiliret, hoc videns iussi, vt pa-  
 ter indè abscederet: quo remoto, non amplius se percuti,  
 sed percussum fuisse, alta voce conquerebatur. cum autem  
 denuò pater dolore filij anxius ad eum consolandum rediisset,  
 statim iterum se ab eodem percuti altius clamabat. tã-  
 dem remoto patre, cum per spatium trium horarum con-  
 questus fuisset, ostenderetq; astantibus sæpè flagelli vesti-  
 gia, vibicesq; ac liuiores, nullo adhibito remedio præter co-  
 piosum potum vini generosi (nullum enim aliud, omnia re-  
 nuens, admisit) spontè incidit in profundissimum somnum;  
 qui per mediam diem, & noctem integram perseuerans  
 soluit hunc affectum superueniente copiosissimo sudore, vn-  
 de expergesfactus sanus quidem, sed ferè mente stupidus  
 euasit. Hinc pateat, quantum fortis imaginatio polleat ex  
 uenenatis pharmacis causata. quæ cum fortissima sit in his,  
 qui rabie cruciantur ob virus illud, non mirum, si ex solo  
 aquæ vel sonitu, vel sermone aliquando affligantur. His cau-  
 sis alteram addo, quæ si minus omnibus prædictis probabi-  
 lis videatur, tamen vera erit. sciant omnes vim deglutiendi  
 in rabidis hominibus præpeditam esse, & hoc ratione ma-  
 teriei pituitosæ, crudæ, viscidæ, & virulentæ, gulam totam  
 vsque ad fauces occupantis, non tamen omninò eam occlu-  
 dentis, à qua eleuatur, & resudat, cum deterius habent, ra-  
 tione magnæ cōmotionis, concussionis, agitationis, & vel-  
 licationis viscerum spuma ad os rabientium. hinc timet isti  
 extingui, & suffocari ab assumptis, præcipuè autem aliqui-  
 bus succis, & omnibus potulentis. quapropter & hæc maxi-  
 mè omnium rerum potissimum abominantur, cum hæc  
 difficilior deglutiantur, quàm solida, & ab his materia il-  
 la in via existens magis agitetur, indeq; magis deglutioni re-  
 sistat: qua de re oppressa aspera arteria, suffocationis peri-  
 culum impendit. quàm lētionem rabidi perferentes etiā  
 liquida hinc præcipuè abhorrent, tanquam ea, à quibus suf-  
 focari debeant, & quæ deglutire vix possint. interrogati. n. vt

*Rabidi homi-  
 nes habent vim  
 deglutiendi quo  
 quo pacto im-  
 peditam.*



*Rabidi an potius liquida, quam solida ratione impedite deglutitionis abhorreere debeant.*

pluries ego expertus sum, cur bibere non audeant, potiusq; omnē fugiant, respondēt potulenta nec posse penetrare, nec permeare fauces, gulamue ob eorū magnā angustiam, & cōstrictionem. At quispiam parum in operibus naturæ exercitatus dicet. si ratione deglutitionis læsa incederet his timor liquidorum, potius solida, quam hæc, formidare deberent, cum facilius liquidiora, quam solidiora, ob substantiæ tenuitatem ingerantur: sed nouerit hic, quod ubi deglutiendi virtus impediatur non ratione tumoris, vlcerisue, aut alius cuius alterius instrumentalis morbi substantiam gulæ occupantis, sed vel ratione intemperiei, vel alicuius virosæ qualitatis facultatem oppugnantis, difficiliora liquida, quam solida ad ventriculum demandari; quoniam ubi quid deglutiendum est, arctius gula constringi debet, ut contingens rem deglutiendam, quasi manu per fibras eam ad inferiores detrahat partes: ubi autem læsa hæc fuerit, facultasq; eius labefactata, non ita arctè constringi potest: cuius ratione tunc temporis (quoniam in absorbendis liquidis arctius adstringitur gula, quam in assumendis solidis cibis) difficiliora liquida, quam solida deglutiuntur. quod eò difficilior est in casu rabientium, quod in eis præsto est ea virulenta materia, obstruens partes illas. Tot igitur sint causæ, quare homines rabie correpti aquam, & omnem potum auersantur. Ex quibus pateat rabientes liquida omnia abhorreere non ratione vani timoris, nec merito alicuius falsæ imaginationis, sed quia verè, & sensibiliter ab his non tantum assumptis, sed etiam oblatis interius admodum læduntur, & cruciantur: qua de re præcipuus huius morbi character non erit aquæ timor, quemadmodum antiqui opinati sunt cum *ὕδρφοβία* appellantes, cum hi non aquam timeant, sed læsionem, & cruciatum internum ab aqua inductum, sed verus character erit ad humidorum assumptionem, vel oblationem magnoperè lædi, & angustiari, adeoq; affligi, ut hæc perhorrescant, & abominentur, ab his se suffocari putantes, ut

*Rabientes aquam abhorreere non ratione vanitioris*

*Rabies verus character.*

hinc

hinc ea fugiant. Quapropter, vt rem concludam, vel in rabie non erit timor aquæ, cum aquam non timeant rabidi homines, immo valdè sitientes eam admodum desiderant: quam tamen, & vnâ cum ea omnia liquida tantummodò auersantur ob læsionem in internis partibus ab eis assumptis, vel oblati excitantur, quam læsionem si sensibiliter, eamq; validam non perferrent, aquam, & omnia liquida ob præsentem sitim libentissimè admitterent. Vel si in rabie aliquis aquæ ponendus est timor, quem succedere ob læsionem, non ob aquam, admitterem, saltem irrationalis, vt omnes sentire, non erit dicendus, immo maximè rationalis erit; cum enim ab ea vel assumpta, vel oblata perferant se admodum cruciari, eamq; ipsis aduersari animaduertant, si eam timent, iure, maximaq; cum ratione timent, non secus, ac sanus homo res virosas, & abominabiles noxam ab eis inferendam animaduertens timeat, auerseturq; cum ei oblata fuerint. hæc de timore aquæ, & omni liquorũ.

*In rabidis an sit aquæ irrationalis timor*

An autem in rabie sit delirium, hoc non rationibus, sed particularibus experimentis est declarandum. Non possum quidem ego negare, me nonnullos vidisse rabientes, qui nõ tantum delirarent, sed etiam furerent. plurimos tamen sciõ mente semper vsque ad vltimam vitæ horam constitisse, cuius meritò non possum delirium huius morbi pathognomicum signum constituere. quòd si à viris grauissimis aliter asseratur, hoc fuit, vel quia huius rei experimentum ipsi non habuere, vel quia tantummodò delirantes rabidi ipsis citrandi se obtulerunt. Ego autem testor me vidisse & illos, in quibus nulla vnquam minima fuit delirij suspicio; immo persuasi ad bibendum dicebant, claudatis mihi oculos, ne videam, & omni conatu conijcite ad intra os aquam, & omnia alia, quæ in potu prodesse possunt. cumq; dentibus frenerent, moreq; canum alios morfu petere ob virus rabidũ cogerentur, precabantur astantes, vt eos validè continerent, ne e manibus eorum ad aliquem mordendum exilirent. eos-

*An in rabie sit delirium.*

deniq; adinonebant, vt ad os eorum manum, vel aliam corporis partem non admouerent, nè ex ea propinquitate cogrentur eos dentibus petere. hos eosdem. propriam miseriam, & calamitatem lamentari noui, conquerentes morbi principiũ non validè oppugnatum fuisse, seque in omnibus Deo maxima cum cõmiseratione commendãtes, ab eo peccatorum veniam, & vitam æternam implorantes audiui. hæc & similia vidi. quibus experimentis plena fide testificor, delirium necessariò rabiem non consequi.

*An in rabie sit conuulsio.* De conuulsione autem, quam author diffinitionum Medicarum ponebat rabiei coniungi. sciendum est rabiem sine conuulsione sæpius videri: in qua tamen rabie distensio neruorum, & membrorum magna adest. distenduntur enim sæpè, motumq; patiuntur pandiculationi similem. quẽ aliqui obseruantes forsã credidere conuulsionem esse, cum tamen conuulsio non sit, sed quædam membrorum distensio violẽta, & nõ continua, similisq; pandiculationi. conuulsionem tamẽ veram in nonnullis etiam noui factam vltimis horis cum maximo dentium stridore, genito ob musculorũ temporalium conuulsionem compatiẽtium ratione cerebri affecti. Singultus etiam est signum non perpetuũ, nec omnibus commune, sed in aliquibus tantũ apparet, & hoc cum pessimè habent, morteq; appropinquante postridie, vel eadem die perituri sunt.

*Lib. 2. prorrbet.com. 17.* Visis symptomatibus rabiẽm consequentibus, ex quibus clara supposuimus, obscura declarauimus; reliquum est, vt prospiciamus, an affectio ista, vt docuit Galenus ex antiquorũ Medicorũ sententia, quam omnis posteritas sequuta est, in intemperie calida, & sicca, solidas hominis partes occupãte, in illisq; in habitum redacta consistat. Opinio hæc, quæ nulla fulcitur ratione, non minimam patitur difficultatẽ; quoniam & sensui, & rationi contradicit. Sensui quidem; quoniam nullus rabientium à proprio habitu, & temperamento ex aspectu inmutatus apparet, cum nec in colore, nec

nec in mole corporis, nec in facultatibus, nec in affectionibus, nec in vllis accidentibus sensibilibus, antequàm rabie incurrant, vllam mutationem subierint. Rationi autè, quoniam ex hoc supposito sequitur, intemperiem inæqualem esse insensibilem, & innocuam; æqualem autem, & heciticam manifestè dolorosam, & sensibilem esse. Cuius tamen oppositum Galenus ipse docuit, experientiaq; dicat, à quibus habetur, quòd, dum fit alteratio, persentitur id, quod alterat, cum autem alterata sunt corpora, & intemperies est in habitu, nec sensus, nec dolor adest; cuius meritò hecici, nec febrile se sentiunt, nec ex ea dolent. Nec si dicas, intemperies ista sensim introducit; idèò, quamuis inæqualis existat, indolens est; cum ea, quæ dolorem inuehunt, confertim agere debeant, difficultatem tolles; quoniam licèt nò esset dolor, esset tamen aliqua sensatio, illius permutationis; quoniam etiam in his, quæ sensim sunt, licèt omnis absit dolor, tamen aliquis est sensus illius alterationis in corpore. Vnde qui ex intemperie frigida ad calidam sensim transmutatur, temporis processu se calidos sentiunt; at homines rabientes, nec dum ad eandem disponuntur, nec dū eadem corripiuntur, vllam talem sensationem persentiunt. præterea vbi in corpore humano introducta est aliqua intemperies insignis, eiusdem signa adsunt; nulla autè huius in tali casu indicia intemperiei reperiuntur. His alteram addo rationem manifestam. si hæc affectio in intemperie calida, & sicca consisteret, possent patientes per refrigerantia, & humectantia, sicuti per balneum aquæ frigidæ, præseruari. quod nedum est falsum (cuius ratione in præseruatione nulli scribingentium eius meminere) verum, etiam totum oppositum operatur; cum per id venenum hoc introcludatur, & ad intimas partes violentius impellatur, sicuti omnia refrigerantia exterius applicata hoc idem facere possunt. Quare intemperies hæc à rabie excludatur, & quemadmodum hæc, pariter & reliquæ omnes, quæ minorem analo-

giam ad rabiem habent, non admittantur in casu isto, tanquam ex, in quibus rabiei essentia consistat.

*An rabiem febris cōcomiteatur.*  
 Febrem validam concomitari rabiem, nonnulli docuerunt; alij parvam, & minimā dixerunt, ceteri autem nē huius quidem meminere. Non ratio, sed experientia discriminē hoc dirimere debet. Quidam commorsus à cane rabido ulcere iam sanato, in remediumq; veneni nullo adhibito præsidio, nisi pane, & aqua benedicta, vti consuevere vtplurimum nostri homines facere, à quodam sacerdote assumpta, exactis duobus mensibus, passus est ex vehementissimo ictu contusionem ingentem in imo ventre; hinc cum malè haberet, febre valida deprehensus est, simulq; paulò post rabiē correptus tertia die delirans, furens, & insigniter febricitans, omniaq; symptomata rabientium patiens, misèrè vita functus est. Mulier quædam cuius historiam inferius enarrabo, semper cum hac affectione febricula detenta est usque ad mortem. Reliquorum rabientium, quos ego viderim, neminem sensi vlla conflitari febre, nec huius adesse suspicionem, nē dixerim signum, observavi. Hinc colligo rabientes ratione proprii virus non febricitare; si autē aliquando febriant, hoc ex corporis prævia altera indispotione fieri.

*Rabida animalia ultra mortem an per aliam viam possint virus cōmunicare.*  
 Animalia rabida per morsum homini proprium virus cōmunicare, omnes tradiderunt. an autem alia via eundem inficere possint, non ita constat. Quidam sensere canis rabientis salivam, si humanum corpus tantum contigerit, rabiem excitare posse, quod tamē nequaquam verum est, nisi aperta, fissæ cuti non enim venenum istud eius est efficaciæ, ut per solum contactum hominem cute integra inficere queat: immo in aliquibus hoc est adeò debile, & segne, ut etiam per morsum non possit cōmunicari. hinc vidimus multos à cane rabido commorsos, qui etiam nullo auxilio evasere, & à rabie præservati sunt. non enim omnes, quos petit canis, rabiem incurrunt, sed eos tantum, quorum ulcera mol

ra saliuâ madefecerint, incidere in hanc affectionem ex patientium relatione obseruavi, cum enim virus hoc segne sit in penetrando, & in agendo, similiter, nisi notabilis sit quantitas (quoniâ etiam deleteria pharmaca in minima quantitate nihil lædere, sicut nec scintillæ ignis urere possunt) vlceri non ita adhærere potest, vt altius permeare queat. hincq; multi à cane rabido commorsi nulla cum difficultate saluantur; illos autem, nisi valida administrentur remedia, vix præseruare queas. Quod saliuâ ista per vlcus aperta cuti facere potest, idem efficacius aget, si quis eam delibauerit. vbi enim labia, vel linguam tetigerit, facillimè penetrando rabiem introducet in hominem, ex quo casu narrat Hieronymus Cardanus Patritiū Mediolanensem rabidū euasisse, cum rabientem canem, quem suffocandū destinauerat, osculasset. Ex consimili causa notat Cælius Aurelianus, Sartricem quandam, cum vestem à rabido cane cômorsam ore, & lingua ad eam sarcindam contrectaret, hunc morbum incurrisse. quod non ex alia potuit fieri causa, quàm ex spuma pânno immixta, & ab ea delibata. huiuscemodi autem patientes, licet citissimè validissimis curentur antidotis, & medicamentis, vix mihi persuadere queam, præseruari posse. quod tamen nequaquam impossibile esse attestor, cum etiam aliqua nouerim antidota, quæ deteriora, & validiora venena superare possint. hoc tantum sit dictum, vt patientes, Medicique manifestum, & imminens conspiciant, & animaduertant periculum. An autem ex solo afflatu canis rabidi, & ex eiusdem solo contactu, & contrectatione possit homini cõmunicari rabies, vt notat Cælius Aurelianus, dixerim, me contactum, & contrectationem solam ad hoc impotentè existimare, qui nouerim sæpè eiusdem morsum ad hoc peragendū inualidū fuisse. Inspirationē autē nō ita facile excludo, cū huius virus possit tanta esse analogia ad cerebrū, vt ex sola inspiratione, & odoratu ei labes ista impartiri possit, cuius tamen rei yllam nec vidi nec audiui experientiam.

*Rabies per saliuam ore delibatam communici potest.*

*Rabies an per solū contactū, vel afflatū possit cõicari.*



*Rabies quare  
tardat à mor-  
tu per menses,  
& annos.*

Hoc virus per morsum homini communicatum adeò se-  
gniter agit, vt perniciem, quam illaturum est, non ita citò  
proferat, ac manifestet. hinc aliqui ad dies plures, alij ad  
menses, aliqui anno exacto rabie corripiuntur, in nonnullisq;  
proditum memoriæ ab antiquis habemus, hunc morbum ad  
quintum, septimum, & duodecimum annum dilatum fuisse.  
cuius rei si ratio perpendenda est, hæc erit. Venena delete-  
ria, & quæ toto genere humanæ naturæ aduersantur, à calo-  
re nostro vnquam nec euinci, nec superari possunt, sed vel  
hausta, vel eiaculata in corpore humano existentia semper  
agunt, vitam oppugnantes, in perniciemq; tandem hominē  
ducunt. Actio ista aliàs citò, aliàs tardè perficitur. huius  
diuersitatis ratio ex duobus pender, videlicet vel ex violen-  
tia, seu imbecillitate agentis, vel à fortitudine, seu debi-  
litate patientis. Ratione agentis nouimus idē venenum,  
modò suam actionem citissimè, modò longo tempore ede-  
re ex eiusdē violentia, vel maiori, vel minori; hinc videmus,  
si sub sole ardenti, media æstate, vigente Canicula, quis à nō  
cicurato aspide percutiatur, statim interire; qui idē si hyber-  
nis tēporibus cicurato existente aspide feriat, tardè peri-  
bit. hoc venifici agnoscentes venenū id, quod velociter, pau-  
cisq; horis, vel diebus hominem enecare posset, ita præpa-  
rant, vt idē remissa eius violentia longiori tempore effi-  
ciat. Ratione patientis, multos nouimus, qui eodem assum-  
pto veneno, diuersis temporibus extincti fuerunt; quoniam  
ad omnem actionem patientis dispositio requiritur, cuius  
merito imbecilla corpora citius, fortia tardius à veneno ne-  
cantur. His stantibus dixerim, cum ex sui natura virus rabi-  
dum in agendo segne sit, nullo pacto ex morstu posse citò  
agere. cur autem in aliquibus citius, in alijs autem tardius  
rabiem introducat, hoc ex patientis dispositione fieri asse-  
ro. huius merito eorum, qui ab eodem cane cōmorsti sunt,  
alios vidimus duobus, alios quatuor mensibus, alios tar-  
dius rabie correptos fuisse; quoniam illi imbecilliores, isti  
fortiores

fortiores existentes pro ratione dispositionis virus admiscere. cum autem quædam corpora à natura robusta sint, partesq; solidas ita formatas habeant, vt faciliè externis resistent causis, si his communicatum sit virus istud, quod sui natura segne, & tardum est in agendo, actio eius diu in eisdem protrahetur. cui si forte addatur, quòd victu hi vtantur, qui venenum hoc hebetare possit, eiq; resistere, sicuti est vsus vinorum potentium, radicum, & herbarum acriorum, gulæ indulgentia, & satietas, in his per multum temporis potest tardari rabies. quoniam cum venenū semper aliquid malè disponendo agat, sed robore corporis, & victus ratione reluctante ulterius progredi non ita faciliè queat, res ad actum vltimum non, nisi per multum temporis spatium, deduci poterit. vnde in his, & per menses, & per annos poterit tardari rabies: quæ tamen, nisi virus illud potentibus, & validissimis antidotis superetur, ineuitaliter succedet; quoniam hoc venenum vi naturæ nec excludi, nec expugnari potest, sicuti & cætera deleteria, quæ nunquā à calore nostro superantur: cuius ratione nec è corpore ex naturæ operatione excernuntur, nec quò ad facultatem virulentam euincuntur.

Virus istud, quod in tot generibus animantium procreari, hominiq; per ea impartiri nouimus, considerandum est, an in homine ipso, nullo extrinseco accedente contagio, à principijs internis fieri possit. Dictaret ratio quidem, cū omnium assensu venena deleteria in homine generari possint, etiam hoc virus non excludendum esse, non magis distante homine à fera, & serpente venenum ei aculante, quàm ab animalibus, quæ in rabie procliua sunt, immo maiorè cum his, quàm illis, analogiā habente: tamen cū nulla antiquorum auctoritas hoc attestata sit, qui semper rabie ex contagio, non spontè homini accessisse docuerunt, nō videtur hoc ita faciliè admittendum esse. Si tamen experientia difficultatem istā dirimere potest, dicam, quid viderim ipse in particulari casu,

*Rabies à principijs internis an in homine generari possit*

su,

fu, quem nunc explicabo. Mulier annum agens trigessimū sextum, febre languens me ad eam curandam accersuit; inuenio eam febre pestilenti detentam, curationem aggredior, sanitatiq; restitutam die vndecima eam relinquo. totidem diebus interpositis dysenteria admodum dolorosa, addita febre, affligi caput. me iterum aduocat, morbum oppugnare incipio, septemq; diebus morbum supero. febri cula quædam remansit, quam cum curare delibero, superuenit mulieri maxima omnium liquorum auersio, tantaq; ut non modò, quæ ipsi offerenda erant tum medicamenti, tum cibi ratione, perhorresceret, & abominaretur, sed etiā, ut astantes (nam media erat ætas) etiam bibentes coram ea sustinere non posset. hanc rabie correptam ex hoc solo symptomate deprehendi, quod adeò deinceps auctum fuit, ut nihil admitteret, etiam in thalamo, liquidi asportandum esse. & non modò potum simplicem, sed etiam omnia cibaria liquida abominaretur. cumq; solida alimenta ratione febris, & longitudinis morbi non ita faciliè admitteret, in virium prostrationem delapsa est; non tamen citò periit, sed ultra septimam producta est à die, in quo humida auersari caput, octauaq; die defuncta est. in qua muliere nullum aliud symptoma ex his, quæ retulimus cōcomitari rabidos, fuit, præterquàm liquorum omnium auersio, menteq; semper constitit. nec de vllò vnquam conquesta est, nisi cum liquida admonerentur. quo tempore adeò affligtabatur, ut horrendum quid esset ipsam conspiciere. reliquo tempore semper quieta fuit, interrogataq; à me, an vnquam à cane rabido cōmorfa fuisset, certò affirmabat, nunquam se à cane nedū rabido, sed nec etiam sano tactam fuisse. cum nec domi vnquam canem educasset, nec externis vnquam communicasset. Mater autem præsens interrogata à me, an meminisset filiam, dum puella esset, & in ætate infantili, cuius ratione ipsa non recordaretur, vnquam commoriam ab vllò cane, attestabatur certissimè filiam nihil tale vnquam passam

fam fuisse. Quare hinc dubitare cæpi, an homo à principijs internis posset rabiem incurrere. cum enim hic de contagio nihil constaret, hydrophobiaq; ista non esset coniuncta cum his symptomatibus, quæ rabidos homines à rabientibus animalibus cômorfos concomitari consuevere, suspicatus sum factum esse à causa interna, & cum non fuerit communicata à furente, & rabida bellua, idè eam extitisse cæteris mitiorem: nisi dixerimus remissam fuisse eius perniciem ob antidota assumpta in curatione pestilentis febris, & propter notabilem prauorum humorum in dysenteria excretorum euacuationem. Vltra hanc experientiam ad idem suspicandum me persuadebat Cælij Aureliani authoritas, docentis certò fieri nonnunquam in homine rabiem absque manifestâ causa, Soraniq; historia narrantis se vidisse infantem vbera expauescentem nullo præcedente contagio, ad hoc idem arbitrandum me admonebat. Quid tamen in hac re sit sentiendum, certòq; affirmandum, ego non decernam: sed cæteri his propositis, animaduertant, iudicentq; an homo à causa interna, nullo accedente cõtagio, possit ex se rabiem incurrere.

His ad declarandum huius affectus essentiam præhabitis (ex quibus pateat, rabiem, nō timorem aquæ irrationabilem esse, sed affectionem præternaturalem à uiru rabidi animalis ex proprietate agente concitatam vnà cum auersione liquidorum omnium ob læsionem ingentem, quam iisdem assumptis, vel oblati perferunt patientes) reliquum est, ut ad curationem descendamus, eiusdem signis prius declaratis, & expositis. non cogniti enim morbi nulla fidelis, & opportuna potest esse curatio. Signa hæc in triplici sunt differentia; alia futuri, alia præsentis morbi sunt, alia vel salutem, vel mortem prognosticantur. Per hæc signa futurâ rabiem in his, quos cômorfos nouerimus à rabido animali, deprehendemus, videlicet, ubi in patiente insolita fuerit anxietas, impotentia ad omnem actionem, iracundia, siue causa,

*rabiei futura  
signa.*

causa, stomachi vellicatio, mentis conturbatio, timor sine ratione, somni perturbati, aquarum abominatio, pluraq; alia similia accidentia. Sed ultra hæc signa vnum ego præcipuum, & infallibile animaduerti, quod omnibus ignotum ex minima huius rei experientia fuisse credo. & hoc signum est dolor quidam in loco iam cōmorso, licet vlcus antea per dies, & menses integrè fuerit sanatum, accedens, qui intentus esse non consuevit, nisi morsus partem nervosam petierit. hic dolor à loco iam cōmorso incipiens, leuiterq; patientem affligens per partem post partem spatio trium, aut quatuor dierum, aliquando paulò plus, aliquando paulò minus, ascendit ad cerebrum: cui cum communicatus fuerit, in eo quasi vertiginem causat, simulq; confusionem quandam, quorum merito modò ad hanc partem, modò ad illam declinantes recta progredi nequeunt, indeq; statim in rabiem homo deducitur. hoc signum animaduertant hi, quibus qd feruntur cōmorsi à rabiente bellua: quoniam tunc res est in præcipiti casu, de proximoq; perniciës, quæ latuerat, propalanda est. & si prædicta omnia cōiecturam futuræ rabiei inducere possunt, hoc vnicum præ omnibus certam imminere declarat. Quæ ubi accesserit, omnia iam enarrata superius signa ipsam præsentem demonstrare possunt, quæ cū iam sigillatim explicauerimus, dum rabiem hominis perscrutaremur, hic non erunt repetenda. hoc vnum tantum dixerò, quòd facta rabie manifestò patientes aquam, & omne liquoris genus abominantur, ac fugiunt. & ab his tum asumptis, tum oblatis summopere læduntur. hicq; est præcipuus character, quo dignoscere possumus certò factam esse, & confirmatam rabiem. Quo tempore solent ut plurimum omnia excrementorum genera retineri. In vno tamen vidi ego excretam maximam, & ingentem vrinæ copiam sine villo ægrotantis sensu. Dum hi comedunt, cibariaq; solida assumunt, licet quoquo pacto difficulter degluriant, auidè aliquando comedunt. Vidiq; aliquos simul carnes, & ossa apprehen-

*Rabiei præsentis signa.*

apprehendere, & conterere, & ita facilè esitare, vt profectò non adeò facilè canes ipsi ossa edant. Arabes alterum addidere signum confirmatæ rabiei, videlicet, vrinam nigrā, in qua excernantur carunculae, quæ viuas canum imagines repræsentent. Quòd hi vrinam mingant nigram, non possum ego attestari, qui viderim lotium in multis à sanorum lotio parum immutatum, in aliis autem immutatum quidem, sed non nigrum, Quòd autem in lotio istorum appareant viuæ canum imagines, credo meram fabulam esse, remq; poetis, non medicis dignam. omni enim diligentia adhibita hoc esse mendatium comperi; cum nec carunculas, nec imaginem aliquam vnquam perspexerim, nec alios, præter Arabes, hoc vidisse audiuerim. quapropter problema illud, in quo quæritur, quomodo in laborantibus hac ægritudine possit excerni lotium, in quo canum imagines appareant, mea sententia Medico, & Philosopho indignum est. Medico quidē, quoniā cū ipse artifex sit sensatus, nec sensu hoc deprehendatur, huius causa ab eo quærenda nō est. Philosopho autem, quoniam hic veritatem, non fabulas, indagare debet. Signa prognostica proponenda pauca erunt, quoniam duo solum pro prognostico sunt animaduertēda, videlicet, an tantum sint præludia futuræ, & imminentis rabiei, vel an sit iam rabies ipsa facta. Stante priori casu speranda est salus, possibilisq; est curatio, si morbus validis, non leuioribus oppugnetur medicamentis. quoniam nondum in totum virus istud membra expugnauit principalia, quæ vbi occupauerit, perniciemq; suam propalauerit, eius sum sententiæ, vt etiam sensere nobiliores artis nostræ proceres, impossibilem esse curationem. quam tamen vix apparente morbo tentandam censeo; cum eo tempore, dum incipit, nondum confirmata in totum sit labe ista; confirmatam enim remedijs nec oppugnari debere, nec expurgari posse, opinor. Si autē Dioscorides testatus est Eudemū vnicū hoc morbo laborantem curasse, Themisonemq; medicum

*Urina rabientium an sit nigra, et an in ea sint carunculae canibus similes.*

*Rabiei signa prognostica,*

ab hoc



ab hoc eodem euasisse, dum hæc vera existant, inter admiranda opera, & quæ supra hominum vires sint, adnumerentur. cum enim ab eò tempore citra per tot sæcula nullam habuerimus historiam attestantem, confirmatam rabiem sanatam fuisse, in dubium mihi renocatur de fide horum scriptorum. Quod si verè hi ex hoc morbo saluati sint, in eà eo sententiam, vt incipienti, non progresso morbo, reluctatū sit. Themisoq; faciliè potuit euadere, cum ex leui contagio (non enim à cane cōmorſus fuit, sed tantū amico rabienti cōmunicauit) in hunc incurrisset morbum. Noui quidem Scribonium Largum meminisse cuiusdam Barbari, qui in insula Creta mercede publicè accepta, cum hi liquores ab horrerēt, & latratus ederent, spāsmoq; vexarentur, remedium brachio sinistro alligato adhibebat, ita vt in posterum potionem acciperent, & vitio liberarentur. Sed cum ipse hoc pro verō non attestetur, immo dicat hanc fuisse opinionem, quæ ad eum peruenit, in eadem persisto sententia, vt progressum, & iam factum morbum nullo pacto ars nostra expugnare possit. Signum illud ab Auicenna positū, quod in eis patientibus, qui propriam imaginem in speculo cognoscant, curabilis sit affectio ista, fallax deprehendi. qui enim non sunt delirantes, se ipsos agnoscent, & tamen ex confirmata rabie non saluabuntur.

Positis signis, curatio superest declaranda: quoniam autem præseruatio est quædam curatio, ideo ab hac auspicati, ita rem istam ordiemur. Virus suum homini animalia rabida duplici via communicare docuimus, videlicet vel per morsum, vel per contactum linguæ, & labiorum. Vbi morsu animal rabidum hominem petierit (quoniam non omnis morsus, vt superius innuimus, hanc luem impartitur) statim experiri debet Medicus, an per hanc virus istud sit communicatum, nec nē: quod percunctabitur, si nuces iuglandes optimè tritas, vel micas panis, vel triticum cōmansum vlceri imposuerit, postridie autem pullis gallinaceis edenda præbuerit

*Rabiei præseruatio, cum per morsum communicatur.*

būctit : si virus vlceri impartitum fuerit , ex his intereunt pulli ; sin minus , nequaquam morsus fuit virulentus . si tamen morsus fuerit prævalidus , carnesq; plurimum lacerauerit , vel si partem neruosam ( per neruos enim facilius hoc virus suscipitur ) tetigerit , licet in eo minima morsurę vestigia appareant , coniiciendum est absque vlllo experimento virus illud vlceri per contagium inharere . Hoc cognito vel ex medici coniectura , vel experimento , duo præcipuè agenda sunt . primum omni conatu eniti debemus , vt venenum illud à vulnere extrahatur , antequàm altius penetrauerit . secundum , vt partes internas ita muniamus , & defendamus , vt venenum à se propellere , & superare possint . & si qua eius pars p ambitū corporis præpagata sit , à partibus principalibus reuellatur , & educatur . Quibus autē medicamentis ambo hæc sint peragēda , Dioscorides , cæteri q; aucthores , qui in hac curatione plurimi fuere , adeò perfectè , & diffusè explicauerunt , vt superfluum esset ea omnia hic repetere . pauca tamen rem ipsam perstringens referam , & ea præcipuè , quę ego in tali curatione expertus sum . Pro prima intentione vlcus non consolidandum , sed dilatandum est , attrahentibusq; medicamentis exasperandum ; ità enim agentes virus illud euocabimus , dissipabimusq; . pro dilatione , vbi vlcus sit angustum , circuncidatur caro , pro attractione : fiunt scarificationes , & applicentur cucurbitulæ : quibus peractis , imponatur vlceri Theriaca oleo rosaceo eliquata , vel Diadictamuni , vel Cerine , quæ potentissima sunt in tali casu . Si tamen locus toleraret , coniecturaq; sit certa de communicato viru , statim inuratur vlcus candenti ferro . hinc erim vlla absque difficultate omnem venenositatē superabimus , vlcusq; deinceps tutò consolidare poterimus . Si autē locus cōmorsus , vel æger vñtionem ( quod sæpe contingit ) non admiserint , prædictis agatur , vel saltem vlceri ad eandem intentionem applicetur emplastrum à Dioscoride desumptū , quo frequenter vsus sum cum felicissim

mo

mo successu in pauperibus, & corporibus durioribus, & in his etiam, qui chyrurgicam manum non admittunt, ex allio, cepa, & granis tritici cōmansis compositum. hoc attrahit, euocat, & exasperando etiam vlcus dilatat. quoniā tamen aliquando est valde dolorosum, interpositis diebus repeto, vel diluo cum oleo de hypericone, vel lumbricato, vel simili, extracto, & euocato veneno: quod conijcio tum ex experimentis supra expositis, tum ex appositione medicamentorum. vltra Diadictamum, & Cerine interdū vsus sum medicamento Galeni ex pice, opoponace, & aceto, vt hinc diutius apertum detineatur vlcus, & vt si quid eius virus forsan latuerit, in totum absumatur. hac ratione per tractandum est vlcus, moneoq; , vt nullo vnquam pacto negligatur. Si enim hoc rectē curatum fuerit, nihil indē erit timendum. hęc enim est præservationis potissima pars, tantaq; , vt neminem viderim, nec audierim, cuius vlcus recta cum ratione fuerit pertractatum, rabie correptum fuisse. Pro secunda intentione, & medicamentis opportunis, & recta victus ratione agendum erit. Victus ratio ea sit, quæ venenū refrangere, & hebetare possit, & quæ idem ad viscera penetrare prohibeat. Vndē vinū potens, & dulce, radices aciores, vt alliū, cepa, porrū, raphanus, smirniū, olera acra, semina odorata, sinapi, aromata, cancri fluuiales, caricę, nuces iuglādes, amigdala præcipuē amara, & similia in vsum veniant; cibus & potus sit copiosus; fames, & ieiunium, & omnia, quæ corpus exinanire possunt, vitentur; caueantq; a tactu, & vmbra earum plantarū, quas diximus virus istud longa testante experientia excitare posse. Medicamēta sint antidoti, quarū plurima est sylua apud scriptores, ad quos legentes relego, inter quas Theriacam omnibus præfero. cuius in hoc casu frequentem, & sælicissimum habeo vsum. Mithridatum etiam optimum erit. Gentianam sæpe exhibui, hisq; propinatis aliud medicamentum non desideravi. Cancrorum fluuialium, qui adeo in morsu rabi-

do

do ab antiquis celebrantur, vt his primas attribuant, vsum nec habui, nec vidi, cæterasq; antidotos vel antiquas, vel nouas nunquam expertus sum. Ea autem, quæ à propria substantia agere dicuntur, sicut hepar, vel dens canis rabidi, experiri non potui; cumq; hæc ex Galeno suspecta haberem, abominarerq; nec quæsiui, nec inuestigauī. Sanguinis misio, quam nonnulli in tali casu proponunt, omnino vitanda est, vt quæ exinanitis venis altius penetrare virus permittat. Purgatio autem, quam alij laudant, inconsultò, ac sine methodo iniretur. cum enim humores nondū labe ista sint coinquinati, nulla datur iudicatio, vt eos euacuemus. quos tamen si qui audaces euacuare tentauerint, nouerint etiam maiorem veneno penetrationem dedisse, & vi medicamenti ad internas partes virus illud attraxisse. & hæc de cōmorsis ab animanti rabiente, qui statim medico se curandos exponat. Cuius si oppositū contigerit, videlicet quòd tardò, diebusq; pluribus transactis, & forsā mēsisbus, vlcereq; adhuc aperto medicos consulant, amplius nec vlcus inurendum, nec scarificationibus, cucurbitulis, emplastrisq; nullis exasperandum est; iam enim virus penitiores partes adiuit, ægerq; nullo modo ex illis cruciaretur. Monco tamē, vt in partis cōmorsæ loco opportuno fiat exulceratio, vel actuali, vel potēiali cauterio, quæ diu aperta teneatur, per cuius continuatā euacuationē possumus aliquā sperare virus & euocationē, & vacuationē. Vnde pars cōmorsa nō ita patietur, vt cōdolens faciliè altius suū virus communicare possit. Quòd si vlcus fuerit consolidatum, eò magis hæc exulceratio fiat, tuncq; validissimis antidotis agendū erit, purgationesq; validæ maximè cōferre poterunt, prius præparatis rectè humoribus peccantibus. concoquentia sint ea, quæ retulimus in curatione febris pestilentis; medicamenta autem purgantia sint validiora, qualis est hyera diacholochintidos, hyera logodion, pillulæ cochix, pillulæ de vitro, pillulæ de lapide lazuli, pillulæ fætidæ, & omnes, quæ

*Lib. I I. de  
simpli. med.*

*An in præser-  
uatione à ra-  
bie sit secunda  
vena.*

*An in præser-  
uatione à ra-  
bie sit purga-  
tio tentāda.*

*Purgatio quæ  
do conferat in  
præseruatione  
à rabie.*

gummata recipiunt. omnium tamen horum validissimum, & vtilissimum medicamentum est Elleborus albus, de quo inferius agam. repetantur hæc euacuationes. & ad euacuandum venenum cum his veniant in vsu frictiones asperæ, sinapismi, dropaces, exulcerantia, sudorem prouocantia, & omnia ea, quæ venenum ab internis euocare queant. An hic venæ sectio, sicuti pharmacia, conueniat. ego, qui in omni veneno siue hauſto, siue eiaculato semper venæ sectionem abhorreo (vt quæ vires debilitare, venenum exagitare, eiusque violentiam, & venenositatem non refringere potest) hæc euacuationem vitandum censeo, & eò magis, cum notum sit vîrus hoc rabidum: quod adeò segne, & tardum est, vt multo tempore egeat ad suam proferendam perniciem, & virulentiam, non ad spirituosam partem cõtentorum, sed ad crassam (qualis est pituita, & melancholicus humor) analogiam quandam habeat. & hæc de cõmorſis, dum adhuc non adsunt signa instantis rabiei. Si autem huius indicia accesserint, hic non segniter agendum est, sed raptim ad validissima deueniendum. quare hic adhibitis frictionibus asperis, sinapismatibus, dropacibus, præcipuè autem exulcerantibus, quæ potissimum ex cantharidibus formentur, cum in tali morbo multum celebrentur, & prodesse possint, exhibeantur antidoti magnæ, quæ in dupla ad minus. sint quantitate eius, qua vitimur in præseruatione prima. Vnde vel mithridati, vel Theriacæ non minus, quam duarum drachmarum pondere, exhibeatur cum vino potentissimo dilutæ. repetaturq; singulis diebus summo mane, ante cenam Gentianam, vel aliud opportunum medicamentum, exhibendo. si quid tamen in tali casu prodesse poterit, hoc vnum erit Elleborus albus ab antiquis valde celebratus, qui admirandus est in hisce affectionibus. quare statim, nulla interposita mora, administretur, & exhibeatur, prius tamè ad hunc quoquo pacto corpore præparato. Quoniam autem huius celeberrimi medicamenti serè obsoleuit vsus, scioq; plurimos

Elleborus al-  
bus.

plurimòs Medicos nostrorum temporum auctoritate quorundam Arabum deterritos ab eo, tãquam à veneno, abhorrere, hic de eo verba facere decreui, vt omnes moneam tutò in pristinum vsum reuocari posse. quod meo periculo tẽtaui, felicemq; eius vsum comperi. Cum enim viderim diuinum Hippocratem, artis nostrę fundatorem, huius medicamenti quotidianum habuisse vsum, Galenumq;, eius sectatorem eodẽ vsum fuisse, ceterosq; antiquos scriptores hunc summopere celebrare, admirabar, quare nostris temporibus ad purgationes à Medicis non admitteretur; cum hodiẽ idem sit cœlũ, quod Hippocratis, & Galeni, aliorumq; ætate fuit, eademq; sint humana corpora, ijdemq; morbi vapentur. quo stante, quid causę esse potest, vt homines nostri hoc idem medicamentum hũc temporibus tolerare nõ possint? hac ductus ratione data occasione ausus sum eo vti. sed nè nouitate rei deterriti homines hoc auerterentur, incipi primò eius infusionem exhibere. quam cum profecisset, nullo subsequente incommodo, comperissem, cepi eius decoctionem. feliciter propinare. tandem nullo deterritus exemplo eundem in substantia, & in puluere comminutum administravi, experientiaq; testante, noui hoc medicamentum utilissimum esse, omniq; periculo suffocationis, ceterorumq; accidentium ipsi ascriptorum, si rectè præparatum exhibeatur, carere. Hanc præparationem, & modum exhibendi, quo ego vtor tum in infusione, tum in decoctione, omnibus patefacio. Accipio drachmam radicis Ellebori albi electi, & optimi; quibus notis hoc deprehendatur, à Dioscoride, cæterisq; hanc materiam tractantibus habeatur, infundoq; in cyatho vini albi potentis, quod ad ignem calefacio, & per totam noctẽ quiescere sino. Summo mane vinum calidum exhibeo. hoc idem per acetum mulsum, in quo Elleborus per diem, & noctem ad Galeni imitationem infusus extiterit, facio; hoc. n. leniter purgat. si validius medicamentum desidero, eundem in simili quantitate vini

*Elleborus quomodo exhibendus in infusione, decoctione, & in substantia.*



bullio, postea hoc vinum reijcio. alterũ superinfundo, quod iterum bulliat, per noctemq; ita maneant. summo mane vinum hoc colatum exhibeo. si autem adhuc potentius desidero, vinum illud primum non reijcio, sed ex eodem factã decoctionem assumo. Vbi verò maiori efficacia, & robore indigeo, Elleborum ipsum hac ratione præparatũ adhibeo. Collectis radicibus Ellebori albi, nostrate autem, quod non ita, vt externum, est validum, à quibusdam ministris hoc modo præparato vtor, purgatisq; à terra, & ab omni superfluitate, acetum album optimum assumitur, in quo eadem radices decoquantur. quod vbi parum ebullierit, reijciatur, nouumq; superinfundatur, iterumq; in hoc illamet radices decoquantur, quæ vbi molles ex coctione fuerint, satiq; coctæ appareant, percolentur, supra pannum in tabula extendantur, ficcariq; sub vmbra sinantur. hæc ficcata in puluerem, non tamen admodum tennẽ, cõminuuntur. cuius si drachma, vel paulò minus exhibeatur, adeò copiosam per vomitum educit materiam, præcipuè autem pituitosam, vt sit mirum, nulloq; ferè tentat patientes incommodo, præterquàm eo, quod consueuere egrotantes in simplici vomitu pati. animaduertatur autem in huius exhibitione, quòd semel exhibitus in vehementibus morbis parum prodest. sed si interpositis tribus, aut quatuor diebus, vel paulò plus repetatur, adeò potenter rebelles humores educit, vt etiam ferè insuperabiles morbos soluat. Hoc vtor, habita semper ratione habitudinis subiecti (nam in debilibus, timidis, & extenuatis corporibus, & etiam in his, qui angustum thoracem, & iccirco pulmonem compressum habent, tale vitandum est medicamentum; quoniã hi & ad uomendum omnium sunt ineptissimi, & ex vomitu in periculum disruptionis eorum vasorum, quæ in instrumentis respirationi inservientibus sunt, deducuntur) in maniacis, melancholicis, & his, qui à spiritu malo detineri existimantur, & in cerebri antiquis passionibus, quæ per consensum

*Ellebori albi  
usus.*

sensum partium inferiorum factę sint, vsus sum in quartanis, & cæteris similibus morbis, in quibus prauæ fuerint ventriculi, & hypochondriorum à copia materiæ antiquę indispotiones, quas aliquando vnica exhibitione solutas vidi. in his tamen omnibus ante pharmaci exhibitionem materiæ peccantis præparationem procuro, aluumq; valdè lenio: euacuationis tempore vomitum, vbi sit difficilis, iuribus pullorum pinguibus oleo addito, bis & ter ipsdē repetitis modò à cibo, modò ieiuno existente ventriculo, facillè red-  
do. Quod idem pharmacum in thoracis affectibus semper vitauī, ab omnibusq; pariter vitandum duco, nam hoc ex se difficultates spirandi causat, & suffocationis periculum in aliquibus minari videtur. ex quibus liquet, quantum tho-  
raci elleborus infestus sit. vnde nec in tussibus molestis, nec in sanguinis reiectione, nec in vlcere pulmonis, nec in suffo-  
cantibus morbis, nec in Asthmate ipso, licet Auicenna in hoc affectu contra veterum dogmata, & aduersus rationē hunc probet, nec in alijs pectoris morbis exhibeatur. super-  
næ enim euacuationes his affectibus, vt monet Oribas. lib. 7. collect. Med. cap. 26. ex Rufo Ephes. infestæ sunt, & præcipuè quæ ex elleboro fiūt. Quod idem Aet. lib. 3. cap. 121. expresse habet, & Paulus lib. 7. cap. 10. sub nomine morborum suffocationem minitantium docuisse videtur.  
Hoc igitur medicamentum, habita prius & morbi, & su-  
biecti ratione à medicis, in pristinum reuocetur vsus, appa-  
rentibusq; instantis rabiei signis, statim exhibeatur, interpo-  
sitisq; paucis diebus, vt dixi, repetatur. quo si non super-  
etur morbus, res in angusto est posita, cum nulla spes in alio  
medicamento maior, quàm in hoc, reponenda sit. Hæc re-  
media, quæ apparentibus rabiei signis, administranda do-  
cuimus, statim eadem in his, qui labijs, vel lingua virus hoc  
delibauerint, agenda erunt. nam hinc morbus subito im-  
minet, qui non mensibus, sed paucis diebus propalandus  
est. hæc de præseruatione instantis, non instantisue rabiei.

*Rabiei præse-  
ratio, cum vi-  
rus per labia,  
& linguā fue-  
rit cōicactū.*

curationem ipsam nunc aggredior.

*Rabiei facta  
curatio.*

*Balneū aquæ  
dulcis an sit  
conueniens re-  
medium in ra-  
bie, & eiusdē  
potus.*

Superueniente ipsius aquæ, & omnium liquidorum auer-  
sione, facta est rabies, morbusq; grauissimus euasit, qui adeo  
læthalis est, ut ni ope Diuina saluentur ægrotantes, auxilia  
humana incassum ab his imploranda esse censeam. Vnicum  
tamen propositum est ab antiquis ad hoc remedium; vide-  
licet aquæ dulcis balneum, eiusdemq; potus. quo eorum au-  
thoritate fretus aliquandò expertus, nullam in eo vtilitatē  
inueni. immo cum plurimum huius nonnulli potassent, plu-  
rimum etiam detrimenti hinc eos consequutos noui. quam  
rem cum accuratè perpenderem, ratio, & frustrata experiē-  
tia me vanum esse remedium istud, credere coegerunt. quæ  
enim potest esse causa, ob quam rabidi à copioso aquæ po-  
tu iuuentur? num quia cum hic morbus positus sit in intem-  
perie calida, & sicca, hæc intemperies facilè à copioso po-  
tu extinguatur? at declaratum est, hunc morbum non in in-  
temperie consistere, nec tantam caliditatem, ac siccitatem  
in rabidis deprehendi posse, quam, si ea etiam adesset, cum  
sit in habitu, hecticaq; facta sit, vnico potu solui non lice-  
ret; sique hoc aliqui de caliditate existimarent, tamen quò  
ad siccitatem impossibilis curatio est iudicanda. Et si po-  
tus aquæ solus posset morbum hunc factum superare, quan-  
tò magis cōmorfos præseruare valeret, cum multò facilius  
sit, intemperiem inæqualem, quàm æqualem, remouere? at  
nec ad præseruandum balneum, seu potus aquæ est potens  
remedium, nec ad curandum, immo cum ingens antipa-  
thia sit inter aquam, & virus istud, ut suprà monstratū est,  
epota aqua semper detrimento erit patientibus. cuius meri-  
tò, & maxima cum ratione ab Auicenna dictum fuit. Et  
quandoq; sorbet ex ea, quare strangulatur per eam, & mori-  
tur. quapropter non fidant Medici huic remedio, ut pote  
vano, & contra rationem administrato. An autem illud me-  
dicamentum ex cantharidibus compositum ab Auicenna  
prodesse possit, alij experiantur. Ego hoc non sum ausus vti,  
dubi-

*Lib. 4. Fen. 6.  
Cap. 7.*

dubitans, ne ex ingenti introducta vesicæ læsione afflictionem afflicto adderem. Pillulas ex Castoreo, & lathyride à Galeno propositas aliquis exhibere posset, sed leuamē morbi, non salutem speret. sicuti nec ex elleboro albo, quem maximē in rabie cōmendo, omnibusq; præfero, si in primo morbi insultu, vixq; cō apparente, incipienteq; non autem in cōfirmata aquæ auersione, exhibeatur; tunc temporis enim prodesse poterit, vt Dioscorides testatus est. quem tamen & eiusdem testimonio, & experientia approbante, vbi omninō ægri manifestē aquam, & cætera liquida fugiant, factaq; integrē sit rabies, nullo modo prodesse nouimus.

Qua de re mea sententia omnia in vanum tentabuntur auxilia, nisi forsan quædam exhibeantur antidoti non ad soluendum morbum, sed tantū ad remittenda symptomata, quę in his verenda, & horrenda sunt. ad quod idem facient exterius applicata, sicuti exulcerantia, sinapismi, inunctiones, & omnia ea, quæ ad extra virus euocare, & simul quæ omnia viscera, & præcipuē cor roborare possunt.

Qui cogitarunt in hoc casu de sectione venę, proponunt remedium ad accelerandam mortem; tum quoniam in confirmata rabie vires labant, & languidæ sunt; tum quoniam ex hac euacuatione nullo pacto virus ipsum oppugnatur, Amulceta proposita, sicuti aqua ea, in qua ferrum intingitur, artifice inscio, exhibita, dens canis rabidi alligatus, corium Hyenę, quod pro secreto habebat Topyrus Gordiensis Medicus, panno inligatum, & consimilia veniant in vsum his, qui credunt ea prodesse posse, & qui eorum certam habeant experientiam. ego his parum fido, eiusq; sum sententię, vt in confirmata rabie omnia incassum administrentur. nullaq; sit in ea spes salutis. Quare nec alia proponam remedia, nec in imperanda victus ratione admodum ero sollicitus. Sed vnicum hoc tantū proponam præceptum, videlicet, vt cibaria laudabilia, & boni succi, nè exacerbentur morbi symptomata ex prauo victu, exhibeantur. quæ vbi in sub-

*Antidoti quare aliquando exhibenda in rabie facta.*

*Sectione venę an in rabie conueniat.*

*Amulceta proposita in rabie an prodesse possint.*

stantia solida fuerint, à rabientibus in vsum alimenti, facile vt interdum vidi, assumentur, nec tot ad facilitandam cibi assumptionem erunt paranda, quor docent, qui sorbilia exhibenda esse iudicarunt.

*De motu Conuulsivo. Cap. XX.*

*Motus cōuulsivus.*

**Q**Voniam de rabie agentes, cuiusq; symptomata explicantes, posuimus hanc semper concomitari distensionem membrorum, affectum pandiculationi similem, raro autem conuulsionem, sciendum est, inter hos duos motus dari tertium medium, qui sine distensione, & sine conuulsione fiat. Hic motus fit, retractis ad propria principia neruis, & membris motui voluntario deseruientibus, cum quadam concussione, & vibratione, vt videatur neruorū palpitatio, vel vibratio, correspondens motui pulsus vibrantis. consuevit hic motus admodum affligere patiētes, & eos detinet aliquando per menses, & annos, sed diuersimodè; in aliquibus enim hic motus antiquatur, & cōsenescit continuè affligens, in aliquibus autem periodos habēs, vt contingit in epileptisis accessionibus, per interualla repetit, & molestat, nisi factus fuerit in morbis acutis; hic enim morte præueniente citò terminari solet. Hic motus, qui aliquādo valdè dolorosus est, aliquando autem non dolorosus quidem, sed valde molæstus ratione concussionis, & vibrationis existit, raro occupat totum corpus, creberrimè autē modò dextram, modò sinistram partem, rarissimè autem vnicum membrum. qui cum violentior est, causat distensiones membrorum sæuas, & admodum dolorosas, à quibus summopere languentes cruciantur. quæ si inualescant, & partibus superioribus, ac cerebro ipsi interdum cōmunicētur, solet inducere affectum epilepsiæ similem; concidunt enim cum deperditione sensuum, & per interualla quasi salientes conuelluntur, cum tamen epilepsia non sit; in his enim non emittitur spuma ad os. nonnullosq; vidi, dum hoc detinerentur

inherentur affectu, licet omnes cæteros sensus amisissent, auditum tamen seruasse. Motus hic differt à distensione nervorum, quoniam in hoc non distensio, sed eorum contractio, licet non continua, adest. differt autem à conuulsione; quoniam quamvis in conuulsione pariter, ac in motu isto, retrahantur nervi, & muscoli à causa præter naturam ad propria principia, tamen hæc adest differentia, quod in conuulsione vera ex retractione nervorum, & musculorum membra remanent rigida, sicuti fit in tetano, opisthotono, emprosthotono, risu sardonio, strabisino, & similibus conuulsionibus; at in motu isto membra rigida non redduntur, sed quasi satiando concutiuntur, & vibrantur, sitq; in nervis ipsi motus palpitationi similis. Hunc motum, & hanc differentiam non aduertentes multi Medicorum motum hunc conuulsionem appellarunt, cum tamen nequaquam conuulsio sit, & ab ea differat non tantum essentia, sed etiam causa. Conuulsio enim duplici fit ratione; aliàs enim fit ex inanitione, aliàs ex repletione; fit ex inanitione, exsiccatis, & inanitis nervis; ex repletione autem, dū materia, vel flatu iisdem replentur, & in utroq; hoc casu semper tenduntur membra, & rigida manent una cum notabili dolore. At motus iste, de quo loquor, nunquam ab intentione; quoniam nervi exsiccati cuicunq; motui, ne dicam concussioni, ac vibrationi inest, sed nec etiam à repletione eorum; quoniam nervi repleti seu à materia, seu à flatu, cuiuscemodi fit in cordis humore aliquo madefactis, semper rigent, non autem concutiuntur, nec vibrantur. Cuius autem ratione fiat motus iste, hinc pateat, cum ex notis causis in cognitione eorum, quæ non ita in aperto sunt, devenire possumus. In vulnere capitis lethalius solet hic motus, dū deterius habent, superuenire in opposita loci affecti parte, his, quæ è directo sunt, paralyti deprehensis. hoc qua causa fiat, satis apertum est. nam vulnere malè habente, superataque ab eo iam, & evicta partis natura, & temperie, putredo

*Conuulsio quæ differt à nervorum distensione.*

*Motus conuulsivus quid differat à conuulsione.*

*Motus conuulsivus causæ.*

*Conuulsio motus quare superueniat vulnere capitis lethali.*

ingens



gultu; insurgente natura ad expulsionem rerum præter naturam in substantia ventriculi existentium, & ipsam proritatum, tandiuq; durat motus iste conuulsuus, quandiu fuerit in totum discussa hæc praua materia per motum illum; sicuti & perseverat singultus, quousque materia in ventriculi substantia existens, vel remota, vel discussa in totum fuerit. Hoc autem tantum contingit, ubi nec continuè noua materia subministratur loco affecto, nec continua eiusdem fit generatio: tuncq; motus iste vel in totum soluitur, vel de nouo genita, & transmissa ad eadem loca simili materia, repetit, periodosq; habens per interualla accedit. Si autem continuè noua materia & generetur, & subministretur, non quiescit motus, nec periodos habet, sed continuus est, & continuè affligere consuevit, præterquam in somno. quo tempore obseruauimus patientes à tali motu non concitari, qui tamen ubi repetens dormientes aggrediatur, & præcipuè ille, qui periodicè, & per interualla quædam accedere consuevit, à somno excitat patientes, eosq; è lecto nonnunquam surgere, & deambulare ad alleuiandam molestiam cogit. sicq; motus iste hanc habebit differentiã, quòd quandoq; accessiones, & periodos habeat; quandoq; autem sit continuus, & continuè affligat patientes, semper à simili dependens materia: quæ tamen in habente periodos, & accessiones est tenuior, & subtilior, & inde citò soluitur; in continuo autem est minus subtilis, & minus tenuis, & ideo magis resolutioni rebellis. In periodicis autem accessionibus, cum soluendus, & in fine est periodus, tunc maximè concutuntur ægrotantes, magisq; tunc affliguntur. Vnde nonnullos tunc temporis vidi alta voce clamare, & deprecantes astantes, ut eos detinerent, ut hinc motum illum vehementem, & eius solutionem facilius ferrent. Hæc tamen materia nervos petens, si multum prauitatis consequuta fuerit, motuiq; illi, & discussioni non ita faciliè cedat, non tantum motum simpliciter conuulsuum generat, sed etiam ex valida

neruorum

*Motus conuulsui differētiæ.*

neruorum afflictione distensiones membrorum ingentes, & retractiones vehementes, & admodum dolorosas causat quæ si fortè ob causarum vehementiam, vel ob partis læsæ imbecillitatem partibus superioribus communicatæ fuerint, in cerebro affectum, epilepsiæ consimilem, producit. quo affectu accedente, saeuienteq; tunc clamantes, & volentes ab astantibus detineri concident patientes, ac si epileptici forent. à quo tamen casu postea terminata per resolutionem materiæ affectum hunc causantis accessione, immunes, ac liberati ab omni motu præter naturam resurgunt. Nec mirum sit ex tam pauca materia in principio neruorum existente posse subsequi tot praua, & sæua symptomata; cum pateat ex pauca materia virulenta ad os ventriculi existente subsequi syncopes, conuulsiones totius corporis, & aliquando epilepsiam, & sæpè mortem. Materia hæc, quæ principia neruorum petens est in causa huius motus, non in ipsis generatur neruis, sed alibi genita aliundè transmittitur. Ut plurimum autem in cerebro generari, ab eoq; ad principia neruorum transmitti consuevit, sicuti ad principium medullæ spinalis. tuncq; motus hic, si æqualiter eam in totum occupat, vniuersum apprehendit corpus. si autè vel dextram tantum, vel sinistram eius partem detinet, fit motus iste in parte vel dextra, vel sinistra tantum è directo loci patientis existente. si autem hæc eadem transmittatur materia, non ad principium spinalis medullæ, sed ad aliquem particularem neruum membro particulari inseruientem, tunc fit motus ille tantum in illo particulari membro. si tamen in particulari membro læsio ingens fuerit, hic motus ab eo communicatur etiam omnibus è directo partibus se habentibus, & hinc sæpè à læsione particularis membri hæc affectio vniuerso corpori transfertur, indeque totum corpus hoc motu apprehenditur. licèt autem ut plurimum fiat hoc vitio capitis, tamen & vidi factum ratione aliarum partium, in quibus genita hæc materia, & indè ad neruos transmissa factus fuit

*Materia motu  
conuulsui cau  
sans ubi gene  
retur.*

fuit hic motus. Vnde & in visceribus patiētibus, & in dorsi affectibus, & partibus inferioribus ( sicuti coxis, & cruribus læsis, cuius vitio generari potuerit talis materia) vidi factos hosce motus, primò quidem in membris vicinis, & particularibus, postmodum etiam communicatos vniuerso corpori, præcipuè autem ei parti, quæ è directo loci affecti sita est. quapropter quodcunq; membrū ita infectum, vt prauam gignere, licet minimam, queat materiam, potest esse huius motus sufficiens causa. Quod membrum quomodo sit inuestigandum, Medico diligenti patebit, dum considerauerit læsionem membrorū, eamque perpenderit, & diiudicauerit, an primariò, vel secundariò; & an per se, vel per cōsensum patiatur. Inuēta enim parte principaliter læsa, & ad cuius læsionē generetur hæc praua materia, ab eaq; neruis demandetur, nouerit etiā, cuius vitio talis fiat, genereturq; motus. ad cuius generationē nō tantūm requiritur materia illa praua, & causa apta neruos ipsos lædere, sed etiā neruorū ipsoꝝ imbecillitas concurrat. omnes enim ferè, quos pati hosce motus animaduerti, semper notauimus imbecillum genus neruosum vel ab ortu recepisse, vel ex accidenti in eis tale factum fuisse. Quare affectus hic, qui nullis signis ponendis declarandus est, cum sensui pateat, pendet ex pauca, tenui, & virosa, prauaq; materia ad principia neruorum patientium, qui ratione propriæ imbecillitatis facilius omnē admittunt noxam; transmissa, quæ genita sit vel ratione cerebri malè affecti, vel ratione particularium membrorū prauè se habentium; ad quæ principia cum fuerit transmissa, in eis infigitur, eaque praua stimulans qualitate, virosa q; essentia molæstans, proritat naturam ad motum hunc, cuius merito ipsa tentat vel remotionem, vel discussionem materiæ peccantis; sicuti natura irritata à materia in substantia ventriculi existente, insurgit per singultum ad remotionem, vel ad discussionem contristantium. Quibus positis, *Indicationes.*

dum

dum sit; iudicatur enim primò, vt ea materia vel amoueatur, vel discutiatur. Sed quoniam hæc faciliè per motum hunc, vel remoueri, vel discuti potest, nisi noua suggeratur materia, ideò principaliter incumbendum est, ne materia hæc vel generetur, vel vt, si genita est, aliò diuertatur. non generabitur, si membra principaliter læsa, & in quibus fomes huius materiæ seruetur, roborentur, & temperentur. Si autem generatio non sit prohibita, euocanda est materia hæc à parte, læsa, & à neruis ipsis; aliòq; diuertenda, præcipuè autem ad exteriora, simulq; partes neruosæ roborandæ erunt. An his indicationibus possimus satisfacere, vel non, dixerim morbum hunc difficillimum esse curatū, & hoc præcipuè si hic non ad alios cōsequatur morbos, sed spontè aduenerit; neruosæ enim partes in hoc afficiuntur, quæ semper difficulter omnē recipiūt curationem. Vnde hunc motum in aliquibus non tantum antiquari, sed etiam, vbi à principio neglectus fuerit, confenescere vidi. si tamen pars primariò affecta inuenta fuerit, eique opportuna adhibeantur medicamenta, dum morbus non fuerit antiquatus, sollicitusq; sit patiens, non ita difficilem attestor esse curationem; facile enim tolli poterit, si materiæ prauæ generatio cohibeatur, eiusq; genitæ vel discussio, vel euocatio tentetur. Quibus autem re mediis hæc exequi debeamus, hinc pateat. Præsupposita vniuersali facta, & parata cum his, quæ neruorum genus respiciunt, medicamentis totius corporis euacuatione, quæ semper particularibus curationibus præmittenda est, admittret Medicus ea, quæ discutiendi facultate donata sunt; sicuti oleum camomelinum, lumbricatum, anethinum, lilliorum alborum, rutaceum Viperinum, & quæ huius sunt generis, calidaq; actusæpius applicentur. quòd si hæc non satis fuerint, his admisceatur Castoreum, quod cum subtilitate partium donatum sit, in casu isto multum conferre poterit. loca inungenda erunt præcipuè collū, & dorsum

*Prognosticum*

*Curatio.*

ab

ab occipite vsque ad os sacrum, & vnà cum his etiam partes magis ab hoc affectu detentæ. Partes læsæ pellibus animalium actu tepidioribus continuè cooperiantur: vel si hæc desint, sit loco harū stuppa canabina, vel lana succida semper calida. Reucllatur materia cum frictionibus in parte opposita factis, fiant clysteria acriuscula ad eandem intentionem. his poterit morbus superari, nisi noua regeneretur, & fluxerit materia: quo casu adeunda est ea indicatio, qua membro generanti, & transmittenti attendendum est. Vnde si cerebrū sit in causa huius materiei, cōsideret Medicus, qua hoc intemperie laboret, eamque corrigat, & temperet. in cuius vsum veniunt ea, quæ in hoc casu (ubi in culpa sit intemperies frigida, calidaue) omnes docent administranda esse, sed præcipuè hic assumantur Embrochæ aquarum naturalium, quæ hic multum prodesse poterunt; robur enim cerebri hinc habebimus, & materię discussionem, quam similiter tentare possumus ex eisdem, si instillētur supra partes affectas. Si autem non cerebrum sit pars primariò affecta, sed vna ex inferioribus, ei incumbatur, tum intemperie tollendo, tum ipsam roborando. siq; genita materia ab his adhuc in fluxu fuerit, hæc euocetur ad extra, & simul discutiat. quo casu expertus sum sinapismata omnibus medicamentis præstare; his enim administratis, vidi quieuisse motum hunc. sicuti animaduerti in puella decimum quartum annum agentem: quæ cum maximè molestaretur ab hoc motu, per annosq; ita laborasset, & per interualla morbus regrederetur, ex nullis, quæ plura à Medicis parata fuere, remedijs vllum sensit iuuamen: tandem cum tempore exacerbationis illius motus cōquereretur maximè se affligi sub costis mendosis propè spinam in dextra parte, ego iudicans hanc partem primariò affectam esse, hincq; transmitti, & communicari materiam nervis illis proximioribus, indeq; causari motum cum conuulsuum, totis sinapismatibus, præmissis tamen vniuersalibus ei parti applicitis, morbum sustuli,

sustuli, qui tamen semper totā dexterā corporis partem apprehendebat, ac vehementissimè cruciabat, adeoq; vt & distorsiones membrorum, & affectum, epilepsię consimilem, sæpè induceret. Ultra sinapismata tamen parti primariò affectæ adhibita, discutientia etiā neruis applicentur, iidēq; roborentur & per exterius admota (qualia sunt inunctiones, emplastra, perfusiones, balnea, Embrochæ, ac similia) & per interius assumpta, qualia erunt Confectiones magnę, Antidoti variæ, Castoreum ipsum, & vsus Terebinthi Cyprij, quæ valde prodesse poterunt. Vbi tamen cerebrū primariò affectum sit, præcipuè sum expertus pulueres ex cornu ceruino, talo suillo, cornu Vnicornis, craneo humano, & consimilibus ossis medicamentis; addita cortice ligni Guaiaci, & radice falsæ pariliæ, multum profuisse. quæ etiam in cæteris casibus prodesse poterunt. Si verò affectus hic rebellis fuerit, nec prædictis cesserit remedijs, decoctum falsæ parilię, additis corticibus ligni Guaiaci, & alijs, quę neruos respiciunt (sicuti iua, stęchas, & similia, cum tenui, & siccanti victus ratione) opportunè exhibeatur ad minus per viginti quinque dies; ita enim deuinci poterit, & potissimū vbi intemperies mēbrorum prauam materiam generantium, & transmittentium, ad frigidum declinauerit, Si autem ad calidum vergat, fluxioq; , & distillatio sit admodū praua, potius veniat in vsum decoctio radici iuæ; hæc enim, distillante, & fluente materia tenui, calida, & praua, multum prodesse solet; & ideo in casu isto cæteris præferatur. Alimenta statuosā, & vaporosa in affectu isto vitentur, similiter & quęcunq; acida, & acria, & quę prauī, & retri sunt odoris; hæc enim omnia neruos lædere solent. Vinum primis diebus interdicitur, postmodum autem debile, & aquosum concedatur. Veneris vsus prohibeatur, & omnis acris excessus, præcipuè autem frigidus, & humidus, & omnia animi molesta accidētia, quæ potissimum hunc morbum exacerbare solent, fugiantur.



*De Obstructionibus arteriarum leuiampulmonis.*

*Cap. XXI.*

**Q**Uemadmodum nerui, qui omnes à cerebro originē ducunt, aliquandò malè afficiuntur, hincq; cum de terius habent, vt in conuulsiuo motu fieri dixi, cerebrum ipsum in consensum ducunt; pariter arteriæ, quæ à corde propagantur aliquo affectu, præter naturam nonnunquam deprehenduntur, & per eundem propriam noxam cordi communicant. Ex quibus arterijs præcipuè eæ, quæ leues in pulmone existunt, malè affici animaduerti, dum obstructione laborant. qui casus maximè à medico considerandus est; quoniam per tales obstructions sæpius homines in periculum vitæ manifestissimum, ac in mortem ipsam deducuntur; cum tamen hoc absque insigni noxa, quæ ab ipso egrotante ab initio percipiatur, fieri consueuerit: in talibus enim obstructionibus nec patientes respirandi difficultatē, nec grauitatē, nec dolorē, nec aliud molestū symptomā incurrunt, & tamen, cū hæ acutæ fuerint, ac perseuerauerint, nisi tollantur, tandem eosdē perdunt. Obstruuntur arteriæ istæ leues à duplici causa; nam vel ex succis frigidis vel ex crudo tuberculo in eisdē genito obstructione laborant. vbi n. humores crassi, & viscosi in ipsis arteriis infarti fuerint: vel vbi phyma aliquod, seu tuberculū crudū in eisdem genitū erit, arteriæ obstruuntur. Quibus obstructis, cordi tandem praua affectio cōmunicatur, hincq; patientes vel sunt proni in syncopem, vel etiam in suffocationem. quoniam obstructis ijs arterijs, nō ita facilè recrementa fuliginosa expelli possunt, quibus retentis semper cor necessariò patitur. Dum tamen istæ arteriæ leues in totum non sunt obstructæ, fit pugna, naturaq; præpotenter resistit morbificis causis, indeq; per vim propriam, & innatam quarrit dissolutionem, & transitum earum viarum, vt inde fuliginosa excrementa retrudat. quod vbi sufficienter assequuta fuerit, nullum adhuc nec syncopis, nec suffocationis pericu-

*Obstructionū  
leuiū arteria  
rū pulmonis  
causa.*

lum instat. Vbi autem hoc nequaquam cōsequatur, vel facta omnimoda obstruētionē, vel propē ad eā accedente, reſtētis fuliginolis excremētis, in periculū syncopis primò, post modum & suffocationis etiā ducitur homo. Deprehēduntur obstruētionē istā à solo pulsu, nec ullū aliud inditiū habēt. in his. n. nec tensio, nec grauitas, nec dolor, nec respirādi difficultas, nec quid aliud molestum percipitur; quoniā affectio à materia pendet frigida, & in loco est nullā sensationē habente. pulsus autem immutatur ab hac necessariò; quoniā organis, & instrumētis lēsis, non potest nō immutari pulsus, qui ex hac lēſione omnē acquirit inæqualitatē, & non tantū illam, quæ in vnica pulsatione reperitur, sed eam etiam, quam systimaticem, seu collectiuam appellant; vnde in huiuscemodi obstruētionibus magnæ & prauæ, celeres & tardæ, raræ & frequentes, validæ & imbecilles adsunt pulsationes: inter quas aliquæ decurtantur, aliquæ nonnunquā intermittunt, aliquæ intercidunt; in eadem autem pulsatione sæpe est inæqualitas quò ad plures eius differentias. Vbi autem talis inæqualitas contigerit, & ex his pulsationibus plures erunt magnæ, vehementes, celeres, intercidentes, & æquales, minorem lēſionē indicant, & minus periculum minantur: vbi autem plures erunt languidæ, paruæ, decurtatæ, intermittentes, & crebriores, offensam ingentē astantur; & periculum præceps prænunciant. in aliquibus tamen patientibus, cum grauis non est affectio, solent etiā adesse pulsationes plures æquales, quas interpellant nōnullæ vel periodicæ, vel nullo seruatō periodo decurtatæ, aut intermittentes, quod in principio harum obstruētionum præcipuè contingere solet: qua de re pulsuum hæc æqualitas à pulsu vel intermittente, vel decurtato interpellata habeatur pro inditio incipientium, ac futurarum huiuscemodi obstruētionum. An autem hæc fiant, cum à duplici causa gignantur, vel à crassis, & viscidis humoribus, vel à tuberculo crudiori, hinc cognoscatur. Vbi crassi, & viscida humores

*Signa differentiarum.*

mores fuerint obstructionum causæ, tunc pulsus ( quoniam in utrisque casibus semper adest aliqua durities) erunt duri per tensionem: vbi autem tuberculum sit id, quod obstruat, erunt duri per tensionem, & siccitatem. præterea in obstructione ab humoribus pulsus erunt magis inter se diuersi, nec semper eodem modo procedent, sed variabunt, prout humor obstruens vel in hanc, vel in illâ partē magis impinget. At à tuberculo inæqualitas erit magis vniformis, cū à causa magis cōstanti, & fixa causetur. præterea in humorū obstructione æquales pulsus plures simul, ac collectiue adesse possunt: at in tuberculo plures sunt inæquales. vnde vbi aliquæ intermittentes, aut decurtatæ pulsationes plures æquales interpellauerint, cēsetur hanc obstructionē ab humoribus factā esse. à tuberculo. n. non possunt plures adinuicē se subsequētes æquales, ac ordinatæ fieri pulsationes; cū causa lædens ipsa organa immediatē eadē lēdit, ac in eis fixa eodē pacto semper permanet: quapropter hinc æqualitas naturalis pendere nō potest, licet nō naturalis, seu præter naturā (idest, quæ plures inæquales pariter habeat) hanc concomitari cōsuēuerit. In hac autē pulsū inæqualitate hoc solet esse vtrisque obstructionib. cōmune, quod si intermittentes pulsus, ceteris pulsū differentiis admisceantur, quādo inter mittit pulsus, percipiunt patientes motū quemdā, tãquam ictum in regione cordis, perindē, ac si quis ipsi cordi tunc manum obuiet, ac motum impediat. quod non causatur, nisi ab obstructione tunc valenter irruente, ac cor comprimente, indeq; pulsus motū impediēte. quod idem ferē cōtingit à pulsu decurtato. Sed cum decurtatum minor noxa inferat, quā intermittētē, minorē etiam percipiunt patientes motum, & istum ictum à decurtato pulsu, & minus ab eo læduntur, quā ob intermittente. Cum percipiunt ictum istum egrotantes, si ab humoribus crassis obstruentibus hoc factū sit, statim reuocantur patientes. in iisdemq; per quādam interualla, existente agitata diuersimodē à naturali facultate ma-

teria, aliquandoq; versus cor infarta, ac detrufa, & aliquādo ab eodem transmissa, renouantur tales pulsationes. at ubi a tuberculo obstruente fiat talis ictus, vereq; intermiserit pulsus, non ita reuocantur patientes, hocq; erit indicium tuberculum augeri, properareq; ad omnimodam obstructionem, nisi hoc à causa procacitatia, sicuti à copioso vini virosi potu, ab ira, à vehementi motu, à destillatione superueniente, & similibus rebus exacerbatum, & concitatum fuerit. ubi enim hæc non præfuerint, intermissio pulsus manifestissimum vitæ discriminē pronosticatur: qui si supra vnā pulsationē intermittat, mortē instare prænunciat. Vtrisque his obstructionibus, videlicet, & ei, quæ à crasis humoribus, & ei, quæ à tuberculo causatur, hoc etiam cōmune est, quod ubi occupauerint arterias leues, si perseverauerint, augeantur: ubi autem auctæ fuerint, etiā asperis arterijs cōmunicentur, & tunc, quæ prius non aderat, respirandi superuenit difficultas, quæ semper pro ratione adauctæ obstructionis increfcit, hac tamen differentia accedente, quod in obturatione à crasis succis difficultas respirandi non est semper vniformis, nec semper vniformiter adaugetur; quoniam aliquando intensior, aliquando remissior esse potest pro ratione materiæ, & loci obstructi. at in obturatione à tuberculo semper est vniformis, & vniformiter, nisi à causa externa concitetur, vel magis angustietur, sicuti à motu, à destillatione superueniente, ab immoderata ira, à copioso vini potu, à nimia ciborum ingurgitatione; & similibus causis, adaugetur; quoniam causa hæc de se est stabilis, ac fixa, & vniformis existit. Vbi autem hæc obstructiones arterijs asperis communicatæ fuerint, indeq; accesserit respirandi difficultas, cum diutius hæc perseverauerint, calor innatus, quoniam hic vnā cum corde sufficienter non euentatur, languescit, ac imminuitur: cuius ratione in nonnullis sæpe succedere solet, hoc marcescente, refrigeratio cæterorum membrorum, & præcipuè ipsius hepatis, cuius merito his ob-

*Difficultas respirandi quando superueniat obstructioni leuium arteriarum pulmonis.*

structionibus, cum diutius perseverauerint, hoc reddito imbecillo, ac debiliore, solet succedere aliqua hydropis species. Vnde tales egrotantes vel in anasarcam, vel in ascitē deducuntur, perindeq; ac ex difficili respiratione, ex his morbis periclitantur. Quibus etiam succedere solet, communicata ingenter ipsi cordi affectione, ipsius cordis palpitatio, quæ patientes angit, & eosdem, cum deterius habent, in lypothymiam, ac synopem deducunt. Quapropter maxime animaduertat Medicus hæc arteriarum obstructiones tum ratione periculi; tum ratione difficultatis rei cuius merito forsitan hæc tractatio ab ordinarijs practicis neglecta fuit, quam tamen advertere, & docere tenebantur; tum quia de his meminit Gale. lib. 4. de locis affectis cap. ultimo in historia Antipatri, tum quia casus iste quandoq; accedat, egrotantesq;, ac Medicos sæpè eludat, qui periculum non perpendunt, nisi cum symptomata, & morbi prædicti sæuerint. Pro huius autem cognitione pro nunc sufficiant ea, quæ à me proposita sunt; tum ut morbi essentia, tum ut eiusdem causæ, differentiæ, ac signa omnibus pateant. His habitis, curationem aggredior. Præsentibus obstructionibus in leuibus pulmonum arterijs, quid indicatur? duo indicantur; alterum, quod commune est vtriusq; causis; alterum, quod singulis proprium est. Commune est, ut redūdantia humoris affectionem generantis expendatur, & cōsumatur. proprium autem est, ut affectio à crassis, & viscidis pēdens humoribus tollatur per attenuātia, & extergētia medicamenta. quæ autem à crudo tuberculo genita est, per attenuantia, & resiccantia curetur. An autem Medicus his indicationibus plenè satisfacere possit, iudicet ex proprijs harum obstructionum signis, & causis, ac ex his symptomatibus, vel morbis, quæ his succedent. Nouerint enim difficillimum esse obstructiones à tuberculis genitas remouere; tum quia in his crūda admodum, & digestionī rebellis adest materia; tum quia affectio est in loco, cui valida, &

*Indicationes.*

*Prognosticū.*

potentia remedia applicari non possunt. & hoc maxime, vbi progressa, & antiquata fuerint hæc tubercula: si autem à viro, qui in arte medica multum polleat, incipientia cognoscantur, rectaq; ratione curentur, non ita difficile erit à principio ea solvere, quare eorum solutionem tunc temporis sperare poterit. hæc autem omnia de tuberculis intelligantur, quatenus cruda sunt; quoniam si hæc aliquando ad suppurationem devenient, vnde postea disrumpantur, lethalem inferunt casum: nã materia suppurata effunditur supra cor, & inde subito mortis periculum instat, vt sæpius experientia testata est. Quæ autem à crassis & viscidis succis ortæ sunt obstructiones, non ita difficile est removere; quoniam similes matetie facilius medicamentis cedunt, quàm tubercula illa cruda. & istæ obstructiones, siue incipientes, siue antiquatæ fuerint, poterunt solui facilius. hæc quæ tû minori periculo semper, quàm tubercula, antiquantur, & perseverant. Quoniam tamen ab his, vbi antiquatæ fuerint, communicantur aliquando hæ obstructiones arterijs asperis, indeq; succedit respirationis difficultas, si ad hæc successerit refrigeratio illa caloris innati, vnde vel hydrops fit præsens, vel immineat, ferè impossibilis erit earû curatio; sicuti & illarum, quæ à progressu, & antiquato tuberculo erunt causatæ, nullo pacto possibilis est solutio. in quibus omnibus semper considerentur egrotantis pulsus: qui, vbi erunt valde inæquales, & plurimi ex his sint imbecilles, pravi, decurtati, vel intermittentes, maiorem noxam, ac periculum ingens prognosticantur. si autem plurimi sint æquales, vehementes, magni, & ordinem seruent, minus malum, ac minorem curandi difficultatem prænuñciabunt. In eisdem etiam consideretur cordis status; si enim ratione consensus, & communicatiæ palpitationem incurrat, in lypothymiamq; pronum sit, res in deteriori est conditione, quàm vbi cor ex eisdem obstructionibus nihil tale passum fuerit. His autem consideratis, adeat Medicus curationem; cuius,

quoniam



quoniam ratione caufarum bipartita eft; ideo non vnicus, fed duplex erit curandi modus. Vbi enim obftruftio pendeat à crassis, & vifcidis humoribus; attenuantia, & abftergentia pharmaca adhibeat. & quoniam in his adminiftrandis omnia ea, quæ in afthmate valida funt, conueniunt; ideo pro hac tollenda traducatur in hunc cafum tota, ac integra afthmatis curatio, tum quò ad vniuerfalia, tum quò ad particularia peragenda. Vnum tamen moneo, quoniam locus affectus eft in penetralibus magis interpis, quàm fit in afthmate, quòd in hunc vsum vehementiora, & potentiora medicamenta, & quæ validius attenuare cum abfterfione poffunt, affumantur, quæ ad maiorem penetrationem vel liquida, vel cum liquoribus diluta præparentur. Vnde in tali cafu iubeo ego, vt multa medicamenta in afthmate opportuna fublimentur, vt hinc tenuiora reddita, facilius penetrare vique ad locum affectum queant. Ex quibus præcipuè elenij aquam modò simplicem, modò alijs validioribus admixtam, & per fublimationem in duplici vafe factâ pofttea adminiftro; eufq; vsum plurimū, ac fæliciffimum habeo. Et præ cæteris quoniâ sulphur eft vnum ex his, quæ valdè potentia funt in difcutiendis, & confumendis humoribus craffioribus, eius aquam in difficilioribus, ac magis rebellibus obftruftionibus accipio, & commifceo iuleb formatū ex melle ad eam quantitatem, vt facilè à patiente affumi poffit; hoc medicamētum exhibeo ad cochlearia duo, vel circa ante cibum per duas horas, & potens hinc remedium habeo ad attenuādos, & disperdendos tales humores obftruentes. Ad idem elleftuaria, cuius basis fit chalybs præparatum, admixtis medicamentis incidentibus, & opportunis, quale eft gentiana, elenium, ariftolochia, thymū, pulegium, iua, origanum; & fimilia, cum maxima vtilitate exhibeo. & vbi hæc non fufficiant; afeendo ad medicamentum ex feylla, vel simplex, vel admixtum cæteris prædictis medicamentis. hæc & fimilia formanda funt remedia. qui-

*Curatio ob-  
ftruftionis à  
crassis suc-  
cis,*

bus administratis per intervalla quædam, ac interpositis nō nullis paucis diebus, sicuti vel vnoquoque duodecimo, vel decimo quinto die exhibeantur pharmaca solvantia, quæ apta sint humores crassiores educere, & à longinquis partibus evacuare, quæ potius in forma solida, quàm liquida formata sint, qualia sunt pilulæ cochis, aggregatiuæ de nitro, & omnes illæ, quæ gummiata recipiunt, quibus admisceri possunt quandoq; cortices radicum ellebori nigri, turbiti, & similia, quæ quantum possint in huiusmodi affectibus, mirum est: quoniam tamen sæpius hæc eadem pharmaca repetenda sunt, nō in summa dosi accipiantur, per exterius autem administrentur eę inunctiones, quæ cutim exasperando, et lancinando ex alto materiam euocare possint; sicuti quæ recipiunt nitrum, salem, pumicem, fecem vini coctā, æruginis, & quæ huius sunt ordinis. Quò ad victum, sit valde attenuans, & in eo quęcunq; repletio fugiatur, & omnia ea, quæ crassos humores generare, & adaugere apta sunt, vitentur. Vinum sit antiquum, tenue, & nequaquam adstringens, sed maturum valde existat, potusq; nec parvus, nec immoderatus fiat, ne illinc materia incrassetur, ac siccetur; hinc autem nimium grauantur naturales facultates, quæ à nimia vini potentis quantitate sæpius obstruuntur, & languēt. & hinc omnem (vt in summa dicam) victus rationem, ac medicamenta quoque hand aliter, quàm asthmaticis iubeat Medicus, qualia Galenus in Antipatrotalem obstructionē patiente adhiberi iussit, licet aliter senserit Acrius; qui iudicauit in Antipatro obstructionem non à crassis humoribus, sed à crudo tuberculo factam fuisse; cum tamen verba Galeni, dicentis [At ego probabilia inquam ipsum dicere, sed à veritate aberrare, quippe cum ab huiusmodi causa orthopnea fiat humore crasso, & lento non in leuibus arterijs, sed aspera arteria collecto] oppositum perinde, ac etiam eius curationis modus ab eodem propositus, indicent. non enim coincidit curatio asthmatis à crassis succis cum ea, quæ de-

betur

betur tuberculo obstruente, vt docet Galenus lib. 7. de Com.med.secundum loca cap. de orthopnæa.& hæc de ob-  
 struptione arteriarum leuium intra pulmones existentium, à *Curatio ob-*  
 vifcidis,& lentis humoribus genitarum. Vbi autem hæc ob- *struptionis à*  
 struantur à crudo tuberculo, per attenuantia, & reficcantia, *crudo tubercu-*  
 tia, per quæ idem tuberculum consumi, & disperdi queat, *lo.*  
 est procedendum. his tamen (quoniam vniuersalia particu-  
 laribus præcedere debent) præmittenda erit tum corporis  
 vniuersi purgatio, tum venæ sectio, si in corpore pletorico;  
 & quod humore copioso abundet, sit factū hoc tuberculū,  
 quibus præmissis, eaq; ratione, quam in altera obstru-  
 ctione administrandam esse monuimus, adhibitis, accedat Me-  
 dicus ad vsum eorum medicamentorum, quæ attenuantia,  
 & reficcantia existant. talia erunt aromata, quale est cina-  
 momum, piper, macis, ireos, nux moscata, cardamomum,  
 galanga, zingiber, cubebe, zedoaria, costus, & similia; ex  
 his pulueres, & electuaria Medicus formare poterit, quæ  
 in continuo sint vfu. & quoniam ex his formata sunt plura  
 specierum genera, ideò varia in hoc casu vtilia poterunt ef-  
 se, sicuti species aromatici ros. diagalangæ, diamoschi amari,  
 diacimini, diacalamēti, & cōsimiles. his autē omnibus The-  
 riaca antiqua, & Mithridatū potentiora erunt. Vltra hæc  
 inueni prolicuū vsum pulueris ex ossibus formati, admixto  
 cornu ceruino, & quibusdam ex aromatibus prædictis. Val-  
 deq; potens etiam in hoc reperi vitrum combustum. quibus  
 omnibus etiā sulphur viuum, tanquam medicamentum val-  
 de potens in ablumendo, & digerendo, commisceatur: his  
 tamen semper admiscenda sunt aliqua, quæ manuducant  
 medicamenta prædicta ad locum affectum, ac ad thoracē  
 ipsum. hæc autem continuè administrentur, per interual-  
 la tamen, vt superius notauī, exhibeantur medicamenta  
 soluentia, quæ saltem materiam fluentem retrahere pote-  
 runt. Quoniam autem sæpè prædicta non sufficiunt ad tol-  
 lendum, vel saltem minuendum tuberculum, ego aliquan-  
 do ad

do ad decoctum salsæ parilię, tanquàm ad medicamentum valdè in discutiendo potens, deueni, & eo morbum leniui. quod idem tamen in antiquato exhibui, & nihil profeci. Inunctiones similes prædictis etiam in hunc vsum assumantur. Victusq; similiter attenuans præscribatur, sed parcus magis sit, quàm in obstructione, à crasis, & viscidis humoribus genita. Parcior autem multò sit potus; parum enim bibere debent oēs hi, in quibus abscessus internus reperiatur. & in his vinum exhibendum sit tenue, & antiquū, & potius generosum, quàm aquosum. Fiant communiter in ambobus hisce casibus omnia genera reuulsionum, & derivationum ad retrahendam materiam à loco affecto. degāt in aere tenuiori, sicciori, & validiori. exerceantur moderatè. somnus longior, & diurnus vitetur. & omnia ea, quæ destillationes vel inducere, vel augere possent, ac ea, quæ thoracem lædere apta sunt, fugiantur.

*De morbis acutis mulierum vtero gerentium. Cap. XXII.*

**A**ffectus, quos hucusq; explicaui, vtriq; sexui communes sunt; nunc de duobus agam, qui fæmineo tantum sunt peculiare. euenit enim aliquando, vt mulieres, dum vel vtero gerunt, vel sunt in puerperio, diuersis conflantur morbis: qui si vel neglecti, vel malè curati fuerint, eas in perniciem ducunt. quare hos duos fæminarum status considerantes, primò agemus de morbis acutis mulierum prægnantium, secundò de his, qui in puerperio superuenire solent. quid enim in his agendum sit, & quomodo Medici hos curare debeant, non ita liquet, nec qui artem hanc communiter faciunt, locum istum explicasse videntur. Primam autè partem aggrediens dico, quòd tria habemus præcipua remedia, quibus potissimum in morbis vtimur acutis, scilicet rectam victus rationem, sectionem venæ, & pharmacum: quæ omnia consideranda sunt, an conueniant. & si conueniant, quo modo in vtero gerentibus admi-

# DE AFFECTU PARTIV.

ministranda sint. Quò ad victum nulli dubium, quòd in morbis acutis victu tenui, immò aliquando tenuissimo; uti debet agrotantes, qui tamen in vtero gerentibus non ita tutus est. Vnde Galenus lib. 5. Aph. commen. Aph. 30. exponens sententiam Hippocratis dicentis, Mulierem vtero gerentem capi ab aliquo morbo acuto, lethale esse, dicebat ex morbis acutis vtero gerentibus duplex imminere periculum; alterum ex magnitudine febris, quæ fætum occidere potest; alterum ex tenui victu, qui morbis debetur acutis, cuius ratione ex alimenti defectu fætum destruimus: quod alimētū, si ut hunc, seruemus, nō verebimur crassiores exhibere, febres cōtinuas victu intēpestiuo augentes, matrē occidemus. quare hinc (quoniā & fētū, & matrē simul, ut res prosperè succedat, seruare tenemur) duo habemus; vnum quòd ratione fētus in his pro victu cibi aliquid adijcere, alterū autē, quòd ratione acutiei morbi detrahare debemus. quibus duabus indicationib. cōtrarijs existētib. & vtrisq; neglectis mortem minitantibus, hinc Medicus non tenuē, nec plenum, sed mediocrem imperet victum, ex quo nec fætus decidere, nec morbus ingrauescere poterit. nam ratione fētus facilē absumentur talis ratio victus, quæ nec morbo poterit esse grauis, cum manutene & fætus, & matrē virēs tantū, non autem eas grauare possit. Vnde in morbis acutis vtero gerentium poterit Medicus ascendere ad iura pullorum tenuiorum, in quibus fercula parentur, vel pitana dissoluatur; aliquando ad lutea ouorum recentium forbilia, abstinendo tamen semper à vino, & carnibus, & omnibus his, quæ multum nutrire, & inde morbum augere possunt. hæc de genere victus. quò autem ad quantitatem, quantitas sit maior, vel miuor pro ratione maioris, vel minoris magnitudinis fētus. vnde maior sit quantitas in vltimis mensibus; quoniā tunc fætus grandior vberior indiget alimento, in medio autem tempore sit moderata; in principio verò gestationis vteri sit minoris quantitatis

*Mulierum vtero gerentium in morbis acutis qualis debeat esse victus.*

tatis, vel parum immutatus ab eo, quo vteretur, si mulier non concepisset. hæc de primo auxilio.

*Sectio vene  
an conveniat  
in morbis acu  
tis mulierum  
prægnantium.*

Secundum auxilium erat sectio venæ, quæ ex sententia Hippocratis lib. 4. Reg. acut. tex. 19. in omnibus acutis morbis florente ætate, & constantibus viribus administranda est. quod idem comprobans Galenus millies affirmavit. Hanc sectionem venæ docet Hippocrates lib. 5. Aph. 31. in utero gerentibus abortum causare, & ideo cauenda erit, dum dicebat [ Mulier vtero gerens sanguine misso ex vena abortit, & magis, si fœtus sit maior. ] quare dubitandum venit, an hoc secundo auxilio in mulieribus vtero gerentibus, dum acuto morbo detinentur, vti conveniat; quoniam si non secetur vena, morbus sævior redditus patientem necabit. si autem secetur, incurrerit mulier abortum, qui est casus lethalis in acuto morbo. hæc difficultas ita explicanda venit. Mulier vtero gerens, misso sanguine è vena, abortit; quia extracto sanguine subtrahitur alimentum fœtui. Vnde si fœtui hoc non subtrahatur ex sectione venæ, nec etiam abortum ex hoc incurrere debet. hoc fiet, si, dum fœtus est minor, sicuti est in primis mensibus, tunc mittatur sanguis; cū enim his temporibus fœtus plurimo non indigeat sanguine pro sui nutrimento, si secetur vena, non erit periculum, quod fœtui alimentum subtrahatur, & eò magis, si mulier patiens fuerit pletorica. Vnde à primo mense vsque ad quintum tu-  
to venæ sectio administrari poterit. Circa autem ultimos menses magis rem circumspectat Medicus; quoniam cum fœtus maior hisce diebus factus sit, copiosiorq; hinc indigeat alimento, non ita tutum erit secare venam. Si autem mulier sanguine abundet, & copiosa admodum non fiat venæ sectio, tuto mitti potest sanguis; quoniam hinc sedabitur morbus, nec tantum alimentum fœtui subtrahetur, ut hinc mulier abortum incurrat. Si autem videatur aliter sensisse Hippocrates loco citato lib. 5. Aph. 31. clarè docens sanguine misso mulierem vtero gerentem abortum pati,

Ani-



Animaduertatur, quòd longè aliter nos venam secamus, ac faciebant antiqui: illi enim ad libras, nos ad uncias sanguinè mittimus. non minus enim, quàm ad Corylam consueuerant vt plurimum secare prima vice venam, cuius dimidiam quantitatem postea in sequenti repetebant. Coryla autem, vt habetur à Galeno in lib. de ponder. & mensur. habet vini uncias decem, mellis autem tredecim. cum verò sanguis melle minus, vino autem magis ponderet, Coryla habebit sanguinis ferè uncias duodecim. Nos autem ad tantam quantitatem etiam in robustis viris, nè dixerim in mulieribus, non ascendimus, nisi rarò, & ybi plenitudo in gens existat, & vrgentissimus sit casus, sed ad uncias tantum sanguinem mittimus. quam quantitatem in vtero gerentibus seruantes nunquam viribus constantibus abortum causabimus. Immo ad præseruandas mulieres ab abortu, quæ in hunc incurrunt ob multitudinem, & copiam (quæ in multis generari, & abundare, & per plures dies, dū non concipiunt, copiosè menstruis temporibus expurgari solet) sanguinis fætum suffocantis, & occidentis, nullum validius remedium excogitari potest sectione venæ. qua testor ego me plurimas ab abortu, in quem frequenter inciderant, ex sola sanguinis missione, primis mensibus facta, præseruasse. Non ita tamen celsendum est de hac sanguinis missione, vel moderata, vel parca in vtero gerentibus administranda, vt vnquam non veniat etiam in vsum, si copiosè fiat; interdū enim in vltimo mēse copiosa sanguinis missio facta nō spernendum attulit iuuamentum. Et ego aliquando hanc venæ sectionem copiosè factam in vltimo mēse, instante partus tempore, dum vtero gerentes ardenti conficerebantur febre, plurimoq; abundarent sanguine, tentavi. & hinc remissionē febris, ac partus accelerationē sperās, vtrūq; ex sanguinis missione consequutus, summa cū utilitate administraui, fætumq; & matrem vnà periclitantem ex hoc solo remedio saluavi. quod remedium in aliquibus prætermisum, & à

*sectio venæ  
aliquādo præ  
seruat mulie  
res ab abortu.*

Medicis

Medicis verba solū Hippocratis, & non ipsam rē ponderantibus neglectum, fuit in causa, vt conceptus sæpe vnā cum matre à plenitudine, & feruore sanguinis suffocatus miserabiliter perierint. Quare commendo in simili casu copiosam sanguinis missionē; in ceteris autē moderatā, & ad vncias factā. quā ad præseruationem ab abortu, vbi à plenitudine immineat, summopere probō, nec ista contra Hippocratis, Galeniq; sententiam erunt, quia salutem ægrotantium, non vanas opiniones sectati sunt. & hæc de secundo auxilio.

Tertium auxilium erat pharmacum. quod an conueniat, & quando conueniat in vtero gerentibus; clarissimè docet Hippocrates lib. 4. Apho. primo, & Galenus ibidem. quo loco habetur, in his mulieribus nunquam conuenire pharmacum, nisi materia turgente. nec turgente materia semper admittendum esse, sed solum à quarto mense vsque ad septimum. Hunc aphorismum audiui nonnullos Medicos ad indicationem sectionis venæ transulisse. Sed longè alia est ratio sectionis venæ, & alia pharmaci. sectio enim venæ suspecta est, quia per eam alimentū fœtui subtrahitur. at pharmacum non ratione subtractionis alimonie, sed quia in vtero gerentibus maximam facit cōmotionem, vnde disruptio ligamentorum, & abortus impēdet, periculi plenū est. Quod perpendens Hippocrates abstinēbat à pharmaco primis, & vltimis mensibus; in medio autem tempore non nisi turgente materia concedebat. hoc idem ponderans Galenus duo dicebat; alterum, quod cum primis, & vltimis mensibus facilè ex validis motibus, in illis ex ligamentorum mollitie, in his autem præ grauitate fœtus, dirumpantur ligamenta; ideo nec primis, nec vltimis mensibus vnquam pharmacum admittendum esse. in medio autem tempore, quo firmiorem habent conceptus coalitum, vnde tunc mulier potest fortiores sustinere motus sine fœtus offensione, nonnunquam administrandum fore. alterum erat, quod in intermedio hoc tempore non indiscriminatim conueniat phar-

*Pharmacū an  
conueniat in  
morbis acutis  
mulierum præ  
gnantium.*

pharmacum; sed solum quando materia turgēt ratio est, quoniam in materia turgēte exhibito pharmaco, nec magna fit in corpore commotio; quia humores turgētes spontē facili hincinde desuunt, naturaq; motum adiuuante facillimē leni pharmaco educuntur. cuius merito dicebat Galenus. Cum natura ad hos expellendos humores incitatur, nō vehēmenti pharmaco, sed aliquo manum porrigente, & hūc humorum motum ad alium deducēte solum indigere. cuius ratione satis liquet minorem ex materia turgētis, quā fixæ purgatione in corpore commotionem fieri. & ideo nec hinc vtero gerentibus discrimen abortus in intermedio tempore, præcipuē cum in his mensibus fetus externis causis, tum quia coalitum firmiorem habent, tum quia gravitatē non ponderant, non ita facili cedunt, imminere potest. & ideo summa cum ratione ab Hippocrate statutū est, à quarto mēse vsque ad septimum, si materia turgēat, has medicandas esse. Quam Hippocratis sententiam Galenus lib. primo Epid. sect. 3. commen. 29. amplificat etiam ad tertium mensem, hæc verba habens. [Iam illud quoque meminisse par est, sextum trimestrem, & quadrimestrem præter cæteros iniurijs resistere.] His igitur omnibus prædictis mensibus poterit Medicus, materia turgente, pharmacum administrare. at quæ erunt pharmaca hæc? non profectò electiva illa, & vehēmentiora medicamenta; tum quoniam hæc maximam in corpore commotionem faciunt, tum etiam, quoniam in materia turgente ista non conveniunt. quæ materia turgens manum porrigente pharmaco, & ideo leni tantum indiget. tale erit syrupus rosatus solutivus, Manna, Cassia fistula, Rhabarbarum, & huiusmodi lenia, & benedicta pharmaca, quibus vrgente, necessitate parum quid vel Diaphniconis, vel electuarij de succo rosarum addere poterit Medicus, nunquam tamen ista transcendens. At his eisdem medicamentis ausi sunt nonnulli vti etiam in vtero gerentibus, non turgente, sed firmata materia, consili benig-  
gnitate

gnitate eorundem medicamentorum, ac opinantes ideo pharmaca in infirmata materia Hippocrati, & Galeno suspecta fuisse; quoniam ætas illa tali genere medicamentorum caruerit. Sed animaduertant hi ex Galeno, quod talia medicamenta sunt ea, quæ administranda ipse docet turgente tantum, & non firmata materia, quam firmatam nullo pacto mouere pharmaco præcipit. Vnde cum vehementiora pharmaca nullo conueniant tempore gestationis veteri, & lenia tantum conueniant turgente materia, nec etiam ista vnquam conuenient, vbi materia non turgeat, sed firmata sit. hæc enim medicamenta, quæ turgente materia, quoniam cōmotionem, & agitationem eadem turgente in corpore non faciunt, conceduntur; si firmata fuerit materia, cum ad motum naturam adiuuantem, & incitatam nõ habeant, materiaq; de se sit segnis, vt ex immobilitate apparet, magnam erunt apta inducere cōmotionem, valdeq; agitare poterunt vtero gerentes, & fetus, citius validi, & importuni motus ratione disrupti faciliè ligamēta, & abortus subsequi poterit. quare semper in tali casu hæc eadem medicamenta valde suspecta erunt, & ideo nunquā in vsum recipienda sunt, nisi materia turgeat. Quod si interdum proficue, nulloq; subsequente incommodo hæc à quibusdā Medicis administrata fuerint, vt in nonnullis contigisse vidi, hoc robori mulierum, & fetus firmitudini, quorum ratione vidi etiam tolerata medicamēta abortiua in aliis, quæ sponte abortum procurabant, non rationi, quæ in hoc nulloquam est, adscribant, regulamq; ex his, quæ præter rationem, & artem fiunt, non condant. At dices, quid igitur excluso pharmaco agendum erit? alia habemus ingenia, quibus possumus superare morbos, sicuti victus rectam rationem, præparantia humores, concoquentia, clysteria lenia, ea, quæ possunt materias ad vias ductuum deducere, & alia similia, quæ tentanda sunt relicto pharmaco, & hoc præcipue in febribus ipsis. cuius pharmaci nō meminuit quidem

Galenus

Galenus in libris Methodi, in quibus perfectissimam omnium febrium curationem, & curandi methodum docuit, innuens non summam curationis febrium in solo consistere pharmaco. Sed contra hanc sententiam videtur esse Galeni locus lib. 5. Apho. in commen. Aph. 55. ubi reddens rationem, quare utero gerentes febre detentæ vel abortiunt, vel cum periculo pariunt, inquit, q̃ hæ mulieres aliquando corripuntur febribus adeo vehementibus, ut ex necessitate abortiant. aliquando autē corripuntur quidē febribus nō vehementibus, sed mediocribus, in quibus cum à medicis nō sufficienter purgentur, ut potè qui valida medicamenta exhibere mulieri grauidæ nō possint, aliquid superest reliquarū humorum vitiosorum in corpore, ex quibus postea frequenter fiunt recidivæ, & diu laborant, vnde tandem vel abortiunt, vel difficulter pariunt. Ex quibus verbis patere videtur, Galenum concedere purgantia medicamenta in utero gerentibus, etiam in quibus materia non turgat. ubi enim febres sunt mediocres, non turget materia; cum turgere, ut ubique habet Hippocrates, sit propriū acuti morbi, in quo non mediocres, sed vehementes sunt febres: & si valde purgantia medicamenta non concedit, innuit tamē lenia exhiberi posse, dum habet hæc verba. [Sed cum non purgentur sufficienter, aliquid si perest reliquiarū in corpore vitiosorū humorū.] quibus paulò post subdit. [Nō potentibus medicis mulieri grauidæ aliquod validum auxiliū adhibere.] & ideo purgationem, licet non à valido pharmaco factam, concedit. quare ad mentem Galeni denientia, & benedicta pharmaca convenire videbuntur. At res longe aliter se habet; quoniam Galenus clarissimè pharmacū excludit per ea verba, dum habet, mulieri grauidæ nullum validum auxiliū adhiberi posse. validum enim auxiliū est pharmacia, ut ubique ipsemet docuit, et inquit, quòd mulieres utero gerentes in febribus mediocribus non sufficienter purgantur, consumat in his excludendum esse

*An Galenus  
admisceret  
purgantia phar-  
maca in utero  
gerentibus, ubi  
materia non turget*

*Galenus lib. 5.  
Aphor. 55.  
ubi dicitur  
mulieres  
utero gerentes  
in febribus  
mediocribus  
non sufficienter  
purgantur*

pharmacum non purgantur enim sufficienter; quoniam in eis illa tantum purgatio adhiberi potest, quam docuit lib. ij. Meth. cap. 9. in febribus putridis administrandam esse, ubi monuit expellenda esse ea, quæ putruerunt, per vrinas, & aluum, & sudorem; & quandoq; per vomitum, si materia sua sponte eò impetum capiat; ad quam intentionem pti sanam proponit; & aquam mulsam, & oximele, & apomele, & decoctum radices apij: quod si venter sponte nihil red dat, aquam mulsam cum oleo injiciendam per clystere iubet. talem purgationem; quæ imminuere materiã potest, in vtero gerentibus administrare possumus: at eam, quæ eradicare materiam peccantem potest, ut quæ pharmaco electiuo tentatur, non utique debemus, cum in his valida præsidia adhibere nequeamus; & ideo iure dicebat Galenus, quod cum hæ sufficienter non expurgentur, quoniã integro pharmaco expurgari non possunt, superest in his aliquid vitiosorum humorum, cuius merito febres, vel protrahuntur, vel recidiuæ fiunt. Qua de re concludatur, pharmacum in vtero gerente nunquam, nisi turgente matetia, ad ministrandum esse.

*An liceat pro  
uocare abortũ  
dum prægnã-  
tes morbo la-  
borant.*

Qui priscam hanc medicorum antiquorum sententiam non animaduerterunt, vel neglexerunt, non tantum ad expurgandas mulieres vtero gerentes, sed etiam ad prouocandum abortum pharmacum exhibere ausi sunt. Hi conspicientes mulierem grauidam pleuricide, peripneumonia, angina, febre ardenti, & simili alio acuto detineri morbo, aut casum esse ferè impossibilem curatu. quoniam ratione gestationis vteri mulier debita, & opportuna his morbis non potest ferre remedia. vnde necessarium est, ut vel mater, vel foetus pereat. iudicant autem; ut saluent matrem, foetum excludendum, & abortum procurandum esse; ut mater à statu hoc naturali liberata tutius possit omne remedii genus admittere; & ideo ad hanc intentionem nonnulli ausi sunt exhibere pharmacum soluens, & alia abortiva medica-



menta, dicentes satius esse, foetum interfici; ut saluetur mater, quàm eundem vnà cum matre periclitantem ex prætermisso pharmaco conseruare velle, quod postea in vtriusq; perniciem cessurum esse affirmant. Hæc sententia nequaquam admittenda est, ut potè quæ nec monumentis antiquorum, nec rationi consona sit. Hippocrates in Iusiurando suo promittit se nulli feminae, quò partum abigat, perdatuè, medicamentum vnquam daturum esse, monetq; in lib. de natura muliebri, vbi mulier conceperit, & prægnas sit, si erysipelas in vtero fiat, cum tamen eam perituram censeat, non vtendum esse his cibis, ac potibus, à quibus foetus corrumpatur. Galenus nunquam docuit abortum procurandum esse, foetusq; ita semper curam habuit, perindè ac viuientis hominis. & in morbis acutis mulierum prægnantium monuit lethale esse abortum causari. Vnde lib. 5. Apho. comm. 30. explicans Hippocratis sententiam dicentis, Mulierem vterò gerentem capi ab aliquo morbo acuto lethale esse, huius rationem assignabat, imminentem abortum, qui ex duobus pendere potest, primò ex magnitudine febris foetum occidentis, secundò ob tenuem vitam in morbis acutis necessarium, qui obseruatus, ex alimenti defectu, conceptum destruit: quare cum lethale sit mulieri prægnanti capi morbo acuto ex parte foetus, quia eius imminet abortus, hinc clarè liqueat in morbis grauius nunquam abortum procurandum esse; cum enim hic casus per se semper sit discrimine plenus, si in morbo grauiori contingat, cum malum malo addatur, res in extremum vitæ periculum deducetur: quare nunquam nec pharmacum, nec abortiuum medicamentum ad hanc intentionem exhibearur, sed semper incumbat Medicus conseruationi foetus, quantum in eius potestate erit, omnia rectè circumspiciens, & mensurans, foetusq; & matris simul summam habens rationem, nè partu interfecto, vnà & matrem interficiat. ut sæpè factum esse ab his Medicis apparet. quòd si

oppositum nonnunquam visum sit, vt superius dixi, hoc nõ rationi, sed robori mulierum, per quod errata medicorum tolerare potuerunt, adscribant. & hæc de vsu horum trium auxiliorum in mulieribus, dum vtro gerentes morbo acuto laborant, administrandorum.

*De Morbis acutis puerperarum, Cap. XXXII.*

**A** Partu solent accidere puerperis plura incommoda, eis tantum peculiaria, sicuti secundæ retentio, dolores ad inum ventrem, & circa vterum, mensium diminutio, vel suppressa, vel superflua expurgatio, vel eorundem deprauatio, ex lactis generatione febres validæ, & quæ huiusmodi sunt classis, de quibus hic non agam, cum ab omnibus in proprijs eorum capitibus exquisitè pertractata sint. His autem aliquandò superuenire solent acuti morbi, & apprehenduntur vel à pleuritide, vel à peripneumonia, vel ab angina, vel à phrenitide, vel à febre ardenti, vel ab aliquo simili, & graui morbo. quare perscrutandum erit, cum hoc nõ ita liqueat, quomodo in his, sicuti & in superioribus, medicus gerere se debeat, & quò ad victum, & quò ad venæ sectionem, & quò ad pharmacum. Quò ad victus rationem sciendum est, communè esse ferè omnium mulierum errorem, existimantium à partu statim optimis alimentis reficiendas, & nutriendas esse puerperas, vnde ad iura caponum, ad eorundem carnes, ad aromata, ad vina vinosa statim deueniendum esse opinantur, in qua occasione nisi prudens assistat mulier, vel diligens aduocetur Medicus, qui iuxta Hippocratis, & Galeni sententiam lib. 7. Reg. acut. 13. afferentium, ab euacuatione ad pleniorē victum non properandum esse, hæc errata animaduertant, subsequi cōsuevere grauissimi morbi, caueant igitur puerperæ à tali genere victus, & vtantur ferèulis tantum in iure primis diebus, abstinentes à carnibus, & vino, & aromatibus, ac ceteris, quæ febrem vel inducere, vel augere apta sint. ad quæ om-

*Victus ratio  
seruanda in  
morbis acutis  
mulierum  
prægnantium.*

nia deuenient subsequenti tempore pro ratione & virum, & status mulieris. Si autem hoc tempore contingat, puerperam apprehendi acuto morbo, victus tenuis imperetur, & hoc maximè, si hoc primis diebus euenerit, quo tempore facilius, quàm in processu puerperij, solent mulieres tenuem victum tolerare; tunc igitur exhibeatur prisana, quæ, si optimè parata, & cocta fuerit, nullos poterit edere flatus, & hæc diluatur iure pulli tenuioris, quod idem pro potu commendando exhibendum esse. vinum enim omnino excludendū est, & potus aquæ etiam optimè alteratæ in pluribus mulieribus solet ventriculi, vel vteri dolores ob flatus inde genitos inducere, consuevitq; puerperis mirum in modum aduersari. si tamen habeamus patientem boni habitus, robu sti ventriculi, & quæ vterinis affectibus molestari non consueverit, in hac poterimus aquæ potum cum cinamomo, vel aliquo semine odorato alteratæ, admittere, vt interdū ego feci, qui puerperas tales cum potu huiusce aquæ in acutis passionibus vsque ad septimam, & nonam diem sæpè detinui. lutea ouorum, & cætera, quæ pleniorē reddere victum solent; non admittantur, nisi vires, quæ semper in quocunque casu manutenendæ sunt, hoc idem iudicent: à quibus semper iudicatio cibi reguletur, qui & quò ad qualitatem, & quò ad quantitatem semper sit talis, vt nunquam hinc morbus ingrauescat.

Quò ad sectionem venæ considerandum est, an morbus acutus vel in principio puerperij, vel in medio tempore, vel in vltimis diebus partus puerperam apprehenderit; si enim hoc à principio factum sit, licet in morbis acutis florente ætate, & constantibus viribus, semper sit secunda vena: tamen cum à partu statim, & per primos illos dies copiosè naturaliter expurgentur mulieres, nulla alia tentanda est sanguinis euacuatio, quàm quæ à natura rectè & naturaliter operante dirigitur: quæ tamen si supprimatur, vel imminuatur, tum ad tollendum morbum & affectum præter natu-

*Sanguinis missio quò, & quæ paranda in morbis puerperarum.*

ram, tum ad propocandam naturalem euacuationem secen-  
tur venæ inferiores, & copiosè mittatur sanguis; quoniam  
copiosa etiam esse debet ex præscripto naturæ mensû tunc  
temporis purgatio. Si autem medio tempore acutus super-  
ueniat morbus, duo consideranda erunt; primum, an mor-  
bus pendeat vel à materia in particulari loco conculcata,  
vel à materia sparsa; secundum, an mulier conuenienti ex-  
purgatur mensura, vel non. si à sparsa generetur morbus  
materia, vt fit in febris, mulierq; non perfectè expurga-  
ta sit, statim ad sectionē venarū inferiorū descendere debe-  
mus; quoniā hinc materiæ minorationē, & naturalis expur-  
gationis prouocationē habebimus. Si autē mulier sufficiē-  
ter expurgetur, morbusq; inuale scat, nec euacuatio natu-  
ralis morbo satisfaciat, venas inferiores secabis, tantumq;  
detrahes, quod ex coniunctis ambobus pficiatur, quod po-  
stulat morbus, vt docuit Galenus lib. 9. Meth. cap. 5. si ta-  
men febris admodum intensa, incendiumq; magnum ade-  
rit, id fiat, quod nunc in morbo à materia in loco particu-  
lari conculcata, & putrescente facto agendum esse decla-  
ro. Vbi particularis aderit acutus morbus, vt puta pleuri-  
tis, vel angina, vel similis alius affectus, si grauis is sit, val-  
deq; instet, & indicet de sectione venæ, siue expurgetur suf-  
ficienter, siue non, statim deueniendum est ad sectionem ve-  
narum superiorum è directo loci affecti existentium, & ei  
proximiorum; quoniam ita à loco affecto euacuanter mor-  
bum facilius tollemus, quàm si inferiores secemus, quæ nec  
proximæ sunt loco affecto, nec ab eo euacuari possunt, im-  
mo has secantes virtutem ex euacuatione labefactabimus,  
& materiam in loco particulari conculcatā non minuemus.  
hoc pateat exemplo angina, quæ instante secanda statim est  
humeralis vena, vt à loco affecto educatur, & reuellatur  
materia: si autem inferiores secuerit, vel totum ferè san-  
guinem educes ad reuellendam, & euacuandam materiam  
suffocantem, vel ex ea sectione adeo tarda succedet vili-

tas, vt prius mulier ex angina ea extincta fuerit, quàm per  
 sentiat reuulsam fuisse materiam à loco affecto. Hoc tamẽ  
 cum hac conditione exequatur, quòd antequam minister  
 ad secandam accedat venam, fiât frictiones ad coxas, & cru-  
 ra; quibus factis, fiant ligaturæ dolorosæ in medio coxarũ,  
 ita quòd detineantur, quoad secta fuerit vena: à misso san-  
 guine paulò post soluantur, & tunc cucurbitulæ iisdem ad  
 coxas in parte interiori applicentur, vel saltẽ frictiones illæ  
 repetâtur. hinc habebimus materiei peccâtis minorationẽ,  
 loci affecti alleuiationẽ, & purgationum naturalium conser-  
 uationẽ. Hoc idem censeo faciendum esse in febribus ardẽ-  
 tibus, & vehementioribus. quoniam licet materia sit sparsa;  
 tamen incendium tantum est circa cor, & viscera, vt ex  
 eorum longinquæ venæ sectione non ita mitigari, & extin-  
 gui flamma possit, sicuti ex proxima, & maiori, qualis est  
 basilica. Quem curandi modum non solum prædictis ratio-  
 nibus persuasus seruandum esse censeo, sed etiam affir-  
 me hoc felici experientia confirmasse: quod idem non solũ  
 in puerperis, sed etiam in cæteris mulieribus morbo acuto  
 detentis, dum menstrua purgatione naturaliter euacuan-  
 tur, seruauĩ, hoc vnum tantũ animaduertens, vt dum in  
 principio copiosè purgantur, rem naturæ dimittam: post  
 principium autem statim, supradictis conditionibus obserua-  
 tis, ad superiorum venarum sectionem deuenio, indeq; vti-  
 litatem ægrotantium salutare euentu consequor. Si autem  
 in vltimis diebus puerperæ morbo acuto laborauerint, iisdẽ  
 conditionibus habitis, & obseruatis idem agatur, quod do-  
 cui agendum esse in medio tempore, hoc animaduertens,  
 quòd semper quò magis distamus à die partus, cò tutius  
 possumus ad venarum superiorum sectionẽ ascendere; quò  
 autem magis illi appropinquamus, etiam in medio tempore,  
 hoc idem maiori cum præmeditatione agendum erit. nisiq;  
 instet morbus, vrgeatq; eius acuties, sique naturalis expur-  
 gatio copiosa fuerit, ab eis abstinere poterimus. si autẽ non

copiosè expurgentur; venas inferiores ad supplementū de  
bitæ quantitatis secabimus. si tamen oppositum contigerit,  
seruetur id, quod urgente, & instante acuto morbo agen-  
dum esse declaravi, venæq; superiores in talibus casibus nul-  
la cum hesitatione tutò, & cum ratione secantur.

*Pharmacum  
purgans an in  
puerperis ad-  
ministrandum  
sit.*

De pharmaco hæc pauca notanda sunt. Dum expurga-  
bitur mulier, purgationesq; naturales fuerint, nullo pacto  
admittatur pharmacum; per hoc enim materia à proprio di-  
uerteretur opere. si tamen purgationes non naturales fue-  
rint, fluxioq; albida, vel alterius non naturalis coloris pro-  
dierit, cocta existente materia, ultimo puerperij tempore  
tutò administrari poterit. quod nunquam in primis diebus  
à partu exhibendum censeo; quoniā ex naturæ præscripto  
moles sanguinea, quæ ex conceptu detenta, & non purgata  
fuit, educenda est. quod sola sanguinis euacuatione, nō phar-  
maco peragendum venit. Vbi autem non expurgetur mu-  
lier, remediaq; ad hoc opportuna incassum tentata sint, ma-  
teriaq; morbi sit cocta, transactis primis diebus à partu, le-  
uiori pharmaco educi poterit. vehementiora enim in his ca-  
sibus vereri oportet, solaq; assumenda sunt ea, quæ inter  
benedicta recensentur. quæ eadem tutius, & absq; vilo di-  
scrimine in vltimis diebus, cum non expurgabitur mu-  
lier, administrari poterunt. hæc de tribus his auxi-  
lijs vel in vtero gerentibus, vel in puerpe-  
rio existentibus, dum acuto morbo  
detinentur, administran-  
dis sufficiant.



PETRI SALII DIVERSI  
MEDICI, AC PHILOSOPHI  
FAVENTINI.

ANNOTATIONES IN LIBRUM  
DONATI ANTONII AB  
ALTOMARE.

De medendis humani corporis malis.



Vemadmodum per ea, quæ hucusq; à me explicata fuere, non aliud declarare volui, quàm vt eos, qui huic nostro studio se addicunt, cōmonestacerē, vt antiquorum scripta nō conuiuentibus oculis, sed quāta possint diligentia, & sedulitate per-

legant; ita per hæc, quæ mōx expositurus sum, non aliud intendo, quàm eosdem admonere, cum artis nostræ partem factiuam attingere voluerint, ne ita fidant recentiorū sententijs, vt ab eis existiment artis medicæ absolutam perfectionem accipere posse; plura enim ab huiusce classis hominibus literarum monumētis mandata sunt, quæ nec Hippocratis, nec Galeni principijs satis consonare videntur.

Quæ omnia si examinanda forent, res in vastum, & amplissimum volumen esset transponenda. Quod nè fieret, cogitavi ego vnicum ex recentioribus proponere authorē, qui, & secundum Galeni, & Hippocratis principia artem medendi docuerit, & qui ita metam hanc attigerit, vt ei meritō, iureq; inter omnes, qui hucusq; hanc medendi rationē exposuerint, primas quisq; tribuere debeat. Hic est Donatus,

Antonius

Antonius ab Altomari, Medicus Neapolitanus, Vir insigni doctrina, & exercitatione præditus; cui, & nostra studia, & qui à morbis vexati à nobis artibus huius implorant auxilium, plurimum debent. Hic de medendis humani corporis malis absolutum edidit volumen, quod quibus excellentiam nullo est pacto à nobis negligendum; imò à nemine, qui hanc nostram profiteri velit scientiam, iure prætermittendum est, non tamen ita est admittendum, ac si nihil in eo sit, quod sub diligenti examine positum, veritati, aut antiquis præcorum Medicorum decretis refragetur; Cuiusmodi nunc quedam particularia loca exponens clarè ostendā, hoc vnum animaduertens non omnia, quæ difficultatem, & examen pati potuissent; me breuitatis gratia propositurum, sed nonnulla tantum, tanquam exemplaria, quorum merito iuniores perspicere valeant, non esse ita simpliciter huiusmodi authoribus credendum, sed necessarium ad adipiscendam perfectam huius artis notitiam præcorum Medicorum volumina euoluenda, & cum maxima attentione perlegenda esse: dum autem hoc exequar, si quid à me in singularibus his morbis obseruatū est, cæteris comunicabo.

*Cap. Primum de Memoria deperdita.*

*Memoria deperdita an causetur ab intemperie materia.*

**S**upponens Author affectum hunc pendere ab intemperie frigida ex Galeno, & deueniens ad causas inquit, alias esse externas, alias internas; internas recensens ait, duas esse, scilicet vel pituitam, vel humorem melancholicum, quibus absentibus ait, obliuionem non ab interna, sed externa causa originem ducere: quæ sententia videtur longè distare à Galeni mente, qui lib. 3. de loc. affect. cap. 4. docet hunc affectum pendere ab intemperie frigida nuda, non ab intemperie cum materia; ut opinatus est author, immo Galenus expressè hæc verba habens, dicebat. Quod si frigus cum humore vehementer intendatur, soporē, stuporemque constituit; sine hoc verò memoriæ nocet, stultitiamque inducit,

ducit, per humorem autem pituitam intelligebat Galenus; quoniam si non pituita, sed melancholicus humor cerebri substantiam occupet, non soporem, sed melancholiā causat, sicuti ipse eodem lib. cap. 5. post medium docet, & tūc nec obliuionem, nec stultitiam introducere, sicuti asserit Author, potest. Quare causa internæ memoriæ deperditæ non poterit esse nec pituita, nec melancholicus humor, cerebri substantiam occupans; quoniam hic melancholiā, ille soporem, & stuporem, non obliuionem, inducit: sed causa hæc interna erit intemperies frigida sine materia, quæ & cum intemperie humida, & cum sicca; & cum his temperatis connecti potest. quæ intemperies humida non intelligitur à Galeno ratione humoris humidi abundantis, sed ratione humidæ temperaturæ solidarum partiū cerebri, sicuti nec intemperies sicca eodē intelligitur ratione humoris siccī abundantis, sed ratione propriæ temperiei siccæ ipsius substantiæ cerebri, in qua re lapsus est author, existimans idē intemperiem frigidam esse iunctam intemperiei humidæ, vel siccæ; quia humor vel humidus, vel siccus substantiam cerebri occupet. Quod ultra id, quod Galeno nō consentit, etiam hoc implicat, quod non daretur memoria deperdita ex pura, & simplici intemperie frigida, existentibus paſsiuis temperatis, in qua, quod ad somnum, patientes secundum naturam, non autem somnolenti, vel non somnolenti se habent; quod tamen admisit, & docuit Galenus cap. 5. in principio. Si autem Galenus lib. 2. de sympt. caus. cap. ultimo inter causas torporis rationis, & memoriæ recenset frigidum succum in cerebro collectum, hunc dicimus etiam memoriæ noxam quidem inferre, non tamen primariō, sed ob altum introductum affectum, sicuti vel per soporem, vel per lethargum, vel per similem introductum morbum; quoniam his morbis præsentibus semper læditur memoria, non autem quod vitiosus succus in cerebro collectus possit memoriā lædere, vel sine sopore, vbi non putrescat

scat putuita, vel sine lethargo, vbi eadem putrescat. Quòd si non pituitosus succus, sed melancholicus is sit, qui in cerebro collectus est, non propriè memoria lèditur, sed melà cholia introducitur, per quam delirare, timere, & mædere possunt ægrotantes, non tamen propriè memoriæ lèsiônè incurrisse dicantur. Qua de re pro curatione memoriæ deperditæ non debemus attendere humores hos peccantes, tanquàm causas huius morbi proximas, sed tanquàm materias, si adsint in corpore superabundantes, quibus præsentibus curatio morbi non est tentanda; quoniam vniuersalibus particularia sunt præmittenda.

*An memoria deperdatur sè per ratione in temperiei frigida.* At hæc Galeni sententia, quòd obliuio ab intemperie frigida pendeat, non leuem penes me difficultatem habet; cum enim nouerim, videamq; plurimos insigni frigiditate cerebri laborantes, quorum nullus memoriæ noxam patitur, suspicari cèpi, an hæc positio vera esset. quod idem mihi suspicandum persuadebat multitudo ægrotantium, quia Medicis ad Embrochas naturalium aquarum calidarum ad remouendam indè cerebri frigiditatem relegantur; hi enim quamuis insignem capitis frigiditatem habeant, nullà tamè ex hac obliuionem incurrunt: quæ nihilominus, si Galeni argumenta à similitudine causarum efficientium, & à similitudine animalium frigidorum, non à re ipsa desumpta, vilius existant roboris, succedere posita causâ deberet: quod tamen non tantum non vidi factum, sed eius etiam oppositum obseruauì. In nonnullis enim obliuiosis, quos curandos suscepi, nullum frigoris manifestum indicium animaduerti, & in aliquibus adesse insignem cerebri calorem perspexi, quos adhibitis circa futuram coronalem refrigerantibus auxilijs adiui; non nego tamen me in plurimis etiam insignem frigidam intemperiem cognouisse, sed hoc non esse perpetuum animaduerti: quare iure dubitauì, an ab hac sola intemperie memoria ipsa vel diminueretur, vel in totum deperderetur, In quam eandem hæsitatiônem me casus in-

ita describendi impingebant. Ab ictu cerebri valido non  
 mus in aliquibus memoriam abolitam esse, legimusq; præ  
 stantem philosophum ex lapidis vehementi in capite percus  
 sione omnium scientiarum, & disciplinarum eius oblitum  
 esse. Testatur Galenus hoc ex Thucydide referens, non  
 nullos peste laborantes, posteaquam ab ea saluati fuere, om  
 nium præteritorum ita recordationem amisisse, vt & lre  
 rarum, & artium, & suorum etiam nominum amplius nō  
 meminerint. At quæ ex ictu in cerebro accepto, vel ex pe  
 ste frigida intemperies in cerebrum ipsum introduci potest?  
 Præterea curavi ego iuvenem obliuio fuit, qui tantum præ  
 sentium rerum recordationem amiserat, earum autē, quas  
 antea cū annis edidicerat, memoriam integram seruabat;  
 carmina enim plura, quæ memoriæ olim mandauerat, con  
 cinnē, & compositē recitando cācbat: qui tamen à pran  
 dio statim interrogatus, quo alimenti genere in mensa vsus  
 esset, nullius rei recordabatur, nec si ab amicis visitatus fuis  
 set, illis quā primum discedentibus, eorum amplius me  
 minerat. In hoc si intemperies frigida obliuionis fuit causa,  
 cur præteritorum, & non præsentium recordabatur? cum hu  
 ius, si ab intemperie frigida hoc heret, oppositum continge  
 re debuisset. Præ manibus etiam mulierem omnium rerum  
 obliuiscētem habui, quæ ex spontanea per alium euacua  
 tione, per quam biliosa, sanguinolenta, viridia, mucosa, &  
 similia educebātur, amissam memoriam nullo adhibito ipsi  
 cerebro particulari medicamento recuperauit. Alteram cu  
 ravi mulierem hoc idem patientem, quæ ex arte factis eu  
 acuationibus à morbo soluta, pristinaq; sanitati restituta me  
 moriam quidem præteritorum recuperauit, sed illarum re  
 rum, quæ dum ea ægrotaret, circa ipsam administratæ fue  
 rant, vilius non meminerit, ita vt eam me visitasse nec agno  
 sceret, nec recordaretur. Hac omnia me in hanc difficul  
 tatem, vt de Galeni sentētia dubitarem, deduxerunt, indeq;  
 credo deperditæ memoriæ alio rem causam, quā purā  
 intem-

intemperies (sit hæc vel morbus organicus, vel alius quilibet) perscrutandam esse.

*De Lethargo. Cap. II.*

*Lethargus  
duplex est.*

*Lethargus an  
semper sit cum  
putredine.*

*An ex Gale-  
no pituita in  
lethargo sem-  
per putrescat.*

**I**nquit Author ex Galeno, necessariò pituitam debere putrescere, ad hoc ut lethargus contrahatur, quod tamè non ita verum esse videtur; quoniam duplex datur lethargus, alius cum putredine, alius sine putredine pituitæ. Vbi. n. frigiditati iuncta sit humiditas, hoc sufficit ad causandùm lethargum, ut habet Gal. lib. 2. Aphor. commen. 3. in qua tamen indicatione necessariò febrilis requiritur calor, ut habetur lib. 4. de Prognost. ex pulsu, ubi docet, qui pulsus fiant cerebro affecto, & hic lethargus est sine putredine, alius autem est cum putredine, & hic fit, dum pituita putrida cerebrum, ut ibidem docet Galenus, afficit, & hi duo lethargi sicuti differunt abinvicem per putredinem, vel non putredinem materiei peccantis, ita etiam pulsus differentes edunt; quoniam pulsus in lethargo sine putredine est mollis: at in lethargo cum putredine est mollis quidem, sed præbet speciem arteriæ contentæ; quoniam per hunc magis læditur, & tenditur cerebrum, ut loco citato Gal. habet, expresseq; docet, prædictos lethargos abinvicem distinguens.

Cum autem author ex Galeno lib. 13. Meth. cap. 11. demonstrare nititur, quòd in lethargo necessariò pituita putrescat, animaduertatur, quòd Galenus hoc non affirmat, sed inquit, quòd si pituita aliquando putrescat, cum febre fit is affectus, qui lethargus vocatur, per quam dictionem, aliquando, non attestatur omnem lethargum esse cum putredine humoris, sed tantum hoc aliquando fieri, scilicet ut putrescat, & tunc, cum pituita in cerebro putrescet, necessariò fieri lethargum, tamen hoc non includit, quòd in omni lethargo eadem putrescat; quoniam, ut declaratur loco citato lib. 4. de Prognost. ex pulsu datur ex eius mente lethargus, & cum putredine, & sine putredine.

Hic



Hic animaduertant Medici alterum signū lethargi, quod nec à Galeno expressè, nec à Paulo, nec ab Aetio, nec ab alio classico authore positū est, & est delirium quoddā, quod sequitur ad lethargum ex putredine pituitæ genitū, nisi forsā Aetius per illa verba, aliena loquuntur, hoc idem intellexit. Hoc videbunt in praxi artem hanc exercentes, sicut ego saepius vidi, nec hoc erit præter rationem; quoniam licet in lethargo ab omnibus scribentibus ponatur rectricium facultatum diminutio, vel abolitio, non deprauatio, non tamen verificatur in omni lethargo, sed in eo tantum, qui est sine putredine. Et si dixerit Galenus lib. 2. de sympt. caus. cap. vltimo. succos delirium causantes omnes esse calidos, & mordaces, præter eos, qui melancholiam causant, ex quibus habetur pituitam non posse delirium causare. Animaduertatur, quod pituita de se non potest delirium ob propriam frigiditatem inducere: si tamen putrescat, incalescit, mordacitatemq; acquirit, cuius ratione delirium aliquod leue gignere poterit; & ideo in lethargo, vbi pituita putrefcit, erit aliquale delirium. Hoc ultra experientiam confirmatur pulcherrima Galeni sententia lib. 3. Epid. sect. 3. comment. 45. ita dicentis. Non est igitur nouum in corpore crudis collectis humoribus, ut excrementa cominostrant, esse sopitos illos simul, & dementes euasisse. sopitos quidem ex multitudine, & frigore succorum crudorum; dementes, quod acredinem pariebant, & calorem putrescentes.

Deueniens Author ad exponendam curationem lethargi, dicit maximam esse similitudinem lethargi cum memoria deperdita, propterea eorundem curationem ferè similem esse: quod nedum non est verum, sed etiam oppositū constat; nam lethargus est morbus acutus, memoria deperdita longus; lethargus est morbus lethalis, & valde periculosus, at memoria deperdita, nisi alteri coniuncta sit morbo, omni caret vitæ periculo; lethargus fit à materia, memoria deperdita à nuda intemperie; lethargus habet necessariò  
semper

*Lethargū ex putredine con-  
sequitur ali-  
quale deliriū,*

*A frigidis suc-  
cis sed putre-  
scentibus causa-  
tur delirium.*

*Lethargi, &  
memoria de-  
perdita cura-  
tio an coinci-  
dant.*

semper febrem coniunctam, memoria deperdita, quantum sit de se, nunquam; quare non tantum non sunt similes, sed valde dissimiles, & ideo iure etiam curatio dissimilis esse debet.

Pro potu statuit lethargicos uti debere hydromilite, vel vino albo, aquoso, tenui, adstringente. de hydromilite, coquatur; at de vino hoc asirino, videlicet omnino abstinendum esse ab omni genere vini, usque ad morbi perfectam, & uniuersalem declinationem; quoniam vinum omnes inflammationes membrorum principalium proritat.

Vena secanda, inquit, sit media, vel interna, Ego autem ex Galeno dico secandam esse humeralem, quod pluribus docuit locis, precipue autem lib. de curandi ratione per sang. miss. cap. 16. in quo hanc habet claram sententiam. Nam hi tres sunt loci mittendi ex cubito sanguinis, interior, exterior, medius. Igitur interior utilis est in ijs, quibus inferiores collo partes patiuntur; exterior in ijs, quibus quæ his superiores sunt, ut facies, aut caput; medius locus interdum utraque habet diductas venas in ulteriorem brachij partem tendentes, ac deinde hinc coeunt, interim uero celeriter in unum mutuo congregientes, ipso videlicet iunctura flexu, ac nonnunquam obscuram earum alteram, claram vero alteram; itaque ubi vena, quæ parti affectæ propria est, obscurior fuerit, & ad mediarum aliquam accedas, conare, quæ à propria diducitur, potius incidere, &c. Ex quibus patet humeralem in capitis affectibus semper secandam esse, nunquamque deueniendum ad mediam, nisi existente superiori obscura, in incidendaque; media semper secandam esse eam, quæ ab humerali diducitur.

Quò ad purgationem laudat in lethargo medicamenta ab eo proposita in curatione deperditæ memoriæ; quoniam tamen auctor omisit hic medicamentum celebre, & utilissimum, ac in lethargo specialem habens convenientiam, id pro Iunioribus ratione sauitici huius morbi notabo, quod est scammonia una cum castoreo exhibita, quæ licet non videatur

videatur opportuna, cum scamonea dicatur bilem, non pituita, cuius educationem in lethargo tentamus, euacuare; tamen conuenientissimum est medicamentum, ac antiquissimum, & à Rufo Ephesio valde in lethargo celebratum, vt refert Oribasius lib. 17. coll. Med. cap. vltimo, quod eo magis ratione probandum est, cum ex eodem Rufo non solum bilem, sed etiam pituitam bili impermixtam educat, vt eod. lib. cap. de scamonea recensetur, vtque experientia veritatis ministra pluries testata est.

In enumerandis particularibus remedijs probat castoreum vel aceto, vel oleis commixtum capiti administrandum esse; At ex Gal. lib. ij. de simp. med. cap. de castoreo habetur, hoc rosaceo admixtum non tantum capiti, sed & collo affusum valde prodesse posse.

In parando sinapismo iubet sinapi acetò macerandum esse, cuius rei præter id, quod ei experientia refragatur, oppositum docuit Actius lib. 3. cap. 181. & Oribasius lib. 10. collect. med. cap. 13. monentes ex aceto sinapismum obrusus reddi, quod idem animaduertens Iacobus Holerius lib. 3. de chirurgicis institutionibus cap. 5. de pyroticis testatur aceto vim sinapis exolescere, quare aceto aqua præferatur. Ego tamen aliquando, vbi vehementius desideravi hoc medicamentum, in hunc usum lixiuium assumpsi.

*Sinapismus  
quando rectè  
parari debeat.*

Docuit Author hoc eodem capite ex communi omnium sententia lethargum fieri à pituita; sciant tamen omnes ex mixtione bilis, & pituitæ etiam fieri posse lethargum, vbi bilem ipsam pituita superabundauerit, & tunc licet sit horum humorum miscella, tamen exquisitus lethargus vocabitur, vt docet Gal. lib. primo Prorreth. commen. primo hæc verba habens. Nonnunquam & in horum alterum res ita deflectit, vt vel bilis, vel pituita superior sit, ægerque reddatur aut phreneticus exquisitè, aut lethargicus. In quo casu sic perspicax Medicus tum pro morbi cognitione, tum pro eiusdem curatione; quoniam præsentè bile ea medicamen-

*Lethargus an  
fiat ex sola  
pituita.*

ta, quæ in lethargo à sola pituita sunt administranda, cum aliquo temperamento paranda erunt, aliàs apta erunt maxima nocumenta agrotantibus ipsis inferre.

*Lethargus  
quãdoq; cau-  
satur ex per-  
mutatiõe phre-  
nitidis.*

Huius etiam ratione animaduerto quandoq; fieri lethargum ex permutatione phrenitidis, vt habetur lib. 3. Epid. sect. 3. comm. 45. & Aetius in proprio capite, & tunc nõ à pituita lethargus ortum habebit; hoc enim vt plurimum cõsuevit contingere ex refrigerantibus medicamentis in phrenitide intempestiuè adhibitis, & tales lethargi sunt forsan insanabiles, vt haberi potest ex Galeno lib. 3. Epid. sect. prima. commen. 7. nec in talibus lethargis vnquam conueniunt reperiencia; quia materia iam impacta est, nec aliunde fluit.

*De Caro. Cap. III.*

*Caros, & le-  
thargus quo-  
modo differat.*

**D**iffert, inquit, caros à lethargo, cum ab eadem materia dependeant, scilicet à pituita cerebrũ irrigante, quòd in caro nõ putrescit pituita, sicuti putrescit in lethargo. Quod tamen nequaquam verum est; quoniam, vt supradictum est, ultra lethargum ex putredine, datur & lethargus sine putredine. At in hoc differunt, quòd in caro, quantum sit ratione sui, non adest nec febris, nec putredo, sicuti etiam nec in apoplexia, & catochè; at in lethargo necessariò adest febris, & quandoq; putredo.

*De Catoche, & Catalepsi. Cap. II.*

*Catoche, &  
catalepsi qd  
sit.*

**T**ranscribit Author ex Aetio huius morbi symptomata, in quo notandum est, quòd Aetius non concordat cum Galeno in essentia huius morbi; quoniam Aetius describit morbum cum febre medium inter phrenitidem, & lethargum, mentem, non corpus occupantem, & deprehendentem: at catalepsi, & catochè ex Galeno est affectus sine febre, deprehendens tum mentem, tum corpus; ex quo sequitur, vt agrotans in ea figura permaneat, in qua deprehensus

sus est à morbo, & inde rigidus totus maneat sine loquutione, & sine sensu, vt videatur statua immobilis, tuncque nec si pungantur, sentiunt, nec in parte vlla mouentur; ita vt si palpebris apertis deprehensus sit æger, oculis apertis manet, nec tamen videt: cuius rei testimonium est, quòd post accessionem nullius rei, quæ facta sit in accessione, recordatur; Vnde sentiendum est, alium esse casum Actij, alium Galeni, cuius ratione credo nunquam Authorem vidisse, aut curasse morbum hunc; aliàs in confundendis his signis, & symptomatibus valde lapsus est Galeno contradicens. hoc hinc pateat, dum ex Aetio hæc verba transcribit; Admouent autem manus suas aliquando ad caput, & oculos, ac nares, velut qui vellicentur, atque hoc non sentiunt. hoc clare ostendit, ipsum mentem Galeni non perfecte assequutum fuisse, nec vnquam vidisse ægotantem catoche deprehensum; quoniam hi adeò rigidi sunt, vt nullam corporis partem, nec palpebras etiam moueant; immo tanquam immobiles larvæ se habeant. quare mirandum est, quomodo huic morbo adaptare velit Actij sententiam de alio morbo, in quo non est rigiditas corporis, nec immobilitas, loquentis.

Dum ex Aetio etiam transcribit, quòd in hoc morbo spiritus aliquando est densus, aliquando rarus, & quòd nonnunquam per intervalla quædam ducitur magnus spiritus, clare opponitur Galeni decretis, qui in lib. 4. de locis affectis cap. 2. dicebat, quòd in sopore, & catalepsi seruatur spiratio secundum naturam

*In Catoche an spiritus à naturalibus nutrentur?*

Quærens Author, ad quem cerebri morbum sequatur catoche, statuit ex Galeni mente lib. 2. Apho. commen. 3. hunc affectum consequi frigidam, & siccam cerebri intemperiem ex frigidiori, sicciorique materia ortam. Recensens autem in hoc Pauli autoritatē sentiētis Catalepsidis causam ortum habere ex obstructione posterioris cerebri ventriculi à frigidiori, & sicciori materia causata, eius sententiam videtur paruipendere. vnde concludens ait. Hos ve-

rò, qui in hoc, veluti in aliis, Galenum præcipuè sectamur, ex frigida tantum, & sicca cerebri intemperie ortum habere fateamur. Attamen nos pro Paulo in oppositum demonstratam habemus rationem. nam cataleptis, seu catoche subito accedit, & subito generatur; igitur non ab intemperie, sed à materia, & ea quidem obstructè, causatur. Ratio hæc erat Galeni lib. 3. de loc. affectis cap. 5. ad demonstrandum Epilepsiam ab intemperie non posse generari. quam eandem rationem assuebat eodem lib. cap. 7. ad probandum idem de Apoplexia, hæc verba habens. Apoplexiæ autem quod subito euehiat, aut frigidū succum, aut crassū, aut viscidū, qui principales cerebri ventriculos affatim implet, nō totius substantiæ intemperiem, causam esse, manifestum est. Obstructio autem hæc in catalepsi contingens, omnes quidem cerebri ventriculos occupare solet, sed præcipuè, & magis posteriorem, ut habetur à Paulo, qui hanc particulā à Galeno ex lib. 4. de loc. affect. cap. 2. trāscripsit, & hæc de causa in catoche patientes semper rigidi sunt, & hinc eum statum, in quo à morbo deprehensi fuerē, conseruant, non tamen semper priuantur, vel visu, vel auditu; quia in aliquibus non fit completa catoche, & ideo anteriores cerebri ventriculi non omnino obstruuntur; cuius ratione quoque patet sensus illi, qui ab anteriori parte cerebri ortum habent, conseruari possunt. Ex tali autem obstructione, etiam ubi totalis extiterit, nobis fit apoplexiā, sed catoche; quia ad apoplexiam causandam requiritur, quod omnes cerebri ventriculi æquè, & insigniter obstruantur. præterea in apoplexia non solum cerebri ventres, sed etiam corpus, & corpus magis, quàm ventres, affici solet, ut habetur à Galeno loco citato lib. 4. de loc. affect. cap. 2. At in catoche non æquè omnes cerebri ventriculi, sed præcipuè postremus leditur, nec in catoche corpus cerebri, sed ventriculi tantum, & potissimum posterior afficitur. cum autem à posteriori cerebri parte ortum habeant, & spinalis medulla, & nervi

duri



duri motui inferuientes, non est mirum, cum obstructio hæc à sicciori, & frigidiori materia, idest à succo melancholico, qui exustionem adhuc non senserit, causetur, si omnia corporis membra ab hac parte nervos, & motum recipientia in catoche rigiant, cum frigidum, & siccum aptum sit res ipsas indurare, materiæq; hæc obstruens propriam qualitatē, & naturam partibus inferioribus impartiatur. Quemadmodum autem talis obstructio non est apta inducere apoplexiam, pariter nec apta est inducere epilepsiam; in epilepsia enim materia à natura agitur, stimulata ad motum propter exitum animalis spiritus, concutiturq; cerebrum ad explosionem materiæ obstructis: at in catoche materia obstruens est fixa, & firmata, nec insurgit natura ad eius expulsionem: nec in catoche materia hæc ullam pravam (qualem in epilepsia forsitan necessariò habere debet) qualitatem adepta est. Et ideo catoche à tali obstructione causari, summa cum ratione censendum est, non autem ab intemperie, sicuti ex Galeni mente loco citato lib. 2. Aphor. commen. 3. probare nititur Author. Non enim Galenus sibi per refrigerationem unā cum siccitate iunctam puram intemperiem frigidā, & siccam intelligit, sicuti nec per refrigerationem humiditati mixtam intelligit puram intemperiem frigidam, & humidam, sed intendit per hæc Galenus declarare materias, non intemperies, morbos hosce causantes. Quare: (inquit) refrigeratio humiditati mixta, idest humor frigidus, & humidus (qualis est pituita) lethargica passiones facit; lethargus enim à pura, & simplici intemperie causari nequaquam potest: refrigeratio autē siccitati iuncta, idest humor frigidus & siccus, qualis est succus melancholicus, eas, quas græco vocabulo Cathalepsis, idest depræhensiones nominantur, producit.

Eodem cap. cum proponit prognosticum ex Aetio, ait quod hic morbus est lethargo periculosior, licet in febribus lethargo similibus consistat, ex quo videatur consenti-

*Catoche, & catalpsis an sit cū febre.*

re Aetio dicenti, huic morbo coniungi febrem. Quod est contra Galenum lib. 13. Metho: cap. 11. ubi ponit catochen inter morbos, qui sunt sine febre; & qui ab humore frigido gignuntur, quod idem ultra experientiam testatur & ratio; nam materia causans morbum est frigida, & in loco firmata frigido, nec putrescit, & ideo non potest accendere febrem. Nec etiam est periculosior eadem ratione, & eo magis, cum experientia constet hanc aliquando periodos habere, & accessiones: quod non est in lethargo, qui acutus est, non habens periodos.

*Catoche et catalepsis quid sit.*

Ne autem res ita imperfecte hinc habeatur, hanc sic declaro. Catalepsis, seu catoche est deprehensio corporis in ea figura, in qua a morbo corripitur, cum detentione sensuum tam interiorum, quam exteriorum. Quare hic affectus erit rigiditas totius corporis, in quo auferuntur omnes facultates rectrices tum internae, tum externae; Vnde nec loquuntur, nec vident, nec sentiunt, nec soluta accessione vllius rei recordantur; Morbus igitur hic erit totius corporis rigiditas cum ablatione tam sensuum externorum, quam interiorum; vnde in lib. Finitionum medicarum iure dicebat author ille: Catochus est, cum sensu priuatur anima, corpusque omne, velut gelu, obrigescit; hanc sententiam experientia confirmat.

*Catalepsis historia.*

Monialis hunc morbum patiens ter, & quater in mense nulla praesente febre ab eodem capiebatur, & ea forma, quae eam stantem inuadebat, permanebat, & tanquam statua rigida se habebat, sine motu, & sine sensu erat, adeo ut etiam si tunc temporis pungeretur, vel secaretur, nihil sentiret, nec vllius rei post solutam accessionem meminerat: in resolutione autem accessionis incipiebant quaedam suspiria, & quaedam vox clangosa, cum semper prius sine loquutione muta permaneret. huic aliquando visum est crus sinistrum conuelli, qui forsan est casus similis posito ab Hippocrate lib. tertio Prorrhet. tex. 66. haec curata est a me per vniuer-

uniuersalia & per particularia, & sana facta est.

Quoniam tamen Hippocrates lib. 2. Prorrh. tex. 56. meminit de delirio cum catоче, & ideo videntur catochi loqui posse: & quoniam Galenus in commento narrat historiam iuuenis catоче deprehensi, quem testatur & audiuisse, & vidisse, & meminisse, & ideo videntur sensus, tam interiores, quam exteriores seruari, cuius oppositum posuimus, notandum est hæc fieri posse incipiente, & debili existente catalepsi, completa autem nequaquam. Cuius merito dubitans Galenus de casu Hippocratis dicebat, potuisse incipiente catоче loqui agrosantem, & hinc delirium cognitum fuisse; completa autem minime amplius loqui posse, hoc idem assero de sensibus tum internis, tum externis; quoniam si incipiens sit morbus, seruari possunt, & pariter si levis sit affectus. Vbi autem completus fuerit, aufertur, ut sæpius attestante experientia obseruaui, & ut Galenus innuit in lib. de diff. sympt. cap. 3. in quo habet in catalepsi esse paralytim, seu resolutionem virtutis imaginatricis. Si autem imaginatio in ea omnino est resoluta, nec imaginari, nec inde intelligere, aut memorari aliquid poterunt illi, qui catalepsi deprehensi erunt.

Quando Author curationem proponit, licet intendat, & merito, calefacere, & humectare, non tamen perfecte omnes indicationes explicat; quoniam alia superest intentio à Galeno explicata lib. 13. Methodi cap. 21. & est incisio ipsa; nam cum gignatur hic morbus ab humore frigido, & crasso, non tantum debemus calefacere, & humectare, sed etiam incidere.

Quò autem ad curationem, sciendum est remedia particularia applicanda esse parti capitis posteriori, indeq; ad totam spinalem medullam, quod ultra id, quod consentit Galeno testati lib. 4. de loc. affect. cap. 2. in catalepsi capitis posteriora pati, & ideo ibi remedia administranda esse, etiam huius potest esse iudicium, quòd partes neruosa, pro-

*An in catоче  
seruetur sensus  
tam interiores  
quam exteriores.*

*Catochi indicationes curatiua.*

*In catоче  
quo loco sint  
applicanda remedia.*

pter quarum propriam passionem totum riget corpus, in hoc morbo præcipue patiantur, quæ cum à parte capitis posteriore ortum habeant, indeq; per spinam descendant, idè in his locis medicamenta iure admoûenda erunt. Quod etiam ego affirmo, hoc idè experientia testante, agèdum esse.

*De Comate. Cap. V.*

*Coma qualis affectus sit.*

**A** Vthor hic agit de Comate, seu de cataphora, tanquàm de affectu particulari; sciendum tamen est, quòd coma, siue somnolentum fuerit, siue vigilans; & ex vigilanti siue fuerit simplex, siue pigrum; nunquam de se est particularis affectus, sed est symptoma consequens ad alios morbos, sicuti vel ad phrenitides, vel ad lethargicas passiones, vel ad febres pituitosas, & somnolentas, vel ad alios cerebri affectus, qui vel primariò, vel secundariò ipsum lædât, nisi hoc à causa fiat externa, vt sæpè in ebrijs à vino contingit, quibus coma adeò graue, & profundum, his præcipue, qui debilioris sunt cerebri, succedit; vt eos euigilare ante solutam crapulam, & ebrietatem sit impossibile, sicuti etiam ex compressione ventriculorum cerebri, & maximè ipsius medii subsequi consuevit. Quare non est, quòd iuniores attendant affectum hunc tanquam particularem morbum, quem ipsi curaturi sint, sed eum animaduertant, vt qualitates, & mores prædictorum morborum attendentes, & eorum differentias adnotantes principali morbo summa cum ratione incumbere queant.

*De Phrenitide. Cap. VI.*

*Phrenitis, à qua bus fiat humo ribus.*

**E** xplicans materiam, à qua generatur phrenitis, statuit hanc unicam esse, scilicet bilem, vel pallidam, vel flauam, vel adustam. Ego tamen sentio etiam ex sanguine tenuiori, & calidiori, qui verè naturam bilis attingit, gigni posse, & eandem ex pituita commixta bili, vbi pituitam bilis superabundauerit, fieri assero ex Galeno lib. primo Prorrhæ.

commen.

coriandri primo, & talis phrenitis exquisita phrenitis vocatur; ut ibidem declaratur. Et dubito, an ex frigidis, & tridis succis eadem phrenitis generari queat, propter sententiam Galeni superius iam allegatam; & positam lib. 3. Epid. sect. 3. column. 45. ubi loquens de phrenitide, cui iungitur sopor, inquit hanc generari hoc pacto, videlicet, quoniam ex horum succorum tridorum multitudine, & frigiditate fit sopor; delirium autem ex acredine, & calore, quem iidem pariunt putrescentes; adeo quod vult causari delirium non à qualitate propria succorum, quia sunt frigidi, sed ab extrinseca, quam acquirunt putrescentes, videlicet ab acredine, & calore acquisitis, & à talibus succis putrescentibus causatum delirium cum febre recentet Hippocrates in tertio illo Epidemiarum pro phrenitide, quod idem acceptas Galenus in commento affirmavit; Unde phrenitis non semper causabitur ab humore sui natura acri, & calido. Si autem hinc fieri possit phrenitis, quomodo hæc differat à lethargo, forsitan est, quoniam in phrenitide ingens est pituitæ putredo, ex qua excitatur maximus calor, & maxima acredo, ex quo delirium, & febris est intensa, & acuta; in lethargo autem non est, nisi levis, ex quo febris non est ita acuta; nec delirium ita validum, nec etiam adest vigilia; quoniam acredo, & caliditas non est tanta, quæ frigiditatem eorum remittat.

In phrenitide pro potu ordinat decoctum seminum coriandrorum, qui tamen potus apud me valde suspectus est; cum enim semina coriandrorum ex se apta sint turbare mentem, deliriumque inducere, ut notauit Dioscorides lib. 3. cap. 66. in phrenitide, cæterisque delirij, & desipientiæ generibus non erunt administranda tanquam ea, quæ affectum ipsum augere, & exacerbare valeant.

Nec est, quod hic auctoritatem Auicennæ, qui coriandrum arbitratus est esse frigidum, & ideo ratione propriæ temperici frigida in phrenitide conuenire poterit, opponas; quoniam

*Phrenitis autem possit fieri à frigidis succis*

*Si autem hinc possit fieri phrenitis*

*Coriandrorum decoctum an conueniat in phrenitide.*

niam

in. v. 11  
 h. 11. 11  
 11. 11. 11

niā frigidum, vt ex capite signorum specierum subdit, alijsq;  
 in locis elici potest, viride censuit; humidum enim corian-  
 drum, inquit, aptum est inducere soporem, siccum autem  
 calidum est, vt sensui patet, & turbatio mentis, & delirium,  
 quod à causa tantum calida, præterquam in melancholicis  
 causatur affectibus, hoc idem testatur, in qua re verò demō-  
 strauit Gal. cui utpote inter Medicos Excellentissimo, & in  
 ter Philosophos præstantissimo in iudiciō simpli. medic. ma-  
 gis, quàm Auicennæ credendum est, qui Auicenna cum  
 coriandrum non tantum viride, sed etiam siccum, frigidum  
 censet, vt habet lib. 4. fen. 2. tract. primo. cap. 8. clarè oppo-  
 nitur experientiæ, rationi, & veritati.

Quæ vena se-  
 canda in phre-  
 nitide.

De secanda vena diuersa ex diuersis proponit authori-  
 bus, qui modò hanc, modò illam secandam esse venam do-  
 cent. hoc tamen certum habeatur, tum ex natura rei, tum  
 ex Galeno, vt notauimus in capite de lethargo, quod in affecti-  
 bus capitis sectio humeralis venæ omnibus præfertur. Quod  
 si phrenitici brachium nequaquam porrigant, non secetur  
 vena frontis, vt Author ex Tralliani, & Pauli sententia mo-  
 net; quoniam euacuationes particulares à loco affecto vni-  
 uersalibus non sunt præmittendæ, sed tum aperiantur hæ-  
 morrhoides, quæ in casu isto valde prodesse poterunt, post  
 quarum apertionem sectio. venæ frontis iure administrari  
 poterit, quam profectò laudo: verum magis commendo,  
 vt loco huius venæ narium hirudinibus applicatis aperian-  
 tur; hinc enim valde subleuabitur cerebrum, morbusq; fa-  
 cilius hinc medicamentis cedere poterit. quod repeto, &  
 animaduerto agendum esse, præmissis vniuersalibus eua-  
 cuationibus.

Dum purgationem administrandam esse docet, animad-  
 uertatur hoc intelligendum esse, cocta iam materia, aliàs  
 cruda eadem existente, & nequaquam turgente, in principio  
 inflammationis iniretur purgatio contra Hippocratis, &  
 Galeni mentem, vt aliàs monuimus.



1. Multa docet Author administranda esse in phreniticis ad prouocandū somnū, cū vigiliæ hos maximè molestēt, hincq; magis delirent; sciendum tñ est, quòd in phrenitide potest etiam sopor contingere, vt habetur lib. 3. Epid. sect. 3. cōm. 45. Qui tamen sopor debet esse vigilans; quoniam vigilia est de his, quæ necessariò consequuntur phrenitidem, vt docet Gal. lib. Prorreth. p. com. 1. Quod euenire solet, vbi est miscella bilis cum pituita, quæ inflammationem in cerebro causet, vt ibidem habetur.

*Phrenitidi soporē quādoq; conueni,*

2. De phrenitide hectica in hoc capite nō meminit Author, de qua Galenus loquutus est lib. primo Prorreth. com. 33. cuius signa erunt, cum tremulæ, blandæ, obscuræ, & contractibiles crunt desipientiæ, ita vt fetē non desipere videatur; & talis phrenitis, vt ibidem habetur, necessariò est lethalis, quare cognoscenda, & valde à Medico aduertenda, nè in prognostico decipiatur.

*Phrenitis hectica quæ sit,*

*De Melancholia. Cap. VII.*

3. IN curatione huius affectus laudat ex Actio, & Paulo, qui à Possidonio hoc transcribere, sorbitionē acetī acerrimi post omnem cibum, vbi iam dormire velit æger; qui commendat etiam obsonia aceto intincta cōmedere, quæ tamen sententia valdē suspecta est, cum experimento cōpertum sit omnes melancholicos affectus ab aceto exacerbari; notumq; sit ab Hippocrate, & Galenō (quibus magis fidendum est, quàm Paulo, Actio, & Possidonio) damnari acetum, tanquam medicamentum melancholicis valde obnoxium. vnde lib. 3. dereg. acut. tex. 38. dicebat Hippocrates; Nigra autem ab aceto fermentantur, attolluntur, & multiplicantur. & Gal. in commen. hoc idem affirmabat dicens, Acetum melancholicis aduerfissimum existit.

*Acetum acerrimum an conueniat in Melancholia.*

4. Loquens de melancholia hypochondriaca non declarat, quæ sit affectio, nec quis sit locus affectus. præterea nec in curatione explicauit indicationes curatiuas huius morbi, quæ

tamen

tamen omnia perspicere debet ille medicus, qui huius perfectam curationem assequi vult. Quod ad affectionem. n. declarandum erat, an melancholia hypochondriaca consistat in interperie; & si in interperie, an in calida; vel in frigida; vel an consistat in obstructione, vel in inflammatione, vel in altera consimili affectione. Ratio huius est, quoniam horum omnium inditia habemus, & tamen an in his omnibus, & in singulis consistat hic affectus, non ita notum est. Frigiditatis signa sunt, plurimi flatus, ructus acidi, fluctuationes, plura spiramina à cibo, tarditas coctionis, ventriculi dolores, vomitus crudorum ciborum, sitis, febrisque absentia, & in summa sanatio ipsa; nam ex calefacientibus curari, & sanari videtur hic morbus. Caliditatis autem signa habemus, & fluxum in praecordijs, exacerbationem à calidioribus, & causticis, alleviationem à refrigerantibus cibis, & vomitum materierum sub amararum, & calidarum. Obstructionum autem indicium maximum vel hoc argumento habemus, quod alimentum corpori non distribuitur, sed in ventriculo manet incoctum; cum ipsum meatus antea suscipere, magnamque ipsius partem in imum ventrem excernerent; item quod postera de vomitu reiiciantur, ut pote non digestis per corpus cibis. Inflammationis autem coniecturam habemus ab aestu praecordiorum, à sublata ad cerebrum ab atra bile evaporatione, à sanguinis in loco affecto adustione, & à ciborum refrigerantium alleviatione: quam tamen inflammationem non adesse, etiam hinc conijcere possumus, quod in his nec sitis nec febris adsit, & quod affectio haec admodum diuturna sit, cum tamen vlla inflammatio tandiu protrahi posse non videatur. quare determinandum erat, ex qua harum affectionum fiat melancholia hypochondriaca, & in qua consistat. Quod autem ad locum affectum declarandum erat, an locus affectus in melancholia hypochondriaca sit venae mesaraicae, ut sensit Drocles, vel an (ut alij sensere) sit pylorus, vel sit vena porta, ut quidam dixerunt, vel an sit ventriculus ipse, ut videtur

tur affirmare Galen. & an possit esse lien, vt habetur lib. 6. de loc. affect. cap. primo. & an ab utro, & à semine non tantum in feminis, sed etiam in viris possit hic affectus fieri; cum videamus multas mulieres ex retentis mensibus, & ex abstinentia Veneris (vt etiam testatur Gal. lib. 6. de loc. affect. cap. vltimo in viris contingere) melancholicas fieri. Quæ omnia declaranda erant ad demonstrandam huius affectionis & essentiam, & curationem. quæ vnica instituenda non erat; quoniam non videtur vnica esse vel affectio, vel locus affectus. Vt autem iuniores hanc tractationem integrè assequi valeant, monito eos quamcunque partem in inferiori ventre positam (cuius ratione possit sanguis aduri, & superassari, aut melancholicus succus in eodem aggregari, à quo euaporationes melancholicæ ad cerebrum eleuari queant) posse etiam melancholiam hypochondriacam causare. Hinc à mesaraicarum venarum obstructione quandoq; fit hæc affectio; quoniam cum ex obstructione non ita liberè possint exurgere sanguinem, & per vniuersum corpus transmittere, fit, vt plus iusto incallescens sanguis aduratur, & inde conuersus in humorem melancholicum ad caput euaporet. Similiter si afficiatur pylorus, ita vt in eo, & per eum aduratur sanguis, melancholicas euaporationes causare potest. idè dicatur de vena porta. hoc idè affirmo de pancrea, & valibus illis internis. similiter de liene hoc asseratur. si per eum non expurgetur melancholicus succus, potest ventriculo, & cordi communicari, à quibus eleuati vapores cerebrum inficere possunt. De ventriculo autem hoc animaduerto, per ventriculum non intellexisse Galenum substantiam ipsius ventriculi tantum; quoniam in eo non potest nec sanguis aduri, nec adeò superassari, vt hinc vaporations melancholicæ tolli possint (ratio inferius patebit) sed per ventriculum intelligit cum ventriculo & pylorum, & venas cohærentes, & continuas, in quibus talis potest aggregari, & aduri vel sanguis, vel succus melancholicus. Quod de his dictum est,

idem intelligatur & de vtero, cum in eo mēles retinentur, qui naturam melancholici succi retineant, & de vasis spermaticis, cum in eis semen non excretum, & diutius detentū corrumpitur, à quo sublatae evaporationes prauæ cerebrū ipsum petant. hæc de loco affecto aduertenda sunt. Quò autem ad affectionem moneo etiam non vnicam, sed plures esse affectiones, in quibus consistat hic morbus. animad. uertoq; ut in pluribus; cum hoc connexas esse malas ventriculi dispositiones ab intemperie frigidiori pendentes. cuius intemperiei ratione accidunt ructus acidi, fluctuationes, flatus plurimi, coctionis tarditates, plurima sputamina, & cætera, quæ talem consequi intemperiem consuevere. à qua non causatur verè talis melancholia; quia ab hac intemperie nō potest assari sanguis, sed tantum exacerbatur, factis, & aduētis per hanc plurimis evaporationibus, quarum ratione cerebrum facilius læditur. pendet autem hæc melancholia à vaporibus melancholicis ad cerebrum delatis, & eleuatis, vel à sanguine melancholico, qui seu ratione obstructionis mesaraicarum venarum, aliorumue consimilium vāforum, seu ratione inflammationis pylori, alteriusue similis membri superassatur, vel eleuatis à succo melancholico circa viscera, quia per lienem non expurgatur, detento: vel eleuatis à mensibus cohibitis, & melancholicis, vel à semine retento, & ob Veneris abstinentiam corrupto. Moneo insuper, cum Diocles, Galenus, & cæteri dicunt in ventriculo, in venis mesaraicis, in pyloro, in alioque membro inflammationē adesse cum hoc morbo, q̃ non intelligendum est verā adesse inflammationē. nā ad hanc sequeretur necessariò febris, quæ ab hac melancholia abnegatur. præterea vera inflammatio per conueniens tempus tandem vel discutitur, vel suppuratur. quorum neutrum contingit in hac melancholia, quæ non tantum per menses durat, sed etiam ad plurimos annos (ad quod tempus inflammatio perdurari non potest) protrahi consuevit. quare per inflammationem audiamus non

non tumorem inflammatorium, sed intemperiem calidior-  
 rem, phlogosin dictam, per quam fit, ut sanguis in parte cō-  
 tentus, & attractus aduratur. cui intemperiei quandoque  
 connectitur aliqua materia, cuius merito ab ea inibi obstru-  
 ctio causatur, quæ postea est in causa, ut cibus non facilē  
 distribuatur, sed in ventriculo maneat, indeq; plurima cir-  
 ca ventriculum symptomata, & indispositiones fiant, exacer-  
 benturq; . cuius ratione etiam fit, ut licet intemperies mor-  
 bum faciens sit calida, a calidioribus tamen remedijs quan-  
 doq; curetur hic morbus; quoniam calidiora medicamenta  
 in hoc non ratione alterationis, sed quia exobstruere pos-  
 sunt, prodesse valent. Quæ calida remedia eò magis in ca-  
 su isto conuenientia sunt; quia cum hoc semper intempe-  
 ries ventriculi frigidior connectitur. Vnde ratione huius,  
 & ratione symptomatum ventriculi valde profunt. Cum au-  
 tem tot sint loci, qui primariò affici possunt in hoc morbo,  
 torque sint affectiones, à quibus pendere potest, non erat  
 instituenda vnica curandi forma. quæ variari debet pro ra-  
 tione loci primariò affecti, & pro ratione affectionis, in-  
 deq; semper pro harum diuersitate diuersæ insurgunt cura-  
 tiuæ indicationes, quæ in summa capita redactæ ad mi-  
 nus tres erunt. Quarum prima erit circa materiam iam  
 genitam, quoniam eam tollere debemus. Secunda erit cir-  
 ca partes primariò affectas, quibus occurrendum est, remo-  
 uendo etiam, ubi adsint, earundem obstructions. Tertia  
 versabitur circa symptomata, & malas ventriculi dispositio-  
 nes, quas corrigere, & amouere debemus. Quibus autem  
 medicamentis horum singulis obuiandum sit, id doceat re-  
 cta medendi methodus, per quam seligantur opportuna, &  
 rationabilia remedia, quæ non vnus, sed diuersæ conditio-  
 nis pro diuersitate affectionis, & pro diuersitate loci affe-  
 cti, existant.

Hic etiam prognosticum exponens non tradidit si-  
 gna, per quæ distinguitur melancholia confirmata à me-  
 lancholia

lancholia non confirmata, quam tamen nouisse Medici saltem pro prognostico debent.

*De Mania, idest Furore. Cap. VIIII.*

**I**Nquit Author Galenū per melancholiam lib. 3. de loc. affect. cap. 6. in fine intellexisse Maniam, cum ait, sit autem huiusmodi melancholiæ species affectio prius calidis dispositionibus cerebro, aut æstuatione, aut inflammatione, aut &c. ratio est, inquit ipse, quoniam melancholiæ causa est intemperies frigida, non calida, quæ calida est causa insanæ. quæ expositio falsa est; quoniam Galenus eo in loco loquitur de melancholia propriè sumpta, & de ea, quæ fit capite solum per se affecto, ut patet consideranti verba eius. & per illa verba intendit Galenus exponere causas extrinsecas, & mediatas ipsius melancholicæ, non immediatas, & proximas. Quod non intellexit Author hic; unde eius ratio licet sit vera, non tamen est ad propositum; quoniam melancholiæ huius perfectio est causa immediata, & proxima intemperies frigida, inducta ab humore melancholico: attamen hic humor melancholicus potest gigni ex pluribus causis calidis, qualis est dispositio calida cerebri, & æstuatio, ut patiuntur hi, qui versantur sub sole diutius, & inflammatio, & phrenitis, quæ per caliditatem propriam reddunt sanguinem & crassum, & melancholicum, quæ omnia sunt causæ externæ sicuti etiâ sunt curæ, mæstitiæ, & vigiliæ ibidē tanquā causæ externæ ab eodem propositæ, quæ tamen non calefaciendo, sed refrigerando sunt in causa huius humoris melancholici, ex quo postea dependet, & gignitur hic morbus.

Ultra phrenitidem, melancholiam, insaniam, & cæteros hosce inorbos, qui delirium ex materia cerebri laedente inducunt, sciendum est quandoq; nulla præsentē materia delirium in nonnullis causari à pura intemperie calida, ut docet Gal. lib. 2. de sympt. causis cap. ultimo, & lib. 6. Aphor. commen. 53. Dignoscitur autem hoc delirium à cæteris, qui ex

*Delirium quādoq; causari à pura intemperie calida.*



qui ex fluxione materiæ fiunt; quoniam in his modicum est delirium, & delirantes habent omnes voluntarias actiones infirmas, ut habet Galenus lib. 4. de præſag. ex pulſibus, ubi agit de pulſibus, qui fiunt cerebro affecto, in hiſq; pulſus ſunt duri, non per tensionem, ſed propter ſiccitatem arteriæ. Hoc notaſſe volui, ne Iuniores in curatione delirantium ſemper recurrant ad capita ea, quæ à practicis pro delirantibus explicata ſunt.

*De Capitis dolore. Cap. X.*

**D**Eclarans, quid per caput in hac tractatione intelligendum ſit, inquit, eam nunc ſignificari partem, quæ capillo regitur. quod dictum imperfectum eſt; quoniam dolores capitis, qui curandi ab ipſo, ab omnibusq; ſcriptoribus pariter proponuntur, non tantum partem capillo teſtâ, ſed etiam frontem ſæpè occupant, ad radicesq; oculorum quandoq; pertingunt, ut ipſe etiam ex mente Galeni docet diſtinguendos eſſe eos, qui internas capitis partes occupât, ab hiſ, qui externas afficiunt.

*Per caput  
quid intelligen-  
dum, dum agi-  
tur de dolore  
capitis,*

Examinans quid ſit dolor, inquit, quòd dolor eſt dignotio alterationis gravis, vel aſperæ factæ in corpore ſentiente. Quæ ſententia non ita veritati conſonare videtur; quoniam ſi dolor eſſet dignotio, eſſet operatio, & actio corporis ſentientis: at dolor non eſt actio, ſed paſſio, ergo dolor non eſt dignotio. Dolor enim (medicè loquendo) eſt paſſio, vel motus (nam quæ mouentur, patiuntur etiam) factus in parte actu ſentiente conſertim à re contraria. & licèt ad hoc, ut hæc paſſio ſit propriè dolor, requiratur cognitio huius motus & paſſionis, non tamen hæc dignotio eſt dolor. Dixi autem hoc (medicè loquendo) quia ſi propriè, & philoſophicè loquamur, dolor eſt in genere affectus, non actionis, vel paſſionis, ut habetur lib. 4. Aethic. propriè enim gignitur in appetitu, non in ſenſu. Quòd etiam dignotio illa non ſit dolor, hinc apparere poteſt, quòd cum dolor ſit de hiſ, quæ maximè proſternunt vires,

*Dolor quid ſit*

EE non

non est affirmandum, quòd dignotio illa sit dolor; quoniã dignotio illa non est id, quòd vires resoluit, sed est motus ille; & passio præter naturam in corpore sentiente facta; Sed forsitan quis dicet, immo illa dignotio est dolor; quoniam illa ablata, licet adhuc sit motus ille præter naturam, aufertur & dolor, sicuti apparet ex usu medicamentorum stupefacientium, quæ sensum, & non passionem tollunt.

Ad hoc ego dico, quòd ad formationem doloris duo necessariò requiruntur, scilicet & motus ille præter naturam, & cognitio illius motus; adeò quòd dolor nil aliud est, quàm passio confectum facta in membro actu sentiente, quòd cum sit, dico etiam, quòd horum duorum quodcumque tollatur, tollitur etiam & dolor; nam siue tollatur illa passio, siue tollatur actio sensus, tollitur & dolor. Unde ad argumentum dico, quòd licet per ablationem sensus auferatur dolor, non tamen dolor est sensus, & dignotio illa, quoniã ad illius ablationem, hic auferatur. nam hoc quidem ad illius essentiam necessariò requiritur, non tamen est illud formaliter; formaliter autem dolor est ille motus naturam contristans, per vim sensitivam deprehensus. Et hic aduertatur, quòd cum dico dolorem esse motum, vel passionem, quòd per hæc non intelligo causas doloris, ut putà solutionem continui, vel intemperiem, sed intelligo illam dispositionem, per quam maie afficitur membrum sentiens, vel à solutione continui, vel ab intemperie, & illa affectio deprehensa per vim sensitivam est dolor; quæ affectio deprehenditur ab ipso sensu, non quatenus provenit à tali causa, sed quatenus contristans; ut puta crus dolet ex frigore periossi, sensus in dolore non apprehendit hanc affectionem, quatenus à frigiditate causatur, immo sensus ipse in talibus casibus sæpe non deprehendit causam dolorem inducentem, sed quatenus contristat, & molestat.

*Cephalalgia  
an sit dolor recens  
capitis.*

Hoc eodem loco, dum diffinit Cephalalgiam, ait eam esse dolorem capitis recensentem, per quam particulam inquit ipsam

ſam diſtingui à Cephalæa, quæ eſt dolor antiquus. quod dictum falſum eſt; quoniam Cephalalgia poteſt eſſe & recens, & antiqua, vt apparet lib. 2. comp. med. ſecundum loc. ſerè in principio, vbi agit Galenus de antiquo capitis dolore, qui quidem non Cephalæa, de qua inferius poſtea ſerè in fine eiusdem libri agit, ſed Cephalalgia dicitur. Diſferunt autem hæc duo abinvicem, nō ratione temporis, ſed ratione acceſſionum, & debilitatis capitis, vt habetur loco citato, & lib. 3. de loc. affect. cap. 7.

Capitis dolorem ab intemperie frigida vnà cum materia pendentem curare docens, plura, & yniuerſalia, & particularia ſumma cum ratione adminiſtranda monet, quibus tamen hoc addam, me contumaciſſimos capitis externos dolores hæc de cauſa genitos vel propoſitis, vel ſimilibus, ac etiam vehementioribus medicamentis aliquando non potuiſſe ſuperare. Vnde coniectura facta, vel pericranæum, vel vna cum pericranæo os ab ea materia admodum malè affectum eſſe, ad vſionem loci patientis deveni; hancq; curandi rationem ſæpij cum ſucceſſu tentavi; in qua hoc ſemper obſervavi, vt cādenti ferro facta vſio, vſque ad os, quod plurima ſemper ſcatens humiditate inueni, profundè penetraret; aliquando verò os ipſum cariolum reperi, quo diſquammato, omnis conquieuit dolor. Vſio hæc non in occipite, nec in ſincipite ſupra futuram coronalem, qualis à multis ratione diuerſionis fieri ſolet, ſed vel in dextra, vel in ſiniſtra capitis parte, prout hæc magis, quàm illa pars, dolore cruciaretur, ad tollendam intemperie frigidam, & ad euacuandam materiam peccantem, à me ſœliciter tentata eſt; quod notaſſe volui, vt cæteri audacter, vbi detur huius actionis occaſio, vſionem hanc adminiſtrare poſſint. Vt autem cognoſcant, qua ratione deprehendatur os, integra, exiſtente cute, cariolum eſſe, adeant Hippocratem lib. 2. de morbis, vbi monet in tali caſu cutim de capite alia, atque alia parte diſcedere, iſeſt, cutim ad tactū

*Capitis dolor à cauſa frigida quibus remedijs tollendus.*

*In capitis dolore ad vſiones quādoq; proficuum eſſe deuenire.*

ab osse separatā perferri. quod est signū maximè animaduertendū, cū sit infallibile, ac certum cariei ossis indicium.

*Cauteria in occipitio an fecerim Galenū conueniant.*

Postea quā in sermonem de vitione in capite faciendā nunc incidi, data occasione, Iuniores moneo, quosdam esse Medicos, qui ad pauca respicientes, in similibusq; opinionibus senescentes, cauteria, & vitiones in occipite damnāt, illis ducti Galeni verbis, quæ in secundo lib. de comp. med. secundum loca posuit, curationem doloris capitis ex ardore docens, vbi hæc expressè habet. Neque enim facilè exurit capitis ea pars, quæ occiput, & à Græcis Inion appellatur. opinātur autē hoc in loco Galenū loqui de exustione facta ab igne. At longè errant; qm̄ Galenus nō de vitione ab igne, sed à sole facta, sermonē habet; docēs. n. curationē doloris capitis ex ardore solis monet anteriori capitis parte, non posteriori, administranda esse localia remedia. Et hoc duplici ratione. Primò quidē, quia posterior capitis pars, idest occiput ipsum, ita facilè, quemadmodum anterior pars, nec à sole exurit, nec solis calorem concipit. Secundò quia in occipite adest principium spinalis medullæ ad stipitis modum in multos nervos diuisæ, quæ à refrigerantibus medicamentis appositis posset lædi, à quibus habetur, quòd occiput (quia non ita incalescit à sole, quemadmodum sinciput) remedia refrigerantia non requirit. & quia in eo est principium spinalis medullæ, quæ est pars frigida, non toleret absque manifesta læsione huiusmodi refrigerantia medicamenta; quare nullo pacto talia circa occiput erunt vnquam administranda. Hanc esse mentem Galeni doceat processus verborum eius, & illæ duæ particulæ in eius sententia positæ, scilicet, enim, & facile; nam per primā liquet eum superioris sententiæ reddere rationem; per secundam autem apparet eum loqui de cōtū solis, non de vitione ignis; ea pars enim à sole difficulter incalescit, at facilè ab igne, si cuti cæteræ omnes partes, exurit. Hanc eandem sententiā attestatur Oribasius ad Eunapium lib. 4. cap. primo, qui trāscribens

Scribens, à Galeno hæc in curatione doloris capitis ab æstu habet. Quæ in re cauere debes, ne posteriore partē capitis, quæ ad occiput est, attingas; cū caput ea parte nō facile exuratur, cumque inde ortum ducat spinalis medulla, ne aliqua noxa consequatur. Caput etiam exuri à sole, esse dictum à Græcis, receptum ultra Galeni loca, in quibus per vstionem, intelligitur supercalefactionem à Sole factam, si curi potissimum clarè habetur libro primo ad Glauconem cap. de feb. Ephimera. & lib. 8. Meth. cap. 3. ubi febres ab vstione causatas curare docet, & inferius etiam lib. nono pluribus in locis, in quibus huius vstionis meminit, habentur à Paulo, qui lib. 3. cap. 13. docens quæ ab epilepticis vitanda sint, in fine inquit, & in balneo mora, & capitis ex sole exustio. quare concludo Galenum per illud verbum, exurit, intellexisse exustionem à sole, non ab igne, factam; quæ propter non abstinence horum ducti sententia Medici à cauendis occipitis, sed ubi dabitur indicatio, audacter tales, iam per sæcula ab ipsa experientia vtiliter confirmatas, vstiones administrant.

*De Hemiplegia. Cap. XII.*

**H**emiplegicum dolorem ut plurimum per circuitus exacerbari monet hic Author, & hoc idem experientia ipsa testatur. Quod autem hi circuitus habeant aliquando certos periodos, nec ab autore expressum habemus, nec omnibus hoc notum est. Cum verò à me casus hemiplegici doloris, qui statis horis, & diebus regrediebatur, visus sit, dignus est, ut à me recenseatur. Curavi ego Religiosum virum, & diui Dominici fratrum consortio iunctum, qui per tres annos continuos, & menses septem passus est hemiplegiam in parte capitis dextera una cum ingenti, & acuto dolore circa temporalem musculum, quæ vnoquoque octauo die Luna dicato, semper eadem ferme hora inuadebat. exacerbatio ad viginti octo, aut ad triginta horas ad summum

perseuerabat, quò tēpore nec lumen aspicere, nec strēpitū audire sine manifesta lāsione, nec etiam cibum assumere, aut gustare poterat. hoc tempore elapso sanissimus erat; omniaq; munia tam naturalia, quàm animalia feliciter obibat. Hunc casum non tantum notare volui, tanquam rarū hemieranici doloris exemplar, sed etiam, ut hinc conijciant Medici, an possit dari octaua febris, quæ consimiles circuitus, & periodos vnoquoque octauo habeat die. De hac enim licet Hippo. lib. primo Epide. sect. 3. tex. 2. alia febrium genera recensens non meminerit, videaturque Galenus, cum Diocle in hoc concordans, eius esse sententia, ut nullus alius, ultra quintanum, detur circuitus, tamen ex præcedenti narrato casu possumus arguere dari circuitū febrilem octauum: quoniam quæ maior potest esse causa huius octauī circuitus in hemierania, quàm quæ possit esse in febre? sed ultra hoc argumentū experientia hoc idem mihi bistestata est dari certò octauū circuitū, & octauā febrem; alteram. n. vidi in nobili Equite non ultra vigesimū quintū annum agente; alteram autem in muliere quinquagenaria.

*De Conuulsione. Cap. XIII.*

*Conuulsionis  
causa.*

**V**ltra causas ab Authore connumeratas aduertatur conuulsionem etiam fieri à spiritu flatuoso, ut docet Galenus lib. 2. de symptom. caus. cap. 2.

*Conuulsio quod  
symptoma sit.*

Ex mente Galeni ponit conuulsionem esse symptoma in genere functionis virtutis motricis, causatum à causa præter naturam. Aduertatur tamen hoc solum verum esse in conuulsione facta per se, non per consensum; Vbi enim fuerit per consensum, non à materia, & à causa præter naturā tantum fit, sed etiam à virtute stimulata, sicuti fit in epilepsia per consensum, ut habetur lib. 3. de locis affect. cap. 7.

Conuulsionis prognostica exponens ex Hippocrate lib. 5. Apho. 6. ex Galeno in eius commento ait tetanum quatuor diebus iudicari, nec ultra primum quaternarium, cum

fit



fit morbus valdè acutus, protrahi, quibus subiungit ex Aetio, nec senes, nec pueros tetano corripit; Ego tamen testor Infantes hoc affectu facillè deprehendi, quod idè Gal. lib. 3. Prognost. commen. 36. per hæc verba affirmavit. De conuulsione hoc loco disputat, quæ non in parte vna corporis, sed in omni eo intestet, quæ in pueris promptissimè euenit, sed magis lactentibus, quos etiam lib primo Epid. sect. 2. commen. 24. conuulsionibus, propter neruosi generis infirmitatem, opportunissimos appellauit, testorq; me vidisse plures infantes tetano detentos, in eisdemq; hunc morbum aliquando vltra decimam quartam diem pertractum fuisse, animaduerti. Vnum autem peculiariter quatri-mestrem conspexi ita tetano correptum, vt si animam non duxisset, statuam rectissimam, in nullamq; partem declinã rem iudicasset, adeò rectà, rigideq; totus se habebat; nullam enim partem nec minimam quidem mouebat; hic per quadraginta dies ita permanlit, nec vnquam vocem emisit, nec vbera matris lactauit; lac tamen per ampullam vitream in eius os instillatum deglutiuit, cuius meritò nutrimentū sufficiens assumpsit, morboq; superuixit, & viuit adhuc.

*Infantes, & pueri an tetano corripiantur.*

Curationem conuulsionis ex repletione explicans ex lib. de locis, in homine proponit exhibendam esse mandragoræ radicem in potu. Quod remedium animaduertant iuniores in vsum reuocandum non esse; quoniam radix hæc licet exsiccare possit, tamen quia frigidissima est, & virofa qualitate donata, cū frigidū neruis inimicū sit, hic nocere, nō iuuare poterit: quare miror, quomodo Author iste locū hūc probet, & eò magis, cum videam eum hūc sententiã tanquã Hippocratis proponere, cum tamen liber ille forsan spurius sit, nec inter geminos Hippocratis libros recensendus veniat.

*Mandragoræ radix an conueniat in potu in conuulsione & repletionē.*

Eiusdem conuulsionis euacuationē proponens, inquit, in hac secandam esse venam, modò non penitus à sanguine secretus pituitosus fuerit succus redundans. Hic aduertatur, quòd indicatio sectionis venæ non ab humore peccante,

*Sectionis venæ indicatione nō sumitur à qualitate succorū peccantium.*

nec ab humoris statu, seu qualitate desumitur, sed à magnitudine morbi, consentientibus viribus, vt millies à Gale-  
no explicatum est: quare siue secretus, siue non secretus fue-  
rit peccans humor; semper viribus nō contraindicantibus se-  
canda est vena, ob acutiem, & magnitudinem morbi, &  
hoc obseruetur in quocunque alio casu.

*Conuulſio, &  
paralyſis ali-  
quādo in eodē  
membro coniu-  
guntur.*

Spasmo opponitur paralyſis, quoniam ille dicit motum,  
hæc immobilitatem, tamen ſpaſmus iunctus cum paralyſi,  
ita vt alternatim affligant eandem partem, ſcilicet, quod  
modò illa pars conuellatur, modò eadem reſoluatur, poſtea  
iterum conuellatur, & deinde iterum paralyticetur, ponitur  
lib. 3. Prorreth. tex. 26. Qui caſus fuit etiam à Galeno vi-  
ſus, vt ibidem in com. ipſe narrat. Hoc idem ſemel ego tã-  
tùm vidi; quare hoc aduertatur tanquam vnum ex mirabili-  
bus, poſſibilibus tamen, quæ Medicis offeruntur.

*De Paralyſi. Cap. XIII.*

*Paralyſis an  
ſemper fiat ab  
humore ner-  
uos obſtructe.*

**P**aralyſis prognostica recensens ex Cornelio Celſo af-  
firmat paralyſim nunquam acutum, ſemper longū eſſe  
morbum. At experientia mihi ſæpe oppoſitum dictauit,  
cum viderim plures paralyſes intra ſeptimam diem ſolutas;  
quarum ratione coniecturam feci, paralyſim ex neruorum  
obſtructione ortam non ſemper à frigidis, viſcidis, & craſ-  
ſis ſuccis cauſari; tales enim paralyſes tum ratione materiei  
morbunt facientis, tum ratione partis affectæ diuturnæ ſunt,  
& non facilè ſoluuntur: cum autem illæ citò, & leui negotio  
ſoluantur, ab alia materia, & ab alia cauſa procreari conijci-  
dum eſt. qua de re ego in eam ductus ſum ſententiã, vt exi-  
ſtimem paralyſim etiam fieri poſſe ex neruorum quidem ob-  
ſtructione, at non ſemper cauſata ab humore frigido, & vi-  
ſcido, verum etiam à vaporofa materia, quæ ad principia  
neruorum tranſmiſſa obſtructionem in eis inducens, ac ſpi-  
ritus animalis viam intercipient ſenſum, & motum inferio-  
rum partium inhibeat. Hanc ſententiam mihi hæc Hiſtoria  
compro-

comprobauit. Tonfor quidam, cum die præcedenti vino, ac gulæ nimium indulisset, nocte media cum timore maximo (nā videbatur sibi suffocari) expergefactus incidit subito in paralyfim omnium corporis partium infra faciem existentium; in quā adeò motus, & sensus erant deperditi, vt nec acu profundè perforatus, nec gladiolo scarificatus quicquam sentiebat, omniaq; motui, præterquam ipsius capitis, ineptus erat. Hic tamen soluta in totum ebrietas, & crapula intra tertium diem, liberè omnino sanatus est, factis tantummodo nonnullis reuulsionibus, ac inunctionibus quibusdam resoluentibus ad spinam. Hic quæ potuit esse paralyfis causa è non materia frigida, & viscida; quoniam non ita velociter, nec ita facilè subleuatus eger fuisset, sed vapores crassi, & multi ratione crapulæ oborti, & ad neruos transmissi, qui eosdem obstruentes fuerunt in causa paralyfis. Nec alicui sicuti nouum, ita etiam mirandum hoc appareat, cum etiam à flatuosa materia neruos ingrediente species quædam conuulsionis generari solita sit: quæ eadem materia flatuosa, si crassior abundauerit, quid prohibebit eam neruos obstruere posse, et inde paralyfim causare? Sed cur nouum dixerim, cum antiquissimum sit, à flatuosa materia causari stuporem, paralyfim, & syderationem corporis. sicuti habetur ab Hippocrate in libello de flatibus, spiritibusuè inscripto, in quo hanc sententiam clarè docuit: Quod verò stupor attonitus, vel syderatio à flatibus fiat, deinceps demonstrabo, quum ergo flatus multi frigidi penetrent, ac insciant carnes, partes corporis stupide, & insensiles fiunt, & si quidem plurimi flatus per vniuersum corpus discurrant, totus homo syderatur si verò per partem, partem illam syderant, & percutiunt: atque vbi abierint flatus, cessat & morbus; quamdiu autem permanserint, consistit & morbus; hæc Hippocrates.

Proponit Author ex Aetio, qui hoc ab Archigene transcripsit, valdè prodesse partibus resolutis, si agrotantes *Decollum sar* *mentum vi-*  
assidue

*ris an conue-  
niant in paraly-  
fi.*

assiduè potent decoctum farmèterum vitis viridium: quod remedium cum facultatis sit frigida, & adstringentis, quid in paralyfi prodesse possit, consideretur, nec sine ratione talia medicamenta in usum assumantur.

Paralyfis ex refrigeratione curationem tradens alterantibus tantum eam curari præcepit, inter quæ præcipuū propono balneum olei calidi, remedium à Galeno in lib. 2. de facult. symp. med. cap. 7. ad hoc celebratum.

*De Convulsione Canina. Cap. XV.*

*Convulsionis  
caninae causa.*

**I**Nter causas convulsionis caninae recenset resolutionem alterius partis faciei: quod nedum à veritate distat, sed valde absonum est, cum paralyfis convulsionem nequaquam gignere, nec producere queat. lapsus est autem in hoc capite Author, existimans omnem torturam faciei spasmus caninum esse. quod falsum est: nam tortura faciei à duplici provenire potest causa, quarum altera est paralyfis, altera convulsio. In tortura ex paralyfi pars faciei distorta est pars sana; quoniam muscoli sane actione sua fungentes trahunt resolutos ad se, in tortura autem ex convulsione pars distorta est pars affecta; quoniam muscoli convulsi versus proprium principium trahuntur, & ita distorquentur, hæc curatur curatione convulsionis, illa autem curatione paralyfis.

*De Incubo. Cap. XVI.*

*Incubi causa  
distincta, &  
discrimen dis-  
ferentiarum.*

**C**Ausam huius affectus assignans inquit hanc esse frigidum, & crassum vaporem ad cerebrum delatum, eiusque ventriculos obstruentem. quæ sententia verissima est, sed distinguendum erat, vaporem istum modò à ventriculo tantum, modò ab uniuerso corpore eleuari à ventriculo eleuatur ex crapula, & continua cruditate, ex facietate nimia, ex cibis crassioribus, flatuosis, & quæ caput petere possunt, & incubus hac de causa genitus faciliè tollitur sola recta vi-

cius

Aut ratione, & leuioribus medicamentis administratis, nec hinc periculum impendet; ab vniuerso autem corpore eleuantur, dum in eo vel melancholici, vel pituitosi abundant humores, à quibus eleuati in somno vapores crassi, & frigidi, & cerebrum replentes sunt in causa, vt virtus ad inferiores partes vix descendat, & hinc difficultates illæ in somno, & tales incubi; hincq; vel epilepsia, vel apoplexia, vel melancholia; vel quid simile impendet, & ideo in his purgationibus, euacuationibus, & his, quæ cerebrum roborare, & alijs, quæ vapores inhibere possunt, indigenus, ac ea summo studio parare debemus.

Quemadmodum in Incubo credunt patientes se vel ab hoste inuadi, vel ab aliquo Venerem exigente vim pati, vel à Dæmone deprehendi, vel mole aliqua premi, vel quid aliud horrendum sustinere: similiter in somno contingunt, & hoc præcipuè in pueris fieri obsequauimus, aliquando pauperes maximi, & terribiles aliæ imaginationes, ex quibus admodum cruciantur dormientes, cum in his tamen nec vox, nec motus, vt in Incubo, intercipiatur: sed hinc adeò anguntur, vt vel summissa querimonia lamententur, vel alta voce clament; & inde nonnunquam irà validè tanquam horribilia fugientes, mouentur, vt à decubitu surgant, & è lecto profiliant. Quorum accidentium non eadem sunt causæ, quæ & Incubi, sed longè diuersæ; has autem ego obseruauimus, scilicet, vt hæc eueniant, vel vbi in somno humores vitiosi grauent ventriculum, ac ipsum mordeant, vel vbi cibus in ventriculo corrumpatur, qui corruptus mordeat etiam ventriculum ipsum, quod præsertim accidere consuevit, quando loca ad ventriculum attrinientia sensu quidem vigeant, sed natura sit imbecilla, vt notauit Gal. lib. 3. Aphor. cōm. 14. Vel vbi vermes in intestinis existentes aut eadem intestina, aut ventriculū, cum ad partes superiores ascenderint, mordeant, vel vbi in somno ad cerebrum commotus sanguis illud grauet, comprimat, & compingat; hinc enim cerebro

*De quibusdā  
accidentib. qui  
in somno dormientib. contingunt.*

*Cur aliqui dormientes clamēt,  
& conquerantur, & valde  
in somno cruciantur.*

contur-

conturbato vident patientes somnia horrenda, & terribilia, & ab his maximè anguntur: quod mihi fuit quandoq; sufficiens indicium ad præfagiendam in aliquibus de proximo aduenturam Epilepsiam, & hoc præcipuè cum nouerim in his dormientibus faciem rubicundiores, & ferè ignem euadere, quod animaduerti à sanguine partes superiores petente, ac cerebrum ipsum replente, & grauante causari; solet enim in plethoricis dispositionibus, vt docet Gal. lib. 4. Aph. commen. 67. à somno caput repleti, & inde cerebrum aggrauari: quæ plethorica dispositio, si ad naturam atræ bilis vergat, timores, & horrenda insomnia causare consuevit: qui idem sanguis, vbi dormientes expergiscuntur, in proprias venas recurrens, in eisque dispersus, est in causa, vt iidem, & resipiscant, & quiescant, vt optimè declarat Hippocrates in libro de morbo sacro. Vel vbi ad cor, debili eodem existente, cum in somno concentrentur calor, & humores, sanguis vel multitudine, vel praua peccans qualitate recurat, aut saltem prauas exhalationes transmittat: præcipuè autem hoc obseruauit fieri in his, qui feruido sanguine, & ferè igneo abundant: quod idem notaui, sed rarius, in his contingere, qui eundem melancholicū habent. & in summa hoc fieri in illis vidi, qui ex copia, & prauitate sanguinis vel in syncopem, vel in cordis palpitationem, vel tremorem, vel dolorem parati sunt. Quare vbi patientes in somno talia passi fuerint, nouerint Medici vel os ventriculi aut à vitiosis humoribus eò decumbentibus, aut à corruptis cibariis, aut à vermibus morderi, vel cerebrum à sanguine repleti, & grauati, vel cor ab eodem premi, aut stimulari. Vnde in huius affectionis curatione his causis eas optimè abinuicem distinguentes, recta ratione, ac methodo incumbant. Ad quam eandem intentionem, videlicet, nè patientes aut somnient, aut nè somniantes terribilia, & horrenda videant, quædam, licet forsan superstitiosa, suspendi nouerint. Exemplum primi habetur lib. 3. de medicinis



cinis facile parabilibus, in quo hoc scribitur; vt nè homo noctu somniet, rutæ semen caligæ ipsius nescientis suspendito. Exemplum secundi habetur in libello de incantatione Galeno ascripto, in quo docet Author, sardam viginti granorum pondere collo suspensam, aut in digito gestatâ prohibere, nè homines in somno terribilia videât. Hæc subscripsi, vt liqueat hunc affectum ab antiquioribus Medicis cognitum, & consideratione dignum iudicatum fuisse; In difficilibus enim affectibus tantum ad suspensiones descenderant.

*De Vertigine. Cap. XVII.*

**S**tatuit, quòd vertigo, & tenebricosa vertigo non tantum nomine, sed etiam re differant. quæ sententia nequaquam recipienda videtur; quoniam hæc duo non alter differunt, quam secundum magis, & minus, vt etiam ipsemet in processu testatur, cum ab eadem causa depēdeant, quod tamen non est differre realiter; nam differentia secundum magis, & minus non facit differentiam realem, sicuti in albedine, quæ siue intendatur, siue non, est eadem realiter, licet differat secundum magis, & minus, quod idēmet in alijs verificatur rebus.

*Vertigo, et tenebricosa vertigo an realiter differant.*

Declarans, quomodo fiat vertigo, inquit, quòd hæc generatur ex inordinato motu spiritus in cerebro, eodemque inæquali, & turbulento causato ex motu spiritus flatuosi ibidem detenti, qui eodē motu mouetur; subiungit autem postea, consequatur hæc symptomata ad morbum in via, idest obstructionem, & ad inæqualem intemperiem, adeò quòd velit motus illos spiritus esse symptomata cōsequentia morbos prædictos. Quod dictum falsum videtur; quoniā hæc dicta supponunt essentiam vertiginis esse vel intemperiem, vel obstructionem, ad quas sequatur postea motus ille, ex quo sequitur symptoma illud, quo videntur homines circūagi. quæ sententia nequaquam vera est; quoniam intemperies,

*Vertiginis symptoma ad quem morbum sequatur.*

peries, & obstructio, & motus etiā spiritus flatuosi sunt. cau-  
 ſa morbi huius; nam intemperies generat spiritum illum, ob-  
 structio non permittit eundem exhalare; spiritus autem ille,  
 dum mouetur, mouet etiam spiritum animale: ad quem  
 motum postea sequitur læſio, imaginationis, qua homines  
 opinantur se circūagi, quod est symptoma conſequens ad  
 motū spiritus animalis, qui motus est morbus, qui imme-  
 diatè cauſatur à spiritu flatulento in cerebro inordinatè, &  
 turbulenter commoto; qui spiritus postea multipliciter cau-  
 ſatur, ſcilicet, vel ab inæquali intemperie cerebri, vel ex in-  
 ordinato victu, vel ex membris interioribus generantibus  
 sanguinem, & humores flatuosos; ex quibus hic spiritus ad  
 caput aſcendit; in quo, cum eo malo motu mouetur; mo-  
 uetur etiam, & euerſitur spiritus animalis. quīs autem mor-  
 bus ſit iſte, pater; quoniam eſt morbus in ſitu, cum ſpiritus  
 non diſponantur in loco naturali, ſed euerſantur, & circūa-  
 gātur, & hinc læduntur vires principales; quoniam cerebrū  
 edit functiones ſuas non tantum ratione temperamenti pro-  
 prii, quantum ratione, & formationis, & ſiſus, & aliarum  
 rerum, quæ requiruntur ad membrum organicum compo-  
 nendum; Vnde videmus in mala formatione cerebri, & ad  
 conſimiles læſiones, ſicut ad compreſſionem ventriculorū,  
 & malum ſitum eorum, & ſpirituum ibidē detentorum con-  
 ſequi læſionem maximam in viribus ipſius cerebri.

*Vertigo per  
 conſenſū à qui-  
 bus gigni que-  
 at.*

Declarans, quomodo vertigo fiat per conſenſum, inquit,  
 quòd ſit vel à ventriculo, vel ab alijs partibus: quod ſanè  
 rectè eſt dictum, non tamen declarat, quæ ſint hæ partes, in-  
 ter quas præcipuè eſt vterus, & non ſolum vterus, & reli-  
 quæ corporis partes ſingulares, ſed etiam totum ipſum cor-  
 pus poteſt eſſe in cauſa huius, ex quo ſequitur, vt habetur  
 lib. 3. de loc. affect. cap. 8. quòd ſectis arterijs externis, nō  
 ſequatur aliquando ſanitas; quoniam & partes interiores  
 hunc ſpiritum flatuoſum per partes internas poſſunt trans-  
 mittere.

Cum

Cū ponit signa Vertiginis per cōsensum a ventriculo, quod apparet tūc morsus vētriculi, & nausea; hoc aduertatur, quod hæc indicant bilem in ventriculo existentem, catadrogmos. h. s. i. mordebis humorib. At vertigo per cōsensum a ventriculo facta, nō tantum gignitur ratione bilis, vt habetur lib. 4. Aph. 17. sed etiā ratione cruditatis, æ ratione humorū pituitosorū, vt innuunt Aetius, & Paulus; & ideo pro cognitiōe huius est recurrendū ad signa cruditatis, in qua sepius, quā a bile, vertiginē causari testatur experientia ipsa.

Curatiōem tradēs iubet secandam esse venam brachij, hic aduertatur, quod Galenus lib. de sang. miss. cap. 19. secat pro præseruatione a vertiginē venas inferiores, & non tantum pro præseruatione, sed etiā si incipiens sit affectio, & exemplificat de Epilepsia, & Vertiginē, in quibus, inquit, secandę sunt venę inferiores, hoc tamen supposito, quod in patiētibus sit humorum abundantia, & quod si hæc non tollas, consueuerint in tales morbos incidere.

*De Epilepsia. Cap. XV I I I.*

Pro curatione huius morbi venę sectionem proponit, quā ex Galeno, vt superius notati, lib. de cur. ratione pro sang. miss. cap. 19. docet non cubiti, sed crurum secandam esse. quę sententia videtur contradicere Galeno, qui eodem lib. cap. 16. monuit affectis partibus collo superioribus secandam esse humeratiā venā, quod autem ad ducit Author ex cap. 19. non recte ponderatum est ab eo; Galenus enim eo in loco intendit docere, quę vena secanda sit verē pro præseruatione a morbo, occupante non tunc, quā aliquā ex principalibus partibus cum hac conditione, quod morbus idem causetur, & exacerbetur a plenitudine, tunc docet statibus his duobus, scilicet & ad præseruationem, & vbi a plenitudine causetur morbus, in Epilepsia, & Vertiginē secandas esse inferiores venas, sicuti superiores, ad præseruandum a podagra ex plenitudine genita,

*Vertiginis per cōsensū a ventriculo signa.*

*In vertigine quę vena secanda.*

*In Epilepsia quę vena secanda.*

nita; vbi igitur non aderunt hæc duo', secetur humeraria ex Galeno, non saphena, vt docuit Author hic; qui locum Galeni perfectè non attingit.

*Epilepsia à quib. humoribus causetur.* Ponens eius Epilepsiæ causas, quæ est primariò affecto cerebro, statuit duos tantum esse humores in causa huius, scilicet pituitam, & melancholiam; At etiam à sanguine, qui abundans, & replens venas, & intercipiens spiritum, potest epilepsiā causare, gigni potest, vt docet Gal. lib. 4. reg. acut. 23. quemadmodum nos superius clarè exposuimus.

*Decoctum coriandrorum an conueniat in Epilepsia.* Pro potu ordinat decoctum coriandrorum, qui potus, vt etiam superius notauimus, mihi valde suspectus est; quoniam coriandrum sui natura petit caput, & tantum, vt si largius sumatur, delirium inducat, vt docet Dioscor. cap. proprio. Quare nec etiam semina coriandri quomodocunque parentur, ad comedendum exhiberem; quia non tantum, vt asserit ex Plinio, non prohibet ascendere vapores ad caput, sed etiam, cum sui natura maxime caput petat, vt ex dictis liquet, & etiam vt ex eius odore patere potest, vapores alios potest secum ad altum ducere, & ideò nocere.

*De Apoplexia. Cap. XIX.*

*Apoplexia à quibus humoribus causetur.* Causas apoplexiæ exponens, à duobus tantum fieri statuit humoribus, scilicet pituita, & melancholia, nullum verbū habens de sanguine, à quo tamen superius declarauimus ex Gal. lib. 4. reg. acut. 23. & lib. de cur. ratione per sanguiniss. cap. 5. & lib. de caus. morbo. cap. 3. etiā apoplexiā fieri.

*Apoplexia an fiat ex inflammatione cerebri.* Explicans apoplexiæ causas citat locum Gal. lib. 2. Aph. commen. 42. dicentis aliquando gigni apoplexiam propter aliquā dispositionem phlegmonosam in cerebro existentem, non ipsum quidem obstruentem, sed constringentem. declarans autem, quæ sit ista dispositio, inquit, est inflammatio, erisipelas, & abscessus; At quantum decipiatur Author in explicanda hac Galeni sententia, satis expressè docuimus capite proprio de Apoplexia.

Prognostica

Prognostica enumerans, inquit, quod apoplexiæ sæpe numero succedit paralyfis, quod non contingit epilepsiæ; quia epilepsia non finitur in paralyfim, vt videtur docere Gal. lib. 4. de loc. affect. cap. 2. In hac re aduertendum est; quod dicere simpliciter epilepsiam non finiri in paralyfim, falsum est; quoniam, vt nos ecnites vidimus, & alij etiam quotidie in praxi vident, soluta epilepsiæ, & non solutæ aliquando succedit modò vnius, modò alterius, modò plurimum membrorum paralyfis; sed intelligendum est dictum Galeni in comparatione apoplexiæ, scilicet, quod sicut apoplexia creberrimè, vt dicit ipse, terminatur in paralyfim, ita & epilepsia creberrimè in eandem non finitur. Hoc experientia testatur, nam vt plurimum terminatur epilepsiæ accessiones particulares, & morbus vniuersalis sine paralyfi. Veruntamen aliquando, licet rarò, tum vniuersalis morbus, tum etiam aliquæ accessiones particulares, nondum terminato morbo, in paralyfim ipsam desinunt, ac soluuntur: quod etiam Galenus non neget epilepsiam terminari in paralyfim, ab eo haberi potest lib. 4. reg. acut. comm. 27. vbi clarè habet, quomodo epilepsiæ nonnunquam paralyfis ipsa succedat. Hoc idem testatur Author libri de morbo sacro, qui Hippocrati adscriptus est, docens pulcherrimè, quādo, & qua de causa paralyfis, & membrorum particulariū lationis epilepsiæ succedāt, & quid ex hoc sperandum sit per hæc verba: si verò modica existens pituita in vtraque venas defluxum fecerit, aut in alterius partis, superviunt; nota ex morbo impressa relicta; aut enim os, vel oculus distorquetur, aut manus, aut ceruix, ubicunq; sanè vena pituita repleta superata fuerit, & gracilis reddita hanc itaq; venam necesse est debiliorem esse, & hanc corporis partē læsam defectuosiore: verum ad longius tempus plerunque prodest, nō. n. amplius morbo apprehenditur, si semel notā impressam susceperit. hæc Author ille, ex quib. patet, quod, & quando epilepsiæ membrorum resolutiones succedant.

*Epilepsia an  
desinat in para  
lysim.*

Rationem victus explicans multa quidem appositè, & conuenientia describit: tamen hoc sciatur, quòd dum homines apoplexia detinentur, frustra tentatur omne genus cibi; detentis enim sensibus interioribus, & exterioribus, fieri non potest, vt hi ratione alimonix, quid assumant, & hoc maximè in primis diebus.

*In apoplecticis  
quando secan-  
da vena, quid  
obseruandum.*

Pro curatione inquit conuenire sectionem venę vel humeralis, vel medię. Hoc pro secanda tamen vena animaduertatur (quoniam in apoplecticis sanguis refrigeratur, & sistitur) quòd ante sanguinis missionem optimè confricandum est totum corpus. De vena autem secanda seruetur id, quod docet Gal. lib. 4. reg. acut. commen. 24. vbi monet stante magna plenitudine, secandam esse internam: si autem plenitudo hæc non adsit, humeralis potius secanda erit.

*Apoplecticis  
an sit exhiben-  
dum pharma-  
cum.*

Si inepti, inquit, fuerint egri ad venę sectionem, aut in prædictis malum perseuerauerit, medicamentum purgans exhibendum erit. In hac sententia duę sunt difficultates, altera an stâte materię cruditate, pharmacum exhibere liceat, contra præceptum Hipp. & Galeni; altera erit, quomodo medicamenta, licèt ad intra fauces ponantur, possint in ventriculum descendere, cum apopletici sint in totum resoluti, & ideò facultate diglutiendi careant: quare quemadmodum experientia vidi, credò incassum, sicuti idem de cibo affirmavi, tentari exhibere vel cibum, vel medicamentum, vel quodcunq; aliud, quod sit diglutiendum, hoc nisi declinante morbo agatur.

#### *De Ophthalmia. Cap. XX.*

*In ophthalmiæ  
curatione quid  
per fenugræci  
intelligendū.*

Explicans pro eius curatione lenitiuos liquores, enumerat fenugræci decoctum, in quo hoc animaduerto, quòd non sumatur semen, quoniam hoc magis calidum est, quàm conueniat in oculorum inflammatione, cum sit calidum in secundo gradu, & siccum in primo, vt habet Gal. lib. 8. de simpl. medic. cap. de Teli. sed assumatur herba,



ba, & eius folia pro formando hoc liquore, in quo conficiendo seruentur præcepta ab Aetio tradita lib. 7. cap. 15. hæc duo particularia obseruando, primò vt optimè abluatur, ne puluèrem admixtum habeat, vt etiam notat Gal. lib. 13. Meth. cap. 22. circa medium. secundò nè habeat seminem permixtum. Et hoc libenter animaduerto; quoniam vidi maximà errata commissa in actu medendi, assumpto semine loco foliorum fenugræci in hunc vsum, valdeq; hinc exacerbatas opthalmias fuisse.

*De Mydriasi seu pupillæ dilatatione. Cap. XXVII.*

**C**ausas internas Mydriasis tantum recenset; de externis autem, à quibus etiam hæc affectio inducitur, ne verbum quidem habuit. Ultra autem Auicennæ testimonium experientia testatur non tantum ab interno affectu, sed etià à causa primitiua Mydriasis generari, s. vel à percussione, vel à casu, & hæc notasse volui non solum, vt omnes causæ huius affectus pateant, sed etiam, vt moneam dilatationem pupillæ ex casu, vel ex percussione causatam, dum modo non sit cum disruptione Rhagoidis contra Auicennæ sententiã, qui cap. de Aleneat hæc dixit curam non habere; si citò, & rectè curetur; veram admittere curationem, quam tamen ipse postea in cap. de cura contra decretã propria, tradere conatus est.

*De Suffusione. Cap. XXXIX.*

**D**istinguit ipsam suffusionem esse affusionem humorum circa pupillam congelatorum, & inferius inquit, quod hæc affectio est morbus in numero; quia hic adest id, quod est toto genere præter naturam. hoc admittatur; sed hoc etiam sciatur, quod & datur alia suffusio, in qua non accedit humor ab extrinsecò, sed fit, quando humor albuginès incrassatur, & condensatur, vt habet Gal. libro primo de sympt. caus. cap. secundo. & tunc non est morbus in nu-

*Suffusio quod  
modis fiat.*

mero, sed intemperies cum materia, scilicet morbus in vā  
in hoc, quia est obstructio.

*De Offuscatione oculorum. Cap. XXX.*

*An nervis op-  
ticis resolutis  
male movea-  
ntur oculus.*

**A** Signans causarum offuscationis oculorum signa, in-  
quit, quod si hæc affectio consequatur ad nervorum  
visuorum resolutionem, tardè movebitur oculus, aut om-  
nino non movebitur; Quod dictum falsum est; quoniā ner-  
vi optici non deseruiunt oculorum motui, sed visioni tantū:  
motus autem oculorum dependet à septem illis musculis,  
qui ambiunt nervos illos, & oculos, de quibus Gal. lib. x.  
de usu partium, & idcō ad resolutionem illius nervi, sequi-  
tur ablatio visus, non motus; quoniam ad visum, non ad  
motum deputati sunt illi nervi.

*De Nyctalope. Cap. XXXI.*

*Nyctalopis  
causa.*

**C**ausas explicans ex Aetio addit, tanquam huius affe-  
ctus causam, tunicarum oculi crassitiem, quæ causa in  
nyctalope contingere non potest; quia crassities tunicarum  
non tantum est impedimento, ut noctu videant, sed etiā  
interdiu. at in nyctalope ægri in die satis vident; qua de re su-  
pperit, ut tantum hic affectus cōtingat, vel ratione spirituum,  
vel ratione humorum.

*De dolore aurium. Cap. XXXIII.*

*In dolore au-  
rium an conve-  
niat oxirrhodi-  
num.*

**I**nflammationis aurium curam exponens primò ad intra-  
aurem oxirrhodinum imponit. quod medicamentum  
difficultatem patitur; quoniam in isto casu non videntur  
repercurientia convenire. propter vicinitatem cerebri; ad  
quod si repellatur materia; maximum imminet pericu-  
lum. Præterea hic modus curandi diversus est à modo Ga-  
leni; Galenus enim lib. 3. de med. secundum loc. in princi-  
pio ponens curam inflammationis aurium, distinguit de do-  
lore, dicens, quod dolor vel non est admodum intensus, sed  
potius

potius remissus, vel est admodum intensus, & molæstus. in primo casu adhibet mitigantia, sicuti nardium, basilicum, & consimilia. in secundo autem adhibet opiata: quare Galenus nunquam adhibet repellentia, quæ etiam videntur præter rationem.

Eodem loco adhibet oleum dulce calidum, & inferius etiam describit plura, quæ calida inquit, esse adhibenda. circa quod notandum est, quod Galenus loco citato apponit remedia tepida, non calida; & maximè ubi est inflammatio, non videntur convenire calida, quia potius augment affectionem, cum tamen conueniant tepida, & tepidum respectu calidi sapiat naturam contrarij. In hac autem difficultate ego censeo, quod hæc Galeni regula observanda sit in maioribus, & magis notabilibus inflammationibus, scilicet, ut in his nunquam oxirrhodinum administretur: ubi autem inflammatio talis non fuerit, debilisq; existat affectus, poterit convenire; quoniam cum in parvis inflammationibus pauca adsit materia, ex repellentibus non imminet periculum illud, quod impendit in ingenti, quæ à copiosiori materia causatur. cuius meritò etiam tale medicamentum à Galeno in moderatis, & debilibus inflammationibus probatur; in eis autem, quæ maioris sunt momenti, ingentesq; existunt, improbat. Unde tum in lib. 3. de comp. med. secundum loc. tum in lib. de remed. paratu facil. de oxirrhodino loquens illud in eis inflammationibus laudabat, in quibus non adest pulsatilis dolor, ab eis, in quibus adsit, excludens. cum autem talis dolor maiorum, & ingentium inflammationum, ut habetur lib. 2. de loc. affect. cap. primo, sit proprium accidens, iubeatur hæc regula, quod ex Galeni mente in magnis, & notabilibus aurium inflammationibus nequaquam tale medicamentum administretur, sed tantum debilioribus, quæ potius naturam phlogosis, quam phlegmonis habent, conveniat. cum enim ob propriam ipsius angustiam meatus auditorius à mole etià mi-

*In inflammatione aurium an medicamenta calida sint infundenda.*

nima angustietur, parvæ eius phlegmones à tantula materia producuntur: quæ si paulò plus augeatur, maiores pro ratione loci, & ingentes, vbi copiosior extiterit fluxio, generabit inflammationes. Hoc adnotasse volui, ne indicationibus ab affectu ipso desumptis, Medici indiscriminatim ad repellentia in quacunq; aurium inflammatione descendât: hocq; eò libentius egi; quia in actu practico vidi ex applicatione huiusce medicamenti lenitum quidem fuisse dolorem auris vehementer inflammatae, attamen postea successisse inflammationē partium internarum, sicuti præcipuè in muliere ultra quinquagesimum quintum annum agente factum novi, in qua ex oxirrhodino lenito dolore, & repulsa materia ad interiores cerebri partes, delirium ingens, cōvulsionesq; tales superuenere, vt infra quartam ab oxirrhodini impositione morti succubuerit.

*De grani auditu, & surditate. Cap. XXXV.*

*Antidofius  
meatus an ter  
minetur ad du  
ram membra  
nam, et nervū.*

**S**Tatuit ex Galeni mente auditorium meatum valentissima perferre medicamenta, quamvis non solum vsq; ad cerebri duram membranam pertineat, sed etiam nervū contingat, qui à cerebro descendit: quæ sententiā vera quidem est, quò ad partem primam, scilicet quòd hic meatus perferat vehemensissima medicamenta, vt experientia ipsa testatur, sed quò ad secundam, falsā est; quoniam iste meatus non peruenit nec ad duram membranam, nec ad nervum, sed terminatur ad membranam facientem tympanum, quam membranam (eò quod ibi terminatur hic meatus exterior) non pertranseunt medicamenta imposita, quod sicuti ignoravit Galenus, qui aurium Anatomem perfectè non est assequutus, pariter ignorasse videtur hic Author, qui puram Galeni sententiam sequutus, rei veritatem, quæ opera excellentissimorum Anatomicorum nunc patet, non est adeptus.

*De dolore dentium. Cap. XXXXI.*

**D**Eclarat dentes dolorem pari ex quacunque intemperie: quod dictum verum quidem est, quò ad frigiditatem, & caliditatem, verum quò ad humiditatem falsum est; quoniam ab humiditate, vt clarè habet Galenus lib. 2. de comp. med. secundū loc. nullus causatur dolor, sicuti etiā docet Aetius lib. 8. cap. 29. vbi habet, quòd humiditas citra aliā affectionē nō inducit dolorē; & idcō nō videtur, quòd dentes possint dolere ex pura intemperie humida.

*Dentes an dolent ex intemperie humida.*

Ennumerans signa doloris dentium ex intemperie sicca, inquit, ad hanc intemperiem consequi intolerabiles dolores. quod dictum licet sumpserit ab Aetio, qui hoc transcripsit ex Adamante sophista, tamen difficultatem habet; quoniam, vt pluribus in locis docet Galenus, præcipuè autem lib. 2. de med. secundum loc. in principio. à siccitate moderati, & leues causantur dolores, non autem intolerabiles, sicuti hoc idem experientia docet.

*Dentes an sanos dolores participant ex intemperie sicca*

*De Catarro. Cap. XXXXIII.*

**C**Atarri à causa frigida curationem exponens inquit, post vniuersalem purgationem deueniendum esse ad ea, quæ per os pituitam educunt. quæ sententia videtur suspecta; quoniam hæc materia, quæ generatur in capite, solet per se euacuari, & fluere, ita vt arte non egeamus ad hoc faciendum. præterea si adest Catarrus, & per medicamenta, quæ per os pituitam ducunt, volumus euacuare caput, periculum est, nè hæc materia ad asperam arteriam, vel ad pulmones dilabatur: quod maximè vitandum est, vt docet Gal. lib. 6. Epid. sect. 2. cōmen. 32. Quare si hæc particularis euacuatio est peragenda, potius per nares esset tētanda, quàm per os. Et si per os aliquando sit facienda, nō fiat nisi in hoc casu, videlicet, quando materia est nimis crassa, & adeo vt sibi viam obstruat.

*Apoplegmatismi an cōueniant in catarro.*

*De Angina. Cap. XXXXVI.*

*Anginā à pituita, & sine dolore dari.*

*Anginam posse fieri ob nimiam siccitatem musculi interni gutturis.*

*In angina super pressis mensibus quæ vena secunda sit.*

**S**igna anginæ à sanguine crasso, & pituitoso explicans inquit, quòd tunc paucus est dolor. circa quòd aduertendum est, quòd datur Angina etiam à pituita, & tunc potest esse sine dolore, vt declarat Gal. lib. 4. Aph. in finē cōment. 34. vbi habet posse fieri Anginā sine dolore, & hoc quando prouenit ex humiditate pituitosa, madefaciente tunicā gutturis interiorem, vel implēte musculos, ipsum guttur aperientes; ex quo & generatur tumor, & sequitur strāgulatio, quod non est cum dolore. Galenus ibidem declarat posse fieri Anginam, & strangulationem propter siccitatem nimiam musculi interni gutturis. & hanc ait Apho. sequenti 35. cum est cum febre valida, esse periculosiorem ea, quæ est cum inflammatione.

Curacionem tradens, & de sectione venæ sermonē habens, inquit ex Alexandri Tralliani sententia, quòd in mulieribus anginam patientibus, si ipsis suppressæ fuerint purgationes. & in viris, vbi consuetam per hæmorrhoides euacuationem non habeant, secundæ sunt venæ inferiores, quæ sententia non est indiscriminatim accipienda; quoniā in indicatione sectionis venæ attendendā est angina acuties: nam si non sit admodum acuta, nec sit vrgentia, possemus secare venas inferiores: sed vbi angina sit acuta, periculūq; suffocationis ex ea insitet, non est incipiendum ab inferioribus venis, licet sit suppressa aliqua euacuatio; quoniam in simili casu debemus moliri talem euacuationem, quæ euacuando totum etiam à loco affecto possit elicere materiā; aliter prius sequeretur suffocatio, quā lenitio morbi ex euacuatione facta ex venis inferioribus, quia ex tali sectione materiā à laesa parte non educeretur: quæ tamen venæ inferiores, sectis superioribus, poterunt postea ad euocandas naturales, & consuetas euacuationes aperiri.



*De Tussi. Cap. XXXXVII.*

**I**udicat Author recensendo tussis causas, quod non tantum ex intemperie frigida, sed etiam ex calida causetur tussis, sicuti habet, inquit ipse, Paulus, & Galenus lib. *Tussis an fiat* 6. Epid. sect. 2. commen. 24. Quæ sententia est dubia; quo *ex intemperie* *valida.* nam licet sit imaginabile, quod omnis intemperies in æqualis, quæcunque sit, in thorace, eò quod lædat, ipsum, possit inducere tussim: attamen non ita experimento hoc comprobatum est; nam in maximis æstibus ita tusses non inuadunt homines, sicuti in maximis frigoribus immo potius illis temporibus nullas videmus, cum tamen plurimæ adesse deberent ob aeris circumstantis immoderatam caliditatem. Præterea in febribus ardentibus, ubi ingentissimus est calor, non adsunt tusses istæ ex intemperie calida, sed tantum quandoque adsunt, vel communicata materia thoraci ab universo corpore, vel exasperatis faucibus ob siccitatem à febre causatam. Præterea non ita videtur calidum, sicut frigidum, posse causare tussim, eò quod ita calidum, sicut frigidum, non sit inimicum pectori. Præterea locus ille Galeni adductus non ita clarè loquitur, ut iudicare debeamus ipsum eius fuisse sententiæ, quod velit tussim excitari ab intemperie calida; inquit enim, quod tussis illa posita ab Hippocrate visa est ab ipso in febribus, quæ ab extrinsecis lassitudinibus ortum habuere, & hoc, cum adisset vel gelu, vel æstus, vel pulvis tunc, cum æger in lassitudinem illam incidit. quare, inquit, accidit hæc tussis non ex lassitudine illa, sed ex duplici accidente, scilicet vel ex faucium exasperatione, vel ex instrumentorum intemperie. exasperatio faucium unde pendeat, declarat, dicens ipsam ex triplici causa iam proposita pendere, scilicet vel ex frigore inducto à gelu, vel à pulvere inspirato, vel ab ariditate, quæ causata fuit ab aere circumfuso calidiori, adeò quod velit æstum, & calorem illum inducere tussim, causando siccitatem in faucibus,

cibus, vnde ipsæ exasperantur. Quò ad intemperiem instrumentorum, non ait, quòd pendeat hæc tussis ex hac, vel illa intēperie, sed tantum absolutè ait intemperie esse huius causam; quoniā subiungit, & alibi declaratū est, ex intemperie causari tussim. Quæ verba non possunt indicare tussim causari ex intemperie calida, cum se remittat ad alia loca pro declaratione huius rei, in quibus omnibus semper docuit tantum causari tussim ex intemperie frigida.

*Tussis quomodo  
causetur ab  
intemperie sic  
ca.*

Declarans quomodo ab intemperie sicca causetur tussis, inquit, quòd tussis non inducitur ab intemperie sicca citra caliditatem, vel frigiditatem; adeò quòd eius est sententiæ, quòd tussis non possit excitari, exsiccatis illis partibus, nisi etiam sint calefactæ, vel refrigeratæ: quæ sententia non ita veritati consona videtur; quoniam siccitas inducit tussim exasperando, non autem eò quòd partes sint intemperatæ in qualitatibus actiuis, & sicuti ex Galeno datur intemperies sicca temperata in actiuis; pariter possunt exsiccari partes illæ absq; hoc, quòd calefiant, vel refrigerentur. & si præcedit ad hanc siccitatem vel frigus, vel calor, vt superius loco citato dicebat Galenus, hæc est causa præcedens, non interna. & differt hæc tussis, quæ ex exasperatione ob siccitatem inducitur, ab illa, quæ est ab intemperie, vt etiam ibidem docet Galenus, disiumctiuè loquendo.

*Tussis an possit  
causari à  
lumbricis.*

Enumerans tussis causas ponit ex sententia Alexandri Tralliani causari tussim à lumbricis intestinaribus stomachum; quæ sententia ex diametro opponitur Galeno, qui in loco citato lib. 6. Epid. sect. 2. commen. 24. & superius etiam commen. 17. inquit, hinc non posse excitari tussim. & qui hoc asserunt (subiungit Galenus) non possunt hoc nec ratione, nec experientia comprobare. Quoniam tamen aliqui Practicantes hoc contra Galenum asserunt, dicentes experientia hoc ipsos obseruasse, ego pro Galeno, & pro veritate dixerim, quòd licet in pueris à lumbricis patientibus viderint aliquandò tussim, non tamen necessariò est concludendum

denndum, quod à lumbricis tussis illa dependeat; quoniam, vt dixit Galenus, ratione demonstrare non possumus, quomodo hi lumbrici possint excitare tussim, cum hi in partibus naturalibus, non spiritualibus detineantur. præterea illud non iudicat hoc ab illis prouenire; quoniam potest cum vermibus coniungi distillatio, vel alia quædam causa apta ad excitandam tussim, quæ nõ cognita ab ipsis fuit in causa, vt iudicaret hanc tussim pendere ex vermibus.

*De difficultate spirandi. Cap. XXXXVIII.*

**C**Ausæ duæ Asthmatis ex mente Galeni assignantur, scilicet obturatio vel à crassis, & lentis humoribus, vel à tuberculo. Notum tamen sit etiam Asthma nonnunquã fieri à siccitate pulmonis, sicuti notauit Auic. cui, utpote ei, qui hanc materiam clarius dilucidauit, in hoc est magis, quàm Galeno, tribuendum. Et hoc Asthma non sine ratione videtur fieri, cū ex nimia siccitate ita in propria substantia possit pulmo deprauari, vt nec dilatationi, nec cōstrictioni facilis, ac promptus sit, vnde anhelitus magna, ac ingēs sequitur difficultas. Tale autē Asthma testor ego me vidisse in iuvene vigesimū secūdū annū agēte, qui solū ex prisana, & lactis potu, ac victus ratione leniēti, & humida sanatus est.

Curationem Asthmatis à crassis humoribus pēdētis tradens, iubet exhibendum esse aliquando vinum austerum, tenue tamen. quod dictum videtur suspectum; quoniam talia vina adstringunt, & sunt inimica affectionibus pectoris, & maximè ubi à materia viæ pulmonis, sicuti præcipuè in asthma, & orthopnæa contingit, clauduntur, & obstruuntur, quemadmodum docet Gal. lib. 3. reg. acut. tex. 7.

Topica medicamenta exponens, inquit, adhibendas esse inunctiones calefacientes, quæ sententia est diminuta, sicuti etiam medicamentum ab eo propositum, quoniã nõ declarat, nec apponit ea calida, quæ conueniunt, ista autem esse debent attenuantia, & attrahentia. Vnde antiqui

*Asthma fieri etiam à siccitate pulmonis.*

*Vinum austerrum an conueniat in orthopnæa.*

*Unctiones in orthopnæa quales parari debeant.*

capie-

capiebant succum scyllæ, fecē vini, ærugines, & consimilia, addendo etiam alia calidiora, & his ego cum maximo successu continuē vtor.

*Orthopnea ex  
crudis succis,  
et ex tubercu-  
lo an eadē cu-  
ratione sit cu-  
randa.*

Dum curationem dispnæ ex crudo tuberculo docet, inquit similia medicamenta, & similē victus rationem ei, quæ adhibetur in dispnæ ex crassis humoribus, esse adhibendam: quæ sententia ex toto est opposita Galeno lib. 7. de comp. med. secundum loc. cap. vltimo. vbi docet aliā, & diversam hic requiri curationem; quoniam in hac conueniunt calidiora, & exsiccantiā, & parcitas potus, & alia, quæ non conueniunt in illa affectione, quemadmodum ibi clarè habet Galenus. Quod autem adducit ipse de historia Antipatri lib. 4. de loc. affect. Aduertatur, quòd Galenus nunquam affirmat eius affectionem pendere ex tuberculo, sed potius ex crassis humoribus in leuibus arterijs collectis, ex quibus postea auctis potuit succedere dispnæ, cum pertingerent vsque ad arterias asperas, ipsasq; obstruerent. Quare casus Antipatri non à tuberculo, sed à crassis humoribus pulmonū obstruentibus pendens non curatione tumoris crudi, sed humorum crassorum tractari debuerat.

*De cruenta spuitione. Cap. XXXIX.*

*Pulmonis vl-  
cerati an sit si-  
gnum insepara-  
bile sãguis spu-  
mosus.*

**T**Radens signa sanguinis à pulmone reiecti, inquit, huius signum esse, si sanguis fuerit spumofus, iuxta Galeni sententiam lib. 4. de loc. affect. & lib. 5. Metho. Aduertatur tamen; quòd licet spumofus sanguis sit indicium vlcerati pulmonis, non tamen semper à pulmone reijcitur spumofus, sed tantum cum eius pars carnosia vlcerata est. si enim exterior tantum pars vlcus patiatur, non erit spumofus sanguis, vt docet Gal. lib. 5. Apho. commen. 13. Quare vlcerati pulmonis non erit proprium, ac inseparabile signum spumofus sanguis; quoniam ab eodem potest non spumofus prodire.

Vbi ex pulmone, ac internis spirituum organis reijcitur sanguis,

Sanguis, docet Author pectori irrigationem adhibendam esse ex vino adstringenti, & oleo rosaceo, vel mirtino, mul-  
tūq; ex Paulo, & Aetio consimilia ad eandem intentionē  
recenset pharmaca; Non videntur tamen ex Galeno talia  
conuenire medicamenta, qui adstringentia in tali casu ex-  
trinsecus thoraci apposita in libro de constitutione artis  
damnabat, tum quia eorum facultas in pulmonem non pe-  
netrat, tum quia hæc sanguinē, qui in thorace est, ad viscus  
compellant. Quod idem videtur docuisse lib. 5. Metho-  
cap. 6. habens hæc verba. At verò, quæ extrinsecus prosu-  
nt particulæ admoventur tum adstringentia, tum sine ad-  
strictione frigida, hæc ipse (veluti plerique Medicorum)  
non ubique probat, sed mihi omnino, quàm fieri res postu-  
lat, ipsum sanguinem intrò compellere, ac venas, quæ in al-  
to eunt, complere videntur. Quod tamen postea vel deri-  
uata, vel reuulsa fluxione tutò poterit fieri, non autem in  
initio his nondum factis,

*In sputo san-  
guinis an con-  
ueniant refri-  
gerantia, &  
adstringentia  
thoraci ap-  
posita.*

*De Pleuritide. Cap. 2. L.*

**D**isputans de sectione venæ in pleuritide faciendâ, in-  
quit, semper secandam esse venam lateris patientis,  
unico hoc excepto casu, scilicet, quando sola tentanda est  
reuulsio, & non euacuatio à parte affecta; sola autem ten-  
tanda erit reuulsio, quando ex sententia Galeni, ait ipse, lib.  
de sang. miss. cap. 14. non est expectanda coloris sangui-  
nis mutatio, quæ in duobus casibus non est attendenda, sci-  
licet, vel quando vires sunt debiles, vel quando adeo pra-  
ua est inflammatio, ut nihil ab ea emittatur; cum autē hoc  
contingit, si fluxio valenter ieruat, aut adsit plenitudo, tunc,  
inquit, est secanda vena non eiusdem, sed oppositi lateris,  
maximè autem viribus existentibus imbecillibus. Hæc sen-  
tentia nec Galeno, nec rationi consonat. Galenus. n. ubiq;  
declarat secandam venam esse lateris patientis, non autem  
oppositi, & hoc nō tantum, ubi expectanda est coloris mu-  
tatio,

*In pleuritide  
an aliquando  
sit secanda ve-  
na oppositi la-  
teris.*

tatio, sed etiam ubi non est expectanda; & non solum ubi vires sunt validæ, sed etiam ubi sunt debiles. Quod hoc sit verum, apparet ex Galeni sententia ab ipso adducta cap. 14. lib. 1. de sang. miss. nam clarum est, quod ipse exponens sententiam Hippocratis de sectione venæ usque ad mutationem coloris, intelligat de venâ secunda secundum Hippocratem, quæ ab ipso limitata est lib. 4. reg. acut. 73. quod scilicet est secunda vena eiusdem lateris; declarans igitur hanc sententiam inquit, secunda est vena interna lateris patientis, & semper expectanda est coloris mutatio, præterquam in duobus casibus; quorum alterum est, ubi vires sunt debiles; quoniam tunc non possumus copiosè educere, & hoc, quia vires non ferrent; alterum est, ubi prava est inflammatio, in qua adeo materia est impacta, ut nihil ab ea emittatur; & quoniam tunc tanta requiretetur sanguinis euacuatio pro mutatione coloris, ut vires fetre non possent, eo quod maxima quantitas esset educenda, si vellemus videre coloris mutationem, ideo ubi vires sunt debiles, vel prava est inflammatio, secunda quidem est vena interna eiusdem lateris; non tamen est expectanda coloris mutatio, inquit Galenus. Hoc idem possumus habere ex Galeno lib. secundo reg. acut. 10. ubi loquens de sectione venæ in pleuritide, dicebat ex Hippocrate secandam esse internam, & maximè si costæ superiores patiantur, quæ interna debet esse eiusdem lateris, ut ex eodem patet lib. quarto eiusdem commen. 73. & hæc erit vena, dicit eodem. 10. quæ potest magis, & velocius tum reuellere, tum euacuare. Et hic aduertatur, quod Galenus loquitur disiunctivè, non coniunctivè; dicit enim, quod hæc vena potest magis, quam aliæ, & velocius tum à parte affecta reuellere, tum etiam euacuare; non autem dixit, quod possit magis, quam aliæ, reuellere; & euacuare simul, ut eius sit sententiæ, quod reuulsio, & euacuatio coniunctim factæ magis, & velocius perficiantur per hanc venâ, quam per



per quamcunq; aliam viam; sed disiunctiue loquendo innuit hanc sententiam, scilicet, quod siue velis reuellere, siue euacuare, magis, & velocius euacuamus, & similiter magis, & velocius reuellimus à parte affecta per hanc, quam per quamcunque aliam venam. Cum igitur reuulsio per hanc venam sit commodissima; ergo hæc vena etiam pro sola reuulsione erit secanda. Quod si adsit plenitudo, & vires sint debiles, nec etiam hæc reuulsio per aliam viam est tentanda, quod idem videtur innuere Gal, eodem commen. nam supponens se loqui de hac sectione, vbi est plenitudo, dicebat. Quod sanè interna cubiti vena facit, multoq; magis, vbi sanguinis redundantia ad superiora vergere videatur, aut superiores thoracis partes affectæ sunt, nempe in eo malo tū brachium, tum mama grauari solent, &c. postea declarans quantitatem sanguinis educendam, dicebat terminum esse coloris mutationem, sed subiungit postea, Si virtus tantam non tolerat euacuationem, vt coloris mutatio non sit expectanda, sciendum est hanc sectionem auxilium minus ferre inflammationi ipsi; quoniam melius est non exoluere vires, quam sanguinem redundantem euacuare. Quæ sententia Galeni est consideranda; quoniam per hanc cognoscimus, quod semper eadem vena est secanda in pleuritide, siue sint vires validæ, siue non, siue adsit plenitudo, siue non; quoniam Galenus loquitur semper de eadem vena. & si diuersa intelligenda esset, maxima dignus esset nota Galenus, qui hanc nō distinxisset, sed semper de eadem sit loquutus: sed quoniam Author hic pro se citat locum Galeni lib. de sang. miss. cap. 16. vbi habetur hæc sententia. Quin & pleuriticis, quæ è directo laborantis lateris adhibita fuit, sanguinis missio, &c. Sciendum, quod ipse extorquet verba Galeni, nec ad mentem ipsius eius sententiam interpretatur; inquit enim, quod Galenus vsus est verbo illo, sæpè; quoniam vult non semper obseruandum esse hoc præceptum, quod vena eiusdem lateris sit secanda in pleuritide; & cum hoc

*Sanguinis euacuationes per directum esse faciendas.*

hoc non sit semper obseruandum, idcō inquit secundam esse aliquandō venam oppositi lateris ex Galeni præcepto ceter non tantam, nec ita celerem, sicuti illa facit, afferat utilitatem, & hoc, inquit, est in casibus prædictis, scilicet, quando vires sunt debiles. Sed mirum est, quantum hic Author ausus sit extorquere verba Galeni, qui ex professo in illo cap. 16. & in superiori is non aliud conatur docere, quam faciendam esse euacuationem per directum, at ex eodē latere, & hoc exemplificat in pluribus, docens euacuationē sanguinis ex opposito latere factam, damnamdam esse, & cum deuenit ad exemplum pleuritidis, nil aliud facit, nec aliud intendit docere, quam euacuationem sanguinis ex latere patiente esse laudabilem, & utilem, ex opposito autē non ita nec laudabilem, nec utilem, & idcō illam esse eligendam, hanc auem prætermittendam, sicuti docuit in aliis exemplis. Quod ad illud autem verbum, sæpē, super quod fundat se Author, mirum est, cum clarē loquatur Galenus, quod ipse sibi fingat res præter Galeni intentionem: nam sciendum est, quod Galenus vsus est verbo illo, sæpē, propter ea verba, quibus vsus fuerat superius cap. 14. dū dixit, nō esse expectandā coloris mutationē, quādo vires nō sunt debiles, vel quādo praua est inflammatio. ex qua parca, & diminuta euacuatione cū nō ita clara utilitas, & minus auxilij, quā ex illa, in qua habetur coloris mutatio, sequatur, idcō vsus est Galenus verbo illo, sæpē, dicens, quod sectio venæ ex eodem latere clarissimam utilitatem affert sæpe, & nō semper; quia aliquando ex eodem latere sumus coacti facere diminutam, & non sufficientem sanguinis euacuationem, & hoc, vel quando vires sunt debiles, vel quando praua adeo est inflammatio, ut impacta in ea materia nullo modo emittatur. Et tunc illa clarissima utilitas non sequitur, quam habemus tunc temporis, quando possumus vsque ad sanguinis mutationem euacuare; & idcō illud, sæpe, non est positum à Galeno, cō quod laudet aliquando sectionem



magis proficit, quàm oppositè, secandè sunt à medico illè;  
 non autèm itè, vt pòte qui & celeriter, & sècurè mede-  
 ri debet, & hæc quò ad Galenum. Quò ad rationem autè,  
 clarum est ex Galeno lib. de sang. miss. cap. 15. reuulsionè  
 esse faciendam ex eodem latere; & per directum. Sed casus;  
 in quo Author iudicat esse secandam venam oppositi late-  
 ris, est, quândo sola facienda est reuulsio; igitur in hoc casu  
 est secanda vena eiusdem, & non oppositi lateris. si enim  
 aliter fieret, reuulsio nec ex eodem latere, nec per directum,  
 vt est mens Galeni, fieret. Quòd si dicas, vt ipse inquit,  
 si velis reuellerel per sectionem eiusdem lateris, diminutam  
 venæ sectionem faciendò, magis attrahes ad locum affectum,  
 quàm ab ipso reuellas. Ego dico hoc falsum: esse; quoniã  
 fluente sanguine per venas ad ipsam pleuram, secta vena  
 in brachio eiusdem lateris reuelleret ab ipsa pleura, & fluxum  
 ipsum retraheret: reducto enim sanguine per venam illam, san-  
 guis, qui fluxurus erat, necessariò succedit euacuationi, &  
 hoc necessariò fit, nè detur vacuum, quòd maximè pròdest  
 ex eodem latere; quoniam licet in ambitu totius sit pleni-  
 tudo, tamen maior est consensus dextrarum partium, &  
 venarum cum dextris partibus, & venis; & sinistrarum cum  
 sinistris; quàm dextrarum cum sinistris, vel sinistrarum  
 cum dextris. & idè cum adhuc iste consensus maximus, à  
 dextris fluit materia ad dexteras partes, & à sinistris ad sini-  
 stras, qui fluxus maximè coercetur per sectionem venarum  
 eiusdem lateris, quòd erat fundamentum, propter quòd  
 laudauit Galenus, & iussit faciendam esse reuulsionè per  
 venas eiusdem lateris, & per directum: quòd etiam com-  
 probatur ab ipso in euacuationibus à natura procuratis, vt  
 in fluxu sanguinis parium declarat; quoniam scilicet per ve-  
 nas eiusdem lateris fluit materia ad partes eiusdem lateris,  
 ex qua postea inflammantur, & quomodolibet afficiuntur.  
 Cum autèm; dicit Author, quòd hæc reuulsio ex eodem la-  
 tere magis attrahit ad locum affectum, quàm reuelleret, fal-  
 sum

*An facta dimi-  
 nuta sectione  
 in eodem late-  
 re attrahatur  
 materia ad lo-  
 cum affectum.*

— 323 —

— 324 —

— 325 —

— 326 —

— 327 —

— 328 —

— 329 —

— 330 —

— 331 —

sum dicit; quoniam in hoc supponitur, quod ad reuulsio-  
nem istam consequatur motus vniuersi sanguinis ad locum  
affectum; quod falsum est; quoniam non commouetur  
sanguis, nisi ad locum euacuatum; ne detur vacuum; eua-  
cuantur autē venę in ista reuulsione extrinsecę, & non illę;  
quę sunt in loco affecto; igitur ad illas commouetur san-  
guis, & non ad istas. qua de re propter hanc sectionē non  
attrahitur sanguis ab vniuerso corpore ad locum affectum;  
immo cum sit iste consensus dextrarum venarum cum dex-  
tris, & sinistrarum cum sinistris, iudicandum est, quod  
maximē proficua sit hęc venę sectio pro reuulsione facta  
in eodem latere; quoniam secta vena eiusdem lateris, &  
educto sanguine, sanguis ille, qui succedit loco euacuato;  
ne detur vacuum, fluit à venis, quę sunt eiusdem lateris,  
cum ab his fluat sanguis ad locum affectum ad inflamma-  
tionem causandam; igitur hęc sectio facta in eodem latere  
maximē prodest pro reuulsione faciendā; & cō maximē;  
quod istę venę, licet cūnes dextra cū dextris, & sinistris  
consentiant, maximā habent cōmunionem cū locis affectis;  
& cum venis, in quibus continetur materia fluens, & proxi-  
ma loco affecto. Quare cōcludendū erit, quod licet aliquā  
do in pleuritide sit faciendā venę sectio pro reuulsione tan-  
tū, tamen semper est secanda vena eiusdem lateris, siue sit  
euacuandū, & reuellendū simul, siue sit tantū reuellendū.

*De Peripneumonia. Cap. LI.*

**C**Vram peripneumonię tradens iubet ex Aetio porū  
exiguum, eō quod humiditas sit noxia pulmōi, ex-  
hibendum esse. quę sentētia videtur dubia ob dictā Hippo-  
cratis, nam ipse Hippo. lib. primo de Morbis in fine, docēs  
huius morbi curam, inquit, quod debent agrotantes pocu-  
la haurire, quibus pulmo madescat: ex quibus verbis clarē  
possumus elicere, quod debent multum bibere. quod idem  
confirmat volumine secundo eiusdem libri in medio, po-

*In peripneumo-  
nia an potus  
debeat esse exi-  
guus, vel co-  
pius.*

nens huiusce etiam morbi curationem; inquit enim primis diebus vinum dulce album dilutum crebrò propinatum: per illud autem verbum, crebrò, clarè innuit potum debere esse copiosum, quod idem etiam videtur attestari ratio, nam in peripneumonia, & maximè ubi superabundat bilis, & sanguis calidior, succescit pulmo: quæ affectio videtur indicare humectationem, humectatio autem maximè potest adhiberi per plurimum potum. Hæc res tamen potest esse dubia, tum ob dictum Aetij, tum etiam ob dictum Galeni lib. 7. de comp. med. secundum loc. cap. de orthopnea; ubi habetur, quod in ijs, qui alicubi abscessum habent, paucitas potus convenit, Nisi forsitan per abscessum ibi non intelligat affectus inflammatorios, qualis est peripneumonia, cum clarè loquatur de tuberculis, pendentibus ab humoribus frigidis, non autem de ijs, quæ inflammationē faciunt.

○ Curationem peripneumoniæ tradens, postquam secandam esse venam ab initio morbi docuerat, subiungit. At si quid venæ sectionem prohibuerit, cucurbitulas thoraci admovere oportet, ac lateribus has defigere, quibus tantum sanguinis elicietur, quantum vires ferunt, ut Paulus refert. At non modò difficillimum est imaginari, non præevacuata multitudine; nec imminuta materia, attrahentia circa locum affectum administrata iuvare posse; sed, certò asserendum est, talia, attrahendo ab universo corpore ad locum affectum plurimam lesionem illatura esse, qua de re omnino à tali remedio in principio abstinendum esse censeo. Nec quempiam auctoritas Pabli vrgeat, cum Galenus lib. 11. Metho. cap. 17. in fine hanc rem clarè docuerit, in quo loco de pulmonis inflammatione loquens hæc verba habebat. Itaque etià cucurbitula vtiliter ijs, qui sic laborant, si prius sint vacuati, applicabitur. Si verò abundantia succorum (quàm Græci plethoram vocat) in his sit, non magis ex pulmone in pectus aliquid excrementi transfert, quàm ex toto corpore attrahet in utrumque. Quapropter, nulla præmissa

euacua-



euacuatione nunquam cucurbitulæ circa thoracem applicandæ erunt, & maximè in principio morbi. sicuti etiam clare docebit Gal. lib. 13. Metho. cap. 19. per hæc verba. Verum vtendum cucurbita in ipsa parte, quæ phlegmone vrgetur, inter initia non est, imò posteaquam totum corpus euacuaueris. Hoc idem monuerat lib. 2. ad Glau. in cura inflammationis, vbi docuerat talia remediorum genera solum conuenire, vbi totum corpus sufficienter fuerit expurgatum, neque iam amplius aliquid influat.

Topica medicamenta thoraci administranda docens, monet ea, quæ digerendi, ac discutiendi vim habeant, applicanda esse, indeq; multa laxantia proponit. Attamen ex Galeno erat etiam monendum in huiusmodi remedijs acrium aliquid, & euidenter calefacientium admiscendum esse ad euocandam materiam ab internis partibus ad exteriores. in qua materiei transmutatione Hippo. lib. primo de morbis. agēs ad pulmonis erysipelate maximam habebat. salutaris peripneumonicorum confidentiam. ad quam eandem intentionem talia medicamenta probabat Gal. lib. 11. Metho. cap. 17. hæc verba habens. At longè quidem magis in pulmonis phlegmone abstinendum ab adstringentibus est, quando in eo ipsis quoque relaxantibus admiscendum aliquid acriū quodāmodo, & euidenter calefacientiū est. quippe foras trahere potius, quā reprimere debemus. Quod idem docuerat lib. 2. ad Glau. in cura inflammationis, vbi hæc verba habebat. Hæc igitur quæcunq; in pulmonis inflammationibus extrinsecus thoraci applicantur medicamenta, valde fortiora, atque acriora natura sunt, quàm si ipsa membro patienti apponerentur.

*De Empymate. Cap. LII.*

**M**ulta transcribit ad educendū pus ex thorace ipso; quibus tñ non cōferētibus, docet, quid agendū sit, cum hoc ex Hippocrate declarandum esset, qui monuit, vbi

*Empyema non  
conferētibus. me-  
dicamentis quo  
modo curantur.*

pos in cauitate thoracis contineatur, educies non queat, deluendum esse vel ad sectionem, vel ad vitionem, ut habetur lib. 2. de passionibus ab eodem Hippocrate, cuius etiam meminit lib. 7. Aph. 45. hanc actionem aliquando cogitur inire Medicus, si velis aegrotantem à pure confici, & suffocari. sectionem autem in audacibus preferat, causticum autem in his, qui sectionem non admittunt, admitteret.

*Lac in empy-  
mate an exhi-  
bendum.*

Ex Alexandro proponit, vbi diuturnior fuerit affectus, & puris pauca quantitas in thorace contineatur, febrilisq; calor moderatior euaserit, lac exhibendum esse. In quo hoc aduertatur, quod hoc stante non amplius sumus in casu Empymatis curandi, sed in casu tabis, & phthisis instantis: nam vbi diutius perseverat Empyma, ad tabem transeunt aegri, & tunc febris refert tantum hecticæ speciem, & puris quantitas minor est. Vnde dicebat Hippo. lib. 5. Aph. 15. quod ij, qui à laterali morbo suppurantur, si in quadraginta diebus, à qua fit eruptio, non purgantur, ad tabem transeunt; & ideo casus iste non est Empymatis, sed tabis, in qua lactis potus, non autem in Empymate cõuenit.

*De palpitatione Cordis. Cap. LIIII.*

*Palpitationis  
cordis cause.*

**D**Amnat Arabes, & modernos, qui arbitrantur palpitationem posse gigni ab alia causa, quàm à frigiditytate contra Galeni principia. In qua re longè fallitur Author, existimans viros hos iudicare veram cordis palpitationem gigni posse ab intemperie calida; quoniam hoc ipsi non asserunt, sed cum iidem agunt de palpitatione, vel de tremore cordis, sub hoc capite comprehendunt omnes motus deprauatos ipsius cordis, qui motus sunt in quadruplici differetia; alij. n. sunt parui, & tremuli, alij similes ipsi palpitationi. Vnde hi melius distinguentes, quàm Author, dixerunt motus hos posse causari ex diuersis causis, inter quas enumerarunt intemperiem calidam, sicuti aliquando contin-

gir,

git, vbi est motus ille tremulus, & paruus, & inæqualis cordis, non autem dixerunt, quòd vera cordis palpitatio ab alia generetur causa, quàm à frigiditate, sed hoc consentientes, & verè iudicantes declarauerunt, etiam alios cordis motus præter naturam à diuersis causis ortum trahere posse, inter quas non tantum est frigiditas, sed etiam caliditas, humores vel multi, vel acres, spirituum paucitas, & consimiles causæ, quæ pro diuersitate earum diuersos in corde inducunt motus, & symptomata; quare, & pro his etiam diuersa requiritur curatio, prout & diuersæ sunt causæ.

Statuit hunc affectum quodammodo ad vnitatis solutionem consequi, cum materia inter duo corpora sibi acquisitum molitur ventrem. Quæ sententia non est simpliciter recipienda; quoniam ab vnitatis solutione sequitur dolor, qui tamen palpitationi nequaquam necessariò conuenitur, nec in ea vlla fit continui solutio, sed sit tantum dilatio membri, recurrente spiritu flatuoso per poros, & meatus naturales partis palpitantis: quo ingrediente attollitur, & quo expulso constringitur membrum, & ita nulla est continuitatis solutio.

Exponens ex Galeni mente causam veram palpitacionis, explicat tantum causam per se, & primariam in corde existentem. At hic aduertatur vnum, quod maximè ad rectam curandi rationem facturum est, Videlicet, quòd cordis palpitatio non semper fit eo primariò, & per se affecto; nam aliquando generatur hæc palsio per consensum ab inferioribus partibus; Vnde ab utero, à liene, à pancrea, & à cæteris hypochondriorum partibus potest trāsmitti ad ipsum cor materia, aut vapor, cuius ratione subsequatur palpitatio, & tunc in curatione incumbendum est non tantum cordi, nè ita facile afficiatur, sed etiam parti primariò affectæ, vt inde materia ad cor non transmittatur, alias incassum lompis curatio administraretur.

Palpitatio  
non fit  
per se  
sed per  
consensum  
ab aliis  
partibus

In palpitacione  
cordis an  
sic solutio  
continui.

Palpitacione  
cordis nõ semper  
fieri, corde  
primariò affecto.

Palpitatio  
non fit  
per se  
sed per  
consensum  
ab aliis  
partibus

*Palpitatio cordis an fieri possit ex tumore in pericardio existente.*

Recensens palpitationis causas ex Galeno, addit palpitationem cordis fieri etiā ex aliquo tumore in pericardio existente, vel humore in eo contento, qualem pustulæ, quas hydatidas vocant, continent, et hoc ait ex mente Galeni: Quod nequaquam verum est, cum hæc proponat Galenus, ut legenti patere potest, non tanquam palpitationis causas, sed tanquam experimenta, quibus persuaderi possit, in pericardio nonnunquam tantum cumulari humoris præter naturam, ut inde cor lædatur.

*In palpitationibus quæ venæ secanda.*

Curationem tradens monet secandam esse venam internam dextri cubiti, si totius corporis plenitudo adsit, ea autem non existente, sinistri. Hæc diuersitas nulla ratione fulciri potest: Quoniam si è directo loci patientis vena secanda est, sinistra hæc erit, nunquam autem dextra. Quod si adsit plenitudo, nulla tamen ab hac desumi potest indicatio, cuius ratione in opposito latere venæ secanda sit; quoniam hoc stante in pletoria non è directo loci patientis, sed ex opposito esset mittendus sanguis, cuius tamen oppositum semper docuit Galenus; quare semper in affectibus cordis secetur vena interna sinistri cubiti: quod si nonnunquam in hisce affectibus adsit pletoria, non immutetur intentio hæc, sed hoc seruetur, videlicet, quod præsentē plenitudine copiosius mittatur sanguis, quam fieri ea absente debeat.

*De Lactis defectu. Cap. LV I.*

*Lactis defectus an sit symptoma in genere retentorum immodicè.*

**C**enset hunc affectum esse symptoma in genere retentorum immodicè. At hoc non ita veritati consonare videtur. nam symptomata in retentione excernendorum supponunt excrementa generata: at in casu isto, cum lac non sit genitum, & hinc deficiat, quomodo potest dici symptoma in genere retentorum immodicè? certè hoc vanum est. At referendus est hic affectus vel ad virtutē mamarū attractricem, vel alteratricē lăsam, & tunc erit symptoma, vel

ad

ad defectū materiæ, vel quia debita materia aliò conuertatur, & tunc non morbum, sed aliud symptoma cōsequitur.   
 x. Laudat ex Hippocrate ad lac multiplicandum, eo deficiente, Viticis fructum, & betæ succum potatum. In qua re aduerto Authorem consuetum esse indiscriminatim plura ab alijs transcribere medicamenta ad morbos facientia. Quare cum ea indistinctè proponat, examinet Medicus, in quo casu conueniant; Viticis enim fructus, qui est siccus in tertio gradu, vt habetur lib. de Alimentis, & quæ huiusce sunt ordinis, quoniam nimis siccant, cum talia, vt habetur lib. 5. de simpl. Med. cap. 21. non conueniant ad generationem lactis, non possunt lac procreare, immo ipsum extinguere, sicuti & disperdere semen apta sunt, nisi forsan exhibeantur in casu sanguinis pituitosi, & humidioris, quare hoc sit pro exemplo aliorum medicamentorum ab eo sine discrimine propositorum.

*Viticis fructus, et betæ succus an faciant ad generationē lactis.*

*De lacte in Cases speciem, seu grumis conuerso. Cap. LVIII.*

**C**Enset ambos hosce morbos in numero, seu magnitudine dici posse, cum in quantitate comprehendatur, atque in excessu eiusdem. In qua re hoc aduerto, quòd lactis coagulatio non potest dici morbus; quoniam contenta in affectibus præter naturam non concurrunt, nisi vt morborum causæ, non autem vt morbi; morbi enim sunt affectus partium corporis: vnde si lac in mammis coaguletur, non potest dici morbus. Si autem consideretur lac concretum, quatenus est in mammis, nec potest dici morbus in numero, nec in magnitudine. non in numero; quoniam morbi in numero dicuntur tantum illi, in quibus vel pars naturalis, vel præter naturā supercreuerit, quæ supercrescens aggeneratur, & parti naturali vnitur. Quapropter in utroque casu requiritur, vt docet Gal. lib. de caus. morb. cap. 8. virtus valida, aliàs nec natura formare, nec quod viciatū est, augere posset, quod idem requiritur, quādo id.

*Morbi in natura qui sunt.*

quod inutile est, abijcit, ut in ganglijs, miliceridis, steatomatibus, & atheromatibus, in quibus etiam, licet sit res præter naturam, tamen fortis requiritur virtus, tum ut excernat pravam materiam, tum ut illam formet, & aggeneret. In lactis autem coagulatione nihil horum reperitur, primo non adest virtus, potens regere lac ipsum; quoniam si hoc esset, lac non concresceret; præterea lac ipsum parti naturali nec aggeneratur, nec unitur, sed tantum in cavitatibus mammarum, eiusque conceptaculis continetur. Quæ de re non erit morbus in numero, nec etiam erit in magnitudine; quoniam mammae, concreto lacte in propria substantia, non augentur, sed in eis tantum materia concreta continetur, & ideo non est peccatum in magnitudine, & eo magis, cum mammarum magnitudo non sit morbus, alias in puerperis, in quibus mammae in magnitudinem eximiam extenduntur, esset hic morbus familiaris, & proprius: quod falsum est, cum magnitudo illa sit secundum naturam, & non præter naturam; præterea sæpius in mammis etiam minori bus, & in quibus non multum lactis abundat, concretio ista fit, quo casu mammae in magnitudinem non atolluntur, & ideo nec dici potest morbus in magnitudine, sed lac coagulatum erit tantum causa morbi, tum cavitatem explendo (& hic morbus pertinet ad morbos in formatione) tum quia hinc lac alienam adeptus qualitatem, mammas ipsas interire perit, & qualitate propria lædit.

Nititur docere ex Galeni mente aliud esse, lac in casei speciem coagulari, & aliud esse in grumos concrescere; opinaturque hæc duo diversa esse inter se, & ab oppositis generari causis, cum sentiat lac in casei speciem ab intensa tantum coagulari caliditate, in grumos autem concrescere à sola frigiditate, quod exemplo sanguinis ostendit. Quæ sententia nequaquam recipiatur, cum lac in casei speciem, vel in grumos concrescere sit idem, sub diversis tamen nominibus prolatum. Hæc autem lactis concretio nil aliud est, nisi ip-

hæc

sus

Lac caseari, et  
in grumos con-  
crescere, an sit  
idem.



lius lactis coagulatio, quæ fit, dū separata ichorosa, & cerosa  
lactis partes; pars eiusdē crassior cōtrefcit, & coagulatur: q̃  
pars crassior cōcreta, & coagulata, sive dicatur in casei spe-  
ciem, siue in grumos conuersa, nil refert; quoniam hoc re-  
idem est, licet nomine differat: Et quò ad nomina cū coa-  
gulatur, propriè dicitur lac in casei speciem concrefcere;  
quoniam ex lacte concreto propriè caseus generatur; dici-  
tur autem improprie in grumos conuerti, transumpto no-  
mine à sanguine extralienato; cuius proprium est, non au-  
tē lactis, cui concretio in grumos non conuenit, extra pro-  
pria vasa in grumos permutari.

Perpendens autem omnia eius dicta, quæ ad eius com-  
probandā sententiam faciunt, dum ait, ab immediata mam-  
marum caliditate lac in casei speciem conuerti hac exsicca-  
te, & fecernente id, quod tenue, & serosum in ipso consistit,  
ab immodica autem earundem frigiditate lac in grumos  
cōuerti, eadem adstringente, & cogente vniuersam lactis  
substantiam; animaduerto Authorem quò ad primam par-  
tem veritatem asserere; quò ad secundam non ita, dum iudi-  
cat vniuersam lactis substantiam à frigiditate in grumos cō-  
uerti; quoniam grumus propriè fit, dum euaporante spiri-  
tu, & separata serosa parte, sanguinis propria, & crassior  
substantia cōtrefcit. quod nō est vniuersam sanguinis sub-  
stantiam adstringi, & cogi: quod idem assero de lacte; quo-  
niam coagulari hoc nequit, admixta eius parte serosa, alias  
hæc coagulatio non esset in grumos concretio, sed esset ip-  
sius lactis congelatio, & glatiatio, quæ in viuente animali  
imaginabilis non est:

Imaginatus quidem est Auicenna caseari lac, & à calidi-  
tate, & à frigiditate; caliditate quidem exsiccante, frigidita-  
te autem congelante, attamen rem eandem per caseatio-  
nem, non autem diuersam intellexit, scilicet ut lac modò  
in casei speciem, modò in grumos differenter concrefcatur.

An autem concrefcens lacte à causa frigida, intelligat vnā  
cum

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

o c o m m u n i

cum parte caseosa etiam serosam in vnum cogi, non ita facile est iudicari, cum tanta frigiditas in viuentē muliere imaginari nequeat. Sed forsitan intellexit Auicenna frigus externum, cuius occasione, expressa parte serosa, caseosa concresecat, quam barbaro nomine congelationem appellauit, quemadmodum per calorem intellexit externam caliditatem, propter quā, exsiccata serosa parte, caseosa cogatur.

*Lac quomodo  
in grumos con-  
cresecat.*

Dum asserit lac non alio modo, quā sanguinem, in grumos conuerti, qui, nisi ubi extra vasa propria ductus est, & frige factus fuerit, in grumos non vertitur. notetur sanguinem extra vasa in grumos conuerti, non à circumstantium partium frigiditate; in cauitatibus enim internis, ubi plurimus viget calor, sæpe concresecit, sed à propria tantū qualitate, quæ soli sanguini, & non ceteris humoribus competit, euaporatis iam spiritibus, & ichorosa parte excreta, cum extra propria vasa, in quibus fluidus conseruatur, eiectus fuerit. Quare hinc non habeatur, lac in mammis ab earundem immoderata frigiditate in grumos conuerti posse, cum ad formandos grumos non extranea, sed propria qualitas, & frigiditas eiusdem requiratur.

*Grumi sangui-  
nis an ledant  
pura intempe-  
rie frigida.*

Habet hoc eodem loco à sanguine in grumos conuerso ideò egrotantes frigore exolui, & penè exanimari, pulsumq; in his minui, & frequentem succedere, ob eiusdem sanguinis refrigerationem, hocq; ex Galeni autoritate cōfirmare nititur. Qui tamen Galenus nunquam ad intemperiem frigidam sanguinis hanc retulit causam. Sed hanc tantū rem vbique admiratur, & semper innuere videtur hoc solum à praua qualitate, non autem à pura pendere intemperie, vt præcipuè habet lib. de cibis boni, & mali succi. ubi cum admiratus est hæc pathemata à sanguine omnium humorum corpori nostro accommodatissimo oriri, subiungit. Ex his enim planè perspicuum est, quantam vitiosi succi qualitatis vim habeant, quas sanè tanquam parui mo-  
menti

menti quidam nostræ ætatis medici aspernantur, eosque sequuntur, qui ita sentiendum esse primum cõmentum sunt. Citat Galenum lib. 5. de simpl. med. cap. 13. ad probandum lac non posse, nisi à valido calore, coagulari, in quo loco tamen nusquam hoc habetur: & mirum est, cum Galenus ibi loquatur tantum de acribus, & diureticis medicamentis, doceatq; , qua ratione per hæc copiosa lotij qualitas prouocetur, dicens hoc à valido tantum calore fundente, & secernente sanguinem fieri; quomodo Author hic transferat hanc causam ad lactis coagulationem, de qua lactis coagulatione mentionem tantum fecit, ut modum secretionis lotij ostenderet, non autem ut easdem causas ambo- bus adaptaret, sicuti cuique rectè literam Galeni confideranti patere potest.

*Lac an coagu-  
letur à solo va-  
lido calore.*

Hoc, quod ex Galeni mente testatur, videlicet, aliud esse in casei speciem cogi, aliud in grumos verti, ex eodem Galeno constat falsum esse; qui libro de cibis boni, & mali succi de lacte agens, docet, quomodo aggrauet hominẽ, ac strangulet, dum haustum in ventriculo in casei speciem cogitur; cui coagulationi sanguinem in grumos conuersum æquiparat, adeo quod & in casei speciem cogi, & in grumos densari apud Galenum idem re sit, cum vtrunque separata serosa parte, crassiori autem concreta, fiat. differunt autem tantum nomine, cum propriè lac in casei speciem, sanguis autem in grumos, excreta parte ichorosa, verti dicatur.

*Lac caseari, et  
grumescere se-  
cundum Gale-  
num, idẽ esse.*

Dum propriam sententiam Author hic testimonio Actij, & Pauli confirmare nititur, in manifestum lapsus est errorem, à diuersitate nominum, & inscriptionum deceptus, non animaduertens Actium in duobus capitibus, scilicet in 34. & 35. eadem curare affectionem, hac habita distinctione, quod in primo præseruationem, in secundo curationem doceat, idem esse supponens, & lac in grumos concre- scere, & in casei speciem coagulari. Ut autem clarè hoc appareat,

*Lac grumescere, & caseari ex Act. & Paul. idẽ esse.*

reat,

reat, considerentur verba Aetij, qui in principio capitis habet hæc verba: Vt nè lac in mammis puerperarum in grumos coeat, & paulò post eodem capite subiūgebat. lac etiā instar casei coagulari in mammis prohibet cera alba, &c. quod non alia dixit ratione, nisi quia opinatus est idem esse lac in casei speciem, & in grumos concrefcere. Hoc idem inscriptio capitum doceat; in primo enim, in quo præseruationem huius affectus docet, titulus est; Nè lac in mammis in grumos coeat. in secundo autem, in quo curationem tradere intendit, titulus est. De coagulato lacte. Hoc idē in processu Pauli habetur, qui in principio capitis præseruationem docens vitur hac voce; lac in mammis casei modo cogi. cuius generationem prohibere intendens, remedia in principio capitis tradit. Quod si contigerit, fiatq; hic affectus in mammis, tunc postea curationem tradit, & vitur hac voce, lac in grumos conuerti, dum dicit. At distentione oborta, vel lacte in grumos concreto, panis ex hydraleo, &c. ex quo processu clarè liquet, Aetium, & Paulum eundem existere affectum arbitratos esse, & lac in grumos conuerti, & in casei speciem cogi.

*De Cardiaco morbo, & Cardialgia. Cap. LX.*

*Cardiaci morbi signa.*

**P**Onens Cardialgiæ signa, ait, aliquando adesse vomitum bilis, aliquando eiusdem humorem infra excerni, vt docet Galenus lib. 2. de Hipp. & Plat. decretis, cap. 8. Attamen idem Galenus lib. 5. de vsu partium cap. 4. ait, necessariò vomitum bilis præcedere Cardialgiam.

*Cardiaci morbi curatio.*

Curationem Cardiaco morbi tradens multa ex Actio, Alexandro, cæterisq; adducit. Galeni autem curationem prætermisit, quam ipse posuit lib. primo ad Glæuc. cap. de curat. feb. cum accidentibus, dum docet curare eos, qui ex vitiosis humoribus os ventriculi mordicantibus, dissoluuntur. quo loco exacta, & perfecta traditur curandi hunc affectum Methodus. Qui docuit etiam, vbi stomachus

chus valentē mōrdeatur, optimū esse remediū oleum  
dulcissimū epotū lib. 2. de simpl. med. fac. cap. 13.

In cardiacis, vt refert author ex Alexandri Tralliani sen-  
tentia, vltra humoris acrimoniā saepe eiusdē humoris pra-  
ua, & venenosa adest qualitas. Vnde in huiusce morbi cura-  
tione plures insurgunt indicationes; nam vel humor pec-  
cans statim vomitu, aut deiectione euacuandus est; vel vbi  
non possit ita facile euacuari, eius acrimonia contempera-  
da quidem; sed ratione venenatę naturę potissimū pra-  
ua qualitati aduersandū erit. quare huic maximē incūbat  
Medicus, remedijsq; quorum ne verbum quidem, nec mē-  
tionem author habuit; potentibus resistat; alias incassum  
omnia experietur remedia. hac enim non euicta, nec mor-  
bus superari poterit.

Hic etiam moneo Medicum, ne; priusquam humor pec-  
cans vomitu, aut deiectione expurgetur, vel eiusdē acri-  
monia retundatur; prauaq; qualitas superetur; ori ventri-  
culi adstringentia; aut roborantia adhibeat medicamenta;  
his enim magis constiparetur materia, rebelliorq; altera-  
tioni, & euacuationi redderetur, hincq; magis apra fieret;  
vt facilius, citiusq; agrotantem perderet. Vnde indiscrimi-  
natim talia remedia; sicuti docuit Aetius, ceteriq; anti-  
quiores, nequaquam; sed tantū educta; vt monuit Au-  
thor, vel saltem, si euacuari non poterit; temperata mate-  
ria, administrentur; huiusmodi enim medicamenta in prin-  
cipijs, vt docuit Galenus loco citato lib. 1. ad Glauconē, &  
dum humor prauus adhuc in parte lęsa continetur, non cō-  
ueniunt. sed tunc temporis tantū, quę os ventriculi cir-  
cūstant, loca; & manus, & pedes ad laxandā partem affe-  
ctam, & ad faciliorem prouocandā, & ad diuertendā  
materiā concalefacere oportet.

*Canina appetentia an fieri possit ratione immodica digestionis.*

**A**ssignans Caninæ appetentiæ causas ultra intemperiem, vel simplicem, vel cū materia, assignat ex Galieno totius corporis immodicam digestionem. In qua re hoc aduertatur, quòd Canina fames, est fames inexplibilis, & hæc vnicā habet causam, scilicet, corrugationem oris ventriculi ab intemperie, vel simplici, vel cum materia causatam, vt habetur lib. 2. Apho. commen. 21. cuius ratione semper fames hæc est vehemens, & indeficiens. Cum autem Galenus lib. primo de sympt. caus. cap. 7. caninæ famis alteram causam adducit totius corporis immodicam digestionem, aduertatur, quòd Galenus hoc in loco ex antiquorum mente loquutus est, intensum appetitum caninam appetentiam vocans, vt ex eius verbis liquet, dum inquit. Vitiosæ verò appetentiæ, quæ quidem quantitate modum excedant, vocanturq; à quibusdam caninæ, tum existunt, cum vel acidus quispiam vitiosus succus ventriculum mordet, vel totum corpus immodicè digestum inops alimentum redditur; verè enim fames canina est insaturabilis, & indeficiens: at quæ ex digestionem corporis prouenit, licet sit ingens, non tamen est indeficiens, quoniam expleto ventriculo, cessat, & quiescit appetitus edendi, qui tamen intensus est, & citò ab assumpto alimèto (quoniam citissimè hoc dissipatur) redit, & patientes angit.

*Canina famis qui succi sint causa.*

Quò ad vitiosum succum famem caninam excitantem, iudicauit Author hunc pituitosum, & acidum esse humorē, vt ex eius curatione ab eo posita clarè apparet. Sed sciatur etiam hunc eundem affectum ab acida posse gigni melancholia, quæ & frigida, & acida pariter aliquando erit, vt pituita, quod Galenus attestans, & de humore hoc melancholico loquens lib. 6. de loc. affect. cap. primo, dicebat. At huiusmodi euacuatione suppressa, nonnulli mastritia melancholica vexantur, atque cibos auarissimè concupiscunt. idque



Idque præcipue, si valde fuerint acida, quæ ad ventriculum transferuntur, excrementa. Hoc idem lib. 6. Epid. sect. 3. commen. 37. affirmabat, docens immodicas appetentias ab acida gigni melancholia. Quod idem ego attestor, qui curavi, & vidi appetentias verè caninas ab acida melancholia causatas. Quapropter animadvertat Medicus differentia horum humorum, pro quorum diversitate, diversa etiã requiruntur medicamenta.

Famis caninæ, & insatiabilis, ultra assignatas ab Authore, est & alia notabilis, & maximè animadvertenda causa, videlicet Vermes in intestinis existētes, & omnē assumptū cibū depascentes. De lumbricis famem hanc procreantibus meminit Galenus lib. de Theriaca ad Pisonem, dum varias Theriacæ facultates enumeraret. De lata autem vermē, helminthes vocatā, habetur historia ab Alexan. lib. 7. cap. 6. In quo agit de grandi fame, quæ bulimus Græcè dicitur, Quod idem innuit Galenus loco citato, dum de lata vermē loquēs inquit, Theriacam hanc latam vermē, quæ omnem assumptum cibū depascitur, eoque reliquum totum corpus emaciat, mirabiliter ab intestinis educere. Et ego testor me curasse talem famem à lata vermē causatam. Unde in casu famis intensæ, & insaturabilis Medicus circumspectat, an hæc vitio vel intemperiei solius, vel humorum acidorum, siue hi sint pituitosi, aut melancholici, vel vermium intestina occupantium, vel immodicæ totius corporis digestionis, fiat.

*Canine famis causam quādoque esse vermes.*

*De Bulimo. Cap. LXIII.*

**A**Gens de Bulimo ponit Aetij dictum, scilicet, quod bulimus contingat etiam in febribus: quæ sententia videtur dubia stante eius essentia, sicuti declarat Galenus, videlicet quod sit animi defectus ex fame, quæ quidē magna inchoavit, sed tamen nondum perdidit, ortum habente ex refrigeratione extrinseca ventriculi, & ex imbecillitate

*Bulimus an contingat in febre*

cillitate eiusdem, quomodo autem in febribus possit esse, dubium videtur.

*De Vomitu. Cap. LXVII.*

*Vomitūs causā.*

**C**Ausas vomitus recensens duas tantum assignat in genere, scilicet vel copiam, vel vitium humorum: quod dictum diminutum est, cum ex Galeno lib. 3. de sympto. caus. cap. 2. detur tertia causa, & est quando in ventriculo adest aliquid alienum à natura, non quantitate, aut qualitate molestum, sicut dulcis pituita, vel sanguis; & ita non duæ, sed tres sunt causæ vomitus in genere.

*De inflammatione ventriculi. Cap. LXVIII.*

*Ventriculi inflammationis signa.*

**I**Nter signa inflammationis ventriculi hoc, quod omisum est ab Authore, recedendum erat; Videlicet, quod os ventriculi, quoties insigni afficitur inflammatione, promissimum infert delirium, ut habet Galenus lib. primo Prognost. com. 32.

*Ventriculi erysipelatis curatio.*

Notat per inflammationem omnem calidum tumorem intelligi, siue sit à sanguine, siue à bili, & utriusque notat, & indicia proponens, non tantum veræ inflammationis, sed etiam erysipelatis signa proponit. Attamen postea curationem exponens non explicat harum ægritudinum diuersam curandi rationem; quod maxime agendum erat, cum utrisque non eadem conueniat curandi ratio. In erysipelate enim magis refrigerantia, quam in inflammatione, conueniunt, & Medicus in huius curatione, magis quam in inflammatione, sollicitus esse debet, animaduertens si purum sit erysipelas, non alia posse ratione, quam per frigide exhibitionem, etiam non apparentibus coctionis signis, assumptam curari. Quod si erysipelas ipsum sit cum inflammatione mixtum, curabitur etiam per frigida exhibitionem, quæ tamen solum apparentibus coctionis signis, exhibenda erit, ut docuit Gal. lib. 9. Meth. cap. 5.

Quæ

Quæ curandi ratio nequaquam inflammationi puræ conuenit, aduersatur.

Curacionem tradens, pro potu concedit decoctum coriandrorum, vel cinamomi; quæ quoniam calida sunt, valdè suspecta sint in affectu inflammatorio, quare non admittantur. nisi forsan declinante morbo.

In moderata inflammatione ceratum à Galeno descriptum lib. 5. Meth. cap. 5. ex cera, Vng. nardino, aloë, & mastiche administrandum docet. Hic aduertant Iuniores, ceratum hoc non conuenire in inflammatione, nisi in vltima declinatione, cum tantum in hoc recipiantur calida, & roborantia, quæ vigente inflammatione non conueniunt. Quare si per moderatam inflammationem intelligit nō magnā, sed debilem, non est tuta eius sententia. sin autem intelligit declinantem, aliquo modo admitti poterit. hoc libenter notaui, quoniam in inflammationibus internis quilibet minimus error lethalis esse potest, & solet mortem accelerare; & vt cætera remedia ab eo, non ab essentia morbi, sed sub alia consideratione proposita ad agrotantium salutem exquisitè ponderentur, & administrantur.

*De Lienteria. Cap. LXXI.*

**I**N cap. de lienteria simul agit de Cæliaca passione, cū ab eadem causa hi duo pendeant affectus, licet hæc in lienteria intensior, in Cæliacis autem remissior existat: An autem sub Cæliacis comprehendat fluxum eum, qui à recetioribus chylosus dictus est, in quo educitur chylus concoctus quidem in ventriculo, sed cum non distribuatur, accidit, quod tanquam onus expellatur à virtute expultrice, dubium est, cum hi duo affectus non omninò coincidere videantur, cuius tamen, vel in hoc loco, vel in cap. de Diarrhæa meminisse conueniebat, cum hæc fluxio sæpè accidat, & molæsta sit. Quæ fluxio contingere consuevit his de causis, scilicet vel quia existente aliqua abrasione in intesti

*Fluxus chylus  
si causa.*

nis, vis expulsiua, antequam exsiccatu sit chylus, molesta  
ta, & irritata à materia, eandem excernit, vel ratione im-  
becillitatis contentiuæ intestinorum, quæ contentiuæ ratio-  
ne aut frigiditatis, aut humiditatis labefactatur, cuius meri-  
tò chylus, antequam attrahatur, descendit, vel hoc est, quia  
nutrimentum ipsum non distribuatur, non distribuitur autè,  
aut ratione obstructionis venarum mesaraicarum. Vnde  
vidimus saepe tales fluxus admodum molestos ratione valida-  
rum obstructionum in dictis venis existentium genitos, qui  
non adstringentibus, alterantibusuè, sed solis exobstruenti-  
bus medicamentis sanari potuerunt: aut quia non fiat attra-  
ctio: Attractio verò nō fit, vel quia non fiat resolutio in vni-  
uersi corporis ambitu, quæ sicuti nōnunquā est huius fluxio-  
nis, pariter etiā est aliquādo nō famescēdi causa, vel quia in  
coris infirma sit attractrix facultas, cuius merito liquidus,  
& nondū iusto modo exsiccatu chylus deijcitur, vt testatus  
est Galen. lib. 8. de compo. med. secūdū Iot. cap. de hepatis  
dfect. per hæc verba. Cū igitur hepar præ imbecillitate ex  
ventre, & intestinis alimentū trahere non potest, liquida, &  
nondum iusto modo exsiccata per sedem excernūtur: Et si  
quidem vter simul cū hoc viscere fuerit imbecillis, ac non  
probè concoquens, cruda. Si verò validus fuerit, concocta  
quidem, sed liquida, propterea quod nulla, aut omnino  
modica digestio, ac distributio ad hepar est facta.

eligi zuculi  
alij dñi

*Lienteria an  
posset fieri ex  
cicatrice à dy-  
senteria.*

*Lienteria* causas recensens ex Aetio inquit, hanc frequē-  
ter oriri ex præcedente magna dysenteria, cui successerit ci-  
catrice leuis, & densa, quæ cicatrix, ait Aetius, est *lienteria*  
causa, quoniam ob densitatem suam, ciborum per corpus  
digestionem fieri non permittit, cum per eius densitatem  
venarum ora obturata sint, quæ distributioni alimenti de-  
stinata sunt. Quæ sententia nec Galeno consona est, nec  
veritati; Galeno quidem, quia solum duas posuit causas, al-  
teram abrasionem ventriculi, alteram imbecillitatem fa-  
cultatis retentricis eiusdem ventriculi, ab intemperie vel  
pura,

pura, vel cum materia labefactatam. Veritati autem; quoniam non est imaginabile fieri posse lienteriam ex tali cicatrice inducta in intestinis, quamvis distributionem alimentum impediret, cum sic necessarium esset, ut cicatrix omnia venarum ora, per quæ ab intestinis ad mesaraicas venas succus attrahitur, intercluderentur, quod non est possibile, cum hanc præcessisse debuisset dysenteria maxima, omnia intestina exulcerans, & occupans, cuius magnitudinis ratione fieri non potuisset, ut superstes agrotus fuisset. Sed stante etiam tali cicatrice, quæ omnia venarum ora occludat, non potest fieri lienteria; quoniam hæc cicatrix non velocem cibi ex ventriculo delapsum causare, & idcirco semper cibis aliquo modo esset cōcoctus, sed tantum liquidas excretiones, non facta distributione, edere posset. in lienteria autem requiritur, & quod cibis velociter deijciatur, & quod in eo nulla facta sit mutatio. Cum autem hanc eandem sententiam ex Cornelio Celso confirmare nititur, aduertitur, quod si idem, quod Aetius, intelligit Celsus, in idem discrimen cum Aetio incidit. Si autem ex dysenteria lienteriam oriri asserat, quia ex dysenteria ventriculus, ut quandoque fieri vidi, valde labefactetur, hincque virtute retentrice labefactata, subsequatur lienteria, admittatur. sed in tali casu habeatur curationis summa ratio, nec ita omnia Celsi remedia admittantur, qui etiam in ultimo consulit vomitum ex elctboro albo, quod remedium in simili affectu omnis discriminis est particeps, cum omnibus intentionibus aduersetur, tum propter medicamenti vehementiam; tum quia euacuat per locum affectum; tum quia educit ab vniuerso corpore; tum quia maximè vires, & ventriculū ipsum labefactat.

Curationem lienteriae ab ulcere intestinorum, & ventriculi superficie genitæ docens, ait huius curationem in dysenterie cura patere. Sed aduertatur, quod desumptis a loco affecto indicationibus, ac remedijs, hic per ea, quæ

ingeruntur, in dysenteria autem per ea, quæ per sedem infundantur, agendum erit.

*De Cholera. Cap. LXXII.*

**D**E cholera humida tantum agit, siccamq; prætermittit, de qua nos in superioribus egimus.

*An ex cholera malè curata possit succedere phthisis.*

Prognostica ex Alexandro recensens inquit, mora levis in curatione huius affectus, videlicet cholerae humidae, habita, non simplicem offensam, sed etiam absolutam subinde tabem, quæ phthisis dicitur, conciliat. Quæ sententia non simpliciter admittatur, cum à cholera ad phthisim nulla sit communicatio, cum hæc pendeat à ventriculo, & intestinis læsis, illa ex pulmonis ulcere, vel putredine, hocq; sit exemplum, ut alias dixi, eorum, quæ ab Authore indistinctè, & indiscriminatim nullo habito examine, ab alijs transcribuntur.

*In cholera humida an sit exhibendum pharmacum.*

Vbi cholera fuerit ex corruptione alimentorum, eaque procliuiora fuerint, ut per aluum excernantur purgantibus medicamentis, licet leuioribus, inquit agendum esse; In quo hoc animaduerto, quod hic non est amplius casus cholerae: si enim cholera sit, dum perturbato ventre inferiori, & ventriculo ipso sit euacuatio materierum humidarum, tum per superiora, tum per inferiora simul, in tali casu non erit cholera, deriuatis solum excrementis ad inferiora: quæ si adhuc etiam per superiora inueantur, superfluum erit exhibere pharmacum purgans; quoniam statim hoc conturbato ventriculo euometur.

*An leue debeat esse pharmacum pro educatione bilis exstentis in ventriculo.*

Quod dixit de pharmaco in cholera ex corruptione alimentorum, idem affirmat, videlicet leuioribus medicamentis, agendum esse, vbi bilis, vel quivis alius vitiosus succus ad excretionem naturam irritare videatur, nihil autem mentione dignum vel per aluum, vel per os erumpat. At Galenus lib. 4. de ratione vict. in acutis commen. 110. in tali casu, vbi venter liquidus sit, in ventre autem sit bilis, quæ acris



acris, & alui contumax existat, non leuiora, sed valida probat medicamenta, hæc verba habens. Qui autem in affectionibus huiusmodi sæpius valenter auxiliatur, is cacochymiam valente medicamento affatim expurgat, vires cōtēplatus egri, habitū, anni tempus, ætatem, & constitutionē.

*De Diarrhea. Cap. LXXIII.*

**D**Ozens signa, per quæ alui fluxus per liquationē corporis factus, in quo colliquata caro in ventrem defluit, cognoscatur, inquit; quòd tunc per aluum excernitur deiectio exigua, glutinosa, opima, admodum graueolens. In quo hoc animaduerto, quòd sanè in tali casu deiectio est exigua, glutinosa, & opima, non tamen semper, nec necessariò graueolens. tunc enim tantum fit graueolens, quando vltra causam colliquationis additur & putredo. Vnde dicebat Galenus lib. 2. Prognost. commen. 22. Graueolentia verò putredinis indicium est. Quapropter vbi non sit putredo, non est graueolentia, cuius meritò in colliquationibus sæpè excrementa nec fetida, nec graueolentia videmus.

*Fluxus colliquescentini signa.*

Docens quibus signis deprehendatur fluxio alui à cerebro dependere, ait, huius esse indicium spumosa excrementa. Sed sciatur hoc indicium fallax esse, nec id affectum hunc certò indicare posse; tum quia excrementa possunt esse spumosa alia de causa, quàm ob fluxionem à cerebro dependentem, vt docet Gal. lib. 7. Aphor. commen. 30. tum etiam, quia non semper distillate materia à cerebro fiunt spumosa excrementa, sed solum quando spirituosus humor ex capite ad ventriculum defluit, vt eodem commen. habet Galenus. Si enim pituita viscidior, & tenax, crassaq; , non autem spirituosa descendat, nullo pacto excrementa spirituosa erunt.

*Fluxus cerebri alui an necessariò habeat excrementa spumosa.*

Hoc eodem capite omisit signa, & curationem eius Diarrheæ, quæ fit vitio obstructionis venarum mēstaraicarum, vel quia ab eisdem non fiat attractio; qui calus cum

aliquando eueniant, à Medicis sunt cognoscendi, & considerandi.

*Diarrhea in-*  
*soluta historia.*

Ultra omnes Diarrheæ species ab Authoribus enumeratas, vidi ego diarrheæ specialem eam, in qua simul cū excrementis educebātur continuè quædam ossicula, quorū aliqua contracta, aliqua integræ erant, similia in totum ossibus auicularum paricarum, perinde, ac si ægrotans auiculas ipsas integras, quas tamē nunquam degustauit, in vsum alimenti assumeret; hæc semper cum ingenti dolore excernebantur, quantitas ossiculorum erat pro singulo quoque die ad mensuram non minus, quàm vnius cochlearij, aut ad summum duorum. fluxus hic per plures dies perseuerauit, nec yllis vnquam potuit remedijs aut leniri, aut firmari. Vnde emaciatus æger doloribus supramodum vrgentibus, tandem miserè vita functus est. Quidam censuere hanc Diarrheam ex maleficio inductam esse, ossiculaq; illa ex Diaboli præstigatione, non ex naturali causa excerni. Attamen nouimus in abscessibus externis ossium, pilorum, carbonum, lapillorum, vnguium, testarum similia inuenta esse corpora solida, sicuti & humida olei, cæni, luti, mellis, sepi, fecis vini, & alia huiuscemodi, quæ omnia verè in abscessibus reperiri, vltra experientiam ipsam, testatus est Galenus, & alij celebres Viri. Vnde iudicent alij, an sicuti in externis, ita in internis possint tales materiæ à naturali causa generari.

*Diarrhea cu-*  
*ratio quomo-*  
*do absoluen-*  
*da sit.*

Tradens curationes diuersarum specierum Diarrheæ tū per interius sumenda, tum per exterius administranda, nunquam docet causam abscindendam esse. Quod maximè est aduertendum ab his, qui tales fluxiones curant; nisi enim causa generationis excrementorum tollatur, vel minuatur, nec minui alui fluxio poterit.

*Diarrhea quā-*  
*lo sit cobiben-*

Inquit, si in Diarrhea euacuatō sit symptomatīca, debemus ipsam cohibere, quod dictum difficultatem patitur propter regulam à Galeno lib. 12. Meth. cap. primo positam,

tam, ubi ait, quod symptomatica non veniunt curanda, nisi subeant vicē causæ vel lædendo vires, vel affectionem augendo; quare, cum hic fluxus erit symptomaticus, non erit curandus; nisi vel vires lædat, vel aliquam affectionem augereat; & ideo non erit simpliciter cohibendus; sicut docet Author. Quod autem ad Aphorismum, quibus pro se ad ducit, notandum est, veram esse Hippocratis sententiam, si rectè intelligatur; nam cum dixeris, quod evacuationes factæ tum à natura, tum ab arte sunt utiles, quando educuntur, qualia educere oportet, subiungit, quod si non talia, qualia educere oporteat, educatur, ea cohibere oportet; quod dictum intelligendum est, in computatione superiori dicti; quoniam sicut in illa evacuatione superiori sequitur utilitas, & tolerantia ægrotantis; ita in illa, quæ huic opponitur, sequitur nocumentum, & mala ægrotantis tolerantia, ex quibus vires debilitantur. Vbi autem vires red duntur debiles ex symptomatico, illud symptoma venit curandum; & ideo illi fluxus ex sententia Hippocratis, qui sunt symptomatici, dum ægrum affligunt, & debilitant, sunt cohibendi; nisi autem læsiq succedat, nec curationem indicant, nec mutant, ut docet Galenus lib. 12. Meth. cap. citato. Ad locum autem Hippo. lib. 6. Epid. sect. 2. comment. 28. dico, quod Hippocrates ibi loquitur de materia; quæ stat pro causa morbi, quemadmodum ex Galeno in eodem commento per eius verba apparet; & ista, quæ stat pro causa morbi, si quò non oportet, vergat, est revellenda; si autem quò oportet, àperiendum est; quoniam & si non aperiatur, morbum causat, quod dictum non contrariatur superioribus; nam, clarum est, quod fluxus symptomaticus, si stat pro causa morbi, venit revellendus, & curandus, ut habetur loco citato lib. 12. Metho.

da, & quando non.

In risu hinc & tunc p[er] illorum, risuq[ue]

in risu hinc & tunc p[er] illorum, risuq[ue]

*Excretionis sanguinolentæ quatuor species.*

**Q**uatuor sanguinolentæ excretionis species ex Galeno lib. 3. de sympt. caus. cap. 2. quatuor succedentes affectibus attestatur esse. Quibus tamen ex eodem Galeno duas ab his distinctas addendas, & notandas censeo; Altera est ea cruenta excretio, quæ in morbis acutis, vel decretoriè, vel tabescentiæ, & liquationis more contingere consuevit, in qua excretionem sanguis qualitate à natura alienus, ut habetur à Galeno eodem capite citato, esse solet, & talis sanguinis fluxio consuevit febribus prauis succedere, ut sæpius hoc idem mihi attestante experientia animaduerti. Altera est cruenta, & sanguinea excretio facta, cum præcedente aliqua sanguinis vehementi profusione corpus refrigeratum fuerit, unde cum in posterum minus, quam deceat, per cutim digeratur, nimia aggregatur sanguinis copia, à qua stimulata natura superabundantis materiei exonerationem tentans sanguineam excretionem etiam cum torminibus causat, ut docet Galenus lib. 4. de artic. in fine commen. 40. Quare non quatuor, sed sex erunt cruentæ sanguinis excretiones.

Ex Aetio vlcere crassorum intestinorum signa exponens inquit inextinguibilem edendi appetitum in his oboriri. At nec ex tali vlcere fames causari potest, nec experientia huic rei attestatur. Quare hoc animaduertant iuniores.

Signa autem exponens vlcere tenuium intestinorum, ait, his vlceratis a delfe dolorem circa vmbilicum. quod dictum videtur dubium; quoniam vlcera tenuia sunt inuoluta, & sunt tam supra, quam infra vmbilicum.

Vbi vlcera sint depascentia, & praua, docet his, quæ cruentam inducunt, utendum esse, non tamen ad particularia, quemadmodum pulcherrimè in tota præcedenti curatione egit, descendit remedia. Nè autem Iuniores in hoc delictum vllum non habeant, animaduerto plura à Græcis propono.

*In dysenteria, ubi vlcera sint depascentia, quod agendum.*

proposita esse ad hoc præsidia, quæ nõ sinè delectu in vsu recipienda sunt, quales sunt Trocisci Faustini, Trocisci Andronis, & Trocisci Passionis, & alij similes, inter quos Faustini sunt adeò vehementes, vt illis nunquam vti ausus fuerim. Troc. autem Andronis valde probo, hisque feliciter in vlceribus prauis, & depascentibus vtor. Troc. passionis ad idem valent, sed mihi magis arrident prædicti, & tutiores videntur. his autem per sedem infusus vtens, vlcera depascentia, & praua firmare consueui. Ad exemplar autem horum seligantur cetera medicamenta ab antiquis proposita.

Ad absolutam etiam dysenteriae curationem alterum, vltra proposita ab Authore medicamenta, remedium mihi frequentissimum, & felicissimum, pluribus etiam medicis notum, & consuetum non reticendum esse duco, quod est administratio aquarum naturalium potentia refrigerantiũ; ex his enim duo in dysenteria, & præcipuè biliosa habemus; alterum refrigerationem iccoris; alterum, quoniam sunt hæ aquæ quoquo pacto adstringentes, quod prohibendo fluxum, dant tonum visceribus, & faciunt ad curam vlcera. Harum tamen non indistinctus sit vsus. non enim tutum est has exhibere, vbi materia peccans multa, ac copiosa in corpore abundauerit; nam si talis materia vi huius medicamenti intercipiatur, alterum duorum sequetur, scilicet, vel quod hæ eadem materia retenta ad alias partes conuertetur, & inde fiunt aliquandò ægritudines lethales, conuersa hæc ad nobiliora membra: aut si non ad nobiliora, sed ad minus nobilia vergat, morbos quidè minus lethales, graues tamen prodit. Vel detenta hæc materia acrior redditur, in maioriq; mole accumulatur: vnde quandoq; maiori impetu postea ruens est in causa deterioris dysenteriae. quare vsus talium aquarum erit, cum pro parte euacuata materia in minori erit mole. quo tempore opportunũ erit has exhibere, cum ex his tunc & iccoris refrigerationem,

&amp;

& viscerum robur, & fluxionis interceptionem, & ulceris sanationem tuto habere possimus. Quod si a dysenteriae principio nec copia excrementorum adsit, nec eorundem prauitas insignis appareat, tuto etiam tunc temporis exhiberi poterunt, vtiq; erunt in usu, quemadmodum mihi sapientissime fuisse, qui adeo felicem harum thermalium aquarum administrationem habui, ut his opportune exhibitis nunquam aliud per dysenteriae curatione efficacius remedium desiderauerim, testorque me his aquis administratis ferè nunquam spe concepta frustratum esse. Vtor autem aqua illa Imeldulèsi, cuius in febris pestilentis curatione meminimus, eam exhibendo & in potu, & in ciborum praeparatione, & etiam medicamenti loco, videlicet iubens, ut in hac cibaria incoquantur, & ut in usu clysteriorum administratur, & ut pro potu in prandio, & cena exhibeatur, & ut aegrotantes summo mane cyathum huius ad formam syrapi, ac pariter in die per tres, aut quattuor horas, ante cenam alterum assumant; siq; hi sicciant, libenter permitto, ut etiam eandem tempore intermedio bibant. In huius autem usu maximam ventriculi rationem habeo, quem semper roborare, ac defendere procuro, ne ex usu talis aquae habefactetur; ventriculum enim frigidiorē solet magis refrigerare. quare in talibus habitibus nō ita inconsideratē exhibeatur, sed aliqua ei admisceantur, quae ventriculi robur manu tenere queant, vel per exteriora administrata remedia, idē corroboretur, vel in eiusdem summa imbecillitate huius usus praetermittatur.

*De Hemorrhoidibus. Cap. V LXXVI.*

*Hemorrhoidibus affectis an secūda sint venae inferiores.*

**P**RO earum curatione docet secūdam esse maleoli venam ex Galeno, quoniam hac vena secta hemorrhoides provocat. In qua re nō sit praecipuus Medicus. stante sanguinis plenitudine, quoniam ex hac sectione sepe maximo adeo impetu ruit sanguis ad partes inferiores, & praecipuo



cipue ad locum affectum, vt inde peior succedat affectio, hincq; viderim ego in tali casu maximas successisse inflammationes, & aliquando etiā canceras. Quare stante plenitudine non secantur interiores, sed potius superiores vena, & hoc præcipue seruandum, vbi sit intentio tantum leniendi dolorem, non prouocandi hæmorrhoides. vbi enim nō sit intentio prouocandi eas, tutius est in omni casu secare superiores, & eō magis, si eas cohibere volumus, vt ibidem habet Galenus.

*De colico affectu. Cap. LXXIX.*

**H**uius causas enumerans, quatuor exponit, scilicet materiam pituitosam, flatum, humores acres, & inflammationem. At vltra has me docuit experientia (quod idem asserit Aetius) colicū dolorē causari a lapide in intestinis genito, a quo noui hominem adeo excruciatum, cum nullo remedium genere leniretur dolor, vt propē mortem expiraturus esset, nisi sponte excretus lapis morbum soluisset. Hoc aduertatur, quod idem etiam non negauit Galenus fieri posse lib. 6. de loc. affect. cap. 2. licet affirmet se hoc nec vidisse, nec alium, qui viderit, audiuisse.

Victus rationem in colicis seruandam instituens, vsum ceparum ex Pauli autoritate commendat; quæ tamen nec à Paulo inter cibaria commoda enumerantur, nec pro vtilibus in tali casu assumantur, licet enim cepa conueniens ratione intensæ caliditatis, quam obtinet, censerī queat, tamen ratione aqueæ humiditatis, quam multam possidet, est flatuosa, vt habet Gal. lib. 7. de simpl. med. facult. cap. de Crōmio, & ideo non est probanda in doloribus a flatu; illa enim, quæ flatu discutiunt, debent esse sicca, non humida, & maxime humiditate aquea, qualis maxima portio est humiditas ceparum.

*Colicum affectum causari a lapidibus.*

*Ceparum vsus an cōueniat in dolore colico.*

*Lombrici an  
causēs tussim.*

**S**I ea, quæ superius explicavi de Ileo, considerētur, facile erit discernere ea, quæ ab Authore proposita sint sub diligenti examine constituenda.

**S**igna lumbricorum explicans, inquit adesse tusses exiguas cum siccitate irritantes. quod tamen contrariari Galeno videtur, qui, vt diximus, capite de tussi, oppositum sentit lib. 6. Epid. sect. 2. com. 17. & com. 24.

Inter lumbricorum signa hoc etiam enumerat, quod aliqui instar delirantium peregrina in somnis loquuntur. Ac sciendum est non tantum in somno vermes delirium, sed etiam in vigilia causare posse. quod, vltra experientiam, quæ hoc mihi testata est, etiam Hippocrates lib. 4. Epid. circa finem asserere videtur, cuiusdam senis historiam recensens, qui, cum furiosus esset, ex vomitu vermis suberassi sedato delirio quieuit.

De verme lata loquens inquit ex Aetio hanc vermem esse permutationem membranæ intrinsecus intestina ambientis in corpus quoddam viuum: vel ex Paulo esse mutationem adnatæ in interiori intestino membranæ in materiam animalis. Quæ tamen sententia non ita, vt verba sonant, est recipienda. nam vermes non ex membranis, partem alia solida procreantur, sed ex varijs excrementorum generibus, præcipuè autem pituitosis, aut ex corruptis cibis, sicuti etiam author pulcherrimè declarauit, ortum habent. Vnde quid per membranam intellexerit Herodotus, à quo Paulus, & Aetius transcripserunt, declarandum erat, & eò maximè, cum, si ex vera intestinorum membrana generaretur hæc vermis, eiecta verme, sanitatiq; restituto ægrotante, intestina ipsa propria, & interna tunica, quæ potius carnosæ est, quàm membranosa, denudarentur, & priuarentur.

Animaduerto autem ego, Herodotum per membranam non  
pro-

propriè membranam, sed mucosam illam, & pituitosam materiam, quæ interiorum intestinorum tunicam oblinet, & circumuallat, intellexisse. hæc autem materia putrescens potest in viuum animal conuerti, & inde in latam hanc vermem formari.

Latae vermis signa ex Aetio recensens inquit. ijs occupatos comitatur corporis gracilitas, & etiam impotētia, seu imbecillitas cum tarditate. Quod tamen verum esse experientia redarguit. non enim huiusmodi patientes semper sunt impotētes, ac imbecilli. imò dicebat Hippocrates lib. 4. de morbis. Qui hanc bestiolam, animalculum uè habet, semper fermè validus est. Cum verò debilitatus, vix reficitur, vixq; conualefcit. Vnde ex Hippocrate debilitas ista non semper consequitur ad hanc vermem: sed quando accedit, vix tolli potest ob assumptum alimentum ab hoc animali dissipatum. & hoc aduertatur, quoniam tales patientes, vt aliquando vidi, non sunt semper debiles, sed tantum, quando superueniente ingenti fame, & notabili corporis extenuatione emaciantur.

Subiungit autē inferius, loquens de hac eadem lata vermi, hæc verba. Huius etenim lumbrici quandoq; cōcisæ partes prodeunt, quæ semel sanè exolutæ non amplius secundario congregantur. Quæ sententia duplicem potest habere sensum, alterum ad mentem authoris, alterum ad mentem Aetij, à quo hæc verba, non tamen eo ordine, & sensu, quo Aetius protulit, transcripsit. Ad mentem authoris hoc significare videntur, quòd si huius vermis partes aliquæ abruptantur, & concisæ prodeant, non amplius restaurentur, & in hoc sensu, si ita intellexit Author, sententia hæc falsa est. quod nō tantū testata est experientia mihi, qui viderim huius vermis partes quādoq; ad semicubitū, quādoq; ad cubitum, quādoq; plus, vel minus abruptas, & excretas, & tamē postea iterū inspexerim eādem vermem ad tantam quantitatem auctam, vt extra podium discederet. sed

sed etiam hoc idem testatur Hipp. lib. citato per hæc verba. Si verò cum medicina exeat, recta pars de lumbrico arumpitur longitudine duorum, aut trium cubitorum, aut etiam longior amplior; & ubi abruptus fuerit, per multum tempus signa cum stercore non prodeunt, postea verò recrescit. Ad mentem autem Aetij hoc enunciant, quod lata vermis, ubi tota, vel integra, vel in partes concisa exierit, non amplius regeneratur: sicuti cætera lumbricorum genera, quæ licet semel, bis, & amplius educantur, tamen iterum, atque iterum regenerari consuevit. & hoc verum est. nameducta verme, & intestinis mundatis ab illo excremento mucoso, & pituitoso, intestinorum internam cauitatem obtinente, quod putredinis merito in tale animal conuersum erat, non amplius regeneratur talis vermis. & ideo ad hunc sensum Aetius hæc verba protulit, dicens. Et semel sanè exoluta, non amplius secundo conuegitur.

*Vinū aquosū  
an cōueniat in  
cura lumbrico  
rum.*

Rationem victus in casu isto seruandam docens, vinum aquosum exhibendum proponit: quod an cōueniat, perpēdendum est, cum vina aquosa minus, quā potentia, vētriculum, & partes nutritiuas iuuent, minusq; alimentum a putredine, vnde vermes ortum ducunt, p̄seruare queant.

*De Hepaticis. Cap. LXXXII.*

*Pistachia, &  
amigdalæ an cō  
ueniant hepaticis  
ex intemperie  
frigida.*

**M**ulta particularia tum medicamenta, tum cibaria pro hepaticorum curatione proponit, quæ si sub diligenti examine ponantur, multas patiuntur difficultates; ne autem omnia recēseam, vnicum animaduerto, quod ex Alexandro transcribit, dum docet curare hepaticos ex intemperie frigida, dicens Pistachia, & Amigdalas in hepaticis duabus rationibus non cōuenire; primò quia hæc facile corrumpuntur; secundo quia sunt oleoginosa. quæ sententia discriminis plena est; nam quò ad primum habemus in oppositum efficacissimum argumentum. difficulter enim cōficiuntur, ergo difficulter corrumpuntur. Quò ad secundum

secundum, quòd sint oleaginosa, & facillè vertantur in bilem, ignoro, qua de causa huiusmodi cibaria in frigida iccoris intemperie sint vitanda: aliàs cætera omnia cibaria, & medicamenta calefacientia non essent administranda. nihil autem de his, quæ facillè vertuntur in bilem, timendum est in hepate refrigerato, in quo indigemus calefacientibus, & abstergentibus medicamentis, & cibariis, quorû utrûq; vsum præstare possunt amigdalæ, & pistachia, cum vtrâq; calefaciant, & abstergant.

*De Hepatis obstructione. Cap. LXXXIII.*

**A**gens de obstructione cum febre asserit ex mente Galeni lib. 8. Meth. cap. 4. obstructionis magnitudinē ex magnitudine febris discerni, ut quæ ex maiori obstructione maior, ex minori minor fiat. Quod dictum falsum est, cum ingens obstructio in hepate cum leui febre, sicut & sine febre, sæpè generetur. Dictum autem Galeni ad propositum istud nihil facit, cum Galenus eo in loco nō de hepatis, sed de cutis obstructione loquatur, ut ipsemet eodem in loco clarè expressit.

*An ex obstructione hepatis fiat febris secundum eius proportionem.*

*De Iecoris inflammatione. Cap. LXXXIII.*

**D**um de hepatis inflammatione agit, meminit & de eius erysipelate, & de inflammatione ad erysipelatis naturam accedente; Curationem tamen exponens, harum nē verbum quidem fecit, cum tamen hoc maximè facere debuisset; cum ab erysipelate puro, & ab inflammatione erysipelatis naturā participante, maius, quā à pura inflammatione, impendat periculum ægrotanti, maiusq; medico in medendo discrimen: pro quo hoc animaduerto, quod idem notavi super caput de inflammatione ventriculi, purū Erysipelas internarum partium non aliter sanari posse, quā per frigidæ exhibitionem, ut monet Galenus lib. 9. Meth. cap. 5. si autem Erysipelas vnā cum inflammatione iunctū

*Iecoris Erysipelas quomodo curandum.*

II fuerit,

facit, conueniens quidem erit, sicuti in puro erysipelate, frigida potus, hac tamen distinctione habita, quod in puro erysipelate quocunque tempore, & indistincte exhiberi potest; at in erysipelate cum inflammatione mixto, non prius exhibenda erit, quam coctionis notæ apparuerint. Pro curatione etiam horum affectuum hoc aduerto, quod quauis in pura inflammatione nihil actu frigidum supra hepar administrandum sit, ut docuit Galenus; tamen in erysipelate puro sint medicamenta actu frigida. quæ calefacta subinde permutentur, nouaq; refrigerantia applicentur, quousq; sentiat eger flammam internam extinguî, ad locumq; affectum frigiditatem peruenisse. Si autem sint inflammatio, & erysipelas simul mixtum, pro ratione urgentiæ, & pro ratione superabundantis materie erit ad hanc, vel illam partem magis declinandum.

*Concocta phlegmone in giba hepatis an exhibenda diuretica, vel soluentia medicamentis.*

*Suppurante icteris inflammatione quid agendum.*

Vbi phlegmone cõcoquatur, si in giba hepatis parte constitit, ex Gal. lib. 13. Metho. cap. 15. notat Author, diuretica administranda esse. At ultra hoc etiam ex Gal. lib. 7. Meth. in fine erat animaduertendum, quod ubi icteris gibæ pars est expurganda, si multa adsit materia peccans, per deiectionem est euacuanda. sin autem mediocris, diureticis, ac per vrimales meatus est educenda.

Vbi icteris inflammatio non discutitur, sed ad suppurationem deuenit, inquit abscessus rupturam, cum perfecta suppuratio fuerit, adiuuandam esse, quæ vel per sedem, vel per lorium, vel per os disrumpatur, & excreta iuuanda etiam erit. At præter hæc docet Hipp. lib. 7. apho. 46. etiam icteris suppurationem aduisione curari, ex qua si fluat pus album, & laudabile euadere patientes monet; quoniam in his pus in hepatis tunica continetur, si verò, qualis amurca, pus extiterit, quoniam tunc corruptio usque ad carnem hepatis pertingit, eos perituros affirmat.

*Interdum icteris non suppurat, sed aduisione curari potest.*

Idem M. & d. Galenus lib. 13. Metho. cap. 15. notat, quod si icteris aduisione curari potest, non suppurat, sed aduisione curari potest.



**P**ro curatione notat, quòd vbi multo sanguine abundauerint patientes, vena secetur, sanguisq; mittatur ante particularium medicamentorum vsum. Quæ sententia ex principiis Galeni valdè suspecta est; cū enim scyrus hepatis, quando perseverat, terminetur ad hydropem refrigerato hepate. vbi autem imminet hydrops, venæ sectio non sit administranda, nec etiam in scyrro hepatis erit conueniens, cum ab ea hepatis refrigeratio timenda sit. & eò magis, cum hic sit morbus diuturnus, pendeatq; à materia frigida, siue hæc sit pituita, siue melancholicus succus.

*In scyrro hepatis an cōueniat secare venam.*

*De inflammatione lienis. Cap. LXXXV III.*

**C**urationem inflammati lienis exponens, inquit pharmacum purgans, si venæ secandæ mēdella relinquitur, à principio ex Aetij, vel in incremento ex Alexandri sententia exhibendum esse, hoc tamen agendum esse monet, si prius parata sit materia. Hanc sententiam notare volui; quoniam implicat contradictionem, dicere materiam paratam esse, & inflammationem esse in augmento, vel in principio, quo tempore nec concocta, nec parata potest esse materia inflammationem faciens; Cuius ratione ab Hippocrate lib. 4. de ratione victus in morbis acutis rex. 22. medicamenta purgantia in inflammationum initijs excluduntur, & damnantur; quare cautus sit Medicus in principijs talium morborum, nec vnquam pharmacum purgans tali tempore exhibeat: si tamen quid exhibendum sit, exhibeantur tantum, non dixerim leuia, vt inquit Author in hoc capite, sed lenientia, & quæ primas venas non transcendere apta sint.

*Lienis inflammatio an cōueniat principio pharmacum.*

*De Cachexia. Cap. XC.*

*In cachexia an  
conueniat san-  
guinis missio.*

**D**Ocet in cachexia ex Aetio, & Paulo venam secandā, mittendumq; sanguinem esse. Quæ sententia nō itā tuta est, cum in cachexia iam refrigerato hepate, & abundantibus frigidioribus humoribus, nequaquam per sectionem venæ conueniat magis hepar ipsum refrigerare. At solum conuenit sectio venæ in tali casu, vbi aliqua sanguinis naturalis euacuatio, sicuti vel per menses, vel per hæmorrhoides suppressa, extiterit propter nimiam plenitudinem, calorem natium propè extinguentem, in causā cachexiæ, vt idem docuit Galenus lib. 4. reg. acut. commen. 111. in anasarca faciendum esse, dum ex retenta naturali euacuatione plethora inducta sit in causā, vt per eā propè extingatur naturalis caliditas. & hoc est id, quod voluit Aetius; quod idem clarius expressit Paulus, cum inquit; sed vacuandi sunt potissimum, qui hæmorrhoidibus, aut mēstruis non respondentibus in morbos inciderunt, quemadmodū ijs, qui copia vitiosorum humorum laborant, vacuatio sanguinis per venam vitanda est. quod nō animaduertens Au thor indistinctè pronunciauit, venam in cachexia secandā, ac mittendum sanguinem esse, vbi aliqua naturalis euacuatio suppressa fuerit.

*De Hydrops. Cap. XCI.*

*Solatvi hortens  
succus an  
conueniat in  
hydrops.*

**A**Scitis curationem docens ex Aetio laudat succum ex solatro hortensi expressum, si quotidie, donec perfectè sanentur, ad cyathi quantitatem exhibeatur. In qua re hoc idem dicam, quod in sexcentis alijs remedijs ab Authore indiscriminatim, ac sine examine transcriptis dicendum esset. Videlicet, quod hoc remedium in tali casu inconueniens sit, cum non tantum non sanare hydropem, sed & eandem, vbi adsit, augere, & introducere, vbi nō sit, polleat; cum enim sit frigida facultatis, in secundoq; huius po-  
ficus

fitus sit gradu, continuus illius potus hepar validè refrigerare, & inde hydropem vel augere, vel introducere aptum erit. Quod, cum sit adeò suspectum ratione primatū qualitatum, non sine examine erat proponendum; & cum adsint alia infinita, & non suspecta, opportuna medicamenta, hoc adeò suspectum prætermittendum erat, vt Iuniores, ac inexperti Medici hinc decepti non ita tutò agrotantibus consulerent.

*De Diabete. Cap. XCII.*

**Q**Uærens Author, quæ renū facultates in Diabete labefactatæ sint, censuit ex mente Galeni tres, lesas esse, scilicet attractricē, retentricē, & alteratricē. De attractrice, & retentricē, vt Gal. ex professo docuit lib. 6. de loc. affec. cap. 2. satis constat. de alteratrice autem nō ita liquet. Nā nec ratio, nec locus ille Galeni lib. primo de cris. cap. 12 in dicant in Diabete facultatem renum alteratricem laesam esse. In renibus enim non concoquitur humorum, seu sanguinis serosa pars, sed in hepate tantum, & in venis ipsis, in quibus humores, & sanguis verè alterantur, & concoquuntur, & ideo lotium qualitatis sanguinis, & humorū in venis existentium certum est indicium. vnde vbi hæc cruda sint, & lotium crudum erit: vbi autem concoctæ, & concoctum hoc existet, pariterq; supra alias eorundem humorum in venis contentorum differentias, & passionēs significare poterit. Renes autem qualem serosam partem attrahunt, talem ad vesicam transmittunt: nec eam, vbi hi præter naturam affe-  
cti non sint, immutare per virtutem alteratricem possunt: alias ex cruda existente humorum in venis mole, vbi renes imbecilli non existant, possent eam serositatem alterare, ac concoquere. vnde crudis existentibus humoribus, lotium coctionem præmonstrare posset, quod tamen experientiæ, & rationi contradicit. At dices: si virtus alteratrix renum non alterat, nec concoquit hoc serosum excrementum, hæc

virtus in renibus vel nulla erit, vel vana. Non profectò. im-  
mo est virtus necessaria, & utilissima; nam per hanc renes  
partem sanguinis tenuiorem, & humidiores, quam vnà cū  
serositate per venas emulgentes à magnis vasis virtute  
attractricis facultatis attrahunt, pro sui nutrimento confi-  
ciunt, & alterant: serositatem autem eam non concoquunt,  
quia nec earum proprij nutrimenti est excrementum, nec  
quid ex ea in proprium alimentum accipiunt. Vnde ea cru-  
da existēs ( hoc sit vel ob generis venosi imbecillitatē, vel  
ob materiæ, ex qua deciditur, incoctionem) nunquā potest  
in alteratricis renum facultatis coctionem, aut alterationē  
recipere. Locus autem ille Galeni lib. primo de crissib. in  
quo habet in Diabete esse extinctionem vtriusque virtutis, sci-  
licet & retentricis, & alteratricis, nec potest persuadere in  
Diabete renum facultatem alteratricem læsam esse. nam li-  
cet ibi Galen. vtriusque virtutis meninerit, non tamen  
eiusdem partis virtutes recenset. nam per alteratricem  
eam intelligit, quæ in venoso est genere, passionem, per  
quam lotium crudum, & exquisitè aquosum apparet. Lo-  
quens enim de exquisitè aquosis, & incoctis vrinis, dicebat  
has desperatæ coctionis accidens esse: quæ venosæ naturæ  
passionem, id est alteratricem in summo labefactatam, signi-  
ficant. Si verò, subiungebat, ultra hoc, quod vrina sit ex-  
quisitè aquosa, & cruda, etiam velociter, & confertim, sicut  
in Diabete contingit, excernatur, in hoc casu qualis in le-  
uitate intestinorum accidit, talis est extinctio vtriusque vir-  
tutis & retentricis, & alteratricis. attractricis quidem, scili-  
cet venosi generis, cui attribuit generationem aquosæ, &  
crudæ vrinæ; retentricis autem, & earundem quidem vena-  
rum, in quibus ob violentam renum attractionem non im-  
moratur humiditas illa serosa, vnde commodè concoqui nō  
potest, sed præcipuè ipsarum renum, quæ labefactata sta-  
tim ad expulsionē attractarum humiditatum insurgit virtus  
expultrix, quibus explosis iterum insurgit virtus attractrix,

quæ

que validè munere suo fungens à superioribus attrahēs eas partes exsiccat, indeq; sitis, & porus necessitas, qua de re per locum hunc, in quo habetur, in Diabete extinctionem adesse virtutis retentricis, & alteratricis, non audiamus ambas has virtutes ipsorum renum, quarū ne me minit quidem Galenus, facultates existere. sed ad solum, & mētem eius rem ipsam exponentes, in Diabete extinctionem retentricis renum, & alteratricis venarum adesse intelligamus.

Curationem Diabetis explicans, post sectionem venæ vult ex intentione Aetij esse exhibenda diuretica pro expurgatione humorum imbibitorum in repibus. Hoc videtur dubium, quoniam diuretica attrahunt materiam ad renes, qui sunt affecti, cum tamen sit intentio ab ipsis diuertere. Quare satius forsitan erit ab illis abstinere, nisi fortassè prius corpus fuerit expurgatum, & per diuretica non accipiamus verè dicta diuretica, sed quæ vrinam quidem prouocant, sed cum humiditate, sicuti semina melonum, & consimilia, quæ illam materiam simul contemperare possunt.

Balneum naturale probat pro curatione huius affectus. Aduertatur tamen, quod si Balneum illud naturale sit balneum aquæ dulcis, potest conuenire, quia humectat corpus iam exsiccatum: sed si non sit aquæ dulcis, sed mineralis, ac facultatis exsiccantis, valde suspectum est; quia sic promptius duceret egrum in hecticam, & præcipuè ubi temperiei esset calidæ. quod si sit refrigeratoriæ facultatis, minus suspectum foret.

*In Diabete an  
cōueniant diu-  
retica,*

*Balneum natu-  
rale an conue-  
niat in Diabe-  
te.*

*De Sanguinis renum profluvio. Cap. XCIII.*

**V**bi sanguinolentum serum mingatur, decernit eius causam esse dispositionem renum, nō dissimilem ei, qualem in iecore dicimus, imbecillitatem. Quæ sententia vera quidem est, sed non vniuersaliter, nec semper; quoniā eadem iecoris imbecillitas, qualis & in hepaticis, & in principio hydropis sit, sæpè est in causa, vt labefactata sangui-

*An sanguino-  
lentum lotium  
fiat ratione im-  
becillitatis re-  
num.*

fica virtute, per lotium tale mingatur excrementum, quale ipsis hepaticis euenire solet, quod est veluti lotura carnis, si cuti sæpè in actu medendi vidi, & notauì. Et in tali casu nõ renibus, sed hepati attendendum est.

De hac eadem materia loquens, signaq; apponens inquit, in his sanguinis sanie magis cruentant videri, citatq; ad huius confirmationem locum Galeni lib. 6. de locis affectis. cap. 2. In quo hoc aduertatur, ibi Galenum non loquutum esse de lotij excretionem sanguinolenta, vt sentire videtur Author, sed loquitur de Aliæ excretionibus, quæ in hepatis eueniunt, in hisq; ait, quod ab initio tenuis sanguinis sanies ab hepato deijcitur, quæ sanies, vt sæpius declarauit, est tanquam carnis recentem mactatæ lotura quædam, deinde aucto malo, crassus humor facibus vini haud absimilis excernitur: quam rem nõ perfecte attingens Author existimauit Galenum loqui de sanguinolento lotio.

*De lapide Renum. Cap. XCIIII.*

**D**eclarans lapidis renum causam agentem, inquit, eam esse caliditatem igneam. Contra hanc sententiam est Galenus lib. 6. Epid. sect. 3. commen. 15. vbi expressè habet, quod ad generationem lapidis sufficit mediocris calor, & quod non semper requiritur vehemens caliditas, vt exemplum patet in his lapidibus, qui generantur secundum aquas sponte nascentes, in quibus etiam est minor caliditas, quàm mediocris. Vnde non sit mirum, si in nonnullis, in quibus renes non sint calidiores, aliquando generentur in eorum renibus lapides.

Curationem exponens, & declarans, quibus clysteribus hic sit agendum, ordinat clysteria acia, quæ an conueniant, dubium est, cum dolore urgente sit demulcendum, non irritandum.

Dubitatur, quare quæ habent tepidum calorem possint lapides comminuere, & soluens inquit, quod cum causa lapidis

In Cisterna  
Lapideum  
Lapideum

Lapidum cau-  
sa an sit calidi-  
tas ignea.

Clysteria acia  
an conueniant  
in curatione la-  
pidis renum.



lapidis sit vehemens calor, & tepida ratione intensi caloris habeat rationē contrarij, ideò tepida tanquam contraria possunt comminuere lapides. Quæ responsio nulla est; quoniam in comminuentia lapides hoc non faciunt ratione caliditate vel multæ, vel parvæ, sed ratione incisionis, & tenuitatis partium. Unde videmus, quod lib. 9. de Med. secundū hoc omnia medicamenta posita à Galeno sunt calidiora, quæ, si eius ratio efficax, & vera esset, non possent comminuerē lapidem, sed potius augere, cum lapis, ut ipse ponit, à valido, & urgente calore fiat, hæc autem participant validiori, & magis intensa caliditate.

*De Exulceratione renum. Cap. XCVI.*

**D**um victus rationem seruandam docet, ait, voluptatis gratia Aceti modicum his concedendum esse, sed hic aduertant iuniores, acetum omnibus vlceribus infestum esse, præcipuè autem internis; Quare ab hoc omnino abstinendum est, in gratiamque agrotantis, cum illi sit infestum, non est concedendum.

*De Dysuria. Cap. XCVII.*

**C**ur rationem eius dysuriæ, quæ ex intemperie frigida prouenit, docens, ordinat propriè diuretica. Quæ sententia dubia videtur, scilicet, an hæc in tali casu conveniant, antequam sit roborata vesica; quoniam ista licet calida faciant, ducunt tamen copiosam materiam ad locum affectum, qui cum sit debilis, & malè possit excernere, magis ex hac materia copia affligetur, quare non videtur, quod ista conveniant, antequam sit roboratus locus affectus.

*De Urine suppressione. Cap. XCVIII.*

**L**icet meminere eius essentiam, declarans de ea urinæ retentione, in qua suppressum est lotium in partibus superioribus, non autem in vesica; nihilominus, nec eius curatio-

*Quare quæ tepida sunt caloris, habeant vim comminuentis lapidis.*

*Acetum an conveniat in vlceribus renum.*

*Diuretica, an conveniant in dysuria.*

*Lotium suppressum aliquando supprænes.*

curationem, nec causas tradit; Quæ tamen omnia diligentissimè sunt animaduertenda; quoniam suppresso lotio, nec eo in vesicam descendente, licèt nec adsit dolor, nec mendendi desiderium instet, casus est lethalis, & plurimi ex hoc pereunt, nisi diligens aduocetur Medicus, qui omnia circûspiciens cognoscat, & locum affectum, & affectionis causam, ac omnia opportunè administret. hoc autem provenire solet ex renum obstructione, quæ obstructio aliàs à materia crassa, aliàs à lapidibus generari consuevit. Vnde hûc casum considerent Iuniores, & secundùm rectam methodum sumptis indicationibus opportuna adhibeant medicamenta, quæ ab Authore forsam prætermisâ fuere; quoniam in hoc non habuit ducem, à quo hanc curationem transcribere potuerit. Nos autem de hoc affectu superius abundè egimus.

*De lapide Vesicæ. Cap. CI.*

*Medicamenta  
descripta ad la-  
pidem vesicæ  
an sint effica-  
cia.*

**T**Ranscribit ex Aetio plura medicamēta ad frangendū vesicæ lapidem: sciant tamen Iuniores hæc tantum efficacia esse in lapide renum, in lapide autem vesicæ inutilia fore.

*De inflammatione vesicæ. Cap. CII.*

*An inflamma-  
ta vesica sint  
secandæ ve-  
næ inferiores.*

**A**Vthor in cura inflammationis Vesicæ primò secatur venam internam cubiti præter Galeni mentem locis ab eo citatis, scilicet lib. 13. Meth. & lib. de sanguinis missione. sed præcipuè cōtra ipsum lib. 6. Apho. 36, qui Hippocratem interiores venas inflammata vesica secandas docentem infestatur, si per interiores intelligat manuum venas, hoc dicens nec verum esse, nec rationi consentaneum. An autem talis sectio conueniat, forsàn sunt validæ, & probabiles rationes, quibus ductus Auicenna hanc in tali casu probauit, quem author, licèt cum nominare non dignetur, sequutus est in hac sententia.

Cum

Cum ad topica descendit remedia, calida, & laxantia solum proponit administranda esse, quæ in principio, & augmento ipsius inflammationis, quo tempore inflammatio nem remittere, & temperare debemus, suspecta sunt; cum potius possint esse in causa, ut maior materiæ copia ad vesicam attrahatur, quam quod ab ea repellatur, & remittatur. Potissimum autem fugiantur talia remedia, ubi inflammatio Erysipelatis particeps erit.

*Vesica inflam-  
matio quomo-  
do à principio  
curanda.*

Subdit in huius curatione, quod ubi inessus, irrigationes, & fomenta non suffecerint, cucurbitula circa pectinē, aut pubem vnā cum scarificatione adhibeatur. In qua re hoc animaduerto, quod hæc sententia si in sensu ab Authore prolata simpliciter intelligatur, videlicet quod non cedente morbo administranda sit cucurbitula, nequaquam admittatur; quoniam & inflammationem exasperando, & materiam plurimam ad locum affectum attrahendo sauiorem reddet morbum. Et hoc præcipue si in principio, & in augmento inflammationis; & dum adhuc materia fluere, administraretur, quo tempore docuit Galenus cucurbitulas loco affecto nunquam admouendas esse. Quod si vnquam fieri dabitur, tunc id agendum erit, cum nihil amplius affluerit, corpusque exinanitum fuerit, & usus rei inflammantis vel mouendæ, vel amoliendæ, vel extorsum euocandæ tulerit, ut ibidem monet Galenus.

*Vesica inflam-  
mata an conue-  
niat apponere  
pubi cucurbi-  
tulam cū scar-  
ificatione.*

*De Gonorrhæa. Cap. CIIII.*

Signa huius recensens inquit, quod ex eo dignoscitur Gonorrhæa; quod semen profluens aquosum, ac tenue existit. In qua re hoc notandum, quod non semper in gonorrhæa semen est aquosum, & tenue, sed aliquando est substantiæ crassioris, & viscidæ, ut potest in his, qui ex feminis copia in gonorrhæam incidunt, sæpè videri. Quare habeatur hoc signum pro incerto; quoniam semen quod

*In Gonorrhæa  
an sæpè fluat  
semen aquosum  
& tenue.*

ad eius substantiā in hoc affectu potest esse tenue, & aquosum, & similiter crassum, & viscidum.

*Gonorrhoea cu  
ratio qualiter  
administranda.*  
Curationem huius affectus tradens, solum particularia docet, vniuersalia autem, sicuti venæ sectionem, purgationes, & alias opportunas euacuationes, quæ particularibus præmittendæ sunt, & quæ sæpè in hac affectione administranda veniunt, omisit: eorumq; indicationes nullo pacto declarauit, quæ à Medicis nequaquam negligenda sunt.

*De Priapismo. Cap. CV.*

*In Priapismo  
an sit inflama  
tio.*  
**E**X Actio in hoc affectu admittit inflammationem adesse, vnde in curatione inquit, propter dolores, & inflammationes in his existentes venam secandam esse. Hic animaduerto, quòd in hoc affectu nequaquam adest inflammatio, quoniam tumor est à flatu, & non in inflammationum, sed in flationum, vt docuit Gal. lib. 14. Meth. cap. 7. generibus reperitur: Nec est, quòd inflammationem adesse suspicandum sit, quia à refrigerantibus hæc affectio curari videatur; quoniam non ratione affectus, cum hic à frigida causa, idest à flatu, qui calefacientia, & resoluentia indicat, generetur, sed ratione causæ, quæ est nimius calor, vel arteriarum ora ultra modum adaperiens, vel in materiam crassam, & glutinosam agens, indeq; spiritum crassiorem educens, refrigerantia conueniunt, quæ tamen in principio tantum, cum in processu morbi ratione affectus postea calefacientia, & resoluentia administranda veniant, opportuna sunt. Affligit autem hic morbus non ratione inflammationis, sed ratione tensionis: vnde fit hic casus conuulsioni conformis, cuius ratione, vt in spasmo, seuisimè succedunt dolores, aliaq; tetanicis similia eueniunt symptomata, & inde, vt in his, aliquando in patientibus priapismum mors succedere consuevit.

*Quòd ad causas Priapismi noui hominem, qui assum-  
ptis medicamentis Venereis pruriantibus incidit in Priapismum,*

pifsum, ex quo adeò ægrè habuit, vt vix faluatus maximis adhibitis remedijs euaserit.

*De ignauis partibus genitalibus. Cap. CVI.*

**P**Articularia tantùm remedia recenſet, nullam habēs rationem vniuerſi corporis, quæ tamen prætermittenda non erant ; cum ſæpè etiam optimis adminiſtratis ad hoc medicamenti, non ſuccedat curatio, niſi corpus accuratè fuerit expurgatum, & præcipuè, vbi Veneris impotentia à partium languiditate, vel reſolutione cauſata fuerit.

*De menſum ſuppreſſione. Cap. CVII.*

**D**Vm docet curare mulieres, quæ ob plenitudinem nō purgantur, propoſita Aetij ſententia, qui monebat & venam cubiti, & tali in hoc caſu ſecandam eſſe. In cōtrarium adducebat locum Galeni in lib. de curatione per ſang. miſſ. cap. 15. in quo habetur nequaquam in cubito ſecandam eſſe venam in iſto caſu, videlicet, pleno exiſtente corpore ; nam ſectio hæc purgationes reuèllere potius, quàm prouocare, poteſt: quam difficultatem dum ſoluere nititur, diuinando exponit, Aetium intelligere id agendū eſſe, vbi magna ſit plenitudo, & vires copioſam non poſſint tolerare euacuationem, Galenum autem non adeò magnam plenitudinem, viresq; robuſtas ſupponere. Quæ ſolutio eſt mera diuinatio, cum neuter viriū meminerit, neuterq; plenitudinem qualem, ſiue maiorem, ſiue minorē intelligat, expoſuerit. Hæc autem difficultas ita tollatur. Plenitudo vel eſt in cauſa ſuppreſſionis mēſiū, ſibi vias præcludendo, vel ex ſuppreſſione menſium non expurgato corpore, ſubſequitur plenitudo. In primo caſu, qui eſt caſus Aetij, prius eſt ſecanda vena cubiti ad tollendam plenitudinem, quæ eſt cauſa ſuppreſſionis, & quæ magna plenitudo eſſe debet, vt quæ ſibi viam ob multitudinem præcludat, poſtmodum autem eſt ſecanda vena tali ad prouocandos

*In ſuppreſſione menſium ob plenitudinē an ſint ſecandæ venæ ſuperiores, vel inferiores,*

menfes. At ubi ex fuppreffione menfium fubfequatur, non expurgato copore, plenitudo, quæ non potefteffe ingens, cum ex tali caufa fit genita, ad proliciendos menfes fecandæ funt venæ inferiores, non superiores; his enim fuperioribus venis in tali cafu fectis, reuclluntur ad fuperiora, non deriuantur ad inferiora menfes, cuius oppofitum fuccedit ad fectionem inferiorum; & hæc non diminuta, fed fatis copiofa venæ fectio ob plenitudinẽ caufatã efle debet. Et hic eft cafus Galeni longè diftans ab illo Aetij, vt clarè patet ex Galeni verbis loco citato, cum ait. Nam plenitudines à fuppreffis menfibus ortas, omninò per crura euacuabis, fiue venam fectare oportet, fiue fcarificare.

Eodem capite plures enumerat caufas fuppreffionis menfium, quibus omnibus tamen non correfpondent curationes ab ipfo propofitæ, quare non fidant Iuniores hinc pectatæ, & abfolutã huius affectus curationem habere.

*De immodica Vteri purgatione. Cap. CVIII.*

*Uteri vafa an  
poffint difrum-  
pi nimio frigo-  
re.*

**C**aufas immodicæ purgationis vteri recensens ponit vteri vafa difrumpi aliquando ob vehemens eiufdẽ vteri frigus. Quam fententiã Author hic tranfcribit à Galeno, qui hoc docuit poffe fieri in thoracis vafibus. Hoc autem an poffit fieri in vtero ipfo, fcilicet, vt propter vehemens eius frigus vafa, & venæ difrumpantur, videant alij, & iudicent.

*Menfibus flu-  
entibus an fint  
cõstringenda in  
guina.*

Curationem huius fluxionis tradens ex Aetio, & Paulo inguinã constringere docet, quæ fententia examinanda erat; cum hinc fanguis motum ad inferiora accipere, & magis talem excretionem proritare queat; perinde enim ligaturæ ad partem alligatam, ac faciunt cucurbitulæ, attrahunt: ac cucurbitulæ pubi, & inguinibus affixæ, vt docet Gal. lib. 13. Meth. cap. 19. menfes euocant, non fiftunt. præterea Hippocrates, & Galenus femper docuerunt ad fuperiora in fuperfluis mulierum purgationibus fanguinẽ,

-1206

vel



vel per cucurbitulas, vel per frictiones, vel per ligaturas superioribus partibus administratas: reuellendum esse eas causas, & curationes tradens, eas tantum proposuit; quæ ratione viarum, & vasorum eueniunt, eas autem, quæ vel ratione sanguinis, vel ratione virtutis contingunt, superfluas purgationes nec animaduertit, nec curandi modum docuit: hæc autem duo animaduertant Iuniores ultra proposita ab Authore, vt perfectam huius symptomatis curandi rationem assequantur.

*De Muliebri profluvio. Cap. CIX.*

**E**X Paulo plura muliebris profluij apponit signa, quæ nec propria, nec inseparabilia sunt; Ultra enim sensum, & patientis relationem, nihil certi haberi potest; quoniam aliæ mulieres ex hoc affectu deterius, aliæ mitius habent, & aliæ nihil inde detrimenti, præter incommoditatem, & forditiem locorum, vt pluries vidi, per sentiunt.

Curacionem tradens, expurgationem materiei peccantis administrandam esse docet; sciant tamen Iuniores, nisi membro, quod est in causa generationis humoris superflui, prospiciamus, incassum curatio vt plurimum tentabitur: quare pro absoluta curacione attendant, & dignoscant, quod sit membrum illud, cuius ratione excrementa generantur, & huic prospiciant, hinc enim præuenient, nè in corpore superfluitates aggregentur, quibus cessantibus facile superflua purgatio curabitur, & cessabit.

*De Vteri suffocatione. Cap. CX.*

**E** silentiam huius affectus ex Paulo declarans inquit hunc esse vteri recursum ad superiora, subditq; ex Galeno in hoc affectu modo, sursum, modo in latus, vterum retrahi. Pro quo animaduertatur, Galenum non dixisse hunc affectum consistere in hac retractione, nec asseruisse in omni vteri suffocatione adesse hanc retractionem: imò ipse quærens,

*Muliebris profluij signa.*

*Muliebris floris curatio quomodo absoluetur.*

*Vteri suffocatio an consistat in vteri retractione.*

rens, cur vterus in hoc affectu modò sursum, modò ad latus retrahatur, subiungebat, Aut cur, ipso in sua sede sæpe numero manente, nihilominus mulieres quædã ab hystericeis accidentibus corripiantur. quod idẽ inferius declarans dicebat hoc esse, dũ à retento semine causatur suffocatio. Quare nec hic affectus erit morbus in situ, cũ nec in hoc situ cõsistat essentia eius, nec à situ ipso malè afficiatur corpus.

*In vteri suffocatione quare mulieres refrigerentur.*

Querens Author, quare hystericearum mulierũ corpus refrigeretur, huius causam refert ad menstrua, vel ad semen ipsum refrigeratum, vi cuius vniuersum etiam refrigeretur corpus. At intemperies nulla subito introduci potest, præfocatio autem subito causatur. Præterea si ab hac causa hoc fieret, semper pro resolutione huius affectus necessaria esset vel mensium prouocatio, vel seminis effluxio; at neutrum horum sæpè euenit, cum tamen soluatur affectus. Quare non ab intemperie, vel seminis, vel mensium, sed à venenata, & praua eorundem qualitate, vt Galenus diffusè docet, hoc gignitur. refrigeratur enim corpus non ab intemperie nuda, sed à venenata qualitate, quæ hac donata est facultate, vt corpus vniuersum refrigeret, sicuti à scorpionis ictu, à proprietate succedit, vt grãdine corpus percuti videatur, sicuti & nõnulla alia venena cõsequitur à proprietate, vel refrigeratio, vel incendiũ in corpore infecto.

*De Mola Vteri. Cap. CXII.*

*Mola eficiã, & signa.*

**D**Vm molæ signa exponit, confundit signa verè molæ, & signa tumoris duri, & scyrrosi ipsius vteri, cũ hæc ipse ex diuersis transcribat Authoribus, qui molam non in eodem significato, sed diuerso acceperunt. Alij enim per molam veram molam, alij tumorem vteri scyrrosum intellexerunt. Quare hoc aduertant Iuniõres, ne ex oppositis signis decepti molæ veram coniecturam assequi nequeant.

*Mola curatio qua esse debeat.*

Molæ curandi rationem tradens videtur ponere curatio nem non molæ propriè dictæ, sed duritie vteri, sicut arbitrat

tratus est Paulus, & ideo prohibet motum, iubet situm elatum ad pedes, & alia similia, quæ in mola vera curanda non solum non sunt fugienda, sed etiam summopere agenda, & procuranda; & ideo quò ad curam videtur procedere contra sua principia, cum declaras quid esset mola ex intentione Galeni, & Arist. docet hanc esse carnem informem in utero genitam.

*Mola curatio, quæ esse debet.*

Cum ex Galeno declaratur, molam esse carnem informem, quæ in utero gestatur, non intelligatur eam omni forma carere, sed humana tantum. Quoniam ipsius molæ variae, & incertæ sunt formæ, & differentiæ. ego enim vidi alias molas obductas, & intertextas multis fibrosissimis ligamentis, quæ duræ quidem erant, sed adeo viscidæ, & tenaces, ut gladio nec cederent. Alias vidi molliores, his ligamentis carentes, quæ tamen erant fibrosissimæ, & hæc omnes aliquando orbicularem, aliquando angularem, aliquando oblongam, aliquando rhomboidem, & diuersam habebant figuram. Alias inspexi, quæ præter velamenta exteriora, nullis fibris intertexta erant, hæcque verè parenchyma dici potuissent, nec ullam propriam receperant figuram. Alias vidi, quæ quadam rudi similitudine nonnulla animalia bruta, ad quorum conformitatem formata videbantur, representabant, quæ tamen tantum vegetatiua anima donatæ erant. Alias autem ad similitudinem alicuius humani membri delineatas animaduerti. præcipuè autem noui honestam, & nobilem mulierem, cum, doloribus instantibus partus naturalis expectaretur, tres molas ad similitudinem pudendi virilis formatas peperisse, quarum una erat notabilis magnitudinis, naturalem quantitatem colis humani excedentis; reliquæ duæ erant minores, hæcque nullis adinuicem communicabant ligamentis. Undè pateat, cum habet Galenus, molam esse carnem informem, non de omni, sed tantum humana intellixisse formam.

*Mola quomodo intelligatur esse caro informis.*

An autem cum humana forma possit esse mola, dubium videtur propter historiam ab Hippocrate narratam lib. 2.

KK

Epid.

*Mola an possit esse cum humana forma.*

Epid. in qua habetur Antigēnis coniugem puerum carnosum mēbris discretis crassum, rotundū, exossatum, digitorū quatuor peperisse. nā talis puer nō poterat esse naturalis partus, cū sine ossibus (quib. eo carēte, nec cerebri, cordis uē tutela, nec corporis firmitas, nec musculorū actio robur uē aderat) superuiuere nō potuisset. Qui partus si pro mola nō habeatur, videant alij, an pro monstro sit recensendus.

*Molam aliquādo mulieres parere vnde cum naturali partu.*

Molam quidem solā non tantū mulieres peperisse videtur etiā eas aliquando vnde cum naturali partu ipsam excludisse noui, quod duplici via factum animaduerti. aliās vno, & eodem tempore cum fetu emissam inspexi. aliās vero post aliquot dies à puerperio excretam cognoui. à partu autem naturalis imissione intermedijs diebus hoc factū est, vt mulieres hoc patientes doloribus continujs affligerentur, & tumor ventris in eisdem admodum insignis esset, ita vt puerperium non præcessisse existimares. Has autem molas per superfætationem quandoq; genitas opinatur Hippocrates, qualē huiuscemodi lib. 2. Epid. in coniuge Gorgiæ Larissæ factam fuisse enarrauit.

*Molam per superfætationem gigni.*

Hippocrates in libro de fēminarum morbis asserit, in his mulieribus, quæ molam concipere, nec aliquid moueri in vtero, nec lac in mammis procreari, attamen experientia mihi oppositum testata est; quoniam in his, quæ molam gestarunt, vidi, & persensī motum molæ, & lac in mammis generari animaduerti. Nisi forsan intelligat Hipp. de motu illo blando, quo naturalis mouetur partus, & quo verò non mouetur mola, cum motu graui tantū, & quadam extensione moueatur, & de lacte etiā naturali, & perfecto intelligat, qui verè non generantur in habentibus molam, cum potius in his sit ichorosa, & lacti similis materia, quā verum ipsum lac.

*Molam concipientes an habeant lac, & an sentiant qd in vtero moueri.*

*Mola an succedat hydrops.*

Author prognostica molæ recensens, inquit ex Paulo, cum hic intenditur affectus, in aquam subtercutem degenerat. sed non animaduertit Paulum loqui de tumore vteri scyrroso,

scyrrofo, ad quem sæpè, cum inueteratus fuerit, solet succedere refrigerato hepate per consensum ab ipso vtero hydrops, non autem de vera mola, ad quam nullus solet subse- qui morbus, sed ynà cum vita in multis mulieribus antiqua- tur, & consensescit. hinc nonnullas vidi per plures annos inolam gestasse, quæ nihil ex ea passæ sunt, præter mole- stiam, & incommoditatem ex tumore ingenti causatâ, nec ex ea perierunt, nec vlllo morbo earum ratione laboraue- runt, cum tamen & quartum, & quintum annum eas su- peruixisse, nouerim.

in Vltra molam, & alios conceptus non naturales in vtero factos, vidi etiâ lapides genitos; præcipuè autem noui Mo- nialém non claustratam in primo senio constitutam, dū per plures menses vterinis fuisset cruciata doloribus, qui nullo vnquam medicamento leniri potuerunt, tandem eiecisse sponte, nulloq; adminiculante perperendum lapidē sca- brosum, magnitudine, & forma oui anatini, quo eiecto cessarunt dolores: attamen superueniente ex vtero fluxione putrida, & corrupta, demum consumpta, & emaciata mi- serè vita functa est. Meminit etiam Hipp. de lapide genito in vtero lib. 5. Epid. in Dyseridis serua, quæ tamen eiecto la- pide, qui ad fusi verticilli conformitatem creuerat, non in deterius lapsa est, sed conualuit.

*Lapides gene-  
rari in vtero.*

*De partus difficultate. Cap. CXIIII.*

**D**Vm ponit causas difficultatis partus ratione patien- tis, inquit, quòd si ossa pubis nimium cōserta fuerint, quoniam in partu dilatari non possunt, pariendi difficulta- tem faciunt. Quam sententiam, licèt transcribat ex Actio, tamen nō est cogitandum hanc veram vlllo pacto esse; quo- niam ossa pubis in partu non dilatantur, tum quoniam nō facerent ad facilitandū partum, cum sint supra os vteri, tum etiā quia à se inuicem non possunt dilatari, nisi per maxi- mam violentiam: nec possunt separari, nisi per diuturnam

*Partus diffi-  
cultatem an fa-  
ciant ossa pu-  
bis nimium cō-  
serta.*

coctionē, ex qua liquefcant ligamēta: quod cū sit, nō est ex-  
stimandū, quod in partu, vel per virtutē naturalē, vel per  
compressionem mulieris ista ossa abinuicem dilatentur.

*De secunda derelicta. Cap. CXV.*

*Secunda dere-  
licta post par-  
tum an sit ne-  
gligenda.*

**P**Ræmissis ad secundæ educationem plurimis medicamē-  
tis, & experta manus opera, inquit, si nec sic educā  
fuerit, pēturbari Medicum non oportet; intra paucos  
enim dies putrefacta, & in saniem dissoluta excidet. hoc  
autem ex Paulo transcripsit, cui consentit & Aetius, qui  
ambo hanc sententiam à Philumeno desūpsere. Sed ani-  
maduertant Iuniores, nunquam hunc affectum spernē-  
dum esse, nec paruifaciendum, sicuti hæc sententia doce-  
re videtur; quoniam hinc certa subsequitur mors: nec ve-  
ra est hæc sententia, quod intra paucos dies putrefacta fa-  
cilē excidet. immo dum putrescit, febres ingētes, & ali-  
quandō malignas in puerperis inducit: à quibus dum expe-  
ctatur, quod excidet secunda, mors eiusdem sæpenumē-  
rō inuitabiliter succedit.

*Secunda putre-  
scente excreta  
post paucos  
dies quid suc-  
cessurū sit.*

Animaduerto tamen quandoq; quidem in puerperis se-  
cundam iam putrescentem, & adeo malè olentem, ut astā-  
tes vix eius odorem tolerare queant; infra paucos excide-  
re dies, siue hoc opere naturæ, siue artis beneficio contin-  
gat: sed cum eius retentione, & putredine malè iam fue-  
rit uterus mulieris, ac eiusdem corpus affectum, non ita uti-  
lem esse tunc temporis ob labem ex ea contractam, eiusdē  
excretionem. quare pro prognostico consideret Medicus  
statum mulieris. si enim excidente secunda, nec febris, nec  
symptomata, quæ eius retentionem consequuta sunt, quie-  
uerint, sique præcipuē adhuc totum malè oleat corpus, si  
gnum est confirmatæ putredinis, & futuri exitij. si autē fe-  
bris quiescat, symptomataq; cessent, nec ullus malus odor  
remaneat, indicium erit utiliter secundam excidisse, salu-  
temq; puerperæ sperandam esse.



*De Vteri inflammatione. Cap. CVI.*

**V**ictus rationem in Vteri inflammatione seruandam exponens ait ex Paulo : à cibo per triduum abstinere. In qua re hoc moneo, hunc cibandi modum transcripisse Paulum ab aliquo Methodico; hi enim hanc formam cibandi seruabant : vnde à Galeno diatritæ vocabantur. Hoc non animaduertens Author iste eandem formam cibandi proposuit, à qua tamen abstinere consulo, cum hoc ex Diametro opponatur Galeno, & Hippocrati: qui in augmento, & statu tenuiorem victum seruandum esse, quàm in principio, docuerunt, vltra id, quod nostra ætate talem formam cibandi non admitterent; nec toleraret patientes absque maximo discrimine, cum homines nostrorum temporum sint assueti sæpius, & plenius cibari.

*Vtero inflammato an interdum per triduum conueniat?*

*De Ischiade. Cap. CXVIII.*

**C**urationem, & modum conficiendi sinapismum tradens, docet sinapi aceto macerandum esse: sed aliàs monuimus, quid de hac re sit sentiendum, & qua forma sinapismus parandus sit.

Absolutam doctrinam de Ischiade an tradiderit, ex his appareat, quæ in superioribus in capitibus proprijs de Ischiade monuimus.

*De Arthritide. Cap. CIX.*

**T**radens eius Arthritidis, quæ ex sanguinea fluxione pedit, curationem, secandamque venam docens, inquit, in brachio secandam eam internam esse, quæ ex directo fit loci patientis. hac non apparente mediam: quòd si manus dextera dolore infestetur, venam, ait, in dextro crure secabis. Cuius sententiæ pars vltima perpendenda est; quoniam si in dextro crure est affectio, licet dextera manus dolore infestetur, non tamen in eodem crure videtur se-

*In arthritide qua vena secanda.*

candam esse venam; cum hinc magis attrahatur materia ad locum affectum, quam ab eo diuertatur. Cumq; ex Galeni sententia in loco affecto non sit secunda vena nisi inueterata passione, cumque non reuellendum ab eo, sed euacuandum est.

Dum docet curare fluxiones bibliosas, & pituitosas, nō admittit venę sectionem, nisi huiuscemodi humores sanguini sint commixti. At ex Galeno scopi mittendi sanguinis non à materia peccante; sed à magnitudine morbi, consentientibus viribus, & ætate sumuntur. Quare in omni fluxione stante magnitudine morbi, ubi nihil sit contraindicans, semper sectionetur vena, vt aliàs secundum Galeni mentem agendum esse monuimus.



In arthride bibliosa, aut pituitosa quoniam est peccata venæ.

In arthride bibliosa, aut pituitosa quoniam est peccata venæ.

Tunc enim si in loco affecto non sit secunda vena nisi inueterata passione, cumque non reuellendum ab eo, sed euacuandum est. Dum docet curare fluxiones bibliosas, & pituitosas, nō admittit venę sectionem, nisi huiuscemodi humores sanguini sint commixti. At ex Galeno scopi mittendi sanguinis non à materia peccante; sed à magnitudine morbi, consentientibus viribus, & ætate sumuntur. Quare in omni fluxione stante magnitudine morbi, ubi nihil sit contraindicans, semper sectionetur vena, vt aliàs secundum Galeni mentem agendum esse monuimus.

# T A B V L A R E R V M

## NOTABILIVM.

- A.**
- A**ctiones multa sunt, quia solum ab intrinseca rei natura, non ratione qualisatum eueniunt. 8
- Acuti morbi an necessario habeant coniunctam febrem. 24
- Acuti morbi cum febre habent ipsas continuas. 25
- Acetiacerrimi sorbitio an conueniat in melancholia. 427
- Acetum an conueniat in ulceribus renum. 505
- Aer quare necessarius pro cōseruanda vita. 17
- Aer, ut vitā tutari possit, quas cōditiones habere debeat. 17
- Aer immutatus, vel in tēperamento, vel in substantia quomodo lēdat hominem. 18
- Aeris corruptio unde causetur. 48, 70.
- Aer quomodo modis immutatur. 63
- Aer quomodo modis mutatur in primis qualitatibus. 63
- Aer quando morbos Epidemios inducat. 63
- Aer in primis qualitatibus immutatus, quando causet febrem pestilentem. 63
- Aer in primis qualitatibus immutatus quando possit inducere pestem. 64
- Aer quomodo immutetur à susceptis ad intra se prauis exhalationibus. 64
- Aer immutatus à susceptis ad intra se prauis exhalationibus quomodo sit causa vel pestis, vel febris pestilentis. 64
- Aeris immutatio in propria substantia. 65
- Aer pestilens quare modo vni animalium speciei, modo alieri nocet. 65
- Aer cū lenē corruptionē patitur, non pestilentes, sed Epidemios tantum inducit morbos. 66
- Aer in propria substantia immutatus ob ingentem corruptionem causat, & febrem pestilentem, & pestem. 68
- Aerem corrumpi, quomodo intelligendum sit. 69
- Aeris corruptio quid sit. 69
- Aeris corruptio à quibus causis generetur. 69
- Aer per putredinem quomodo possit corrumpi. 70
- Aeris corruptio unde causatur. 70
- Aer non semper agit per putredinem, dum pestem causat. 70
- Aeris putredo diuturna esse non potest. 70
- Aeris corruptio aliquādo à causis

|  |  |
|--|--|
| sis superiorib. nō cōcurrenti-<br>bus inferioribus causatur. 71                                  | Alimentū qñ trāseat in naturā,<br>vel medicamētū, uel veneni. 10                                   |
| Aeris corruptio quare non aqua<br>liter in oēs seuiat homines. 73                                | Alienum omnino à natura an<br>statim pharmaco sit educen-<br>dū, stante eius cruditate. 182        |
| Ab Aere calidiori quomodo tuē-<br>da sint corpora sub cælo pesti-<br>lenti, & tēpore pestis. 140 | Angina à pituita sine dolore. 456  |
| Aeris caliditas quomodo corri-<br>genda. 140   | Angina potest fieri ob nimiam sic-<br>citatem musculi interni gut-<br>turis. 456                   |
| Aeris humiditas quomodo corri-<br>genda. 141   | Anginam patientibus mulierib.<br>qua vena secanda. 456   |
| Aer uitiatus à susceptis ad intra<br>se prauis exhalationibue quo-<br>modo corrigendus. 143      | Aphra in pestilentibus febribus<br>apparentes qua, & quot earū<br>differentia, & causa. 128        |
| Aeris inquinamenta, quomodo<br>disperdenda. 144  | Apoplexia à sanguine 126   |
| Aer in propria substantia vitia-<br>tus quomodo corrigatur. 145                                  | In Apoplexia à sanguine an sit<br>vera inflammatio. 227  |
| Aere corrupto à superiorib. cau-<br>sis, quid agendum. 146                                       | Apoplexia à sanguine quomodo<br>distingnatur ab ea, qua fit ab<br>humore frigido. 231              |
| In Aeris pestilētis statu quomō<br>hōes regere se debeant. 147                                   | Apoplexiam non semper fieri ob-<br>structo, vel adstricto plexu<br>retiformi. 234                  |
| Alimentum necessario debet esse<br>simile ei, quod nutriri debet.<br>& huius causa. 8            | Apoplexia an fiat obstructis,<br>& constrictis venis singulari-<br>bus, et arterijs carotisib. 220 |
| In Alimento requiritur similitu-<br>do eius, quod nutriri debet. 8                               | Apoplexia à quibus humoribus<br>causetur. 448  |
| Alimentum ut quid sit, quid re-<br>quiratur. 9   | Apoplexia an fiat ex inflāmatio-<br>ne, & erysipelate cerebri. 448                                 |
| Alimentum uni speciei, quare al-<br>teri non sit. 8  | In Apoplecticis quādo secāda ve-<br>na, quid obseruandū. 450                                       |
| Alimentum, medicamentum, &<br>venenum in quo differant, et<br>in quo communicent. 10             | Apoplecticis an sit exhibendum<br>pharmacum. 450   |

# RERVM NOTAB.

- Apopplegmotismi an conueniant in catarro.* 455
- Aqua scordei composita.* 491
- Aqua potius in febre ardēti, quā tepore exhibēdus, et quō.* 277
- Arthritis quomodo fiat.* 316
- In Arthritis an sit unica materia peccans.* 317
- In Arthritis an membrum mandans sit semper cerebrū.* 317
- In Arthritis an materia possit per venas ad articulos transmitti.* 318
- In Arthritis an materia recipiatur in ligamentis, in periosijs, & tendonibus.* 319
- In Arthritis biliosa, & pituitosa an sit secanda vena.* 318
- Arthritis à siccitate an detur.* 325.
- Arthritis à siccitate an possit fieri à causa interna.* 327
- Arthritici à siccitate an sint purgandi, & euacuandi.* 329
- In Ascite an conueniat succus solani hortensis.*
- Asthma à siccitate pulmonis dari.* 459
- Attrahentia ab interioribus ad exteriora faciunt ad præservationem à febre sub potentiōe cala.* 149
- In Aurium inflammatione an conueniat oxymelodinum.* 452
- In Aurium inflammatione an medicamenta actū calida sint infundenda.* 453
- Auditorius meatus an terminetur ad duram membranam, & neruum.* 454
- B
- Verbones in febre pestilenti contingentes.* 129
- Bulimos an contingat in febre.* 481.
- C
- Cacochymia causa febris pestilentis.* 53
- Cacochymia, à qua imminet febris pestilens, quomodo sit tollenda.* 153
- In Cachexia an conueniat sanguinis missio.* 500
- In Cadaveribus an vis aliqua expulsiua referuetur.* 132
- Cadavera prauas exhalationes euaporare, si peste extincta fuerint.* 133
- Canis an sit animal cacochymus, & melancholicum.* 341
- In Canibus corruptio humorum unde cansetur.* 343
- Canina appetentia, an possit fieri ratione immodica digestionis totius corporis.* 480
- Canina famis qui succi sint causa.* 480
- Canina famis possunt esse causa vermes*

|  |   |
|--|---|
| Capitis dolor à causa frigida quibus remedijs tollendus. 431                     | Cholera male curata an possit succedere Phthisis. 480               |
| Carbunculi in febre pestilenti contingentes. 429                                 | Colicum dolorem aliquando causari à lapidibus. 493                  |
| Cardiaci morbi signa. 478  | Colliquationis febrium pestilentium differentia. 206                |
| Catoche, & catalepsis quid sit. 418. 422.  | Colliquatio fluxu presente in feb. pestilenti quid agendum. 206     |
| Catoche, et catalepsis an sit eadem febre. 421                                   | In Colliquationis fluxibus an conueniant medicamenta purgantia. 206 |
| In Catoche an possint seruari sensus exteriores, & interiores. 423               | In Colliquationis fluxibus an conueniant adstringentia. 207         |
| Catoche an ab intemperie, an ab obstructione fiat. 419                           | Coma qualis affectus sit. 424                                       |
| Catoche indicationes curatiue. 423   | Concolita quare tantum medicanda, nisi materia surgeat. 179         |
| In Catoche remedia particularia quo loco applicanda. 423                         | Coctio est duplex. 182  |
| In Catoche an spiratio naturalis mutetur. 419                                    | Contagiosi morbi qui. 74  |
| Cauteria in occipite an secundum Galenū conueniant. 426                          | Contagium quomodo inducat febrem pestilentem. 74                    |
| In Cerebri inflammatione quare agri non sentiant. 429                            | Contagiosi morbi non semper per contagium generantur. 74            |
| Cerebri inflammatio, quomodo differat ab epilepsia, apoplexia, & pleuritide. 420 | Contagium an semper insequatur morbos pestilentes. 75               |
| Cephalalgia an sit recens dolor capitis. 434                                     | Contagiosi quare aliqui sint morbi pestilentes, aliqui non. 76      |
| Cholera duplex, et quomodo differant. 299  | Contagiosi morbi pestilentes duplices sunt. 79                      |
| In Cholera humida an sit exbibendum pharmacum. 480                               | Contagium quid. 81  |
|  | Contagium quotuplex. 81   |
|  | Contagium immediatum quale. 81                                      |
|  | Contagium medium duplex. 82   |



Contagium per fomitem. 82  
Contagii fomites quid possint, vel esse, vel non esse. 82

Contagium ex aere. 82  
Contagio mediante si morbus inducendus, tria requiruntur. 83

Contagio mediante si introduci-  
tur morbus, à quo fit actio. 84  
Contagio mediante qualitas agens,  
per quod agat. 84

In Contagio vehiculum qualitas  
agens, quos duplex, &  
quid. 84

Contagio vagante quomodo pra-  
feruandi homines. 86

Convulsus motus quis, & eius  
tractatio. 376

Convulsio, quod symptoma sit. 438.

Convulsio, & paralisis aliquan-  
do in eodem membro iungun-  
tur. 440

Convulsionis continua causa. 442

Corpora humida quomodo pra-  
feruanda à febre pestilenti. 336

Corpora excrementosa quomo-  
do praferuanda à febre pe-  
stilentia. 337

Corpora debilia quomodo prafer-  
uanda à febre pestilenti. 337

Corpora laxa, & rara quomodo  
praferuanda à febre pestilen-  
ti. 339

Corpora quomodo praferuanda  
à febre pestilenti sub vincto  
aere. 336

Corde occupato à materia, an li-  
ceat statim exhibere pharma-  
cum, cruda ea existente. 332

Coriandri decoctum an conueniat  
proponi in phrenitide. 425

Coriandri decoctum an conue-  
niant pro proponi in epilepsia. 448.

Cordis propriae affectiones non  
semper sunt corde principio  
affecto. 443

Corrupti humores quando ledant,  
& morbos generent. 448

Corruptio à polilentia inducta  
non est putredo. 448

Corruptio quid differat à putre-  
dine. 448

Delirium quandoq; causari  
à pura intemperie calida. 444

Deiectiones nigrae an semper ma-  
le, & timende. 383

Deiectionum colliquationarum quae  
sint causa, et differentiae. 275

Dentes an dolent ex intempe-  
rie humida. 455

Dentes an sanos dolores pati an-  
tur à siccitate. 455

In Diabete an conueniant diure-  
tica. 303

|   |  |
|---|--|
| In Diabete an conueniant bal-<br>nea naturalia. 503   | E  |
| Diaphragmatis tumores, sine fe-<br>bre. 257   | Elleborus albus celebratur. 370  |
| Diaphragmatis tumores, à ma-<br>teria frigida, cū pſenerāt, de<br>ducūt patientes ad talē. 259          | Elleborus quomodo exhibendus<br>in infusione, decoctiōe, et sub-<br>stantia. 371                             |
| Diaphragmatis tumores cum fe-<br>bre. 259   | Ellebori albi vsus. 372  |
| Diarrhæe curatio quomodo ab-<br>soluenda. 488   | Empyma quomodo non conferen-<br>tibus medicamentis curan-<br>dum. 409  |
| Diarrhæa, quando cohibēda sit,<br>& quando non. 488   | In Empymate an lac exhiben-<br>dum. 470  |
| Dolor quid sit. 433   | Epidemiꝝ morbi quomodo indu-<br>cantur ab aere. 631  |
| Dormientes quare possint ali-<br>quando vigilantium munia<br>obire. 330                                 | Epidemiam anni 1580. fuisse<br>causatam à sola aeris in pro-<br>pria substantia corruptione,<br>sed leui. 67 |
| Dormiētes quare nō possint iter<br>longum facere. 332   | Epilepsia à sanguine. 235  |
| Dormientes quare aliquando nō<br>somniautes videant tanquā<br>vigilantes. 336                           | In Epilepsia qua vena secunda.<br>447  |
| Dormientibus quare aliquando<br>contingant in somnis pauo-<br>res, & terribiles imaginatio-<br>nes. 443 | Epilepsia à quibus humoribus<br>causetur. 448  |
| In Dysleria an dolores à loco pos-<br>sint indicare tenuia, vel cras-<br>sa intestina esse affecta. 490 | Epilepsia an terminetur in para-<br>lysim. 449   |
| In Dysenteria ubi vlcera sint de-<br>pascētia, quid agendum. 490  | Exanthematum, quæ accidunt<br>in febre pestilēti, differentia,<br>& causa. 127                               |
| In Dysuria an conueniant diu-<br>retica. 505  | Exanthemata antiquorum non<br>sunt petichia nostrorum tem-<br>perium. 127                                    |
|   | Exanthematibus apparentibus,<br>quid agendum. 197  |
|   | Excretionis quantitate peccan-<br>tis in   |

# RERVM NOTAB.

sis in febre pestilenti differen-  
tia, & causa. 22

F

Februm quot sint differen-  
tia. 23

Febres, quae dicenda sint mali-  
gnae. 24

Februm colliquefacientium quot  
sint genera. 27

Februm colliquefacientium sin-  
gularum signa, & curatio-  
nes. 27

Febris pestilentis periculum, &  
difficultas. 28

Febris pestilentis communis no-  
tio. 29

Febris pestilens, quae sit, & quot  
modis contingat. 30

Febris pestilens, quae inter spora-  
des morbos contingit, an ma-  
ligna debeat potius appellari,  
quam pestilens. 31

Febris pestilens characterisimus. 32

Febris pestilens, quare indu-  
catur à corruptis humoribus. 33

Febris pestilens quare aliquan-  
do magis, aliquando minus  
maligna. 34

In Febre pestilenti, quomodo cor-  
ruptio, & putredo se conse-  
quantur. 35

Febris pestilens quae sit. 37-43

Febris pestilens prava qualitas  
an in summa consistat putre-  
dine. 39

Febris pestilentis prava quali-  
tas an in sordida, et prava co-  
sistat putredine. 40

Februm pestilentum putredinis  
materialis causa. 41

Febris pestilentis prava quali-  
tas non consistit in putredi-  
ne. 42

In febre pestilenti corruptio sem-  
per praecedit putredinem. 43

Febris pestilentis, in quibus nul-  
lū apparet putredinis signū,  
quales sint, & quare hoc con-  
tingat. 44

In febre pestilenti semper est ma-  
ligna putredo. 45

In Febre pestilenti an necessario  
putrescant vel cordis humidi-  
tates, vel humores in eiusde  
vetriculis existentes. 46

In Febre pestilenti materiam tā  
quam in focē putrescere, non  
est universaliter verū. 47

Febris pestilentis differentia à  
subiecto. 48

Febris pestilens ephéméra an de-  
tur. 49

Febris pestilens, quae visa est ephé-  
meram esse, quare unico san-  
guine perdurat die. 50

Febris pestilens hectica illis. 51

Fe-

# T A B V L A

|                                    |                                   |    |
|------------------------------------|-----------------------------------|----|
| Febris pestilens hectica an de-    | retur per cōtagium.               | 74 |
| tur.                               |                                   |    |
| 49                                 | In Febribus pestilentibus, quale  |    |
| Febris pestilens hectica quare     | fit vehiculum praua quali-        |    |
| habeat aliquādo pulsus simi-       | tatis.                            | 85 |
| les pulsibus sanorū.               |                                   |    |
| 49                                 | Febris pestilens per cōtagium in- |    |
| In Febre pestilēti hectica an pos- | ducta à quo causata est.          | 89 |
| sit esse pulsus moderatus.         |                                   |    |
| 52                                 | In Febre pestilenti per cōtagiū   |    |
| Febris pestilentis differentia à   | genita à quo sit actio febrem     |    |
| materia, et à loco.                | inducens.                         | 86 |
| 52                                 |                                   |    |
| In Febre pestilēti posse omne hu-  | In Febre pestilenti per cōtagiū   |    |
| moris genus putrescere.            | inducta, quod actio non sit à     |    |
| 53                                 | putredine.                        | 86 |
| Febris omnis pestilens an sit con- |                                   |    |
| tinua.                             | Febris pestilentis causa interna  |    |
| 54                                 | quot sint.                        | 87 |
| Febrem pestilentem intermitten-    | Febris pestilentis causa remota   |    |
| tem dari.                          | interna.                          | 87 |
| 55                                 |                                   |    |
| Febris pestilentis causa externa   | Febris pestilens potissimum cau-  |    |
| quot, & qua sint.                  | satur ex nimia Venere.            | 87 |
| 61                                 |                                   |    |
| Febres pestilentes posse à medica- | Febris pestilentis quomodo sit    |    |
| mentis causari.                    | causa obstructio.                 | 88 |
| 62                                 |                                   |    |
| Febres pestilentes quomodo pos-    | Ad Febrem pestilentem causan-     |    |
| sint à venenatis pharmacis         | dam an semper concurrant          |    |
| causari.                           | obstructiones.                    | 88 |
| 62                                 |                                   |    |
| Febris pestilens quomodo possit    | Febris pestilēti cause proximae   |    |
| causari ab aere in primis          | internae.                         | 89 |
| qualitatibus immutato.             |                                   |    |
| 63                                 | Febris pestilentis qualitas praua |    |
| Febris pestilens quomodo cause-    | latitudinem habet.                | 90 |
| tur ab aere immutato à prauis      |                                   |    |
| ad intra se susceptis ex-          | Februm pestilentum differen-      |    |
| halationibus.                      | tia quò ad prauā qualitatem,      |    |
| 64                                 | & quò ad magnitudinē.             | 90 |
| Febris pestilens quomodo cause-    | Febris pestilentis differentia à  |    |
| tur ab aere in propria substā-     | coniunctis.                       | 92 |
| tia ex ingenti corruptione im-     |                                   |    |
| mutato.                            | Cum Febre pestilenti possunt cō-  |    |
| 68                                 | necti morbi diuersi.              | 94 |
| Febris pestilens quomodo gene-     |                                   |    |

# RERVM NOTAB.

- Febres cum peticulis apparentes. *an* oēs sint pestilentes. 93
- Febri pestilenti signa triplicia. 96
- Febrem pestilentem futuram signa prae-nunciantia *ad* quibus. *et* *ad* quos sumuntur. 96
- Febri pestilenti disponentes corpora a prima causa. 97
- Febri pestilenti quomodo sint disposita corpora rara, *et* densa. 98
- Febrium pestilentialium signum commune. 99
- Febri pestilenti signum sumptum *ad* pulsū. 99
- Febri pestilenti signum proprium, sed non commune. 102
- Febri pestilenti signum sumptum *ad* calorem. 105
- Febri pestilenti calor qualis esse solet, *et* quomodo variat. 105
- Pro Febri pestilenti cognitione, quid sit notandum de calore. 106
- In Febre pestilenti an calor sit remissus ad extra, *et* intra. 107
- Febri pestilenti signum sumptum *ad* lotio. 109
- In Febre pestilenti quare lotium aliquando vel nullam, vel nimiam subeat mutationem. 110
- Febri pestilenti cur nullum sit signum *ad* lotio. 110
- In Febre pestilenti quid lotium indicare possit. 111
- In Febre pestilenti quare aliquando lotium sit sanorum lotio simile, *et* tamen ex ea agri tendunt ad mortem. 112
- In Febre pestilenti sapienter agrotantes magis periclitantur ex maligna qualitate, quam ex putredine. 113
- In Febre pestilenti quare lotium sit infidum signum. 114
- Febres pestilentes, quae mites apparent, quare tales videntur. 114
- Febres pestilentes quae sint, in quibus appareat pulsus similis sanorum pulsui. 117
- Febrem pestilentem consequentia symptomata. 117
- In Febribus pestilentibus quae, *et* quales sint sanguinis evacuationes. 119
- In Febribus pestilentibus excrementorum, qualitates contingentes. 120
- Febrem fuisse pestilentem attestantia signa. 130
- Febrem pestilentem odor quidam consequens. 134
- Febri pestilenti praeservatio. 135.

- Febbris pestilens non impendit plenitudine boni sanguinis. 157  
 In Febre pestilenti indicationes curatim, quomodo exequen- 157  
 Febbris pestilentis prognosticum. 157  
 In febre pestilenti, quomodo indicationi minorationis materia satisfaciendum. 158  
 In Febre pestilentis curatione an conveniat sectio vena. 158  
 In Febre pestilenti qua via sanguinis missio peragenda sit. 174  
 In Febre pestilenti an motus nominis materia sit administrandus. 173  
 In Febre pestilenti quo loco cucurbitula sint applicanda. 176  
 In Febre pestilenti mensibus instantibus, quid sit agendum pro minorando sanguine. 177  
 In Febre pestilenti an sit exhibendum pharmacum a principio stante cruditate. 178  
 In Febre pestilenti an materia verè, & semper, surgeat. 184  
 In Febre pestilenti an crises sine pharmaco praeveniendae. 188  
 In Febre pestilenti, quibus lenitudo sit alius. 187  
 In Febre pestilenti clysteria qualia esse debent. 187  
 In Febre pestilenti quae pharmaca lenientia sint excludenda. 187  
 Febbris pestilentis concoquentia, & alterantia medicamenta. 189  
 In Febre pestilenti quando exhibendum pharmacum, et quid in hoc observandum. 189  
 In Febre pestilenti quomodo corpus refrigerandum. 190  
 In Febre pestilenti quomodo exulcerantia, & attrahentia medicamenta conveniant, et quae sine administranda. 201  
 In Febre pestilenti quomodo pronocandum lotium. 204  
 In Febre pestilenti, quando sudor inuandus, & quibus. 204  
 In Febre pestilenti fluente alao, quid agendum. 206  
 In Febre pestilenti quomodo colligatio sit curanda. 207  
 In Febre pestilenti apparentibus abscessibus, quid agendum. 209  
 In Febre pestilenti, quae ratio vitius servanda. 210  
 Febrium pestilentium colligantium curatio. 212  
 Febris omnis intermittens an periculo vacet. 156



# RERVM NOTAB. T

**F**ebres intermitteutes oris non habere ex maligna putredine, quomodo intelligendum est.

**F**luxus alui per coagulationem factus quibus signis cognoscatur.

**F**luxus alui a cerebro descendens an necessario habeat excrementa spuriosa.

**F**ollis per sedem dimissus ad inflanda intestina in ileo.

**F**luxus chylosi cause.

**F**luxus colliguescitur signa.

## G

**I**n **G**onorrhoea an semper fluat semen aquosum.

**G**onorrhoea curatio qualiter ad ministranda.

**H**epaticis ex intemperie frigida an sint nocua pistachia, & amigdale.

**H**epatis obstructionem an sequatur febris secundum eius proportionem.

**H**epatis erisipelas quomodo curandum.

**H**epatis inflammatione suppurata, quid agendum.

**I**n Hepatis scyrru an conveniat secare venam.

**H**emorrhoidibus affectis, an sine secanda vena infima.

**H**irudines naribus applicite quantum inuare quandoque possint.

**H**istoria Epidemice a leui aeris corruptione.

**H**istoria mulieris rabida, in qua nullum fuit novum contagium.

**H**istoria mulieris varacha deprehensa.

**H**istoria pulvertis venenati mentem ledentis.

**H**istoria dormientium, qui vel somniantes, vel non somniantes vigilantium munia obirunt.

**H**istoria diarrhoea, in qua exercebatur officina.

**H**istoria diversa de molis.

**H**omines ad oblationem eorum, quae uersantur, interius affligi.

**H**umores corporis nostri, ut uisuntur apertis, quas conditiones habere debeant.

**H**umores si uel temperamentum, uel propriam naturam amittant.

LL quid

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| quid succedat.                    | sem suscipiunt, semper cor-             |
| Humores venenati cur aliquan-     | rumpuntur, ac nō semper pe-             |
| do generentur in hominibus.       | tescunt.                                |
| Humores, cum venenatam natu-      | Humor sincerus in venis non             |
| ram adipiscuntur, quam mu-        | datur, nisi in casu surgentis           |
| tationem subeant.                 | materie.                                |
| Humorū corporis humani cor-       | <u>Hydropis ex colligatione.</u>        |
| ruptio unde causetur.             | <u>Hydrops ab intemperie calida</u>     |
| Humores corporis nostri, cum      | an detur.                               |
| permutantur, vel in tempera-      | <u>Hydrops ex colligatione nō est</u>   |
| mento, vel in substantia, quos    | vera hydrops.                           |
| morbos producant.                 | <u>Hydrops vitio renum non acra</u>     |
| Humores cum sunt permutati,       | hensium an detur.                       |
| vel in temperamento, vel in       | <u>Hydropis subitaneus casus est si</u> |
| propria substantia, non sem-      | gnum colligationis.                     |
| per laedant, nec morbos fa-       |   |
| ciunt.                            |   |
| <u>Humores corrupti quare la-</u> | <u>Ileos quid sit.</u>                  |
| <u>edant, vel morbos faciunt.</u> | Iles causa.                             |
| Humores corrupti quando febrē     | Ileos an possit causari à pitui-        |
| pestilentem inducant.             | ta sola.                                |
| Humorum venenata natura in        | Ilei signa.                             |
| putredine non consistit.          | In Ileo an sit inseparabile ni-         |
| Humorum putredinem non sem-       | hil inferius descendere.                |
| per præcedit eorundem cor-        | Ilei moris, & prauitatis signa.         |
| ruptio.                           | Ileos an sicuti in tenuibus, ita        |
| Humorum corruptio, per quam       | etiam fieri possit in crassis           |
| acquirunt malam qualita-          | intestinis.                             |
| tem non est putredo.              | Ileos in intestinis crassis geni-       |
| Humores cum prauam qualita-       | sus an sit deterior eo, qui est         |
|                                   | in                                      |



*Lethargus an fiat ex sola pituita*  
147

*Lethargus quandoque causatur ex permutatione phrenitidis.*  
418

*Lethargus & caros quomodo differant.*  
418

*Lienteria an fiat ex cicatrice oborta à dysenteria.*  
482

*Lien inflammato, an cōueniat phar-*  
*macum à principio.*  
499

*Lotium quomodo sit colligatio-  
nis signum.*  
275

*Lotium sanguinolentum an fem-*  
*per fiat vitio imbecillitatis*  
*renum.*  
203

*Lotium supprimatur aliquando*  
*supra renes.*  
350

*Lotium, cū non descendat in vesti-*  
*cam, quot de causis fiat.*  
506

*In Lumbricorū curatione, an cō-*  
*ueniat vinum aquosum.*  
498

*Macula in febre pestilenti*  
*interueniunt.*  
92

*Macula in febris pestilentib.*  
*contingentes.*  
92

*Macula febris pestilentis quas*  
*torporis partes occupent.*  
92

*Macularum febris pestilentis*  
*differentie.*  
92

*Macula febris pestilentis*  
*quomodo appareant.*  
92

*Macula febris pestilentis*  
*quomodo differant.*  
92

*Macula in febre pestilenti ap-*  
*parēs unde causentur.*  
102

*Macula quedā petiulis similes*  
*quid ab his differant, et à qua-*  
*buz causis oriuntur.*  
102

*Macularum febris pestilentie*  
*diuersitas in colore, quan-*  
*sitate, & numero, et earundē*  
*causa.*  
104

*Macula febris pestilentie quan-*  
*do apparentes.*  
104

*Macula post apparentes asse-*  
*stantur febrem fuisse pesti-*  
*lentem.*  
130

*Macularum, quæ post mortem*  
*eueniunt, differētie.*  
130

*Macularum, quæ post mortem*  
*eueniunt, differētie.*  
130

*Macularum, quæ post mortem*  
*eueniunt, differētie.*  
130

*Macularum, quæ post mortem*  
*eueniunt, differētie.*  
130

*Macularum, quæ post mortem*  
*eueniunt, differētie.*  
130

*Macularum, quæ post mortem*  
*eueniunt, differētie.*  
130

*Macularum, quæ post mortem*  
*eueniunt, differētie.*  
130

*Macularum, quæ post mortem*  
*eueniunt, differētie.*  
130

*Macularum, quæ post mortem*  
*eueniunt, differētie.*  
130

*Macularum, quæ post mortem*  
*eueniunt, differētie.*  
130

*Macularum, quæ post mortem*  
*eueniunt, differētie.*  
130

*Macularum, quæ post mortem*  
*eueniunt, differētie.*  
130

*Macularum, quæ post mortem*  
*eueniunt, differētie.*  
130

# RERVM NOTAB.

- Maculis apparere, an epithema  
 1a cordi sint adhibenda. 202
- Macularum motu medio existē  
 se quid agendum. 203
- Mala qualitas an semper a pu-  
 treddine excutetur. 32
- Maligna putredo quā sit. 58
- Mandragora radix an cōueniat  
 in conuulsione ex repletionē. 139
- Materia putrescentis, & non  
 putrescentis, diuersa sunt.  
 rationes quō ad purgationē  
 pharmacofaciendam. 182
- Materiaurgens quā sit. 184
- Medicamenta quā sint. 9
- In Medicamenti natura quan-  
 do transeat alimentum. 10
- Memoria an deperdatur ab in-  
 temperie rigida cum mate-  
 ria. 410
- In Melancholia hypocondriaca  
 quis sit locus affectus, & quā  
 affectio. 437
- Memoria an semper deperdatur  
 rationē, intemperies frigida. 412
- In Mensum suppressione, ob ple-  
 nitudinem an sint secūda ve-  
 na superiores, vel infio-  
 res. 309
- Mensibus fluentibus an sint con-  
 stringenda inguina. 310
- Morbi in numero quā sint. 473
- Mola essentia, signa, & cura-  
 tio. 512
- Mola differentia plurima. 513
- Molam concipientes an habeant  
 lac, & an sentiant eam mō-  
 ueri. 514
- Mola quomodo intelligatur esse  
 caro informis. 513
- Mola an possit esse cum huma-  
 na forma. 514
- Molā aliquādo parere mulierē  
 unā cum naturali partu. 514
- Molam aliquādo per superfata-  
 tionem gigni. ibid.
- Mola succedat hydrops. ibid.
- Motus conuulsivus. 378
- Motus conuulsivus quid diffe-  
 rat a nervorum distensione,  
 & a conuulsione. 377
- Motus conuulsivi cause. 377
- Motus conuulsivus quare super-  
 ueniat vulneribus capitis le-  
 thalibus. 377
- Motus materiarum peccantium  
 in excretionibus est triplex.  
 198.
- Motus purē critici quā sint. 198
- Motus purē symptomatici quā  
 sint. 198
- Motus medij inter symptomati-  
 cos, & criticos quā sint.  
 198.

Motus materierum in excretionibus, qui sint in uadi, & qui non. 198

Mulierum utero gerentium vitæ in morbis acutis. 395

Mulieribus prægnantibus, & acutè laborantibus an sit secanda vena. 396

Mulierem ab abortu aliquando præseruat vena sectio. 397

Mulieribus prægnantibus in morbo acuto an sit exhibendū pharmacum. 398

Mulieribus utero gerentes turgente materia non solum à quarto, usque ad septimum, sed etiam tertio mense sunt purgande. 398

In mulieribus utero gerentibus, dum periclitantur ex morbis acutis, an liceat provocare abortum.

Muliebris profluuij signa. 511

Muliebris profluuij curatio quomodo absoluenda. ibidem

**N**ervis opticis resolutia an male moneatur oculus. 452

Nystalopis causa. 412

**O**bstuccionum quomodo sub pestilenti cælo tollende sūt. 154

Obstruccionum lenium arteriarum pulmonis causa. 395

Obstruccionibus lenium arteriarum pulmonis quare aliquando succedat respirandi difficultas. 398

In Orthopnea an conveniat vinū amsterum. 459

In Orthopnea ex crudo tuberculo an conveniant ea, quæ in orthopnea à crassis succis. 460

**P**alpitationis cordis causa. 470

In Palpitatione cordis an sit solutio continui. 471

Palpitatio cordis non semper fit primario affecto corde. 471

Palpitatio cordis an fiat ex tumore impericardo. 472

In Palpitatione cordis quæ venæ secanda. 472

Paralysis an sit morbus longus. 440

Paralysis an semper fiat ab humore



# RERVM NOTAB.

- more nervos obstruente. 440  
 Partus difficultatem an faciant  
 ossa pubis nimium conferta. 515  
 Pericardij inflammatio. 246  
 In Peripneumonia, an potas esse  
 debeat exiguus. 467  
 Pestis quot modis invadere con-  
 suet. 5  
 Pestis ex acre. 18  
 A Peste inducta corruptio nō est  
 putredo. 18  
 Pestis ex contagio unde ortum  
 habeat. 19  
 De peste cur egerint anthores in  
 tractatu febrilium. 23  
 Pestis an generetur ex putre-  
 dine accensa circa cor. 26  
 Peste infecti aliquando subito pe-  
 reunt. 28  
 Pestis quare uni animalium spe-  
 cieci noceat, alteri non. 3065  
 Pestis causata ab aere ex pravis  
 exhalationib. inquinato quā-  
 diu perduret. 69  
 Pestis causatur ab aere in pro-  
 pria substantia ex ingenti cor-  
 ruptione immutato. 60  
 Pestes à superioribus causis in-  
 ducta quare contingant. 73  
 Pestilentes morbi an semper con-  
 tagiosi. 75
- Pestilentes morbi contagiosi du-  
 plices sunt. 80  
 Pestilentum morborum quare  
 aliqui contagiosi, aliqui non  
 76.  
 Phrenitis à quibus fiat humo-  
 ribus. 424  
 Phrenitis an possit fieri à frigi-  
 dis succis. 428  
 In Phrenitide qua vena secan-  
 da. 426  
 Phrenitis hectica qua sit. 427  
 Phrenitidi quandoque soporem  
 connecti. 427  
 Plenitudo quibus tollenda in pra-  
 servatione febris pestilentis. 150  
 Plenitudo quò ad vires non sem-  
 per tollitur vena sectione. 151  
 Plenitudo quò ad vires quomo-  
 da sanguinis missione sub  
 pestilenti caelo tollenda sit. 152  
 In Pleuritide an quandoque sit  
 secunda vena oppositi lateris. 461  
 In Pleuritide quare sectio vena  
 eiusdem lateris preferenda  
 sit sectioni oppositi lateris. 465  
 In Pleuritide an facta diminu-  
 ta vena sectione in eodem la-

1000. Præparatio materia ad  
 locum affectum. 466  
Præparatio qualitas unde ortum ha-  
 beat, & generetur. 28  
Præparatio vaporaciones pestilentes  
in quibus rebus possint diu  
conservari. 85  
Præparatio materie an sit indi-  
cium sufficiens pestilētis mor-  
bi. 166  
In Priapismo an sit inflamma-  
tiō. 508  
Pulmonis ulcerati an sit signum  
 necessarium spumosis san-  
 guis. 460  
In Puerperarum acutis morbis  
 quæ victus ratio seruanda.  
 404  
In Puerperarum acutis morbis  
 quando conueniat sectio ve-  
 na, & quando. 405  
In Puerperis an pharmacū pur-  
 gans sit administrandū. 408  
Putredo quid differat à corru-  
pitiōe. 34  
Putredinis causa efficiētes.  
 37  
Putredo maligna, & putredo  
summa differunt. 40  
Putredo maligna quæ sit. 58  
Pulsus semper additur frequen-  
tis, cum vehementer ex la-  
borat. 400

Qualitas praua non semper  
 excitatur à putredine.  
 32  
Qualitas praua inuoluitur in  
 humores, nō per putredinem,  
 sed per corruptionem. 34

R

Rabies. 339  
De Rabie tractatus an de  
beat inscribi de morbo ca-  
nis rabidi. 340  
Rabiem quæ animalia incur-  
rant. 340  
Rabies vera an sit solius canis,  
& non aliorū animalium. 340  
Rabies quare à solis canibus pri-  
mam sumpsit denominatio-  
nem. 340  
Rabiem solus canis ex Galeno  
intulxit. 340  
Rabies cur potissimum ex ani-  
malibus canis tentetur.  
 341  
Rabidi lupi caro tosta quare po-  
tuit communicare rabiem co-  
mestantibus. 344  
Rabida animalia quomodo ha-  
mini rabiem communicent.  
 345

Rabien-

# RERUM NOTAB.

Rabientis hominis signa. 345.

Et 364.

Rabies quare dicta est, et ob id ab antiquis.

Rabies quid sit.

Rabientes homines an uerum timeant aquam.

Rabidi homines an sint summe sicci.

Rabidi quandoque solida alimentera audire sunt.

Rabidi quare aquam et omnia liquida auersantur.

Rabidi quare ad oblationem et visum rerum liquidarum adaptantur.

Rabidorum virus non solum a liquidis assumptis, sed etiam oblatione, et uisus exacerbatur.

A Rabido animali commorsus si tetigerit cornu, uel sanguinem inenitabiliter rabie incurrit.

Rabidi cum deterius habent, ubi sonitum aqua audierint, uel scintillam de ea, cruciatur.

A Rabido animali commorsus dormiens sub sorbo, rabie corripitur.

Rabientes habent quoque partem vim deglutendi impe-

ditam.

Rabientes an ratione deglutitionis impedita potius debeat libere

quidam, quam solida abhorere.

Rabientes abhorrendum

nam ratione uariis similibus

Rabiei uerus caracter quid sit.

Rabidus an similis aqua sit irrationalis.

In Rabie an sit delirium.

Rabiei an coniungatur comitatio.

Rabidorum propria est dissensio membrorum.

In Rabie an sit singultus.

Rabies an consistat in inieperio calida, et sicca.

Rabiena an febris comitetur.

Rabida animalia ultra morsum an per aliam viam possint

communicare virus suum.

Rabies potest communicari per saluam ore delibutam.

Rabidus canis an possit per solum afflatum, uel per solam

contactum hominem infectare.

Rabies quare tardas post mortem

# T A B V L A

bum ad menses, & annos.

- 360 Rabies an à principijs internis possit generari in homine. 119.74
- 361 Rabiei futura signa. 363
- Rabidi an mingant urinam crassam, in qua sint carunculae, & canum imagines representantes. 368
- Rabiei signa prognostica. 365
- Rabiei praeservatio cum per mortuum communicatur. 366
- In Rabiei praeservatione an sit secunda vena. 369
- In rabiei praeservatione an purgatio tentanda. 369
- Rabiei praeservatio, cum virus per labia, & linguam fuerit communicatum. 373
- Rabiei facta curatio. 374
- In Rabie facta an balneum aquae dulcis sit remedium conveniens, & cum ratione factum. 374
- In Rabie facta an potus aquae prodesse possit. 374
- In Rabie facta quare antidoti aliquando exhibenda. 375
- In Rabie facta amulea an prodesse possint. 378
- Sanguinis stillatio è naribus qualis. 119.74
- Sanguinem in venis, & arterijs viventis hominis posse coalescere. 230
- Sanguinem in venis, & arterijs viventis hominis posse à veneno coalescere. 239
- Solatri hortensis succus, an conveniat in hydrope. 500
- Sanguis quare aliquando in venis concresecat. 239
- Sanguis extra venas quare statim concresecat. 239
- Sanguis aliquando secta vena frigidus exit. 241
- In Sanguinis sputo an conveniant refrigerantia, & adstringentia thoraci adhibita. 395
- Sanguinolentiarum excretionum quot sint species. 400
- Sanguinis evacuationes per diu rectum esse faciendas. 404
- Sanguinis grumi an ladant propria intemperie frigida. 476
- Sarmentorum viridum decoctum pro potu an conveniat in paralyysi. 422
- Sectionis venae indicatio non sumitur

mitur à qualitate succorum  
peccantium. 439

In sectione vena non tantum  
prasentium virium, sed futu-  
rarum etiam rationem habe-  
re oportet. 162

Secunda derelicta post partum  
an sit negligenda. 516

Sinapis mus quomodo rectè para-  
ri debeat. 427

Secunda putrescente exura post  
paucos dies quid successurū  
sit. 516

Somni causa. 330

In somno reservari aliquos mo-  
tus, & sensus. 330

Sphacelas quid aliquando signi-  
ficet apud Hipp. 221

Sudores quando colliquationem  
indicent, & eorum differen-  
tia, & causa. 276

Sudores in feb. pestilentibus con-  
tingentes, & earum differen-  
tia, & causa. 121

Suffusio quot modis fiat. 451

Sincope cardiaca à sanguine. 32

## T

Tetano an infantes, & pue-  
ri deprehendantur. 439

Tabes ex affectu pericardij an  
possit fieri. 256

Tussis an fiat ex intemperie ca-

lida. 457  
Tussis quomodo causetur ab in-  
temperie sicca. 458

Tussis an possit causari à lum-  
bricis. 458

Venena quæ sint. 123

Veneni naturam quādo sis-  
beat alimentum. 10

Venena omnia licet ledant cor,  
& mortem inferre possint, nō  
tamen omnia primò petunt  
cor. 44

Venenum cōmaculans cadauera  
quāle sit. 123

Venena licet non semper mor-  
tem inferant, lesionem ta-  
men notabilem inducere so-  
lent. 138

Veneni rationem habens mate-  
ria an statim pharmaco sit  
educenda, stante eius crudi-  
tate. 183

Veneno assumpto sectio vena-  
rum patientes ingulat. 159

Ventriculi erysipelatis curatio.  
482

Vermis lata generatio, & signa.  
494

Vertiginis symptoma ad quem  
morbum sequitur. 445

Vertigo,

*Vertigo, & tenebriosa vertigo  
an realiter differant.* 445

*In Vertigine quæ vena secan-*  
*da.* 447

*Vesica inflammata, an sint secan-*  
*da vena inferiores.* 506

*Vesica inflammatio quomodo à*  
*principio sit curanda.* 507

*In vesicæ inflammatione an con-*  
*ueniat applicare pubi cucur-*  
*bitulam cum scarificatione.*

*Idem.* 508

*Idem.* 509

*Idem.* 510

*Idem.* 511

*Idem.* 512

*Idem.* 513

*Idem.* 514

*Idem.* 515

*Idem.* 516

*Idem.* 517

*Idem.* 518

*Idem.* 519

*Veniens causa.* 482

*Vteri vasa an possint disrumpi*  
*ex nimio frigore.* 510

*Vteri suffocatio an consistat in*  
*ulceri retractione.* 511

*In Vteri suffocatione quare mu-*  
*lieres refrigerentur.* 512

*In Vtero generari possunt lapi-*  
*des.* 513

*Vtero inflammato an inedia per*  
*triduum conveniat.* 514

*Idem.* 515

*Idem.* 516

*Idem.* 517

*Idem.* 518

*Idem.* 519

*Idem.* 520

*Idem.* 521

*Idem.* 522

*Idem.* 523

*Idem.* 524

*Idem.* 525

*Idem.* 526









SERIES CHARTARVM.

† ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVXYZ

AA BB CC DD EE FF GG HH II KK LL.

Omnes sunt Quaterni, præter †, qui est Ternio.]



SERIES CHARACTERS.

1 ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ

AA BB CC DD EE FF GG HH II KK LL.

Omnes sunt Quatuordecim littere et quatuordecim









